

この薬は
ゼリット 15mg, 20mg
(一般名：サニルブジン、d 4 T) です
(別名：スダブジン) です

15mgカプセルは黄色と褐色の
カプセルで、識別コードは
BMS1964 です

20mgカプセルは淡褐色の
カプセルで、識別コードは
BMS1965 です

この薬の作用(ききめ)は
ウイルスの逆転写酵素を阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
1回2カプセル、1日2回、12時間ごと
食事の影響はありません

副作用について

①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい

- ・食欲がない、吐き気がする、胃・おなかの激しい痛み、背中の痛み
- ・尿の量が減る、顔や足・体がむくむ
- ・興奮状態となり、おちついてじっとしてられない、急に意識がなくなる、
- ・筋肉のだるさ ・けいれん
- ・発疹、発熱、目や粘膜のただれやびらん
- ・手足のしびれ、痛み

②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
なるべく早めに主治医に連絡して下さい

- ・胃腸症状(吐き気、下痢、食欲不振)
- ・悪寒、発熱、頭痛、腹痛、体がだるい
- ・咳が出る
- ・糖尿病、高脂血症、高血糖
- ・腕や脚が細くなる、頬がこける

③他にも何か変だなと感じたら、
すぐに主治医か薬剤師に相談して下さい

伝え忘れたことはありませんか
(次のことに心あたりのある方は、
主治医にその旨を伝えて下さい)

- ・手足のしびれ、痛みがある方。
あるいは、その経験のある方。
- ・肝臓の病気のある方。
- ・じん臓の病気のある方。
- ・すい臓の病気で治療中の方。
あるいは、その経験のある方。

この薬の価格は

15mg : ¥491.7	30日分 : ¥59,004
20mg : ¥494.7	30日分 : ¥59,364

連絡先

〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
大阪医療センター 薬剤部
TEL 06-6942-1331 内線2122

ゼリット 2006.4作成

この薬は
ヴァイデックスEC 125mg, 200mg
(一般名：ジダノシン、d d I) です

125mgカプセルは白色のカプセルで
識別コードは
6671 BMS125mgです

200mgカプセルは白色のカプセルで
識別コードは
6672 BMS200mgです

この薬の作用(ききめ)は
ウイルスの逆転写酵素を阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
1回2カプセル、1日1回、食間におのみ下さい

使い方の注意

- ・腸で溶けるようにコーティングされた顆粒が、カプセルに詰められています。食後に服用すると吸収が低下します。食間(食後2時間～2時間半)におのみ下さい。
- ・カプセルをはずして中身だけをのむと、胃に届くまでに溶け出す可能性があります。

副作用について①

①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい

- ・食欲がない、吐き気がする、胃・おなかの激しい痛み、背中の痛み
- ・だるい、皮膚や白目が黄色くなる
- ・興奮状態となり、おちついてじっとしてられない、けいれん
- ・筋肉のだるさ ・けいれん
- ・暗い場所で目が見えにくい、筋肉痛、息苦しい

副作用について②

②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
なるべく早めに主治医に連絡して下さい

- ・胃腸症状(腹痛、下痢、吐き気、便秘、口内炎、口が渇く、食欲不振、食欲亢進)
- ・手足のしびれ・痛み、頭痛、眠れない、気分が落ちこむ、めまい、眠い、発疹、かゆみ、皮膚が赤くなる、悪寒、発熱、体がだるい、尿の回数が増える
- ・筋肉痛、関節が痛い、筋力が低下する、息切れ、咳、目が見えにくい、顔が赤くなる、脈が乱れる
- ・脱毛、耳の痛み、変な味がする
- ・腕や脚が細くなる、頬がこける、胸や体や肩に脂肪がつく

③他にも何か変だなと感じたら、
すぐに主治医か薬剤師に相談して下さい

伝え忘れたことはありませんか
(次のことに心あたりのある方は、
主治医にその旨を伝えて下さい)

- ・膝臓の病気で治療中かその経験のある方
- ・手足のしびれ、痛みがある方。
あるいは、その経験のある方。
- ・肝臓やじん臓の病気のある方。

その他の注意

併用に注意するクスリ

ベンゾジピン系薬、アルコール
スルホニルミド系糖尿病用剤：グリブアゼ
抗結核抗生物質：リファジン、ストレptomycin
H2受容体拮抗剤：カスター、クマメト、サンタック
副腎皮質ステロイド剤：プレドニソン、リンデロン等
アミノグリコシド系抗菌薬を含む制酸剤：
酸化マグネシウム、マロックス、アルパミン等
プロテアーゼ阻害剤 ザルシバリン・ハイビット
カンジタゾール・ナフチン リバピリン・レバトール

この薬の価格は

125mg : ¥1,189.9	30日分 : ¥ 71,394
200mg : ¥1,873.9	30日分 : ¥112,434

ヴァイデックスEC 2006.4作成

この薬は
ハイビッド 0.375mg
 (一般名:ザルビドク)
 別名:ジテリンジソン、ddC)です
 淡赤灰色の錠剤です
 識別のためのコードは
 HIVID 0.375 です

この薬の作用(ききめ)は
 ウイルスの逆転写酵素を阻害して
 増殖をおさえます

この薬の飲み方は
 1回2錠、1日3回、8時間ごと
 食事の影響はありません

副作用について
 ①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
 すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
 ・手足のしびれ、いたみ
 ・けいれん、幻覚、興奮状態となりじっと
 おちついていられない
 ・みぞおちがいたい、胸やけがする
 ・食欲がない、吐き気がする、背中
 の痛み、胃・おなかのはげしいいたみ
 ・筋肉のだるさ
 ・けいれん
 ・皮膚や白目が黄色くなる、顔や手足のむく
 み、尿量が減る、耳が聞こえにくい
 ②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
 なるべく早めに主治医に連絡して下さい
 ・頭痛、口内炎、吐き気がする、腹痛、
 下痢、便秘
 ・発しんやかゆみがある
 ・のどの痛み、発熱、体がだるい、
 顔やまぶたのうらがあお白い、
 歯ぐきや鼻血など出血しやすい、
 あおあざができる、のどがかわく
 ・筋肉のいたみ、関節のいたみ
 ・発熱、疲れやすい
 ・腕や脚が細くなる、頬がこける
 ③他にも何か変だなと感じたら、
 すぐに主治医か薬剤師に相談して下さい

伝え忘れたことはありませんか
 (次のことに心あたりのある方は、
 主治医にその旨を伝えて下さい)
 ・手足のしびれ、痛みがある方。
 あるいは、その経験のある方。
 ・CD4リン球数が50/mm³未満の方。
 ・すい臓の病気で治療中の方。
 あるいは、その経験のある方。
 ・肝臓の病気のある方。
 ・じん臓の病気のある方。
 ・心臓の病気のある方。
 ・ベンガジン(ベナハックス)を使っている方。

その他の注意
 併用を避けるクスリ
 ベンガジン:ベナハックス
 併用に注意するクスリ
 クロムフェニール:クロマイテン
 シスプラチン:ランガ、アリプラチン
 ジスルフィラム:ナクベリン エチマド:ツベルミン
 金製剤:シオザール、リトール等
 ビタミンB12:アプレリン等
 イソニアジド:イソチン トロネダゾール:フリンゴール等
 フェニトイン:アレビアチン、ヒガンツール
 ビンクリチン:オンコピン シメジソン:カガメト等
 アムピシリン:ファンギゾン等
 プロベネド:プロベネド
 アルブミン又はマグネシウムを含む製剤:
 酸化マグネシウム、マロックス、アガリニン等
 ジンダリン:ヴァイテックス
 ラミブジン含有製剤:エビビル、ゼフィックス
 アミグロビト系抗生物質:アミカシ、トブラシン等

この薬の価格は
 1錠: ¥696.4 30日分: ¥125,352

連絡先
 〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
 大阪医療センター 薬剤部
 TEL 06-6942-1331 内線2122

ハイビッド 2006.4作成

この薬は
ザイアジェン 300mg
 (一般名:アバカビル、ABC)です
 黄色の錠剤です
 識別のためのコードは
 GX623 です

この薬の作用(ききめ)は
 ウイルスの逆転写酵素を阻害して
 増殖をおさえます

この薬の飲み方は
 1回2錠、1日1回、24時間ごと、または、
 1回1錠、1日2回、12時間ごと
 食事の影響はありません

使い方の注意
 ・過去にザイアジェンを服用し、発疹等の
 過敏症状が出た経験のある方は、
 再度服用することを絶対に避けて下さい

副作用について
 ①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
 すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
 ・発疹、熱が出る、吐き気がする、
 体が痛い
 (服薬開始6週間以内、平均11日目に発現)
 ・筋肉のだるさ
 ②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
 なるべく早めに主治医に連絡して下さい
 ・吐き気がする、下痢、胸やけ、
 胃のもたれ
 ・疲れやすい、熱が出る、頭が痛い
 ・眠い
 ・のどの痛み、せき
 ③他にも何か変だなと感じたら、
 すぐに主治医か薬剤師に相談して下さい

次のような場合は、直ちに担当医師に連絡
 し、服用を中止するべきかどうか指示を受
 けて下さい。
 ①発疹が起こった場合
 ②下記の4つのグループのうち、2つ以上の
 グループにあてはまる症状が起こった場合
 ・発熱
 ・吐き気、嘔吐、下痢、腹痛
 ・眠気、倦怠感、筋肉や関節の痛み、頭痛
 ・息切れ、のどの痛み、せき

伝え忘れたことはありませんか
 (次のことに心あたりのある方は、
 主治医にその旨を伝えて下さい)
 ・肝臓の病気のある方

その他の注意
 併用に注意するクスリ:エタノール

この薬の価格は
 1錠: ¥999.6 30日分: ¥59,976

連絡先
 〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
 大阪医療センター 薬剤部
 TEL 06-6942-1331 内線2122

ザイアジェン 2006.4作成

この薬は
エブジコム (ABC/3TC:600mg/300mg)
 (アバカビルABCとラミブジン3TCの配合剤: E2C)
 だいたい色の錠剤です
 識別のためのコードは
 GS FC2 です



この薬の作用(ききめ)は
 ウイルスの逆転写酵素を阻害して
 増殖をおさえます

この薬の飲み方は
 1回1錠、1日1回、24時間ごと
 食事の影響はありません

使い方の注意
 ・過去に本剤又はザイアジェン錠を服用し
 発疹等の過敏症状が出た経験のある方は
 再度服用することを絶対に避けて下さい
 ・B型慢性肝炎のある方は、この薬を中止
 する前に、必ず医師に相談して下さい。

副作用について
 ①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
 すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
 ・発疹、熱が出る、吐き気がする、
 体が痛い
 (服薬開始6週間以内、平均11日目に発現)
 ・からだがだるい、疲れやすい、
 顔やまぶたのうらが白っぽいい、
 出血しやすい、あおあざができる
 ・運動や動作時に息切れがする、顔や体が
 むくむ、筋肉のだるさ、けいれん
 ②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
 なるべく早めに主治医に連絡して下さい
 ・吐き気がする、下痢、胸やけ、胃もたれ
 ・疲れやすい、熱が出る、頭が痛い、眠い
 ・のどの痛み、せき、頭痛、体がだるい
 ③他にも何か変だなと感じたら、
 すぐに主治医か薬剤師に相談して下さい

次のような場合は、直ちに担当医師に連絡
 し、服用を中止するべきかどうか指示を受
 けて下さい。
 ①発疹が起こった場合
 ②下記の4つのグループのうち、2つ以上の
 グループにあてはまる症状が起こった場合
 ・発熱
 ・吐き気、嘔吐、下痢、腹痛
 ・眠気、倦怠感、筋肉や関節の痛み、頭痛
 ・息切れ、のどの痛み、せき

伝え忘れたことはありませんか
 (次のことに心あたりのある方は、
 主治医にその旨を伝えて下さい)

・B型慢性肝炎のある方、
 あるいはその経験のある方
 ・すい臓の病気で治療中の方
 ・じん臓の病気のある方
 ・肝臓の病気のある方

その他の注意
 ・B型慢性肝炎の方がこの薬を中止すると、
 肝炎が再度悪化するおそれがあります。
 この薬を中断する場合は、医師に相談して
 下さい。

併用に注意するクスリ
 スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合剤:パック
 エタノール

この薬の価格は
 1錠: ¥3,916.6 30日分: ¥117,498

連絡先
 〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
 大阪医療センター 薬剤部
 TEL 06-6942-1331 内線2122

エブジコム 2006.4作成

この薬は
ピリアード 300mg
 (一般名: フマル酸テノホビルジツブ、
 TDF) です
 青色のフィルムコート錠です
 識別のためのコードは
 GILEAD4331-300 です



この薬の作用(ききめ)は
 ウイルスの逆転写酵素を阻害して
 増殖をおさえます

この薬の飲み方は
 1回1錠、1日1回、24時間ごと
 食事の影響はありません

副作用について
 ①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
 すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
 ・血尿、脇腹の痛み、顔や足、体がむくむ
 ・食欲がない、吐き気がする、胃・おなか
 の激しい痛み、背中の痛み
 ・筋肉のだるさ
 ②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
 なるべく早めに主治医に連絡して下さい
 ・吐き気がする、下痢、おなかが張る
 ・からだがだるい、頭が痛い
 ③他にも何か変だなと感じたら、
 すぐに主治医か薬剤師に相談して下さい

伝え忘れたことはありませんか
 (次のことに心あたりのある方は、
 主治医にその旨を伝えて下さい)
 ・B型慢性肝炎のある方、
 あるいはその経験のある方。
 ・じん臓の病気のある方、
 あるいはその経験のある方。

その他の注意
 ・B型慢性肝炎の方がこの薬を中止すると、
 肝炎が再度悪化するおそれがあります。
 この薬を中断する場合は、医師に相談して
 下さい。

併用に注意するクスリ
 ジンダノンリファブレン
 硫酸アザノール
 アシクロビル、ガバペンシリン、
 ・ゾピリックス、バルレックス、デノン等


この薬の価格は
 1錠: ¥2,048.9 30日分: ¥61,467

連絡先
 〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
 大阪医療センター 薬剤部
 TEL 06-6942-1331 内線2122

ピリアード 2006.4作成

この薬は
エムトリバ 200mg
 (一般名: エムトリシビン, FTC) です

青色と白色のカプセルです
 識別のためのコードは
 GILEAD-200mg です



この薬の作用 (ききめ) は
 ウイルスの逆転写酵素を阻害して
 増殖をおさえます

この薬の飲み方は
 1回1錠、1日1回、24時間ごと
 食事の影響はありません

副作用について

①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
 すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい

- ・食欲がない、吐き気がする、胃・おなかの激しい痛み、背中
 の痛み

②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
 なるべく早めに主治医に連絡して下さい

- ・下痢、めまい、吐き気がする
- ・おなかが痛い、頭が痛い
- ・眠れない

③他にも何か変だなと感じたら、
 すぐに主治医か薬剤師に相談して下さい

伝え忘れたことはありませんか
 (次のことに心あたりの方は、
 主治医にその旨を伝えて下さい)

- ・ B型慢性肝炎のある方、
 あるいはその経験のある方。

その他の注意

- ・ B型慢性肝炎の方がこの薬を中止すると、
 肝炎が再度悪化するおそれがあります。
 この薬を中断する場合は、医師に相談して
 下さい。

併用を避けるクスリ
 ラミブジン含有製剤: エビビル、コンビビル


この薬の価格は
 1錠: ¥1,619.8 30日分: ¥48,594

連絡先
 〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
 大阪医療センター 薬剤部
 TEL 06-6942-1331 内線2122

エムトリバ[®] 2006.4作成

この薬は
ツルパダ (TDF/FTC:300mg/200mg)
 (テノビル/TDFとエムトリシビン/FTCの配合剤: TVD)
 です

青色のフィルムコーティング錠です
 識別のためのコードは
 GILEAD-701 です



この薬の作用 (ききめ) は
 ウイルスの逆転写酵素を阻害して
 増殖をおさえます

この薬の飲み方は
 1回1錠、1日1回、24時間ごと
 食事の影響はありません

副作用について

①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
 すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい

- ・血尿、脇腹の痛み、顔や足、体がむくむ
- ・食欲がない、吐き気がする、胃・おなか
 の激しい痛み、背中
 の痛み
- ・筋肉のだるさ

②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
 なるべく早めに主治医に連絡して下さい

- ・吐き気がする、下痢、おなかが張る
- ・おなかが痛い、
- ・からだのだるい
- ・めまい、頭が痛い、眠れない

③他にも何か変だなと感じたら、
 すぐに主治医か薬剤師に相談して下さい

伝え忘れたことはありませんか
 (次のことに心あたりの方は、
 主治医にその旨を伝えて下さい)

- ・ B型慢性肝炎のある方、
 あるいはその経験のある方。
- ・ じん臓の病気のある方、
 あるいはその経験のある方。

その他の注意

- ・ B型慢性肝炎の方がこの薬を中止すると、
 肝炎が再度悪化するおそれがあります。
 この薬を中断する場合は、医師に相談して
 下さい。

併用を避けるクスリ
 ジクパソク/ワテックス
 硫酸アザナビル/レイタック
 アシクロビル/ラシクロビル/ガソシクロビル等
 :ゾビラックス/バルトレックス/デノソク等
 ラミブジン含有製剤: エビビル、コンビビル

この薬の価格は
 1錠: ¥3,834.4 30日分: ¥115,032

連絡先
 〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
 大阪医療センター 薬剤部
 TEL 06-6942-1331 内線2122

ツルパダ[®] 2006.4作成

この薬は
ビラミューン 200mg
(一般名：ネビラピン、NVP) です
白色だ円形の錠剤です
識別のためのコードは
54 193 です

この薬の作用(ききめ)は
ウイルスの逆転写酵素を阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
1回1錠、1日2回、12時間ごと
食事の影響はありません
第1週～第2週目：1日1回
第3週目以降：1日2回

副作用について
①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
・発疹、皮膚が焼けるように熱い、
皮膚が痛い、唇や口の中がただれる
・食欲がない、吐き気がする、皮膚や白目
が黄色くなる
②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
なるべく早めに主治医に連絡して下さい
・発しん(概ね18週までに、重篤な発疹は
6週までにあらわれることが多い)
・体がだるい、疲れやすい、発熱
・ねむい
③他にも何か変だなと感じたら、
すぐに主治医か薬剤師に相談して下さい

この薬は
ストックリン 200mg
(一般名：エファビレンツ、EFV) です
暗黄色のカプセルです
識別のためのコードは
3809です

この薬の作用(ききめ)は
ウイルスの逆転写酵素を阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
1回3カプセル、1日1回
食事の影響はありません

使い方の注意
・自動車の運転や機械の操作等には、十分
ご注意ください。
・高脂肪食(1070Kcal、脂肪82g、カロリーの69%
が脂肪由来)摂取後の服薬で吸収が上昇
したとの報告があります。ご注意ください。

副作用について
①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
・発疹、皮膚が焼けるように熱い、
皮膚が痛い、唇や口の中がただれる
・食欲がない、吐き気がする、皮膚や白目
が黄色くなる
②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
なるべく早めに主治医に連絡して下さい
・頭が痛い、かぜの様な症状があらわれる、
体が痛い、下痢、胸やけ、胃のもたれ
・めまい、ふらつき、眠れない、
集中できない、疲れやすい、
現実感のある夢を見る
・発しん(服用開始7～13日後特に注意)
・乳房のしこり、痛み、はれ
③他にも何か変だなと感じたら、
すぐに主治医か薬剤師に相談して下さい

伝え忘れたことはありませんか
(次のことに心あたりの方は、
主治医にその旨を伝えて下さい)
・肝臓の病気のある方。
・じん臓の病気のある方。

その他の注意
併用を避けるクスリ
経口避妊薬
併用に注意するクスリ
シメチジン：カブメト、ラルファリン：ワフアルン
マクロライド系抗生物質：クラリス、メイワット、リカマイシン、
ジヨマイシン等
イトロガゾール：イトリゾール
リファンビシン：リファジン
リアファチン(国内未発売)
プロテアーゼ阻害剤
セイヨウトキリウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品
上記の薬剤以外に、肝代謝酵素(P-450)に
よって代謝される薬剤との間で、相互作用
のおこる可能性があります。詳しくは医師
・薬剤師にご相談下さい。
CD4値が高い場合、肝機能障害の発現率が
高い(女性：250/mm³、男性：400/mm³以上)。
女性は本剤による発疹や肝機能障害の発現
率が高い。

この薬の価格は
1錠：¥1,002.1 30日分：¥60,126

連絡先
〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
大阪医療センター 薬剤部
TEL 06-6942-1331 内線2122

ビラミューン 2006.4作成

その他の注意
併用を避けるクスリ
テルフェジン：トリルガソ、アステミゾール：ヒスマナール
シオブリト：アセナリン、リサモール、トリアゾラム：ハルシオン
メシル酸エロコクタミン：シヒテルコット
酒石酸エロコクタミン：カフェルコット
ミダゾラム：ドルミカム
併用に注意するクスリ
リファンビシン：リファジン
リアファチン(国内未発売)
クラリスロマイシン：クラリス、クラリット
プロテアーゼ阻害剤
経口避妊薬
セイヨウトキリウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品
上記の薬剤以外に、肝代謝酵素(P-450)に
よって代謝される薬剤との間で、相互作用
のおこる可能性があります。詳しくは医師
・薬剤師にご相談下さい。

この薬の価格は
1錠：¥665.4 30日分：¥59,886

連絡先
〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
大阪医療センター 薬剤部
TEL 06-6942-1331 内線2122

ストックリン 2006.4作成

この薬は
レスクリプター 200mg
(一般名: *メシル酸デレキサール*, DLV) です
白色～灰白色のフィルムコート錠で
識別のためのコードは
RESCRIPTOR 200mgです

この薬の作用(ききめ)は
ウイルスの逆転写酵素を阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
1回2錠、1日3回、食事の影響はありません

使い方の注意
・酸化マグネシウムや炭酸水素ナトリウム等の制酸剤
と併用する場合は服用間隔を1時間以上
あけて下さい。

副作用について
①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
・発疹、皮膚が焼けるように熱い、皮膚が
痛い、唇や口の中がただれる
・胃がいたい、便が黒くなる、吐血、下血
・皮膚や白目が黄色くなる
・食欲がない、吐き気がする、背中痛み、
胃・おなかのはげしい痛み
・からだがだるい、疲れやすい、顔やまぶ
たのうらが白っぽい、出血しやすい、
あおざがができる
・興奮状態となりじっとおちついていられ
ない
・手足のしびれ
②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
なるべく早めに主治医に連絡して下さい
・頭が痛い、疲れやすい、
・吐き気がする、下痢
・発しん(服用開始7～13日後特に注意)
③他にも何か変だなと感じたら、
すぐに主治医か薬剤師に相談して下さい

伝え忘れたことはありませんか
(次のことに心あたりのある方は、
主治医にその旨を伝えて下さい)
・肝臓の病気のある方。

その他の注意
併用を避けるクスリ
リファブチン/リファジン
併用に注意するクスリ
フェノバルビタル/フェノバル フェニトイン/アレビアチン
カルバマゼピン/テグレトール リルアリリン/ワーアリリン
Ca拮抗剤: アグアート等 シルベスタット/リスモグアン
アミオロン/アンカソル メタフェキサミン
クラリスロマイシン/クラリシット、クラリス キニジン
アルブアララム/コンスタック トリアゾラム/ハルシオン
ミダゾラム/ドルミカム シルデナフィル/バイグラ
リファブチン(国内未発売) プロテアーゼ阻害剤
H₂受容体拮抗剤: カスター等
ジグザン/ウァイテックス
プロトンポンプ阻害剤: クアロン等
アミノウム/マグネシウム含有制酸剤
セロイオキリウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品
上記の薬剤以外に、肝代謝酵素(P-450)に
よって代謝される薬剤との間で、相互作用
のおこる可能性があります。詳しくは医師
・薬剤師にご相談下さい。

この薬の価格は
1錠: ¥338.9 30日分: ¥61,002

連絡先
〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
大阪医療センター 薬剤部
TEL 06-6942-1331 内線2122

レスクリプター 2006.4作成

この薬は
クリキシパン 200mg
(一般名: *硫酸インジナビル*, IDV) です
白色のカプセルです
識別のためのコードは
CRIXIVAN 200mg です

この薬の作用(ききめ)は
ウイルスのプロテアーゼを阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
1回4カプセル、1日3回
食間におのみ下さい

使い方の注意
・このカプセルは高カロリー、高脂肪、高たんぱく食を
食べた後にのみむと、吸収が80%悪くなります。
空腹時(食事の1時間以上前又は
食後2時間以降)に水、脱脂乳、ジュース、
コーヒー、お茶でおのみください。
なお、バターなしトーストやコンブレックなどの
軽食はさしつかえありません。
・このカプセルによる腎結石を予防するため、
通常の生活でのみ水分に加え、1日に少
なくとも1.5リットルの水分をおのみ下さい。
・酸化マグネシウムや炭酸水素ナトリウム等の制酸剤
と併用する場合は服用間隔を1時間以上
あけて下さい。
・容器のキャップを開ける際は、キャップ部を押
し込みながら逆時計方向へ回して下さい。
閉める際は、時計方向に回して最後
までしっかりと閉めて下さい。
・このカプセルは吸湿性があります。専用の容
器に入れ常に乾燥剤を入れるなどして保
管して下さい。なお、添付の容器はふた
に乾燥剤が入っています。
必要に応じ、小分けの際にご利用下さい。

副作用について
①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
・血尿、脇腹の痛み、顔や足、体がむくむ
・食欲がない、吐き気、皮膚や白目が黄色くなる
・体がだるい、顔やまぶたのうらが白っぽい
・あおざがができる、出血しやすい、発疹、皮膚
が焼けるように熱い、唇や口の中がただれる
・口やのどがかわく、尿量がおえる
②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
なるべく早めに主治医に連絡して下さい
胃腸症状(吐き気、下痢、腹痛、口が渇く、食
欲不振)、つかれやすい、ざらざらした尿が出
る、頭痛、めまい、不眠、発しん、皮膚が乾燥
する、かゆみ、手足の痛み・しびれ、苦い味が
する、おなかが出てくる、腕や脚が細くなる、
出血しやすい(血友病患者)

その他の注意
併用を避けるクスリ
テラフェシジン/トリルグアン アズミゾール/ヒスマール
シブプロリン/アセリン/リチモール トリアゾラム/ハルシオン
シグザラム/ドルミカム アルブアララム/コンスタック
ビモスト/オラップ リファブチン/リファジン
メシル酸デレキサール/レスクリプター アゼホジピン/カバロック
酒石酸エタコタミン/カフェロラット
臭化水素酸エタコラット/レバテックス
併用に注意するクスリ
ジグザン/ウァイテックス プロテアーゼ阻害剤
リファブチン(国内未発売) エファベレンツ/ストックリン
イトラコナゾール/イトリゾール ミコナゾール/フロリトールF
フェノバルビタル/フェノバル フェニトイン/アレビアチン
カルバマゼピン/テグレトール ティンチカリン/デカドロン
シルデナフィル/バイグラ Ca拮抗剤: アグアート等
セロイオキリウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品
上記の薬剤以外に、肝代謝酵素(P-450)によ
って代謝される薬剤との間で、相互作用のおこ
る可能性があります。医師・薬剤師にご相談下さい。

この薬の価格は
1カプセル: ¥118.1 30日分: ¥42,516

クリキシパン 2006.4作成

この薬は
インビラーゼ 200mg
(一般名: 核酸ポリペリド, SQV) です
緑色と淡褐色のカプセルです
識別のためのコードは
ROCHE 0245 です

この薬の作用(ききめ)は
ウイルスのプロテアーゼを阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
1回3カプセル、1日3回
食後2時間以内におのみください

使い方の注意
・このクスリは空腹時にのみと吸収が悪く
なります。
・酸化マグネシウムや炭酸水素ナトリウム等の制酸剤
と併用する場合は服用間隔を1時間以上
あけて下さい。

副作用について①
①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
・手足のしびれ、幻覚、けいれん、
興奮状態となりじっとおちついていられ
ない
・食欲がない、吐き気がする、背中
の痛み、胃・おなかのはげしい痛み
・手足の血管がはれる
・のどの痛み、発熱、体がだるい、顔
やまぶたのうらがあお白い、歯ぐき
や鼻血など出血しやすい、あおあざ
ができる
・発疹、皮膚が焼けるように熱い、
皮膚が痛い、唇や口の中がただれる
・皮膚や白目が黄色くなる
・脇腹のいたみ、尿に血がまじる
・のどがかわく、体がだるい

副作用について②
②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
なるべく早めに主治医に連絡して下さい
・頭痛、めまい、しびれ
・口内炎、下痢、腹痛、吐き気
・脱力感、ひどい空腹感、冷汗、動悸
・体のふしづしがいたい
・おなかが出てくる、腕や脚が細くなる
・出血しやすい(血友病患者)

その他の注意
併用を避けるクスリ
リファブチン: リファブチン テルフェシジン: トリルガン
アステミール: ヒスマール シブプリド: アセリン等
シブプリド: トルカム トリアゾラム: ハルシオン
ビモジド: オーラップ
併用に注意するクスリ
フェノバルビタール: フェノバル フェニトイン: アレブアチン
デキメタキソン: デキサメトロン カルバマゼピン: テグレート
Ca拮抗剤: アムロジウム等 ジソピラミド: リスモタン
キノネ キニジン アミオダロン: アンカロン
テチジン: サンタック リルファリン: ワーファリン
シクロスポリン: ネオラル、サンテ イミムン エルコクサン製剤
クロロリス: プロクラー エリスロマイシン: アイロキシン等
フエンタール: フエンタネスト アルブトラゾラム: コンスタン
シンバスタチン: リボバ ミコナゾール: フロリードF
イトラゾール: イトリゾール フルコナゾール: シブアルカン
クラシロマイシン: クラリシッド、クラリス等
プロテアーゼ阻害剤 シルデナフィール: バイアグラ
アシクロマイシン: シシロマック
キヌプリルチン: カルボプリルチン: シナシッド
非ヌクレオチド系逆転写酵素阻害剤
ニコチン成分含有製品 グレープフルーツジュース
セイヨウトチリ(セント・ジョンズ・ワート) 含有食品
上記の薬剤以外に、肝代謝酵素(P-450)に
よって代謝される薬剤との間で、相互作用
のおこる可能性があります。詳しくは医師
・薬剤師にご相談下さい。

この薬の価格は
1カプセル: ¥168.9 30日分: ¥45,603
インビラーゼ 2006.4作成

この薬は
フォートベイス 200mg
(一般名: サキナビル, SQV) です
淡黄赤色の軟カプセルです
識別のためのコードは
ROCHE 0246 です

この薬の作用(ききめ)は
ウイルスのプロテアーゼを阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
1回6カプセル、1日3回、食後におのみ下さい

使い方の注意
・食事をとらずに服用すると吸収率が低下します
必ず食後におのみください。
・冷蔵庫(2~8℃)で保存して下さい。
・持ち歩きに携帯する分に差し支えありません。
・酸化マグネシウムや炭酸水素ナトリウム等の制酸剤
と併用する場合は服用間隔を1時間以上
あけて下さい。

副作用について①
①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
・手足のしびれ、幻覚、けいれん、
興奮状態となりじっとおちついていられ
ない
・食欲がない、吐き気がする、背中
の痛み、胃・おなかのはげしい痛み
・手足の血管がはれる
・のどの痛み、発熱、体がだるい、顔
やまぶたのうらがあお白い、歯ぐき
や鼻血など出血しやすい、あおあざ
ができる
・発疹、皮膚が焼けるように熱い、
皮膚が痛い、唇や口の中がただれる
・皮膚や白目が黄色くなる
・脇腹のいたみ、尿に血がまじる
・のどがかわく、体がだるい

副作用について②
②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
なるべく早めに主治医に連絡して下さい
・頭痛、めまい、しびれ
・口内炎、下痢、腹痛、吐き気
・脱力感、ひどい空腹感、冷汗、動悸
・体のふしづしがいたい
・おなかが出てくる、腕や脚が細くなる
・出血しやすい(血友病患者)

その他の注意
併用を避けるクスリ
リファブチン: リファブチン テルフェシジン: トリルガン
アステミール: ヒスマール シブプリド: アセリン等
シブプリド: トルカム トリアゾラム: ハルシオン
ビモジド: オーラップ
併用に注意するクスリ
フェノバルビタール: フェノバル フェニトイン: アレブアチン
デキメタキソン: デキサメトロン カルバマゼピン: テグレート
Ca拮抗剤: アムロジウム等 ジソピラミド: リスモタン
キノネ キニジン アミオダロン: アンカロン
テチジン: サンタック リルファリン: ワーファリン
シクロスポリン: ネオラル、サンテ イミムン エルコクサン製剤
クロロリス: プロクラー エリスロマイシン: アイロキシン等
フエンタール: フエンタネスト アルブトラゾラム: コンスタン
シンバスタチン: リボバ ミコナゾール: フロリードF
イトラゾール: イトリゾール フルコナゾール: シブアルカン
クラシロマイシン: クラリシッド、クラリス等
プロテアーゼ阻害剤 シルデナフィール: バイアグラ
アシクロマイシン: シシロマック
キヌプリルチン: カルボプリルチン: シナシッド
非ヌクレオチド系逆転写酵素阻害剤
ニコチン成分含有製品 グレープフルーツジュース
セイヨウトチリ(セント・ジョンズ・ワート) 含有食品
上記の薬剤以外に、肝代謝酵素(P-450)に
よって代謝される薬剤との間で、相互作用
のおこる可能性があります。詳しくは医師
・薬剤師にご相談下さい。

この薬の価格は
1カプセル: ¥82.0 30日分: ¥44,280
フォートベイス 2006.4作成

この薬は
ビラセプト 250mg
(一般名：メシル酸ネルフィナビル) です
青色の細長い
フィルムコート錠です
識別のためのコードは
VIRACEPT 250mgです

この薬の作用(ききめ)は
ウイルスのプロテアーゼを阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
1回5錠、1日2回または、1回3錠、1日3回
食後2時間以内におのみください

使い方の注意
・このクスリは食事をとらずに服用すると、吸収率が50%以下になります。
・酸化マグネシウムや炭酸水素ナトリウム等の制酸剤と併用する場合は服用間隔を1時間以上あけて下さい。

副作用について
①次の症状に気づいたら、のむのを止めてすぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
・のどがかたく、体がだるい
②次の症状がひどかったり、長く続く時は、なるべく早めに主治医に連絡して下さい
・体がだるい、頭がいたい
・下痢、お腹がはる、吐き気がする、お腹痛い、食欲不振、消化不良
・めまい、気分が落ち込む、イライラする
・発しん(服用開始7～13日後特に注意) 体がかゆい
・手足がチクチク痛い、手足のしびれ
・おなかが出てくる、腕や脚が細くなる
・出血しやすい(血友病患者)
③他にも何か変だなと感じたら、すぐに主治医か薬剤師に相談して下さい

その他の注意
併用を避けるクスリ
リファンビシム：リファジン ショブリト：アセチン、リサモール
テルフェナジン：トリルガン(国内未発売)
ミダゾラム：ドルミカム トリアゾラム：ハルシオン
アルブゾラム：コンスタン、ソナックス
塩酸アマギロン：アソカロン バック誘導体
硫酸キノシン ビモント：オーラップ
臭化水素酸エトトリブチン：レムバックス

併用に注意するクスリ
プロテアーゼ阻害剤 リファブチン(国内未発売)
エチルエステル：オールプロセキナール
ノルエチステロン：ノルチンロロン(国内未発売)
フェニバルビタール：フェニバル フェントイン：アルビアチン
カルバマゼピン：テグレート シルデナフィール：バイアグラ
デラベギルミン：レスクリプター シンバスタチン：リボバース
アルバスタチン：リビトール タクロリムス：プログレア
シクロスポリン：サンテイムン アジスロマイシン：ジスロマック
セイウオキトリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品

上記の薬剤以外に、肝代謝酵素(P-450)によって代謝される薬剤との間で、相互作用のおこる可能性があります。詳しくは医師・薬剤師にご相談下さい。

この薬の価格は
1錠：¥161.9
30日分：48,570(10錠/日)
43,713(9錠/日)

連絡先
〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
大阪医療センター 薬剤部
TEL 06-6942-1331 内線2122

ビラセプト 2006.4作成

この薬は
ノービア 100mg
(一般名：リトナビル、RTV)
白色のカプセルです
識別のためのコードは
DS100です

この薬の作用(ききめ)は
ウイルスのプロテアーゼを阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
他のプロテアーゼ阻害剤と併用されます
1回1～2カプセル、1日1～2回、12時間ごと

使い方の注意
・冷蔵庫に入れ凍結を避けて保存して下さい。ただし、持ち歩きに携帯する分にはさしつかえありません。
・酸化マグネシウムや炭酸水素ナトリウム等の制酸剤と併用する場合は服用間隔を1時間以上あけて下さい。
・6カプセル中に、ビール約15ml分のアルコールが含まれています。

副作用について
①次の症状に気づいたら、のむのを止めてすぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
・けいれん、興奮状態となりじっとおちついていられない
・のどが渇く、体がだるい、尿量が増える
・皮膚や白目が黄色くなる
・発疹、皮膚が焼けるように熱い、皮膚が痛い、唇や口の中がただれる
②次の症状がひどかったり、長く続く時は、なるべく早めに主治医に連絡して下さい
・胸やけ、胃のもたれ
・出血しやすい(血友病患者)

その他の注意
併用を避けるクスリ
アンビロキサム：フルカム ショブリト：アセチン、リサモール
エタナセプトリン：シヒルコット、カエルクット
テルフェナジン：トリルガン アステミザール：ヒスナール
トリアゾラム：ハルシオン 硫酸キノシン
塩酸ペパリン：ペパリコル 塩酸プロパフェノプロロン
塩酸アマギロン：アソカロン ビモント：オーラップ
酢酸フルカニト：リボコール リファブチン(国内未発売)
ジアセパム：セカソリン、リザン クロザピド酸二カリウム：ミトドン
ビロキサム：フェルテン エスタゾラム：ユーロジン
フルアセパム：カールト、イヌシ ミダゾラム：ドルミカム

併用に注意するクスリ
フェントイン：アルビアチン Ca拮抗剤：アガラト等
リファンビシム：リファジン リファンビシム：リファジン
シクロスポリン：サンテイムン等 タクロリムス水和物：プログレア
シンバスタチン：リボバース クエン酸サモキシフェン：ノルバテックス
イトラナール：イトリザール
クラリスロマイシン：クラリシッド、クラリス シルデナフィール：バイアグラ
メトロンイミダゾール：フラジール カバコ
非スクロシト系逆転写酵素阻害剤 プロテアーゼ阻害剤
セイウオキトリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品
上記の薬剤以外に、肝代謝酵素(P-450)によって代謝される薬剤との間で、相互作用のおこる可能性があります。医師・薬剤師にご相談下さい。

この薬の価格は
1カプセル：¥125.2
30日分：3,756(1カプセル/日)
7,512(2カプセル/日)

ノービア 2006.4作成

この薬は
レクシヴァ 700mg
(一般名:ホスファブドビル
加水合物:FPV)です
淡紅色の錠剤です
識別コードは GXLL7 です

この薬の作用(ききめ)は
ウイルスのプロテアーゼを阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
初めて治療を受けられる方は
・1回1錠とN-ビ7A1Cap、1日2回、12時間毎
・1回2錠とN-ビ7A2Cap、1日1回、24時間毎
・1回2錠、1日2回、12時間毎 のいずれか
治療経験のある方は
・1回1錠とN-ビ7A1Cap、1日2回、12時間毎
いずれの方法も、食事の影響はありません

副作用について
①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
・発疹、皮膚が焼けるように熱い、
皮膚が痛い、唇や口の中がただれる
・のどが渇く、体がだるい、尿量がおふえる
・関節や皮下に出血しやすい
・手足の筋肉の痛み、こわばり、赤褐色尿
②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
なるべく早めに主治医に連絡して下さい
・発しん(服用開始7~13日後特に注意、
約10日間持続)、体がかゆい
・頭がいたい、吐き気がする、お腹が痛い
・体がだるい
・出血しやすい(血友病患者)

この薬は
カレトラ (1Cap中LPV/RTV:133mg/33mg)
(一般名:ロシナビル/リトナビル、LPV-RTV)です
橙色のソフトカプセルです
識別のためのコードは
PK です



この薬の作用(ききめ)は
ウイルスのプロテアーゼを阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
1回3カプセル、1日2回、12時間ごと
食後におのみ下さい

使い方の注意
・食事をとらずに服用すると吸収率が低下します
必ず食後におのみください。
・冷蔵庫(2~8℃)で保存して下さい。
・持ち歩きに携帯する分に差し支えありませんが
30℃を越えないように保存して下さい。
・このカプセルはN-ビ7A(リトナビル)との配合剤です。
・酸化マグネシウムや炭酸水素ナトリウム等の制酸剤
と併用する場合は服用間隔を1時間以上
あけて下さい。

副作用について
①次の症状に気づいたら、のむのを止めて
すぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい
・のどが渇く、体がだるい、尿量がおふえる
・食欲がない、吐き気がする、
胃・おなかの激しい痛み、背中痛み
・関節や皮下に出血しやすい
・皮膚や白目が黄色くなる
②次の症状がひどかったり、長く続く時は、
なるべく早めに主治医に連絡して下さい
・下痢、吐き気、便質・便の色が変わる、
力が入らない、おなかのいたい、頭痛
・おなかが出てくる、腕や脚が細くなる
・出血しやすい(血友病患者)

その他の注意
併用を避けるクスリ
トリアゾラム:ハルシオン ミダゾラム:ドルミカム
メシル酸エロコクミン:ジヒテルコック
酒石酸エロコクミン:カフェルコック
塩酸ヘパリン:ヘパリン
ビモジド:オーラップ リファンピシン:リファジーン
バルデナフィル:レトラ
フルカニド:カンボコル プロパフェノン:プロロン等
併用に注意するクスリ
フェノバルビタル:フェノバル フェニトイン:アレビアチン
カルバマゼピン:テグレート Ca拮抗剤:アグアト等
ワルファリンカリウム:ワルファリン
イトロナール:イトリゾール
クエン酸シトルリク:パイヤグラ 経口避妊薬
リファアチン(国内未発売)プロテアーゼ阻害剤
非ヌクレオチド系逆転写酵素阻害剤
シナプスチン:リボバス等 アトルバスタチン:リビトール
クラリスロマイシン:クラリシット、クラリス
テキメタゾン:テカトロン等
プロピオン酸フルカニド:フルカイト、フルナーセ
塩酸ヘパリン加水合物:ヘパリン
セヨウオキリウ(セント・ジョンズ・ワート)含有食品
上記の薬剤以外に、肝代謝酵素(P-450)に
よって代謝される薬剤との間で、相互作用
のおこる可能性があります。詳しくは医師
・薬剤師にご相談下さい。

伝え忘れたことはありませんか
(次のことに心あたりの方は、
主治医にその旨を伝えて下さい)
・肝臓の病気のある方。

この薬の価格は
1錠: ¥786.7 30日分: 47,202(2錠/日)
94,404(4錠/日)

連絡先
〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
大阪医療センター 薬剤部
TEL 06-6942-1331 内線2122

レクシヴァ 2006.4作成


その他の注意
併用を避けるクスリ
シナプスチン:アセリク、リサモール
酢酸フルカニド:カンボコル
メシル酸エロコクミン:ジヒテルコック
酒石酸エロコクミン:カフェルコック
フェノフェノン:トリルグリン アステミゾール:ヒスマナール
トリアゾラム:ハルシオン ビモジド:オーラップ
塩酸プロパフェノン ミダゾラム:ドルミカム
併用に注意するクスリ
フェノバルビタル:フェノバル フェニトイン:アレビアチン
テキメタゾン:テカトロン カルバマゼピン:テグレート
Ca拮抗剤:アグアト等 イトロナール:イトリゾール
ワルファリンカリウム:ワルファリン リファンピシン:リファジーン
リファアチン(国内未発売)
非ヌクレオチド系逆転写酵素阻害剤
プロテアーゼ阻害剤
クラリスロマイシン:クラリシット等 シトルリク:パイヤグラ
シナプスチン:リボバス アトルバスタチン:リビトール
セバスタチン:セバパコル 経口避妊薬
シクロスポリン:ネオラル、サンテイムン
クロロリス水合物:プログアラ
アミオロン:アンロン
塩酸ヘパリン:ヘパリン
リトナビル:キソカイン 硫酸キニジン
エチルエストラジオール エトナゾール:フレンジール
セヨウオキリウ(セント・ジョンズ・ワート)含有食品
上記の薬剤以外に、肝代謝酵素(P-450)に
よって代謝される薬剤との間で、相互作用
のおこる可能性があります。詳しくは医師
・薬剤師にご相談下さい。

この薬の価格は
1カプセル: ¥257.3 30日分: ¥46,314

連絡先
〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
大阪医療センター 薬剤部
TEL 06-6942-1331 内線2122

カレトラ 2006.4作成

この薬は
カレトラ・リキッド
(1ml 中 LPV/RTV:80mg/20mg)
(一般名: レビテール・リキッド、
LPV・RTV) です



液剤です

この薬の作用(ききめ)は
ウイルスのプロテアーゼを阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
1回5ml、1日2回、12時間ごと
食後におのみ下さい

使い方の注意

- チョコレート等食べてから、また、タバコ等を使用して服用すると飲みやすくなります。服薬後、牛乳などを飲むと、吐き気が少なくなります。
- 1回5ml 中に、ビール約42ml 分のアルコールが含まれています。
- 冷蔵庫(2~8℃)で保存して下さい。持ち歩きに携帯する分に差し支えありませんが30℃を越えないように保存して下さい。
- このカレトラ・リキッド(レビテール)との配合剤です。

副作用について

①次の症状に気づいたら、のむのを止めてすぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい

- のどが渇く、体がだるい、尿量がふえる
- 食欲がない、吐き気がする、胃・おなかの激しい痛み、背中・腰の痛み
- 関節や皮下に出血しやすい
- 皮膚や白目が黄色くなる

②次の症状がひどかったり、長く続く時は、なるべく早めに主治医に連絡して下さい

- 下痢、吐き気、便質・便の色が変わる、力が入らない、おなかがいたい、頭痛
- おなかが出てくる、腕や脚が細くなる
- 出血しやすい(血友病患者)

その他の注意

併用を避けるクスリ

シブプロリン:アセチル、リサモール
酢酸フルカニド:カンボコール
メシル酸エロコタミン:シヒテロコット
酒石酸エロコタミン:カフェロコット
テルフェジソン:トリカタン アステミール:ヒスマナール
トリアゾラム:ハルシオン ヒモジト:オーラップ
塩酸プロパフェン:プロロン ミダゾラム:ドルミカム

併用に注意するクスリ

フェノバルビタール:フェノバル フェニトイン:アレビアチン
デキメタジン:デカトロン カルバマゼピン:テカレトール
Ca拮抗剤:アダラート等 イトラコナゾール:イトリゾール
ワルファリンカリウム:ワルファリン リファンピリン:リファンピリン
リファンピリン(国内未発売)
非ヌクレオチド系逆転写酵素阻害剤
プロテアーゼ阻害剤
クラリスロマイシン:クラリシッド等 シルデナフィール:バイグラ
シハバスタチン:リボバスタ アトルバスタチン:リビトール
セリバスタチン:セリバ、ハイコール 経口避妊薬
シクロスポリン:ネオフル、サントイムン
タクロリム水和物:プロgraf
アミオロン:アソロン
塩酸ヘパリン:ヘパリコール
リトガイン:キシロカイン 硫酸キニジン
エチルエトキシホル トロネグゾール:フラジール
セイヨウオトギリシ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品

上記の薬剤以外に、肝代謝酵素(P-450)によって代謝される薬剤との間で、相互作用のおこる可能性があります。詳しくは医師・薬剤師にご相談下さい。


この薬の価格は
1 ml : ¥156.9 30日分 : ¥47,070

連絡先
〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
大阪医療センター 薬剤部
TEL 06-6942-1331 内線2122


カレトラ・リキッド 2006.4作成

この薬は
レイアタツツ
(1Cap 中 ATV:150, 200mg)
(一般名: 硫酸アタツツ、ATV) です

150mg カプセルは淡青色のカプセルで
識別コードは
BMS150mg 3624です



200mg カプセルは青色のカプセルで
識別コードは
BMS200mg 3631です



この薬の作用(ききめ)は
ウイルスのプロテアーゼを阻害して
増殖をおさえます

この薬の飲み方は
1回2カプセル、1日1回、
食事中もしくは食直後におのみ下さい

使い方の注意

- このクスリは食事をとらずに服用すると、吸収は約60%低下します。
- 酸化カルシウムや炭酸水素ナトリウム等の制酸剤と併用する場合は服用間隔を1時間以上あけて下さい。

副作用について

①次の症状に気づいたら、のむのを止めてすぐに主治医か薬剤師に連絡して下さい

- 皮膚や白目が黄色くなる
- のどが渇く、体がだるい、尿量がふえる
- 関節や皮下に出血しやすい

②次の症状がひどかったり、長く続く時は、なるべく早めに主治医に連絡して下さい

- 吐き気、頭痛、おなかがいたい、下痢
- 発しん(服用開始7~13日後特に注意)
- おなかが出てくる、腕や脚が細くなる
- 出血しやすい(血友病患者)

その他の注意

併用を避けるクスリ

リファンピリン:リファンピリン 塩酸リネカン:カンプト
ミダゾラム:ドルミカム トリアゾラム:ハルシオン
塩酸ヘパリン:ヘパリコール
メシル酸エロコタミン:シヒテロコット
酒石酸エロコタミン:カフェロコット
シブプロリン:アセチル、リサモール ヒモジト:オーラップ
シハバスタチン:リボバスタ インジナビル:クリキバン
プロトンポンプ阻害剤:オメプラール等

併用に注意するクスリ

ジカチン:ウァイトックス錠 テノホビル:ヒレキート
エフィレブ:ストックリン プロテアーゼ阻害剤
制酸剤 H₂受容体拮抗剤 硫酸キニジン
アミオロン:アソロン リトガイン:キシロカイン
三環系抗うつ剤 ワルファリンカリウム:ワルファリン
シルデナフィール:バイグラ等
Ca拮抗剤:アダラート等
シルデナフィール:バイグラ アトルバスタチン:リビトール
シクロスポリン:ネオフル、サントイムン
タクロリム水和物:プロgraf
クラリスロマイシン:クラリシッド等 経口避妊薬
セイヨウオトギリシ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品

上記の薬剤以外に、肝代謝酵素(P-450)及びUGTによって代謝される薬剤との間で、相互作用のおこる可能性があります。詳しくは医師・薬剤師にご相談下さい。

この薬の価格は
150mg : ¥568.7 30日分 : ¥34,122
200mg : ¥761.8 30日分 : ¥45,708

連絡先
〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14
大阪医療センター 薬剤部
TEL 06-6942-1331 内線2122

レイアタツツ 2006.4作成

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業

**服薬アドヒアランスの向上・維持に関する研究
平成 18 年度 研究報告書**

発行：平成 19 年 3 月

発行者：服薬アドヒアランスの向上・維持に関する研究班

主任研究者 白阪 琢磨

〒540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14

独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター

HIV/AIDS 先端医療開発センター長

TEL 06-6942-1331
