

2 今回の処方せん記載に関する標準案についてお尋ねします。

問10 標準案では情報伝達エラー防止と実際に薬を服用する患者さんの視点を考慮して、処方せんへの

内服薬の記載を以下のように1日分から1回分に変更することを提案しています。

標準案記載ルール(内服薬)

分量は1回服用量で記載し、用法・用量として1日服用回数、服薬時期、服用日数を記載する

| <現行記載例> | | <標準案による記載例> | |
|--------------|------|--------------|------|
| セフゾン(100mg) | 3Cap | セフゾン(100mg) | 1Cap |
| メジコン(15mg) | 3錠 | メジコン(15mg) | 1錠 |
| セルベックス(50mg) | 3Cap | セルベックス(50mg) | 1Cap |
| 分3 毎食後 5日分 | | 1日3回 毎食後 5日分 | |

この標準案記載ルールについてどのように思われますか？

| | 内科 | 小児科 | 薬剤部 | 情報部 |
|----------|----|-----|-----|-----|
| ①妥当である | 23 | 18 | 23 | 11 |
| ②ほぼ妥当である | 30 | 23 | 25 | 22 |
| ③妥当ではない | 24 | 34 | 39 | 24 |
| ④その他() | 21 | 14 | 18 | 13 |

問11 内服散剤の記載方法(案)についてお答え下さい

標準案では内服散剤の記載について記載する名称とその量について以下のように提案しています。

標準案記載ルール(内服散剤、内服液剤)

散剤、液剤の薬名としては特定できる3要素(ブランド名+剤形+規格)を記載する

分量は製剤量(薬剤としての重量;薬価基準収載に使用されている単位)で記載する(原薬量では記載しない)

<記載例1:フェニトイン(製品名:アレビアチン散10%)を原薬量として1日量300mgを1日2回に分けて朝夕食後で処方する場合>

アレビアチン散10% 1.5g

1日2回 朝夕食後 28日分

<記載例2:バルプロ酸ナトリウム(製品名:デパケンシロップ(5%))を原薬量として1日量200mgを1日2回に分けて朝夕食後で処方する場合>

デパケンシロップ(5%) 2mL

1日2回 朝夕食後 28日分

この標準案記載ルールについてどのように思われますか?

| | 内科 | 小児科 | 薬剤部 | 情報部 |
|----------|----|-----|-----|-----|
| ①妥当である | 24 | 13 | 15 | 15 |
| ②ほぼ妥当である | 24 | 15 | 21 | 15 |
| ③妥当ではない | 28 | 43 | 47 | 24 |
| ④その他() | 19 | 17 | 20 | 18 |

問12 外用薬(坐薬等)の記載についてお答え下さい。

標準案では外用薬(坐薬等)の記載について以下のように提案しています。

標準案記載ルール(坐薬等1回の使用量が正確に記載できる剤形の外用剤の場合)

坐薬等の分量は1回量を記載し、用法(回数・使用時期・使用方法)、投与日数を記載して最後に全量を記載する

<記載例1>:ボルタレンサポ50mg 1個

1日2回 朝夕食後 5日分(全10個)

<記載例2>:フランドルテープ40mg 1枚

1日1回 朝 胸部又は腹部に貼付 30日分(全30枚)

この標準案記載ルールについてどのように思われますか？

| | 内科 | 小児科 | 薬剤部 | 情報部 |
|----------|----|-----|-----|-----|
| ①妥当である | 50 | 50 | 49 | 24 |
| ②ほぼ妥当である | 32 | 21 | 29 | 25 |
| ③妥当ではない | 8 | 9 | 15 | 13 |
| ④その他() | 7 | 10 | 11 | 9 |

問13 外用薬(外用液、軟膏等)の記載方法についてお答え下さい

標準案では外用薬(うがい薬等の外用液や軟膏等)の記載について以下のように提案しています。
標準案記載ルール(外用液、軟膏等)

外用液剤の分量は1回量を記載し、用法(回数、使用時期、使用方法)、投与日数を記載して
<記載例1>: インタール点眼液 1~2滴

1日4回 朝昼夕就寝前 両目点眼 全2本

<記載例2>: インテバンクリーム 適量

1日4回 朝昼夕就寝前 左肩に塗布 全量50g

この標準案記載ルールについてどのように思われますか?

| | 内科 | 小児科 | 薬剤部 | 情報部 |
|----------|----|-----|-----|-----|
| ①妥当である | 45 | 39 | 45 | 27 |
| ②ほぼ妥当である | 41 | 32 | 33 | 21 |
| ③妥当ではない | 7 | 16 | 19 | 17 |
| ④その他() | 3 | 2 | 9 | 6 |

問14 処方せんの記載方法を標準案に統一した場合の問題点についてお答え下さい(複数回答可)

| | 内科 | 小児科 | 薬剤部 | 情報部 |
|---------------------------|----|-----|-----|-----|
| ①過渡期の対応をどのようにとるかが問題である | 75 | 64 | 90 | 62 |
| ②コンピュータシステムの対応が必要である | 79 | 61 | 84 | 23 |
| ③コンピュータシステムの変更に費用がかかるのは困る | 41 | 16 | 69 | 52 |
| ④標準案は実施すべきではない | 12 | 19 | 19 | 16 |
| ⑤その他() | 15 | 8 | 19 | 18 |

問15 標準案が実施された場合に看護師への指示書の記載に与える影響についてお答え下さい(複数回答可)

| | 内科 | 小児科 |
|--------------------------------|----|-----|
| ①処方せんの記載と指示書の記載が統一されることになるのでよい | 33 | 38 |
| ②処方せんの記載が指示書に与える影響は小さい | 30 | 32 |
| ③処方せんの記載が指示書に与える影響は大きい | 25 | 13 |
| →影響を与える場合について具体的にご記入下さい。 | | |
| ④その他() | 8 | 10 |

問16 入院患者への薬剤投与の用法を時間指示型に変更する施設があるようですが、この点についてご意見をお聞かせ下さい。

| | 内科 | 小児科 |
|----------------------------------|----|-----|
| ①時間指示型にすることが望ましい。 | 12 | 9 |
| ②注射は時間指示型でよいが、内服薬は時間指示型にすべきではない。 | 43 | 52 |
| ③時間指示を行うべきではない。 | 6 | 8 |
| ④その他() | 34 | 20 |

(3) 劑形別処方記載例

処方例についての記載事項の種類及びその件数

【内用錠剤の処方例】

降圧薬のニルバジピンを原薬量として4mgを1日2回に分けて朝食後と夕食後に服用するよう処方したい。ニルバジピン錠2mgの製品（製品名：ニバジール錠2mg）を14日分処方する場合、処方せんにはどのように記載されますか？

【研究班の想定した現状（1日量）での記載例】

ニバジール錠2mg 2錠 分2 朝夕食後 14日分

【参考：研究班提案する標準案（1回量）での記載例】

ニバジール錠2mg 1錠 1日2回朝夕食後 14日分

| 薬品名 | 件数 |
|-------------|----|
| ニバジール（2） | 35 |
| ニバジール(2mg) | 19 |
| ニバジール錠2mg | 11 |
| ニルバジピン（2） | 9 |
| ニバジール錠（2mg） | 8 |
| ニバジール2mg | 7 |
| ニルバジピン（2mg） | 3 |
| ニバジール錠（2） | 2 |
| ニバジール | 1 |
| ニハルジピン（2mg） | 1 |
| ニルバジピン | 1 |
| ニルバジピン錠2mg | 1 |

| 分量 | 件数 |
|------|----|
| 2T | 68 |
| 2錠 | 16 |
| 2tab | 5 |
| 4mg | 3 |
| (2T) | 2 |
| 2C | 1 |
| II | 1 |
| 4T | 1 |
| 記載なし | 1 |

| 日数 | 件数 |
|------------|----|
| 14日分 | 35 |
| /14T | 9 |
| 14TD | 7 |
| (14) | 5 |
| 14T | 5 |
| 14日 | 5 |
| ×14日分 | 4 |
| /14TD | 2 |
| /14Td | 2 |
| /14日分 | 2 |
| ×(14) | 2 |
| ×14T | 2 |
| 14 | 1 |
| G14TD | 1 |
| /14ds | 1 |
| ×14days | 1 |
| ×14TD | 1 |
| ×14日 | 1 |
| ○月○日から14日間 | 1 |
| 14d | 1 |
| 14Td | 1 |
| ⑭ | 1 |
| g14TD | 1 |
| g14TH | 1 |
| g14TM | 1 |

| 用法 | 件数 |
|--------------|----|
| (2-1-1-1) | 5 |
| /2-1-1-1 | 2 |
| 1×M | 2 |
| 4X (2-1-1-1) | 2 |

(以下は件数1件のもの)

3x 昼、夕、眠前、4x 食後・眠前 (2-1-1-1), 分3 アサ 2T ヒル 1T 夕1T,
分4 朝、昼、夕食後、眠前 2-1-1-1, (2:1:1:1) 分4: 朝昼夕食後30分ねる前, (2-1-1),
(2-1-1-1) 分4 毎食後・眠前, (2-1-1-1) 4x N,vds, /1回朝3x 昼夕眠前,
(2-1-1-1) で投与 1日4回 毎食後 眠前, /(2,1,1,1), /2-1-1-1 眠前
(2T-1T-1T-1T) 4x, (500-250-250-250), (朝2T、昼1T、夕1T、寝る前1T), /3x(2-1-1),
/4x (2T-1T-1T-1T) , /4x (2-1-1-1), /N.vds(2-1-1-1) , /N2x1(2-1-1-1), /分4 2-1-1-1
/朝2cap、昼、夕、眠前各1cap, /朝2Cap、昼1cap、夕1Cap、眠前1Cap, 2-1-1-1,
/分3 (0-1-1-1)(昼、夕、眠前), [不均等][2-1-1-1-0-0] 朝2 昼1 夕1 寝る前1,
/分4(アサ500、ヒル500、夕500、眠前250), +眠前 (2.1.1.1), 分4 (2,1,1,1),
/分4 (2-1-1-1)(朝、昼、夕、眠前) , 1日4回 (2, 1, 1, 1) , 1日4回 (2-1-1-1),
1日4回 毎食後・寝る前 朝2カプセル 昼1カプセル 夕1カプセル 寝る前1カプセル,
2-1-1-1 で投与 分4 毎食後と眠前, 3x n(朝2cap 昼1cap)+就寝前1cap,
3x (朝2、昼1、眠前1) , 毎食後と寝る前 朝2 昼1 夕1 寝る前1カプセル,
4x (アサ500、ヒル、夕、vds250), 4x 朝2cap、昼1cap、夕1cap、寝前1cap,
4x n+vds (2-1-1-1), 4x(2-1-1-1), 4x(2-1-1-1)/, 4x(500-250-250-250),
4x(朝2C、昼、夕、眠前各1C), 4x1 (2-1-1-1), 4x1 1-1-1-1-1c 毎食後と眠前,
4x1(朝食後2カ^oヒル-昼食後1カ^oヒル-夕食後1カ^oヒル-眠前1カ^oヒル), 4xN.Vds 2-1-1-1-1,
4x1(朝2cap-昼1cap-夕1cap-眠前1cap で投与), 4xN, VDS(2-1-1-1), 4回: 毎食後、寝る前,
4x n、vds (朝2C、昼1C、夕1C、眠前1C) , 4x 朝2C、昼夕、眠前各1C,
4x (2-1-1-1) 朝2cap、昼1cap、眠前1cap と付記することになるかと思えます。
nde,vds (2T-1T-1T-1T), 分3 朝後2C 昼後1C、夕後1C、眠前1C,
朝2/昼1/夕1/眠前1 4xN 寝前, 朝2Cap 昼・夕・眠前1Cap (2,1,1,1),
朝2T 昼1T 夕1T 眠前1T, 朝食後2Cap、昼食後1Cap 夕食後1Cap、眠前1Cap,
分x4 朝後 2T 昼後 1T 夕後 1T 眠前 1T, 分4 (2-1-1-1),
分4 (朝、昼、夕) 食後、眠前 不均等 (2錠/1錠/1錠/1錠),
分4 (朝2、昼1、夕1、眠前1), 分4 朝 (2錠) 昼(1錠) 夕(1錠) h.s.(1錠),
分4 朝昼夕 (2-1-1-1) 食後と眠前, 分4 毎食後、眠前 2-1-1-1,
分4 (3食後、眠前) (2-1-1-1), 分4 (7⁺2Tab、ヒル1、夕1、寝前1),
分4、朝2T、昼1T、夕1T、眠前1T, 分4: 朝昼夕食後30分ねる前,
分4x : 朝後2C、昼後1C、夕後1C、眠前1C 1
毎食後すぐと寝る前 (朝2C、昼1C、夕1C、寝る前1C) ,

【休薬期間のある医薬品の処方例】

抗リウマチ薬メソトレキサートを原薬量として6mgを1週1クールで、初日から2日目にかけて12時間間隔で服用し、残りの5日間は休薬とする処方をしたい。メソトレキサートカプセル2mg（製品名：リウマトレックスカプセル2mg）の製品を2クール分（実投与日数は4日）処方する場合、処方せんにはどのように記載されますか？

【参考：研究班提案する標準案（1回量）での記載例（下線分は実際には曜日を記載）】

リウマトレックス（2mg） 1カプセル
1クールとして3回（初日9時，21時，翌日9時）服用
全2クール分

または

リウマトレックス（2mg） 1カプセル
初日1日2回午前9時，午後9時 2日分（投与実日数）
リウマトレックス（2mg） 1カプセル
翌日1日1回午前9時 2日分（投与実日数）

【回答処方記載例】

リウマトレックス（2）3CAP
1×火曜日 20：00 2×水曜日 8：00、20：00 2週間分

リウマトレックス（2）2CAP 1日2回 朝・夕 2日分（月曜日に服用）
リウマトレックス（2）1CAP 1日1回朝 2日分（火曜日に服用）

リウマトレックスカプセル2mg 3cap □日より12時間毎に1カプセルずつ内服
リウマトレックスカプセル2mg 3cap ☆日より12時間毎に1カプセルずつ内服

リウマトレックス（2）1C ○月×日より12hrごとに 3回
do △月□日より12hrごとに 3回

リウマトレックスカプセル（2mg）、1回1カプセル、X月X日朝より12時間毎に計3回内服。その後休薬の後X月X+7日朝より再度12時間毎に計3回内服し終了。

リウマトレックスカプセル2mg 6T
分2 ○時 ○時 ×4日分
（○月○日、○月○日、○月○日、○月○日）

リウマトレックス カプセル 2mg 3カプセル
医師指示 2回 M-3 週に1回 朝1夕1翌朝1 服用

- ①リウマトレックス(2) 3c 1×M (2日間、5日間休薬)
②do 処方(内服日を設定)
-

「原薬量として6mgを1週1クール」の意味が分かりませんので、回答いたしません。

リウマトレックスカプセル(2)

1週目 月曜 8時1T 20時1T 火曜 8時1T 水曜-日曜 休薬
2週目 月曜 8時1T 20時1T 火曜 8時1T 水曜-日曜 休薬

メソトレキサート(2) 2C 分×2 2日分(初日、2日目のみ) 12時間あけて内服。
5日間休薬 上記1クールとして2クール 4日分処方

リウマトレックス(2) 3C/2×(8°, 20°) 月・火 2クール(3/27, 28, 4/3, 4)

リウマトレックス(2) 第1-2日 3Cap 分3 12時間ごと内服 第3-7日 休薬
第8-9日 3Cap 分3 12時間ごと内服 第10-14日 休薬
合計6Cap

リウマトレックス(2mg) 3cap
月曜朝から12時間毎に3回内服 2週分(計6cap)

リウマトレックス(2mg) 6カプセル 2×(8時、20時) (月、火のみ内服) 4日分

1) リウマトレックス(2) 2T/1-0-1 (12時間毎) 2T (毎週月曜)

2) リウマトレックス(2) 1T/1-0-0 2T (毎週火曜)・・・として処方し

「リウマトレックスは毎週月曜の朝から火曜の朝まで12時間毎に1錠ずつ3回飲んで、以後水曜から日曜まで飲まないで下さい」とコメントを入れる。

リウマトレックス(2) 2C/W 2W分 たとえば (月曜20時、火曜8時)

Rp1 リウマトレックスカプセル2mg 2C [分2]1日2回 朝夕食後 1日 毎週木曜日

Rp2 リウマトレックスカプセル2mg 1C [分1]1日1回 朝食後 1日 毎週金曜日

*開始日1週間後の日付けで同じ処方をもう1つ記載 *この薬剤は曜日指定で処方しています

リウマトレックスカプセル 2mg 3C 医師の指示通り (全量) 1回1錠 12時間毎に服用

服用開始日: 2007年4月10日(火)

リウマトレックスカプセル 2mg 3C 医師の指示通り (全量) 1回1錠 12時間毎に服用

服用開始日: 2007年4月17日(火)

リウマトレックス (2mg) 3C 分3

木曜日朝1C 木曜日夜1C 金曜日朝1C 12時間間隔 2回分

リウマトレックス 6mg 0' 12' 24'

リウマトレックス 6mg 0' 12' 24'

(例えば初日→月曜、2日目火曜とする)

Rp1 リウマトレックスカプセル 2mg 2C

1日2回 時間指定 2日 8時、20時、月曜のみ

Rp2 リウマトレックスカプセル 2mg 1C

8時 火曜のみ 1日1回 時間指定 2日

リウマトレックス (2mg) 2cap 2×(2)12時間毎(朝夕) 月曜日

リウマトレックス (2mg) 1cap 1×(2)朝 火曜日

リウマトレックスカプセル (2)

一月一日(月)朝1T、一月一日(月)夕1T、一月一日(火)朝1T、

一月一日(月)朝1T、一月一日(月)夕1T、一月一日(火)朝1T、

メソトレキサート (2) 6mg

2×M. A (12時間隔) (月火に内服)・・・曜日指定 G14TD

リュウマトレックス (2mg) 3cap

1日目(月曜日)朝1、夕1 2日目(火曜日)朝1/週

2週間分 (6cap)

リウマトレックス (2mg) 1cap ×6回分

(月曜日 9時、21時、火曜日 9時に服用すること)

リウマトレックス (2mg) 12時間ごと3回

5日間休薬して再度12時間ごと3回

リウマトレックス 12mg 2×1/4日分
(朝、夕) ただし○日、○日、○日、○日服用のこと

リウマトレックスカプセル 4mg (202) 火
” 2mg (200) 水 × 2週

リウマトレックスカプセル (2) 1カプセル 分1 3回分
(第1週目 12時間ごとに3回)

リウマトレックスカプセル (2) 1カプセル 分1 3回分
(第2週目 12時間ごとに3回) よいのは日付を指摘する

- 1) メソトレキサート (2) 3 Cap/12時間毎、2回 (__月__日)
 - 2) メソトレキサート (2) 3 Cap/12時間毎、2回分 (__月__日)
-

メソトレキサート (2) 3錠/週
月曜日 朝、夕食後と火曜日朝食後のみ服用 4週間分

リウマトレックスカプセル (2mg) 6 cap
分2 12時間毎 内服は第1, 2日及び第8, 9日のみ

リウマトレックス (2) 3T/W 月8時 20時 火8時 /2W

リウマトレックスカプセル 2mg 3C 1Cずつ、12時間毎に3回服用してください。
(朝8時、夕20時、朝8時) 毎週月曜日に開始し2週間分

リウマトレックス (2) 3cap×2クール
12時間毎3回服用 1週間毎

リウマトレックスカプセル (2) 3C
3x (12時間毎) 1週1クール 2クール分 (処方経験なし)

リウマトレックスカプセル (2mg) 1 Cap 6回分 医師の指示通り

リウマトレックスカプセル (2mg) 2 cp
分2 朝・夕 2日分 ○○曜日に服用
リウマトレックスカプセル (2mg) 1 cp
分1 朝 2日分 ○○曜日に服用

リウマトレックスカプセル(2) 2C
2 x 8時 20時4TD 内服日を記入 3/27.28 4/3.4

リウマトレックス(2) 3T 12時間間隔で1週2日(連続)/2週間分

Rp1 リウマトレックス 2mg 2CA
2回:朝.夕食後 2日 月曜日に内服

Rp2 リウマトレックス 2mg 1CA
1回:朝食後 2日 火曜日に内服

リウマトレックスカプセル 2mg 1cap
(何月何日何次服用)
(処方箋6枚書く)

このような複雑に思われる場合、具体的な時間を書くと思います。

リウマトレックスカプセル(2mg) 3Tを1回分として、以下の予定で内服させたいのをお願いします。

1クール ○月△日 朝8時夕8時 ○月×日 朝8時夕8時 ○月□日

以下投薬なし ○月○日 ○月+日 ○月◎日 2クール目も同じように書きます。

リウマトレックスカプセル(2) 2P

2×1 2T 水曜の朝夕

リウマトレックスカプセル(2) 1P

1×1 2T 木曜の朝 金曜から火曜まで休薬。

再度次の週の水木に服薬のこと。2クール分としてトータル12カプセル処方。

リウマトレックスカプセル 2mg 1cap,

3月1日朝9時 1cap, 3月1日夜9時 1cap, 3月2日朝9時 1cap,

3月8日朝9時 1cap, 3月8日夜9時 1cap, 3月9日朝9時

リウマトレックスカプセル 2mg 2CP

毎週火曜日・・・1日2回朝・夕食後 4日分

リウマトレックスカプセル 2mg 1CP

毎週水曜日・・・1日1回朝食後 4日分

リウマトレックスカプセル 2mg 1.5錠

分2 12h毎 (月、火のみ投与) ×4日分

リウマトレックスカプセル 2mg (2P) 毎週月曜日朝夕
(1P) 毎週火曜日朝 2日分

リウマトレックスカプセル 2mg 3c/朝. 夕. 朝
毎週○△曜日に内服 2日分

リウマトレックス Cap 2mg 2C
分2 12時間隔 毎週1回金曜日 4日分

リウマトレックス Cap 2mg 1C
分1 朝 毎週1回土曜日 4日分

リウマトレックスカプセル (2mg) 2T
1日2回 医師の指示通り 3日分 月曜日の朝夕と火曜日の朝服用 ←フリーコメントで入力する。

リウマトレックス (2) 2T
2×朝夕 12時間毎/2T 毎週(月)
リウマトレックス (2) 1T
1×朝 /2T 毎週(火)

リウマトレックス Cap (2mg) 2C
分2 : 朝夕食後30分 2日 毎月曜日に服用 医師の指示通り
リウマトレックス Cap (2mg) 1C
分1 : 朝食後30分 2日 毎火曜日に服用 医師の指示通り

1クール ○月△日午前8時午後8時 リウマトレックス 1c
○月×日午前8時 リウマトレックス 1c
2クール ○月○日午前8時午後8時 リウマトレックス 1c
○月□日午前8時 リウマトレックス 1c

リウマトレックス (2) 6T
3x (12hr 毎) 2TD (○/×回、○/○日)
リウマトレックス (2) 6T
3x (12hr 毎) 2TD (×/○回、×/×日)

リウマトレックス (2mg) 3Tab/週 (初日、2日目に向け12時間毎に1Tab内服 3~7日目は休薬)
2週分

リウマトレックス (2) 4mg 12時間毎 1日分 ○月○日から
リウマトレックス (2) 2mg 12時間毎 1回分 ○月○日から と繰り返す

①リウマトレックス (2) 30

1 x M 2日分5日間休薬

② do 処方 (内服日を設定)

【内用・散剤の処方例】

心不全治療薬のジゴキシンを原薬量として0.15mgを1日3回に分けて毎食後に服用するよう処方したい。ジゴキシ散0.1%の製品（製品名：ジゴシン散0.1%）を14日分処方する場合、処方せんにはどのように記載されますか？

【参考：研究班提案する標準案（1回量）での記載例】

ジゴシン散0.1% 0.05g 1日3回 毎食後 14日分

| 薬品名 | 件数 |
|---------------------|----|
| ジゴシン散(0.1%) | 37 |
| ジゴキシ散(0.1%) | 16 |
| ジゴシン散 | 8 |
| ジゴキシ | 6 |
| ジゴキシ散 | 5 |
| 0.1%ジゴキシ散 | 5 |
| ジゴシン1000倍散 | 2 |
| ジゴシン散0.1% (1mg/g) | 2 |
| (以下は件数1件のもの) | |
| ジゴシン散0.1, ジゴシン(0.1) | |
| ジゴキシ (0.1) | |

| 分量 | 件数 |
|---------------------------------------|----|
| 0.15mg | 40 |
| 0.15g | 12 |
| 1.5g | 6 |
| 150mg | 4 |
| 0.15mg 力価 | 4 |
| 0.15 | 2 |
| (以下は件数1件のもの) | |
| 0.15mg (ジゴキシとして), 0.15g(0.15mg) | |
| 5mg, 1.5mg, 0.45mg, 0.45(g), (0.15mg) | |
| 0.15g (力価として0.15mg), (0.05mg) 3P | |
| 0.15mg または 0.15g, 0.15mg (原末) | |
| 0.15mg(成分量), 0.15mg (実薬量), 1.5 | |
| 0.15mg 原薬量で記載, 0.15(0.15mg) | |

| 用法 | 件数 | |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3xN | 14 | (以下は件数1件のもの) 毎食後すぐ, 分子毎食後, 分3 毎食後, 分3 分3 : 朝昼夕食後30分, 分×3 毎食後 3回 : 朝. 昼. 夕食後, 3x 朝、昼、夕食後 3X 各食後, 3×后, 3×1 毎食後, [分3]1日3回毎食後, /毎食後 /分3 後, /分3 nde, /分3, /Nx, /N3x1 /3 食後, /3x 毎食後, /3 nde, 空欄 |
| 3x | 7 | |
| 3xnde | 6 | |
| 1日3回毎食後 | 4 | |
| 分3后 | 3 | |
| 分3後 | 3 | |
| 分3各食後 | 2 | |
| 3x 毎食後 | 2 | |
| 3×食後 | 2 | |
| 3×1 | 2 | |
| 1日3回朝・昼・夕食後 | 2 | |
| /分3 食後 | 2 | |
| /3xnde | 2 | |
| /3×n | 2 | |
| /3× | 2 | |

【内用頓服薬の処方例】

偏頭痛治療薬のスマトリブタンを原薬量として 50mg を発作時に服用するよう処方したい。
スマトリブタン錠 50mg の製品（製品名：イミグラン錠 50）を 5 回分処方しようとした場合、
処方せんにはどのように記載されますか

【参考：研究班提案する標準案（1回量）での記載例】

イミグラン錠 50mg 1錠 痛む時 5回分

| 薬品名 | 件数 |
|-----------------|----|
| イミグラン(50) | 42 |
| イミグラン錠 50 | 10 |
| イミグラン(50mg) | 6 |
| イミグラン錠(50) | 5 |
| イミグラン錠 50mg | 5 |
| スマトリブタン(50) | 5 |
| イミグラン 50mg | 2 |
| イミグラン | 1 |
| イミグラン(50mg 錠) | 1 |
| イミグラン（錠 50） | 1 |
| イミグラン錠（50mg） | 1 |
| イミグラン錠 50（50mg） | 1 |
| イムグラン(50) | 1 |
| スマトリブタン（50mg） | 1 |

| 分量 | 件数 |
|---------|----|
| 1T | 51 |
| 1錠 | 14 |
| 1Tab | 3 |
| 1回1T | 2 |
| 5T | 2 |
| 1 | 1 |
| （1T） | 1 |
| 1C | 1 |
| 1P | 1 |
| 1T/1回 | 1 |
| 1Tab/回 | 1 |
| 1回1錠 | 1 |
| 50mg 1錠 | 1 |
| 5錠 | 1 |

| 回数 | 件数 |
|-------|----|
| 5回分 | 50 |
| /5回分 | 7 |
| ×5回分 | 6 |
| ×(5) | 3 |
| ×5 | 3 |
| 5回 | 2 |
| /5T | 1 |
| : 5回分 | 1 |
| ×(五) | 1 |
| ×5P | 1 |
| 5p | 1 |
| G5P | 1 |
| g 5 P | 1 |
| 記載なし | 4 |

【坐剤の処方例】

非ステロイド抗炎症薬のジクロフェナクナトリウム坐薬 50mg（製品名：ボルタレンサポ 50mg）を1回1個で1日2回、朝と夕に食後の使用で7日分を処方しようとした場合、処方せんにはどのように記載されますか

【参考：研究班提案する標準案（1回量）での記載例】

ボルタレンサポ50mg 1個 1日2回 朝夕食後 7日分

| 薬品名 | 件数 |
|------------------|----|
| ボルタレンサポ 50mg | 19 |
| ボルタレンサポ (50mg) | 16 |
| ボルタレンサポ(50) | 15 |
| ボルタレン坐(50) | 11 |
| ボルタレン坐薬(50mg) | 4 |
| ボルタレン坐(50 mg) | 3 |
| ボルタレンサポ (50) | 2 |
| ボルタレン坐 50mg | 2 |
| ボルタレン坐 50mg | 2 |
| ボルタレン坐薬 50mg | 2 |
| ボルタレン坐薬(50) | 2 |
| ボルタレン (坐) 50mg | 1 |
| ボルタレン・サポ 50mg | 1 |
| ボルタレン SP 50mg | 1 |
| ボルタレン sup(50) | 1 |
| ボルタレン Suppo | 1 |
| ボルタレン Suppo (50) | 1 |
| ボルタレン坐剤 (50mg/個) | 1 |
| 外 ボルタレン (50) | 1 |

| 分量 | 件数 |
|------|----|
| 2個 | 14 |
| 1個 | 11 |
| 2ケ | 9 |
| 1T | 7 |
| 1ケ | 5 |
| 2T | 5 |
| 14個 | 4 |
| 1回1個 | 2 |
| 1個 | 1 |
| (1個) | 1 |
| (2個) | 1 |
| 14本 | 1 |
| 1Tab | 1 |
| 1コ | 1 |
| 1本/回 | 1 |
| 2C | 1 |
| 2コ | 1 |
| 2本 | 1 |

【その他の外用薬の処方例】

非ステロイド抗炎症薬のインドメタシンクリーム（製品名：インテバンクリーム）適量を左肩に1日5回塗布で、25g入チューブを2本（総量50g）処方しようとした場合、処方せんにはどのように記載されますか？

【参考：研究班提案する標準案（1回量）での記載例】

インテバンクリーム 適量 1日5回 左肩に塗布 全量50g

| 薬品名 | 件数 |
|---------------------|----|
| インテバンクリーム (25g) | 34 |
| インテバンクリーム (25) | 12 |
| インテバンクリーム | 12 |
| インテバンクリーム 25g | 10 |
| インテバンクリーム 25g | 5 |
| インドメタシンクリーム 25g | 3 |
| インテバンクリーム (25g/本) | 3 |
| インテバンクリーム (25mg) | 2 |
| インテバンクリーム 1% | 1 |
| インテバンクリーム (25g 入) | 1 |
| インテバンクリーム (1%25g/本) | 1 |
| インテバンクリーム (1%25g) | 1 |
| インテバン cr. | 1 |
| インテバン Cr 25g | 1 |
| インダシンクリーム (25g) | 1 |

| 分量 | 件数 |
|-------|----|
| 2本 | 66 |
| 50g | 11 |
| ×2本 | 6 |
| 1本 | 2 |
| (2本) | 1 |
| 25g×2 | 1 |
| 2p | 1 |