

【小児の抗菌薬の処方例】

セフェム系抗生剤のセフジトレンピボキシル（製品名メイアクトMS小児用細粒（100mg 力価/g））を力価として180mgを1日3回に分けて処方する場合、処方せんにはどのように記載されますか？

【参考：研究班提案する標準案（1回量）での記載例】

メイアクトMS小児用細粒10% 0.6g 1日3回 毎食後 7日分

薬品名	件数
メイアクト	20
メイアクトMS小児用細粒	15
メイアクトMS	11
メイアクト細粒	9
記載なし	6
メイアクトMS細粒	4
メイアクトgr	3
メイアクトMS小児用細粒(100mg/g)	3
メイアクト(100mg/g)	2
メイアクト(細)	2
メイアクトMS(小児用)細粒	2
メイアクト細	1
メイアクト(細粒)	1
メイアクトD.S	1
メイアクトDS	1
メイアクトds	1
メイアクトDS.	1
メイアクトMS D.S.	1
メイアクトMs f.g.	1
メイアクトMS100mg/g	1
メイアクトMSG(10%)	1
メイアクトMS細	1
メイアクト小児用細粒	1
MeiactMS gr.	1

分量	件数
180mg	75
1.8	7
1.8g	5
(180mg)	1
180mg(成分量)	1
180mg(力価)	1

【小児坐剤の処方例①】

1歳未満の患児に解熱剤のアセトアミノフェンの坐薬を原薬量として50mgを1日1回で4日分処方する場合で、採用薬として1個50mgの規格（製品名：アルピニー坐剤50）がある場合に、処方せんにはどのように記載されますか？

【参考：研究班提案する標準案（1回量）での記載例】

アルピニー坐剤50mg 1個 1日1回 4日分

薬品名	件数
アルピニー坐(50)	11
アルピニー(50)	9
アルピニー坐剤50mg	8
アルピニー坐剤50	7
アルピニー坐(50mg)	5
アルピニー坐薬(50mg)	5
アルピニー(坐)	3
アルピニー坐50mg	3
アルピニー坐剤(50mg)	3
アルピニー坐薬(50)	3
アルピニー	2
アルピニー坐	2
アルピニー坐剤(50)	2
50mgアルピニー坐剤	1
アセトアミノフェン坐薬	1
アルピニー坐材(50)	1
アルピニー(坐50)	1
アルピニー50	1
アルピニー(50)坐薬	1
アルピニー(坐)50mg	1
アルピニー(坐薬50)	1
アルピニー50mg	1
アルピニーSP(50)	1
アルピニーsup(坐薬の略)	1
アルピニーsuppo(50)	1
アルピニーサポ(50)	1
アルピニーザ薬(50mg)	1
アルピニーズポ(50mg)	1
アルピニー坐100mg	1
アルピニー坐薬50mg	1
アルピニー坐剤50mg	1
アルピニー坐薬	1
アルピニー坐薬50	1
アルピニー坐薬50mg	1
アルピニー坐(50)	1
アルピニー坐薬50mg	1

分量	件数
1個	24
1ヶ	9
4個	8
50mg	7
4本	4
1p	3
1T	3
1本	3
4ヶ	3
1回1本	2
50mg/回	2
1	1
(1回1個)	1
(1個)	1
1/2コ	1
1個(1回分)	1
1個分	1
1錠	1
1本/回	1
4コ	1
4包	1
5個	1
記載なし	8

【小児坐剤の処方例②】

前問同様、1歳未満の患児に解熱剤のアセトアミノフェンの坐薬を原薬量として50mgを1日1回で4日分処方する場合で、採用薬として1個100mgの規格（製品名：アルピニー坐剤100）しかなかった場合に、処方せんにはどのように記載されますか？

【参考：研究班提案する標準案（1回量）での記載例】

アルピニー坐剤100mg 1/2個 1日1回 4日分

薬品名	件数
アルピニー坐(100)	14
アルピニー坐剤100mg	9
アルピニー(100)	8
アルピニー坐剤100	7
アルピニー坐(100mg)	4
アルピニー坐100mg	4
アルピニー(坐)100mg	3
アルピニー坐薬(100mg)	3
アルピニー坐剤(100)	2
アルピニー坐剤(100mg)	2
アルピニー座薬100mg	2
100mgアルピニー坐剤	1
アセトアミノフェン100mg	1
アセトアミノフェン坐薬(100mg)	1
アルピニ100mg	1
アルピニ(100坐)	1
アルピニ100	1
アルピニー(100)座薬	1
アルピニー(坐薬100)	1
アルピニー100mg	1
アルピニーSp(100)	1
アルピニーsup(坐薬の略)	1
アルピニーsuppo(100mg)	1
アルピニーサポ(100)	1
アルピニーザ薬(100mg)	1
アルピニーズポ(100mg)	1
アルピニー坐	1
アルピニー坐剤	1
アルピニー坐薬(100)	1
アルピニー坐薬(50)	1
アルピニー坐薬100mg	1
アルピニー座剤	1
アルピニー座薬50	1
アルピニ坐(50)	1
アルピニ坐薬100mg	1
アンピニー(100)	1
アンピニー坐(100)	1

分量	件数
1/2個	14
1/2ヶ	8
4個	8
1個	5
1/2本	4
1ヶ	3
1回1/2個	3
0.5個	2
1/2	2
1/2P	2
1/2T	2
1/2コ	2
1回1/2ヶ	2
1回1/2本	2
1日1/2個	2
2ヶ	2
4本	2
(1/2個)	1
(1回半分)	1
(50mg)	1
(使用時1/2コ)	1
0.5個(1回分)	1
0.5錠	1
1/2 2/回	1
1/2個	1
1/2個使用	1
1/2本/回	1
1T	1
1回1/2個使用	1
1個 1回1/2	1
1本	1
2本	1
4p	1
4ヶ	1
4コ	1
50mg	1
5個	1

【小児内用液剤の処方例】

抗ヒスタミン薬の酒石酸アリメマジンシロップ（製品名：アリメジンシロップ（0.5mg/mL））を原薬量として3mgを1日3回に分けて3日分毎食後に処方する場合、処方せんにはどのように記載されますか？

【参考：研究班提案する標準案（1回量）での記載例】

アリメジンシロップ（0.5mg/mL） 2 mL 1日3回毎食後 3日分

薬品名	件数
アリメジンシロップ	47
アリメジン Sy	17
アリメジンシロップ (0.5mg/ml)	5
アリメジン (Sy)	4
アリメジン	3
アリメジン syr	3
アリメジン S	2
アリメジンシロップ 0.5mg/ml	2
アリメジン s p	1
アリメジン Srp	1
アリメジン sy 6ml	1
アリメジンシロップ (0.5%)	1

分量	件数
6ml	67
3mg	13
(3mg)	2
3 mg (成分量)	2
6cc	2
(6 ml)	1
15.0	1
6mg	1