使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
458	JFFMA	5000	triethyleneglycol diacetate	1	98				1.435-1.441	1.115-1.121	1			3	3,4,5	3
	流通		triethyleneglycol diacetate		98.0	98.0			1.435-1.441	1.115-1.121	1.0					
	流通		triethyleneglycol diacetate		98	98			1.435-1.441	1.115-1.121	<1.0					

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
459	JFFMA	387	cinnamyl isovalerate	3	95				1.514-1.524	0.989-0.999	1			1,3,5,6	3,5	3,6
	JECFA		Cinnamyl isovalerate		95				1.517-1.524	0.990-0.996	3.0					
	FCC		Cinnamyl Isovalerate		95	one major isomer /GC(M-1b)			1.518-1.524	0.991-0.996	3.0					
	流通		cinnamyl isovalerate		98.0				1.517-1.521	0.992-0.996	1.0					
	流通		cinnamyl isovalerate		98				1.517-1.521	0.992-0.996						
	流通		cinnamyl isovalerate		98				1.517-1.521	0.992-0.996	1					
	流通		cinnamyl isovalerate		95.0	98.0			1.517-1.521	0.992-0.996	1.0					
	流通		cinnamyl isovalerate		95.0	98.0			1.517-1.521	0.992-0.996	1.0					
	流通		cinnamyl isovalerate		95.0	98.0			1.517-1.521	0.992-0.996	1.0					
	流通		cinnamyl isovalerate		95.0	98.0			1.517-1.521	0.992-0.996	1.0					
	流通		cinnamyl isovalerate		95.0	98.0			1.517-1.521	0.992-0.996	1.0					
	流通		cinnamyl isovalerate		95.0	98.0			1.517-1.521	0.992-0.996	1.0					
	流通		cinnamyl isovalerate		95.0	98.0			1.517-1.521	0.992-0.996	1.0					
	流通		cinnamyl isovalerate		95	98			1.517-1.521	0.992-0.996	<1					
	流通		cinnamyl isovalerate		95	98			1.517-1.521	0.992-0.996						
	流通		cinnamyl isovalerate		95				1.352-1.522	0.996-1.014	1					
	流通		cinnamyl isovalerate		95				1.518-1.523	0.994-0.999						
	流通		cinnamyl isovalerate		94	98			1.517-1.521	0.992-0.996	<1.0					
	流通		cinnamyl isovalerate		>98				1.517-1.521	0.992-0.996	<1.0					
	流通		cinnamyl isovalerate		>95											
	流通		cinnamyl isovalerate			98.0			1.517-1.521	0.992-0.996	<1.0					
	流通		cinnamyl isovalerate			>98			1.517-1.521	0.992-0.996	<1.0					
	流通		cinnamyl isovalerate													
	流通		cinnamyl isovalerate								1					
	流通		cinnamyl isovalerate													
	流通		cinnamyl isovalerate													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
460	JFFMA	1684	alpha-methyl naphthyl ketone	2	95				1.623-1.633	1.114-1.124				3,5	3,4,5	3,6
	流通		alpha-methyl naphthyl ketone		98.0				1.625-1.630	1.116-1.119						
	流通		alpha-methyl naphthyl ketone		98				1.626-1.631	1.116-1.121						
	流通		alpha-methyl naphthyl ketone		95				1.625-1.630	1.119-1.124	<1.0					
	流通		alpha-methyl naphthyl ketone													
	流通		alpha-methyl naphthyl ketone													
	流通		alpha-methyl naphthyl ketone													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
464	JFFMA	570	dihydrocarvyl acetate	3	95				1.456-1.466	0.944-0.954	1			1,3,6	3,4,5	6
	JECFA		Dihydrocarvyl acetate		97	sum of 4 isomers			1.458-1.463	0.943-0.954						
	流通		dihydrocarvyl acetate		95				1.456-1.466	0.944-0.952		比旋光度: 50-70				
	流通		dihydrocarvyl acetate		95				1.458-1.463	0.947-0.955 (20/4)		比旋光度 ([α]20/D) 50,				
	流通		dihydrocarvyl acetate		>97				1.459-1.460	0.947-0.948	<0.33					
	流通		dihydrocarvyl acetate		>95				1.457-1.463	0.946-0.952						
	流通		dihydrocarvyl acetate		>95											
	流通		dihydrocarvyl acetate		95				1.458-1.462	0.947						
	流通		dihydrocarvyl acetate			98.0			1.456-1.463	0.944-0.951	1.0					
	流通		dihydrocarvyl acetate			98.0			1.456-1.463	0.944-0.951	1.0					
	流通		dihydrocarvyl acetate			98.0			1.456-1.463	0.944-0.951	1.0					
	流通		dihydrocarvyl acetate													
	流通		dihydrocarvyl acetate													
	流通		dihydrocarvyl acetate													
	流通		dihydrocarvyl acetate													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
465	JFFMA	1909	myrtenol	4	93				1.490-1.500	0.976-0.986				1,3	3,4,5	1,3
	JECFA		Myrtenol		95				1.490-1.500	0.976-0.983						
	流通		myrtenol		97				1.491-1.497	0.978-0.985	<0.1					
	流通		myrtenol		93.00				1.494-1.498	0.9700-0.9900 (d20/4)		旋光度(α20/D) -52 - -46,				
	流通		myrtenol		93				1.490-1.500	0.981-0.985		旋光度:(-)60-(-)40				
	流通		myrtenol		93				1.490-1.500	0.979-0.985						
	流通		myrtenol		93				1.490-1.500	0.979-0.985						
	流通		myrtenol		90											
	流通		myrtenol		>93				1.496	0.980						
	流通		myrtenol													
	流通		myrtenol													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
469	JFFMA	289	butyl isobutyrate	1	97				1.400-1.406	0.861-0.867	1			1,2,3,5	3,4,5	3
	JECFA		Butyl isobutyrate		97				1.401-1.404	0.859-0.864	1.0					
	FCC		Butyl Isobutyrate		97	one isomer /GC(M-1b)			1.401-1.404	0.859-0.864	1.0					
	流通		butyl isobutyrate		98.0	98.0			1.400-1.405	0.862-0.867	1.0					
	流通		butyl isobutyrate		98.0	98.0			1.400-1.405	0.862-0.867	1.0					
	流通		butyl isobutyrate		98.0	98.0			1.400-1.405	0.862-0.867	<1.0					
	流通		butyl isobutyrate		98.0	98.0			1.400-1.405	0.862-0.867	1.0					
	流通		butyl isobutyrate		98.0	98.0			1.400-1.405	0.862-0.867	1.0					
	流通		butyl isobutyrate		98.0	98.0			1.400-1.405	0.862-0.867	1.0					
	流通		butyl isobutyrate		98.0	98.0			1.400-1.405	0.862-0.867	1.0					
	流通		butyl isobutyrate		98.0	98.0			1.400-1.405	0.862-0.867	1.0					
	流通		butyl isobutyrate		98	98			1.401-1.406	0.861-0.866	<1					
	流通		butyl isobutyrate		98				1.400-1.405	0.862-0.867	<1.0					
	流通		butyl isobutyrate		98						1					
	流通		butyl isobutyrate		98				1.4-1.405	0.862-0.867						
	流通		butyl isobutyrate		97.5				1.4000-1.4050							
	流通		butyl isobutyrate		>98	99.3			1.400-1.405	0.862-0.867	<1.0					
	流通		butyl isobutyrate		>98				1.400-1.405	0.862-0.867	<1.0					
	流通		butyl isobutyrate		>98				1.400-1.405	0.862-0.867	<1.0					
	流通		butyl isobutyrate		>95											
	流通		butyl isobutyrate													
	流通		butyl isobutyrate													
	流通		butyl isobutyrate													
	流通		butyl isobutyrate						1.309-1.404	0.8630-0.8640						

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
471	JFFMA	1410	isopropyl hexanoate	1	98				1.405-1.409	0.854-0.860	1			3	1,3,4	3
	JECFA		Isopropyl hexanoate		99				1.405	0.854-0.860 (20°)						
	流通		isopropyl hexanoate		98.0	98.0			1.405-1.409	0.856-0.860	1.0					
	流通		isopropyl hexanoate		98.0	98.0			1.405-1.409	0.856-0.860	1.0					
	流通		isopropyl hexanoate		98.0	98.0			1.405-1.409	0.856-0.860	1.0					
	流通		isopropyl hexanoate		98.0	98.0			1.405-1.409	0.856-0.860	1.0					
	流通		isopropyl hexanoate		98.0	98.0			1.405-1.409	0.856-0.860	1.0					
	流通		isopropyl hexanoate		98.0	98.0			1.405-1.409	0.856-0.860	1.0					
	流通		isopropyl hexanoate		98	98			1.405-1.409	0.850-0.860	<1					
	流通		isopropyl hexanoate		98	98			1.405-1.409	0.856-0.860	1					
	流通		isopropyl hexanoate		98				1.405-1.409	0.856-0.860	<1.0					
	流通		isopropyl hexanoate		98						1					
	流通		isopropyl hexanoate		98											
	流通		isopropyl hexanoate		98				1.405-1.409	0.856-0.86						
	流通		isopropyl hexanoate		>98				1.405-1.409	0.856-0.860	<1.0					
	流通		isopropyl hexanoate		>95											
	流通		isopropyl hexanoate													
	流通		isopropyl hexanoate						1.406-1.408	0.8570-0.8590	1.0					

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
473	JFFMA	1570/1916	methyl beta-naphthyl ether	10,18	98		MP	70-75					10	–	5	–
	流通		methyl beta-naphthyl ether		99			72以上								
	流通		methyl beta-naphthyl ether		99			70-74								
	流通		methyl beta-naphthyl ether		99			>72								
	流通		methyl beta-naphthyl ether		98.0			71-75								
	流通		methyl beta-naphthyl ether		98.0			71-75								
	流通		methyl beta-naphthyl ether		98.0			73								
	流通		methyl beta-naphthyl ether		98.0			71-75								
	流通		methyl beta-naphthyl ether		98.0			71-75								
	流通		methyl beta-naphthyl ether		98			72-73								
	流通		methyl beta-naphthyl ether		>98			73.1								
	流通		methyl beta-naphthyl ether													
	流通		methyl beta-naphthyl ether													
	流通		methyl beta-naphthyl ether													
	流通		methyl beta-naphthyl ether					70.0-75.0								
	流通		methyl beta-naphthyl ether					35.5-37.5								

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
477	JFFMA	1642	methyl decanoate	1	98				1.423-1.429	0.872-0.878	1			3,6	3,4,5	3,6
	流通		methyl decanoate		99	98			1.424-1.428	0.872-0.878	<1.0					
	流通		methyl decanoate		98				1.424-1.428	0.872-0.878						
	流通		methyl decanoate		>98	100			1.424-1.428	0.872-0.878	<1.0					
	流通		methyl decanoate		>95											
	流通		methyl decanoate			98.0			1.424-1.428	0.872-0.878	1.0					
	流通		methyl decanoate			98.0			1.424-1.428	0.872-0.878	1.0					
	流通		methyl decanoate			98.0			1.424-1.428	0.872-0.878	1.0					
	流通		methyl decanoate			98.0			1.424-1.428	0.872-0.878	1.0					
	流通		methyl decanoate			98.0			1.424-1.428	0.872-0.878	1.0					
	流通		methyl decanoate			98			1.424-1.428	0.872-0.878	<1					
	流通		methyl decanoate													
	流通		methyl decanoate								1					
	流通		methyl decanoate													
	流通		methyl decanoate													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
478	JFFMA	1726	methyl valerate	1	98				1.395-1.401	0.888-0.894	1			1,2,3,6	3,4,5	3,6
	JECFA		Methyl valerate		98				1.393-1.399	0.883-0.895						
	FCC		Methyl Valerate		98				1.395-1.401	0.885-0.891	1.0					
	流通		methyl valerate		98				1.396-1.4	0.888-0.893						
	流通		methyl valerate		>98	99.1			1.396-1.400	0.888-0.893	<1.0					
	流通		methyl valerate			98.0			1.396-1.400	0.888-0.893	1.0					
	流通		methyl valerate			98.0			1.396-1.400	0.888-0.893	1.0					
	流通		methyl valerate			98.0			1.396-1.400	0.888-0.893	1.0					
	流通		methyl valerate			98.0			1.396-1.400	0.888-0.893	1.0					
	流通		methyl valerate			98			1.396-1.400	0.888-0.893	<1					
	流通		methyl valerate													
	流通		methyl valerate								1					
	流通		methyl valerate													
	流通		methyl valerate													
	流通		methyl valerate													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
480	JFFMA	519	decyl acetate	1	95				1.423-1.433	0.861-0.871	1			1	4	-
	JECFA		Decyl acetate		98				1.424-1.430	0.861-0.866	1.0					
	流通		decyl acetate		98				1.426-1.43	0.863-0.868						
	流通		decyl acetate		95.4				1.427	0.865	0.04					
	流通		decyl acetate		95.0	95.0			1.426-1.430	0.863-0.868	1.0					
	流通		decyl acetate		95.0	95.0			1.426-1.430	0.863-0.868	1.0					
	流通		decyl acetate		95.0	95.0			1.426-1.430	0.863-0.868	1.0					
	流通		decyl acetate		95.0	95.0			1.426-1.430	0.863-0.868	1.0					
	流通		decyl acetate		95.0				1.126-1.430	0.863-0.868	1.0					
	流通		decyl acetate		93				1.426-1.430	0.863-0.868	<1.0					
	流通		decyl acetate		>95											
	流通		decyl acetate			93.0			1.426-1.430	0.863-0.868	1.0					
	流通		decyl acetate			93			1.426-1.430	0.863-0.868	<1					
	流通		decyl acetate			93			1.426-1.430	0.863-0.868						
	流通		decyl acetate			>93			1.426-1.430	0.863-0.868	<1.0					
	流通		decyl acetate													
	流通		decyl acetate								1					
	流通		decyl acetate													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
482	JFFMA	1955	nonanal diethyl acetal	1	98				1.418-1.424	0.835-0.841	1			3,5	4,5	3
	流通		nonanal diethyl acetal		98.00				1.418-1.4240	0.8350-0.8400						
	流通		nonanal diethyl acetal		98.0				1.418-1.424	0.835-0.840	1.0					
	流通		nonanal diethyl acetal		98.0				1.418-1.424	0.835-0.840	1.0					
	流通		nonanal diethyl acetal		98.0				1.418-1.424	0.835-0.840	<1.0					
	流通		nonanal diethyl acetal		98.0				1.418-1.424	0.835-0.840	1.0					
	流通		nonanal diethyl acetal		98.0				1.418-1.424	0.835-0.840	1.0					
	流通		nonanal diethyl acetal		98				1.418-1.424	0.835-0.840	<1.0					
	流通		nonanal diethyl acetal		98				1.418-1.424	0.835-0.840	<1					
	流通		nonanal diethyl acetal		98						1					
	流通		nonanal diethyl acetal		98				1.418-1.424	0.835-0.84						
	流通		nonanal diethyl acetal		>98				1.418-1.424	0.835-0.840	<1.0					
	流通		nonanal diethyl acetal		>95											
	流通		nonanal diethyl acetal													
	流通		nonanal diethyl acetal													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
484	JFFMA	492	decanal diethyl acetal	1	95				1.439-1.449	0.834-0.844	1			–	4	–
	流通		decanal diethyl acetal		98.0				1.421-1.427	0.836-0.842	1.0					
	流通		decanal diethyl acetal		98.0				1.421-1.427	0.836-0.842	1.0					
	流通		decanal diethyl acetal		98.0				1.421-1.427	0.836-0.842	1.0					
	流通		decanal diethyl acetal		95.0				1.421-1.427	0.836-0.842	<1.0					
	流通		decanal diethyl acetal		95				1.421-1.427	0.836-0.842	<1.0					
	流通		decanal diethyl acetal		95				1.421-1.427	0.836-0.842	<1					
	流通		decanal diethyl acetal		95						1					
	流通		decanal diethyl acetal		95				1.421-1.427	0.836-0.842						
	流通		decanal diethyl acetal		>95				1.421-1.427	0.836-0.842	<1.0					
	流通		decanal diethyl acetal		>95				1.421-1.427	0.936-0.842	<1.0					
	流通		decanal diethyl acetal		>95											
	流通		decanal diethyl acetal													
	流通		decanal diethyl acetal													
	流通		decanal diethyl acetal													
	流通		decanal diethyl acetal													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
486	JFFMA	152	amyl hexanoate	1	98				1.418-1.424	0.862-0.868	1			1,5	4,5	-
	JECFA		n-Amyl hexanoate		98				1.418-1.422	0.858-0.863	1.0					
	流通		amyl hexanoate		98.0	98.0			1.418-1.424	0.862-0.868	1.0					
	流通		amyl hexanoate		98.0	98.0			1.418-1.424	0.862-0.868	1.0					
	流通		amyl hexanoate		98.0	98.0			1.418-1.424	0.862-0.868	1.0					
	流通		amyl hexanoate		98.0	98.0			1.418-1.424	0.862-0.868	1.0					
	流通		amyl hexanoate		98.0	98.0			1.418-1.424	0.862-0.868	1.0					
	流通		amyl hexanoate		98.0				1.418-1.424	0.862-0.868						
	流通		amyl hexanoate		98	98			1.418-1.424	0.862-0.868	<1.0					
	流通		amyl hexanoate		98	98			1.4180-1.4240	0.8620-0.8680						
	流通		amyl hexanoate		98				1.418-1.424	0.862-0.868						
	流通		amyl hexanoate		98				1.4180-1.4220	0.8580-0.8630(25℃)	0.00-1.00					
	流通		amyl hexanoate		98				1.418-1.422	0.862-0.867	<1.0					
	流通		amyl hexanoate		>98	100			1.418-1.424	0.862-0.868	<1.0					
	流通		amyl hexanoate		>98				1.419-1.424	0.862-0.867						
	流通		amyl hexanoate		>95											
	流通		amyl hexanoate			98			1.418-1.424	0.862-0.868	<1					
	流通		amyl hexanoate			>98			1.418-1.424	0.862-0.868	<1.0					
	流通		amyl hexanoate													
	流通		amyl hexanoate													
	流通		amyl hexanoate								1					
	流通		amyl hexanoate													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
487	JFFMA	1478	linalyl butyrate	3	95				1.447-1.457	0.892-0.902	1			1	4	6
	JECFA		Linalyl butyrate		95				1.451-1.456	0.855-0.905	1.0					
	流通		linalyl butyrate		99.2				1.451	0.894	0.06					
	流通		linalyl butyrate		98				1.448-1.456	0.892-0.902						
	流通		linalyl butyrate		97				1.448-1.456	0.892-0.902	<1.0					
	流通		linalyl butyrate		95.0				1.448-1.456	0.892-0.902	1.0					
	流通		linalyl butyrate		95				1.448-1.459							
	流通		linalyl butyrate		>95				1.448-1.456	0.892-0.902	<1.0					
	流通		linalyl butyrate		>95											
	流通		linalyl butyrate			97			1.448-1.454	0.891-0.897	<1					
	流通		linalyl butyrate			95.0			1.448-1.456	0.892-0.902	1.0					
	流通		linalyl butyrate			95.0			1.448-1.456	0.892-0.902	1.0					
	流通		linalyl butyrate			95.0			1.448-1.456	0.892-0.902	<1.0					
	流通		linalyl butyrate			95.0			1.448-1.456	0.892-0.902	1.0					
	流通		linalyl butyrate			95.0			1.448-1.456	0.892-0.902	1.0					
	流通		linalyl butyrate													
	流通		linalyl butyrate								1					
	流通		linalyl butyrate													
	流通		linalyl butyrate													
	流通		linalyl butyrate													
	流通		linalyl butyrate													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
488	JFFMA	1975	6-nonenol	4	94				1.444-1.454	0.844-0.854				1,2,3,5,6	4,5	3
	流通		6-nonenol		98				1.448-1.452	0.846-0.853						
	流通		6-nonenol		95.0				1.448-1.453	0.846-0.852						
	流通		6-nonenol		95.0					0.847-0.853						
	流通		6-nonenol		94.00				1.448-1.452	0.8480-0.8520						
	流通		6-nonenol		94				1.449-1.451	0.848-0.852	<0.1					
	流通		6-nonenol		94				1.449-1.451	0.848-0.852						
	流通		6-nonenol		94				1.449-1.451	0.848-0.852	<1.0					
	流通		6-nonenol		98				1.448-1.452	0.846-0.853						

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
489	JFFMA	1397	isophorone	4	97				1.475-1.481	0.920-0.926				3,6	4,5	1,6
	JECFA		isophorone		97				1.474-1.481	0.919-0.927	1.0					
	流通		isophorone		98.0				1.475-1.481	0.920-0.926	1.0					
	流通		isophorone		98.0				1.475-1.481	0.920-0.926	1.0					
	流通		isophorone		98.0				1.475-1.481	0.920-0.926	1.0					
	流通		isophorone		98.0				1.475-1.481	0.920-0.926	1.0					
	流通		isophorone		98				1.475-1.481	0.920-0.926	<1					
	流通		isophorone		98				1.475-1.481	0.92-0.926						
	流通		isophorone		97				1.475-1.479	0.918-0.923						
	流通		isophorone		97				1.4650-1.4850	0.9180-0.9380						
	流通		isophorone		>97											
	流通		isophorone													
	流通		isophorone													
	流通		isophorone													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
492	JFFMA	680	diphenyl ether	10,18	98		MP	26-30					10	2,3,6	4,5	1,6
	JECFA		Diphenyl ether		99		MP	26.8	1.578-1.583	1.071-1.075	0.5					
	FCC		Diphenyl Ether		99	GC(M-1b)	MP	26 – 30	freezes	1.070-1.074						
	流通		diphenyl ether		99.0			26.5-28.0			1.0					
	流通		diphenyl ether		99.0						1.0					
	流通		diphenyl ether		99				1.579-1.583		<1.0					
	流通		diphenyl ether		98				1.578-1.584	1.071-1.075(25℃)	<1					
	流通		diphenyl ether		98			26-30								
	流通		diphenyl ether		98			26.5-28凝固点			2					
	流通		diphenyl ether		>99											
	流通		diphenyl ether													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
496	JFFMA	1164	trans-2-hexenyl hexanoate	3	93				1.432-1.442	0.873-0.883	1			3	4,5	3
	JECFA		(E)-2-Hexenyl hexanoate		93				1.432-1.446	0.875-0.885	3.0					
	流通		trans-2-hexenyl hexanoate		98.0				1.433-1.441	0.874-0.882	<1.0					
	流通		trans-2-hexenyl hexanoate		98				1.433-1.441	0.874-0.882	1					
	流通		trans-2-hexenyl hexanoate		93				144±0.01(25℃)	0.88±0.01						
	流通		trans-2-hexenyl hexanoate		>98				1.433-1.441	0.874-0.882	<1.0					
	流通		trans-2-hexenyl hexanoate		>95											
	流通		trans-2-hexenyl hexanoate			98.0			1.433-1.441	0.874-0.882	1.0					
	流通		trans-2-hexenyl hexanoate			98.0			1.433-1.441	0.874-0.882	1.0					
	流通		trans-2-hexenyl hexanoate			98.0			1.433-1.441	0.874-0.882	1.0					
	流通		trans-2-hexenyl hexanoate			98.0			1.433-1.441	0.874-0.882	1.0					
	流通		trans-2-hexenyl hexanoate			98			1.433-1.441	0.874-0.882	<1					
	流通		trans-2-hexenyl hexanoate													
	流通		trans-2-hexenyl hexanoate													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
498	JFFMA	1148	cis-3-hexenyl anthranilate	3	96				1.546-1.556	1.052-1.062	2			1	4	1
	JECFA		cis-3-Hexenyl anthranilate		98				1.545-1.554	1.047-1.054	2.0					
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate		99.9				1.550	1.550	0.26					
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate		98.0				1.548-1.555	1.053-1.060						
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate		98.0				1.550-1.556	1.053-1.060	2.0					
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate		97				1.550-1.556	1.053-1.060	1					
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate		96				1.548-1.553	1.053-1.060	<1.0					
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate		95											
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate		>95											
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate			98.0			1.548-1.553	1.053-1.059	1.0					
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate			98.0			1.548-1.553	1.053-1.059	1.0					
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate			98.0			1.548-1.553	1.053-1.059	1.0					
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate													
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate								1					
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate													
	流通		cis-3-hexenyl anthranilate						1.547-1.552	1.0530-1.0570						