

ポリエチレングリコール 300	経口;錠剤	25322683	1MG
ポリエチレングリコール 300	経口;錠剤,フィルム被覆	25322683	1.5MG
ポリエチレングリコール 300	局所;軟膏	25322683	57%
ポリエチレングリコール 300	局所L;溶液	25322683	29.70%
ポリエチレングリコール300-1600	経口;錠剤,徐法性,腸溶性 被覆		
ポリエチレングリコール300-1600	局所;軟膏		
ポリエチレングリコール 3350	関節内;注射		3%
ポリエチレングリコール 3350	病巣内;注射		3%
ポリエチレングリコール 3350	病巣内;注射,徐効性		2.90%
ポリエチレングリコール 3350	病巣内;懸濁,注射		2.91%
ポリエチレングリコール 3350	筋肉内;注射		3%
ポリエチレングリコール 3350	筋肉内;注射,徐効性		2.90%
ポリエチレングリコール 3350	筋肉内;懸濁,注射		2.91%
ポリエチレングリコール 3350	滑液嚢内;注射		3%
ポリエチレングリコール 3350	滑液嚢内;注射,徐効性		2.90%
ポリエチレングリコール 3350	滑液嚢内;懸濁,注射		2.91%
ポリエチレングリコール 3350	鼻;溶液		
ポリエチレングリコール 3350	鼻;スプレー,定量式		1.50%
ポリエチレングリコール 3350	経口;カプセル		27.2MG
ポリエチレングリコール 3350	経口;カプセル,ソフトゼラチン		76.92MG
ポリエチレングリコール 3350	経口;懸濁		4.50%
ポリエチレングリコール 3350	経口;懸濁,徐効性		
ポリエチレングリコール 3350	経口;錠剤		25MG
ポリエチレングリコール 3350	経口;錠剤(即時型/複合型リリース),被覆なし,阻滯剤		15MG
ポリエチレングリコール 3350	経口;錠剤,被覆		0.5MG
ポリエチレングリコール 3350	経口;錠剤,コントロールリリース		0.72MG
ポリエチレングリコール 3350	経口;錠剤,持続放出		
ポリエチレングリコール 3350	経口;錠剤,フィルム被覆		13MG
ポリエチレングリコール 3350	経口;錠剤,徐効性		8.5MG
ポリエチレングリコール 3350	経口;錠剤,徐効性,被覆		4.2MG
ポリエチレングリコール 3350	直腸;座薬		1425.96MG
ポリエチレングリコール 3350	軟組織;注射		3%
ポリエチレングリコール 3350	軟組織;注射,徐効性		2.90%
ポリエチレングリコール 3350	軟組織;懸濁,注射		2.91%
ポリエチレングリコール 3350	皮下;懸濁,注射		2.88%
ポリエチレングリコール 3350	局所;軟膏		40%
ポリエチレングリコール 3350	陰;座薬		
ポリエチレングリコール 3350	経口;懸濁,徐効性		
ポリエチレングリコール 3350	経口;錠剤		3.048MG
ポリエチレングリコール3500	経口;錠剤,フィルム被覆		
ポリエチレングリコール 400	伝染性単核球症-静注;注射	9004960	20.30%
ポリエチレングリコール 400	伝染性単核球症-静注;溶液,注射	9004960	18%
ポリエチレングリコール 400	静脈;注射	9004960	11.25%
ポリエチレングリコール 400	静注(輸液);注射	9004960	11.25%
ポリエチレングリコール 400	鼻;スプレー,定量式	9004960	20%
ポリエチレングリコール 400	眼;軟膏	9004960	5.00%
ポリエチレングリコール 400	経口;エアゾール,定量式	9004960	
ポリエチレングリコール 400	経口;カプセル	9004960	500MG
ポリエチレングリコール 400	経口;カプセル(即時型/複合型リリース),ソフトゼラチン,PERLE	9004960	
ポリエチレングリコール 400	経口;カプセル,被覆,ソフトゼラチン	9004960	103.55MG
ポリエチレングリコール 400	経口;カプセル,持続放出	9004960	1.7MG
ポリエチレングリコール 400	経口;カプセル,ソフトゼラチン	9004960	960.78MG

ポリエチレングリコール 400	経口; カプセル, 徐効性, ハードゼラチン	9004960	1.7MG
ポリエチレングリコール 400	経口; 濃縮	9004960	60%
ポリエチレングリコール 400	経口; 溶液	9004960	60%
ポリエチレングリコール 400	経口; 懸濁	9004960	5%
ポリエチレングリコール 400	経口; シロップ	9004960	0.05%
ポリエチレングリコール 400	経口; 錠剤	9004960	105.065MG
ポリエチレングリコール 400	経口; 錠剤 (即時型/複合型リリース) フィルム被覆	9004960	20MG
ポリエチレングリコール 400	経口; 錠剤, 腸溶性 被覆 砂粒	9004960	12.5MG
ポリエチレングリコール 400	経口; 錠剤, 持続放出	9004960	45MG
ポリエチレングリコール 400	経口; 錠剤, フィルム被覆	9004960	5.91MG
ポリエチレングリコール 400	経口; 錠剤, 徐効性	9004960	45MG
ポリエチレングリコール 400	経口; 錠剤, 徐効性, フィルム被覆	9004960	1.8MG
ポリエチレングリコール 400	経口-21; 錠剤	9004960	0.15MG
ポリエチレングリコール 400	経口-28; 錠剤	9004960	0.15MG
ポリエチレングリコール 400	直腸; 座薬	9004960	
ポリエチレングリコール 400	局所; 包帯	9004960	
ポリエチレングリコール 400	局所; 乳剤, クリーム	9004960	7.50%
ポリエチレングリコール 400	局所; ジェル	9004960	45%
ポリエチレングリコール 400	局所; ローション	9004960	12%
ポリエチレングリコール 400	局所; 軟膏	9004960	65%
ポリエチレングリコール 400	局所; 溶液	9004960	69.90%
ポリエチレングリコール 400	局所; スポンジ	9004960	
ポリエチレングリコール 400	局所; 綿棒	9004960	
ポリエチレングリコール 400	腔; 座薬	9004960	
ポリエチレングリコール 4000	関節内; 注射		3%
ポリエチレングリコール 4000	病巣内; 注射		3%
ポリエチレングリコール 4000	筋肉内; 注射		3%
ポリエチレングリコール 4000	滑液嚢内; 注射		3%
ポリエチレングリコール 4000	経口; カプセル		449.6MG
ポリエチレングリコール 4000	経口; カプセル, ソフトゼラチン		15MG
ポリエチレングリコール 4000	経口; 錠剤		15MG
ポリエチレングリコール 4000	経口; 錠剤, 被覆		2MG
ポリエチレングリコール 4000	経口; 錠剤, 徐効性, 腸溶性 被覆		0.96MG
ポリエチレングリコール 4000	経口; 錠剤, 持続放出		45MG
ポリエチレングリコール 4000	経口; 錠剤, フィルム被覆		1.625MG
ポリエチレングリコール 4000	経口; 錠剤, 多層, 持続放出		2.8MG
ポリエチレングリコール 4000	経口; 錠剤, 徐効性		454MG
ポリエチレングリコール 4000	経口; 錠剤, 徐効性, フィルム被覆		1.8MG
ポリエチレングリコール 4000	直腸; 座薬		1269MG
ポリエチレングリコール 4000	軟組織; 注射		
ポリエチレングリコール 4000	舌下; 錠剤		2.5MG
ポリエチレングリコール 4000	局所; 乳剤, クリーム		
ポリエチレングリコール 4000	局所; 軟膏		84%
ポリエチレングリコール 4000	局所; 溶液		
ポリエチレングリコール 4000	腔; 乳剤, クリーム		0.50%
ポリエチレングリコール 4000	腔; 座薬		
ポリエチレングリコール 4500	経口; 錠剤, 被覆		
ポリエチレングリコール 4500	経口; 錠剤, フィルム被覆		0.386MG
ポリエチレングリコール 540	局所; 軟膏		76.50%
ポリエチレングリコール 600	静脈; 注射	6790096	5%
ポリエチレングリコール 600	静脈; 溶液, 注射	6790096	5%
ポリエチレングリコール 600	経口; カプセル	6790096	448.4MG
ポリエチレングリコール 600	経口; カプセル, ソフトゼラチン	6790096	324MG

ポリエチレングリコール 600	経口; カプセル, ソフトゼラチン 液体-FILLED	6790096	580.6MG
ポリエチレングリコール 600	経口; 溶液	6790096	65%
ポリエチレングリコール 600	経口; 錠剤	6790096	6MG
ポリエチレングリコール 600	経口; 錠剤, 徐法性, 腸溶性 被覆	6790096	
ポリエチレングリコール 600	経口; 錠剤, 徐効性	6790096	1.2MG
ポリエチレングリコール 600	局所; 溶液	6790096	0.30%
ポリエチレングリコール 6000	経口; カプセル		10MG
ポリエチレングリコール 6000	経口; カプセル, 持続放出		1.56MG
ポリエチレングリコール 6000	経口; カプセル, ハードゼラチン		450MG
ポリエチレングリコール 6000	経口; カプセル, 徐効性		17.46MG
ポリエチレングリコール 6000	経口; 錠剤		375MG
ポリエチレングリコール 6000	経口; 錠剤 (即時型/複合型リリース) フィルム被覆		0.322MG
ポリエチレングリコール 6000	経口; 錠剤, 被覆		40MG
ポリエチレングリコール 6000	経口; 錠剤, 徐法性, 腸溶性 被覆		0.6MG
ポリエチレングリコール 6000	経口; 錠剤, 持続放出		1.4MG
ポリエチレングリコール 6000	経口; 錠剤, フィルム被覆		30MG
ポリエチレングリコール 6000	経口; 錠剤, 徐効性		12.5MG
ポリエチレングリコール 6000	経口; 錠剤, 徐効性, 被覆		0.5MG
ポリエチレングリコール 6000	経口; 錠剤, 徐効性, フィルム被覆		0.322MG
ポリエチレングリコール 6000	経口-21; 錠剤, 被覆		2.148MG
ポリエチレングリコール 6000	経口-28; 錠剤		0.2024MG
ポリエチレングリコール 6000	経口-28; 錠剤, 被覆		2.148MG
ポリエチレングリコール 6000	直腸; 座薬		128MG
ポリエチレングリコール 6000	局所; 乳剤, クリーム		
ポリエチレングリコール 6000	局所; 軟膏		1%
ポリエチレングリコール 6000	腔; 錠剤		3MG
ポリエチレングリコール 6000	腔; 錠剤, フィルム被覆		0.064MG
ポリエチレングリコール 7000K	経口; 錠剤, コントロールリリース		132.66MG
ポリエチレングリコール 7000K	経口; 錠剤, 持続放出		
ポリエチレングリコール 800	経口; 錠剤		0.9MG
ポリエチレングリコール 8000	眼; 溶液		2%
ポリエチレングリコール 8000	経口; カプセル		10MG
ポリエチレングリコール 8000	経口; カプセル, ハードゼラチン		27.8MG
ポリエチレングリコール 8000	経口; カプセル, 徐効性		1.39MG
ポリエチレングリコール 8000	経口; 錠剤		167.6MG
ポリエチレングリコール 8000	経口; 錠剤 (即時型/複合型リリース) 被覆なし, 咀嚼剤		6.5MG
ポリエチレングリコール 8000	経口; 錠剤, 被覆		0.21MG
ポリエチレングリコール 8000	経口; 錠剤, 徐法性, 腸溶性 被覆		0.75MG
ポリエチレングリコール 8000	経口; 錠剤, 持続放出		2.52MG
ポリエチレングリコール 8000	経口; 錠剤, フィルム被覆		49MG
ポリエチレングリコール 8000	経口; 錠剤, 経口 崩壊性, 除法性		2.55MG
ポリエチレングリコール 8000	経口; 錠剤, 徐効性		100MG
ポリエチレングリコール 8000	経口; 錠剤, 徐効性, 被覆		14MG
ポリエチレングリコール 8000	経口; 錠剤, 徐効性, フィルム被覆		0.18MG
ポリエチレングリコール 8000	経口; 錠剤, 被覆なし, トローチ		
ポリエチレングリコール 8000	経口-28; 錠剤		2.05MG
ポリエチレングリコール 8000	直腸; 座薬		52MG
ポリエチレングリコール 8000	局所; 乳剤, クリーム		11%
ポリエチレングリコール 8000	局所; 粉末		
ポリエチレングリコール 8000	局所; 溶液		
ポリエチレングリコール 8000	腔; 錠剤		3MG

ポリエチレングリコール 900	局所;軟膏		
ポリエチレングリコール 900	局所; 溶液		0.95%

Ethylenediamine (エチレンジアミン)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
エチレンジアミン 塩酸塩	局所; 乳剤, クリーム	333186	0.25%

Ether (エーテル)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
B-CYCLODEXTRIN SULFOBUTYL ETHER SODIUM	筋肉内; 粉末, 注射用溶液, 凍結乾燥, 添加物として	182410000	44.15%
B-CYCLODEXTRIN SULFOBUTYL ETHER SODIUM	静注(輸液); 粉末, 注射用溶液, 凍結乾燥	182410000	
COCAMIDE ETHER SULFATE	局所; シャンプー		5%
PPG-20 METHYL GLUCOSE ETHER	局所; ジェル		4.75%
TRITON X-200 SODIUM SALT OF ALKYLAIRYL POLYETHER	局所; 乳剤		40.30%
TRITON X-200 SODIUM SALT OF ALKYLAIRYL POLYETHER	局所; シャンプー		54%

Erythritol (エリスリトール)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
PENTAERYTHRITOL COCOATE	局所;軟膏		1%

Erythorbic Acid (エリソルビン酸)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
エリソルビン酸	経口; 濃縮	89656	
エリソルビン酸	経口; 錠剤	89656	

Zinc Chloride (塩化亜鉛)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
塩化亜鉛	伝染性単核球症－幹細胞; 注射	7646857	
塩化亜鉛	経皮; 注射	7646857	0.04%
塩化亜鉛	眼; 溶液, ドロップ	7646857	0.00%
塩化亜鉛	皮下; 注射	7646857	0.01%
塩化亜鉛	皮下; 注射	7646857	0.02%

Calcium Chloride (塩化カルシウム水和物)

添加物 (INACT 静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型 (ROUTE; DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
塩化カルシウム水和物	湿潤; 注射	10035048	0.03%
塩化カルシウム水和物	仙骨ブロック; 注射	10035048	0.03%
塩化カルシウム水和物	硬膜外; 注射	10035048	0.03%
塩化カルシウム水和物	伝染性単核球症－静注; 注射	10035048	4%
塩化カルシウム水和物	筋肉内; 注射	10035048	4%
塩化カルシウム水和物	眼内; 溶液	10035048	0.05%
塩化カルシウム水和物	腹腔内; 溶液	10035048	2.57%
塩化カルシウム水和物	脈管内; 注射	10035048	0.01%
塩化カルシウム水和物	静脈; 注射	10035048	0.07%
塩化カルシウム水和物	静脈; 溶液, 細胞内微粒子, 注射	10035048	0.03%
塩化カルシウム水和物	神経ブロック; 注射	10035048	0.03%
塩化カルシウム水和物	眼; 粉末, 溶液用	10035048	0.05%
塩化カルシウム水和物	眼; 溶液, ドロップ	10035048	0.01%
塩化カルシウム水和物	経口; 濃縮	10035048	0.01%
塩化カルシウム水和物	経口; 懸濁	10035048	
塩化カルシウム水和物	皮下; 注射	10035048	0.04%
塩化カルシウム水和物	皮下; 注射	10035048	0.05%
塩化カルシウム水和物	局所L; 乳剤, クリーム	10035048	0.25%

Cetylpyridinium Chloride (塩化セチルピリジニウム)

添加物 (INACT 静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型 (ROUTE; DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
塩化セチルピリジニウム	吸入; エアゾール, 定量式	123035	
塩化セチルピリジニウム	イオン導入; 薬物送達システム	123035	1.2MG
塩化セチルピリジニウム	経口; エアゾール, 定量式	123035	
塩化セチルピリジニウム	経口; カプセル	123035	1.5MG
塩化セチルピリジニウム	経口; カプセル, ソフトゼラチン	123035	0.0043MG
塩化セチルピリジニウム	経口; カプセル, 徐効性	123035	0.02MG
塩化セチルピリジニウム	経皮; 薬物送達システム	123035	1.2MG

Ferric Chloride (塩化第二鉄)

添加物 (INACT 静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型 (ROUTE; DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
塩化第二鉄	静脈; 注射	10025771	6.05%

Sodium Chloride(塩化ナトリウム)

添加物(INACT 静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
ISOTONIC SODIUM CHLORIDE 溶液	硬膜外；注射，懸濁，細胞内脂肪粒子	8028771	
ISOTONIC SODIUM CHLORIDE 溶液	気管内；懸濁，注射	8028771	
ISOTONIC SODIUM CHLORIDE 溶液	静脈；注射	8028771	
ISOTONIC SODIUM CHLORIDE 溶液	静脈；溶液	8028771	
ISOTONIC SODIUM CHLORIDE 溶液	経口；溶液	8028771	
塩化ナトリウム	AN,CNBLK 鞘内；注射	7647145	0.80%
塩化ナトリウム	AN,湿潤；注射	7647145	0.86%
塩化ナトリウム	AN,交感神経 NBLK；注射	7647145	0.30%
塩化ナトリウム	耳介(耳性)；溶液	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	耳介(耳性)；溶液，ドロップ	7647145	0.36%
塩化ナトリウム	耳介(耳性)；懸濁，液体	7647145	9%
塩化ナトリウム	仙骨ブロック；注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	歯科；注射	7647145	0.60%
塩化ナトリウム	硬膜外；注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	硬膜外；溶液，注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	体外；注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	体外；溶液	7647145	0.80%
塩化ナトリウム	伝染性単核球症－静注－幹細胞；注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	伝染性単核球症－静注－幹細胞；溶液，注射	7647145	
塩化ナトリウム	伝染性単核球症－静注；注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	伝染性単核球症－静注；注射	7647145	90%
塩化ナトリウム	伝染性単核球症－静注；粉末，注射溶液用	7647145	9%
塩化ナトリウム	伝染性単核球症－静注；粉末，注射溶液用，凍結乾燥	7647145	18%
塩化ナトリウム	伝染性単核球症－静注；溶液	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	伝染性単核球症－静注；溶液，注射	7647145	0.75%
塩化ナトリウム	伝染性単核球症－幹細胞；注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	湿潤N；溶液，注射	7647145	0.85%
塩化ナトリウム	吸入；吸入剤	7647145	
塩化ナトリウム	吸入；溶液	7647145	3.16%
塩化ナトリウム	吸入；溶液，吸入用	7647145	
塩化ナトリウム	動脈内；注射	7647145	4.90%
塩化ナトリウム	動脈内；粉末，注射 溶液用	7647145	0.14%
塩化ナトリウム	動脈内；溶液	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	関節内；注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	関節内；注射，徐効性	7647145	
塩化ナトリウム	滑液内；注射	7647145	0.32%
塩化ナトリウム	心臓；注射	7647145	0.70%
塩化ナトリウム	心臓；溶液，注射	7647145	
塩化ナトリウム	洞内；注射	7647145	0.82%
塩化ナトリウム	洞内；粉末，注射用 溶液	7647145	
塩化ナトリウム	経皮；注射	7647145	0.70%
塩化ナトリウム	経皮；注射，徐効性	7647145	
塩化ナトリウム	病巣内；注射	7647145	0.85%
塩化ナトリウム	病巣内；注射，徐効性	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	筋肉内；注射	7647145	4.50%
塩化ナトリウム	筋肉内；注射，徐効性	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	筋肉内；粉末，注射 用溶液	7647145	22.60%

塩化ナトリウム	筋肉内; 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥, 添加剤として	7647145	0.24%
塩化ナトリウム	筋肉内; 溶液, 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	眼内; 溶液	7647145	0.70%
塩化ナトリウム	腹腔内; 粉末, 注射用 溶液	7647145	22.60%
塩化ナトリウム	腹腔内; 溶液	7647145	53.50%
塩化ナトリウム	胸膜内; 粉末, 注射用 溶液	7647145	22.60%
塩化ナトリウム	滑液嚢内; 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	滑液嚢内; 注射, 徐効性	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	鞘内; 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	鞘内; 注射	7647145	4.90%
塩化ナトリウム	鞘内; 注射, 懸濁, 細胞内脂肪粒子	7647145	9%
塩化ナトリウム	鞘内; 粉末, 注射 用溶液	7647145	0.14%
塩化ナトリウム	鞘内; 溶液, 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	気管内; 注射	7647145	1.20%
塩化ナトリウム	気管内; 粉末, 懸濁用	7647145	4.68%
塩化ナトリウム	気管内; 懸濁	7647145	0.09%
塩化ナトリウム	腫瘍内; 注射	7647145	
塩化ナトリウム	腫瘍内; 注射	7647145	1.20%
塩化ナトリウム	腫瘍内; 粉末, 注射 用溶液	7647145	
塩化ナトリウム	脈管内; 注射	7647145	0.19%
塩化ナトリウム	脈管内; 溶液	7647145	
塩化ナトリウム	静脈 大型丸剤; 溶液, 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	静脈; 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	静脈; 注射	7647145	90%
塩化ナトリウム	静脈; 粉末, 注射用 溶液	7647145	45.20%
塩化ナトリウム	静脈; 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	7647145	45%
塩化ナトリウム	静脈; 溶液	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	静脈; 溶液, 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	硝子体内; 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	硝子体内; 注射	7647145	0.77%
塩化ナトリウム	イオン導入; 薬物送達システム	7647145	0.6MG
塩化ナトリウム	イオン導入; 貼付 コントロールリリース	7647145	3.1MG
塩化ナトリウム	イオン導入; 溶液	7647145	0.60%
塩化ナトリウム	静脈 - 幹細胞; 注射	7647145	1%
塩化ナトリウム	静脈 - 幹細胞; 液体	7647145	0.70%
塩化ナトリウム	静脈 - 幹細胞; 粉末, 注射用 溶液	7647145	0.68%
塩化ナトリウム	静注 (輸液); 注射	7647145	90%
塩化ナトリウム	静注 (輸液); 粉末, 注射用 溶液	7647145	45%
塩化ナトリウム	静注 (輸液); 溶液, 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	静注 (輸液); 懸濁, 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	鼻; 溶液	7647145	0.67%
塩化ナトリウム	鼻; スプレー	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	鼻; スプレー, 定量式	7647145	1.90%
塩化ナトリウム	神経ブロック; 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	神経ブロック; 溶液, 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	眼; 粉末, 溶液用	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	眼; 粉末, 懸濁用	7647145	
塩化ナトリウム	眼; 溶液	7647145	55%
塩化ナトリウム	眼; 溶液, ドロップ	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	眼; 懸濁	7647145	0.85%
塩化ナトリウム	眼; 懸濁, ドロップ	7647145	0.68%
塩化ナトリウム	経口; カプセル	7647145	
塩化ナトリウム	経口; ドロップ	7647145	

塩化ナトリウム	経口; 微粒, 懸濁用	7647145	13.5MG
塩化ナトリウム	経口; 粉末 経口用 懸濁	7647145	0.10%
塩化ナトリウム	経口; 粉末, 溶液用	7647145	
塩化ナトリウム	経口; 粉末, 懸濁用	7647145	0.25%
塩化ナトリウム	経口; 溶液	7647145	1.90%
塩化ナトリウム	経口; 溶液, エリキシル	7647145	0.10%
塩化ナトリウム	経口; 懸濁	7647145	4.11%
塩化ナトリウム	経口; 懸濁, 吸入用	7647145	0.85%
塩化ナトリウム	経口; シロップ	7647145	0.30%
塩化ナトリウム	経口; 錠剤	7647145	148MG
塩化ナトリウム	経口; 錠剤 (即時型/複合型リリース) 被覆なし, 咀嚼剤	7647145	7.5MG
塩化ナトリウム	経口; 錠剤, コントロールリリース	7647145	36MG
塩化ナトリウム	経口; 錠剤, 持続放出	7647145	223.4MG
塩化ナトリウム	経口; 錠剤, 徐効性	7647145	143.26MG
塩化ナトリウム	硬膜外; 注射	7647145	0.81%
塩化ナトリウム	ホトホアー; 溶液	7647145	0.80%
塩化ナトリウム	直腸; かん腸	7647145	
塩化ナトリウム	直腸; 溶液	7647145	
塩化ナトリウム	直腸; 座薬	7647145	52.5MG
塩化ナトリウム	呼吸 (吸入); 溶液	7647145	2.70%
塩化ナトリウム	呼吸 (吸入); 溶液, エアゾール, 吸入用	7647145	1.13%
塩化ナトリウム	呼吸 (吸入); 溶液, 吸入用	7647145	2.70%
塩化ナトリウム	軟組織; 注射	7647145	0.85%
塩化ナトリウム	軟組織; 注射, 徐効性	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	クモ膜下; 溶液, 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	皮下; インプラント	7647145	77MG
塩化ナトリウム	皮下; 注射	7647145	0.85%
塩化ナトリウム	皮下; 注射	7647145	0.90%
塩化ナトリウム	皮下; 液体	7647145	0.15%
塩化ナトリウム	皮下; 溶液, 注射	7647145	4.50%
塩化ナトリウム	皮下; 懸濁, 注射	7647145	0.80%
塩化ナトリウム	粘膜下; 溶液, 注射	7647145	16%
塩化ナトリウム	局所; 乳剤, クリーム	7647145	0.50%
塩化ナトリウム	局所; ジェル	7647145	
塩化ナトリウム	局所; ローション	7647145	0.27%
塩化ナトリウム	局所; 軟膏	7647145	
塩化ナトリウム	局所; 貼付 コントロールリリース	7647145	3.1MG
塩化ナトリウム	局所L; シャンプー	7647145	2.25%
塩化ナトリウム	局所L; 溶液	7647145	0.60%
塩化ナトリウム	局所L; 懸濁	7647145	0.53%
塩化ナトリウム	経皮; 薬物送達システム	7647145	0.6MG
塩化ナトリウム注射	筋肉内; 注射		
塩化ナトリウム注射, BACTERIOSTATIC	静脈; 注射		

Benzalkonium Chloride (ベンザルコニウム塩化物)

添加物(INACT 静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
ベンザルコニウム塩化物	耳介(耳性); 溶液	8001545	0.02%
ベンザルコニウム塩化物	耳介(耳性); 溶液, ドロップ	8001545	0.02%
ベンザルコニウム塩化物	耳介(耳性); 懸濁	8001545	0.02%
ベンザルコニウム塩化物	吸入; 溶液	8001545	20%
ベンザルコニウム塩化物	関節内; 注射	8001545	
ベンザルコニウム塩化物	滑液内; 注射	8001545	
ベンザルコニウム塩化物	経皮; 注射	8001545	
ベンザルコニウム塩化物	病巣内; 注射	8001545	
ベンザルコニウム塩化物	筋肉内; 注射	8001545	
ベンザルコニウム塩化物	眼内; 溶液	8001545	0.01%
ベンザルコニウム塩化物	鼻; ジェル	8001545	
ベンザルコニウム塩化物	鼻; 溶液	8001545	1%
ベンザルコニウム塩化物	鼻; スプレー	8001545	0.12%
ベンザルコニウム塩化物	鼻; スプレー, 定量式	8001545	0.12%
ベンザルコニウム塩化物	眼; ジェル	8001545	0.01%
ベンザルコニウム塩化物	眼; 軟膏	8001545	0.03%
ベンザルコニウム塩化物	眼; 溶液	8001545	8.80%
ベンザルコニウム塩化物	眼; 溶液, ドロップ	8001545	0.51%
ベンザルコニウム塩化物	眼; 懸濁	8001545	0.03%
ベンザルコニウム塩化物	眼; 懸濁, ドロップ	8001545	0.03%
ベンザルコニウム塩化物	局所L; ジェル	8001545	
ベンザルコニウム塩化物	局所L; ローション	8001545	0.10%
ベンザルコニウム塩化物	局所L; シャンプー	8001545	0.20%
ベンザルコニウム塩化物	局所L; 溶液	8001545	0.01%
ベンザルコニウム塩化物	局所L; 溶液, ドロップ	8001545	0.01%
ベンザルコニウム塩化物	局所L; 懸濁	8001545	0.01%

Hydrochloric Acid (塩酸)

添加物(INACT 静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
塩酸	AN,CNBLK 鞘内; 注射	7647010	
塩酸	AN,湿潤; 注射	7647010	0.64%
塩酸	AN,交感神経 NBLK; 注射	7647010	
塩酸	耳介(耳性); 溶液	7647010	0.37%
塩酸	耳介(耳性); 溶液, ドロップ	7647010	0.06%
塩酸	耳介(耳性); 懸濁	7647010	0.04%
塩酸	仙骨ブロック; 注射	7647010	
塩酸	歯科; 溶液	7647010	
塩酸	DIAGNOSTIC; 注射	7647010	
塩酸	硬膜外; 注射	7647010	
塩酸	硬膜外; 溶液, 注射	7647010	
塩酸	体外; 注射	7647010	
塩酸	伝染性単核球症－静注－幹細胞; 注射	7647010	
塩酸	伝染性単核球症－静注－幹細胞; 粉末 注射用 溶液	7647010	
塩酸	伝染性単核球症－静注－幹細胞; 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	7647010	
塩酸	伝染性単核球症－静注－幹細胞; 溶液 注射	7647010	
塩酸	伝染性単核球症－静注; 注射	7647010	0.02%

塩酸	伝染性単核球症－静注；注射	7647010	
塩酸	伝染性単核球症－静注；注射，溶液	7647010	
塩酸	伝染性単核球症－静注；粉末，注射用 溶液	7647010	
塩酸	伝染性単核球症－静注；粉末，注射用 溶液，凍結乾燥	7647010	
塩酸	伝染性単核球症－静注；溶液，注射	7647010	
塩酸	伝染性単核球症－幹細胞；注射	7647010	
塩酸	伝染性単核球症－幹細胞；注射，徐効性	7647010	
塩酸	伝染性単核球症－幹細胞；粉末，注射用 溶液	7647010	
塩酸	湿润N；溶液，注射	7647010	
塩酸	吸入；エアゾール，定量式	7647010	1.72%
塩酸	吸入；溶液	7647010	3.50%
塩酸	吸入；溶液，吸入用	7647010	
塩酸	間質性；注射	7647010	
塩酸	INTRA-AMNI耳性；注射	7647010	
塩酸	動脈内L；注射	7647010	
塩酸	動脈内L；粉末，注射用 溶液	7647010	
塩酸	動脈内L；粉末，注射用 溶液，凍結乾燥	7647010	
塩酸	関節内；注射	7647010	
塩酸	滑液内；注射	7647010	
塩酸	心臓；注射	7647010	
塩酸	心臓；溶液，注射	7647010	
塩酸	洞内；注射	7647010	
塩酸	洞内；粉末，注射用 溶液，凍結乾燥	7647010	
塩酸	経皮；注射	7647010	
塩酸	病巣内；注射	7647010	
塩酸	病巣内；注射，徐効性	7647010	
塩酸	筋肉内；注射	7647010	8%
塩酸	筋肉内；注射	7647010	
塩酸	筋肉内；注射，徐効性	7647010	
塩酸	筋肉内；粉末，注射用 溶液	7647010	
塩酸	筋肉内；粉末，注射用 溶液，凍結乾燥	7647010	
塩酸	筋肉内；溶液，注射	7647010	
塩酸	眼内；溶液	7647010	
塩酸	腹腔内；注射	7647010	
塩酸	腹腔内；溶液	7647010	
塩酸	胸膜内；注射	7647010	
塩酸	INTRASPINAL；注射	7647010	
塩酸	滑液囊内；注射	7647010	
塩酸	滑液囊内；注射，徐効性	7647010	
塩酸	鞘内；注射	7647010	
塩酸	鞘内；注射	7647010	
塩酸	鞘内；粉末，注射用 溶液	7647010	
塩酸	鞘内；粉末，注射用 溶液，凍結乾燥	7647010	
塩酸	鞘内；溶液	7647010	
塩酸	気管内；粉末，懸濁用	7647010	
塩酸	気管内；懸濁	7647010	
塩酸	腫瘍内；注射	7647010	
塩酸	腫瘍内；注射	7647010	
塩酸	腫瘍内；粉末，注射用 溶液	7647010	
塩酸	脈管内；注射	7647010	

塩酸	脈管内; 溶液	7647010	
塩酸	静脈; 注射	7647010	8%
塩酸	静脈; 注射	7647010	10%
塩酸	静脈; 注射, 粉末, 凍結乾燥, 細胞内 脂肪粒子用 懸濁	7647010	
塩酸	静脈; 注射, 懸濁, 細胞内脂肪粒子	7647010	
塩酸	静脈; 粉末, 注射用 溶液	7647010	
塩酸	静脈; 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	7647010	14.11%
塩酸	静脈; 溶液	7647010	1.83%
塩酸	静脈; 溶液, 注射	7647010	
塩酸	硝子体内; 注射	7647010	
塩酸	硝子体内; 注射	7647010	
塩酸	イオン導入; 溶液	7647010	
塩酸	洗浄 溶液	7647010	
塩酸	静脈 - 幹細胞; 注射	7647010	
塩酸	静脈 - 幹細胞; 粉末, 注射用 溶液	7647010	
塩酸	静注 (輸液); 注射	7647010	1.44%
塩酸	静注 (輸液); 粉末, 注射用 溶液	7647010	
塩酸	静注 (輸液); 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	7647010	
塩酸	静注 (輸液); 粉末, 注射用 懸濁, 凍結乾燥	7647010	0.83%
塩酸	静注 (輸液); 溶液	7647010	
塩酸	静注 (輸液); 溶液, 注射	7647010	12.70%
塩酸	鼻; 溶液	7647010	24.70%
塩酸	鼻; スプレー	7647010	
塩酸	鼻; スプレー, 定量式	7647010	
塩酸	神経ブロック; 注射	7647010	0.64%
塩酸	神経ブロック; 溶液, 注射	7647010	
塩酸	眼; ジェル	7647010	
塩酸	眼; 粉末, FOR 溶液	7647010	
塩酸	眼; 溶液	7647010	1.06%
塩酸	眼; 溶液, ドロップ	7647010	0.17%
塩酸	眼; 溶液, 洗浄	7647010	
塩酸	眼; 懸濁	7647010	
塩酸	眼; 懸濁, ドロップ	7647010	
塩酸	経口; 濃縮	7647010	3.10%
塩酸	経口; 溶液	7647010	9.51%
塩酸	経口; 懸濁	7647010	10%
塩酸	経口; シロップ	7647010	0.20%
塩酸	経口; 錠剤	7647010	
塩酸	非経口; 注射	7647010	
塩酸	かん流, 心臓病患者; 溶液	7647010	
塩酸	硬膜外; 注射	7647010	
塩酸	直腸; 溶液	7647010	
塩酸	呼吸 (吸入); 溶液, FOR 吸入	7647010	
塩酸	眼球後方; 注射	7647010	
塩酸	軟組織; 注射	7647010	
塩酸	軟組織; 注射, 徐効性	7647010	
塩酸	SPINAL; 注射	7647010	
塩酸	クモ膜下; 溶液, 注射	7647010	
塩酸	SUBCONJUNCT 静脈AL; 注射	7647010	
塩酸	皮下; 注射	7647010	
塩酸	皮下; 注射	7647010	0.17%
塩酸	皮下; 粉末, 注射用 溶液	7647010	

塩酸	皮下; 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	7647010	
塩酸	皮下; 溶液, 注射	7647010	
塩酸	皮下; 懸濁, 注射	7647010	0.22%
塩酸	局所L; 乳剤	7647010	
塩酸	局所L; 乳剤, エアゾール泡	7647010	
塩酸	局所L; 乳剤, クリーム	7647010	0.34%
塩酸	局所L; ジェル	7647010	
塩酸	局所L; ジェル	7647010	
塩酸	局所L; ローション	7647010	
塩酸	局所L; 軟膏	7647010	
塩酸	局所L; シャンプー	7647010	4%
塩酸	局所L; 溶液	7647010	1.24%
塩酸	局所L; 溶液, ドロップ	7647010	
塩酸	局所L; スポンジ	7647010	
塩酸	局所L; 懸濁	7647010	
塩酸	尿管; 溶液	7647010	
塩酸	尿道; 注射	7647010	
塩酸	尿道; 溶液	7647010	
塩酸 (希)	AN, 湿潤N; 注射		1.36%
塩酸 (希)	伝染性単核球症—静注 - 幹細胞; 溶液, 注射		
塩酸 (希)	伝染性単核球症—静注; 注射		
塩酸 (希)	吸入; 溶液		
塩酸 (希)	動脈内L; 注射		
塩酸 (希)	脈管内; 注射		
塩酸 (希)	静脈; 注射		
塩酸 (希)	静脈; 溶液, 注射		
塩酸 (希)	静注 (輸液); 溶液, 注射		
塩酸 (希)	神経ブロック; 注射		1.36%
塩酸 (希)	眼; 溶液		
塩酸 (希)	経口; 濃縮		
塩酸 (希)	経口; 溶液		2.75%
塩酸 (希)	局所L; シャンプー		2.35%
塩酸 (希)	局所L; 溶液		5.55%

Cysteine Hydrochloride (塩酸システイン)

添加物 (INACT 静脈 INGREDIENT)	投与経路/剤型 (ROUTE; DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
塩酸システイン	静脈; 注射	7048046	
塩酸システイン	静脈; 粉末, 注射用 溶液	7048046	0.10%
塩酸システイン	静注 (輸液); 注射	7048046	2%
塩酸システイン	静注 (輸液); 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	7048046	1.50%
塩酸システイン	経口; カプセル	7048046	
塩酸システイン	経口; 錠剤, 徐効性, フィルム被覆	7048046	16.2MG
塩酸システイン無水物	内側I幹細胞AL; 粉末, 注射用 溶液	52891	

Petrolatum(ワセリン)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
ワセリン	耳介(耳性);軟膏	8009038	
ワセリン	眼;軟膏	8009038	85%
ワセリン	経口;カプセル,徐効性	8009038	0.07MG
ワセリン	局所L;乳剤	8009038	5.30%
ワセリン	局所L;乳剤,クリーム	8009038	16.43%
ワセリン	局所L;ローション	8009038	2.50%
ワセリン	局所L;軟膏	8009038	99.98%
ワセリン	局所L;スポンジ	8009038	
白色ワセリン	耳介(耳性);軟膏		
白色ワセリン	歯科;PASTE		64MG
白色ワセリン	鼻;軟膏		
白色ワセリン	眼;軟膏		89%
白色ワセリン	局所;クリーム,増強		26%
白色ワセリン	局所;乳剤,エアゾール泡		
白色ワセリン	局所;乳剤,クリーム		58.20%
白色ワセリン	局所;ローション		15%
白色ワセリン	局所;軟膏		99.98%
白色ワセリン	局所;軟膏,増強		81.94%
白色ワセリン	経皮;軟膏		29%
白色ワセリン	陰;軟膏		88.49%

Oleic Oil (オリーブ油)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
オリーブ油	経口;カプセル	8001250	
オリーブ油	経口;溶液	8001250	42.50%
オリーブ油	局所;溶液	8001250	0.60%

Oleyl Alcohol(オレイルアルコール)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
オレイルアルコール	局所;乳剤,クリーム	143282	10%
オレイルアルコールL	局所;軟膏	143282	5%

Oleyl Oleate(オレイン酸オレイル)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
オレイン酸オレイル	局所;軟膏		2.55%

Orange(オレンジ)

添加物 (INACT 静脈 E INGREDIENT)	投与経路／剤型 (ROUTE; DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
DYE DC オレンジ #3	経口; 溶液, エリキシル	1936158	
DYE FDC オレンジ #2	経口; 錠剤, 被覆	2646175	0.07MG
DYE FDCオレンジLB-452	経口; 錠剤		0.54MG
DYE 酸化鉄 ORANGE	経口; 錠剤		0.5MG
DYEオレンジレーキ BLEND 3810	経口; 錠剤		0.45MG
DYE オレンジレーキ BLEND LB-1439	経口; 錠剤		0.22MG
DYE オレンジLB-1387	経口; 錠剤		0.5MG
DYE オレンジ LB-715	経口; 錠剤		4.8MG
DYE SWEDISH オレンジ #2191	経口; カプセル		
DYE TETRAROME オレンジ	経口; 錠剤 (即時型／複合型リリース) 被覆なし 咀嚼剤		
ESSENCE FRITZBRO ORANGE	経口; 懸濁		2.01%
エッセンス オレンジ	経口; シロップ		1%
FLAVOR BLOOD ORANGE 51.226T	経口; 溶液, エリキシル		
FLAVOR BLOOD ORANGE SA	経口; シロップ		0.02%
FLAVOR ORANGE #7679	経口; 溶液		0.40%
FLAVOR ORANGE #7679	経口; シロップ		1.25%
FLAVOR ORANGE 13334	経口; 溶液		0%
FLAVOR ORANGE 249792	経口; 粉末, 再形成用		0.30%
FLAVOR ORANGE 57.458/AP05.51	経口; 粉末, 経口用、懸濁		6%
FLAVOR ORANGE 607217	経口; シロップ		0.50%
FLAVOR ORANGE 739K (PB82)	経口; 粉末, 再形成用		0.63%
FLAVOR ORANGE 74016-71	経口; 微粒, 懸濁用		70MG
FLAVOR ORANGE 9/79J839	経口; 粉末, 再形成用		0.23%
FLAVOR ORANGE BANANA WL-	経口; 粉末, 懸濁用		
FLAVOR ORANGE G-10431	経口; 懸濁		
FLAVOR ORANGE G静脈AUDAN	経口; 懸濁, 液体		0.02%
FLAVOR ORANGE P-5614	経口; 懸濁		
FLAVOR ORANGE PFW-730016U	経口; 懸濁, 徐効性		1.50%
FLAVOR ORANGE WONF 608352	経口; 溶液		0.01%
INK EDIBLE ORANGE	経口; 錠剤, 徐効性		
INK ORANGE AND YELLOW 筋肉内	経口; カプセル		
NON-PAREIL SEEDS ORANGE	経口; カプセル, 徐効性		35MG
OPACODE S-1-13001 ORANGE	経口; 錠剤		0.03MG
OPADRY 03F13325 ORANGE	経口; 錠剤		12MG
OPADRY 15B13335 ORANGE	経口; 錠剤, 持続放出		20MG
OPADRY 15B53449 ORANGE	経口; 錠剤		12.5MG
OPADRY 32K23123 ORANGE	経口; 錠剤, 徐効性		7MG
OPADRY 80W-93032 AMB ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆		9.967MG
OPADRY 85G93096 ORANGE	経口; 錠剤		4.53MG
OPADRY I 03B23197 ORANGE	経口; 錠剤, 多層, 被覆		18MG
OPADRY II 31F23111 ORANGE	経口; 錠剤, 徐効性		16MG
OPADRY II 32K13357 ORANGE	経口-21; 錠剤		5MG
OPADRY II 32K13357 ORANGE	経口-28; 錠剤		5MG
OPADRY II 32K13699 ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆		9MG
OPADRY II 40C13396 ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆		6MG
OPADRY II 40L13950 ORANGE	経口; 錠剤		9MG
OPADRY II 40O93122 ORANGE	経口; 錠剤		9MG
OPADRY II 49B13460 ORANGE	経口; 錠剤		19MG
OPADRY II 85F13980 ORANGE	経口; 錠剤		4.5MG
OPADRY II OY-L-23028 ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆		4.5MG
OPADRY II Y-22-13034 ORANGE	経口; 錠剤		4.2MG
OPADRY II Y-22-13061 ORANGE	経口; 錠剤		24MG
OPADRY II Y-22-13061 ORANGE	経口; 錠剤, 被覆		13MG

OPADRY II Y-22-13061 ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	6.5MG
OPADRY II Y-22-13061 ORANGE	経口; 錠剤, 徐効性	-40MG
OPADRY II Y-22-13083 ORANGE	経口; 錠剤	15MG
OPADRY II Y-22-13089 ORANGE	経口; 錠剤	4.9MG
OPADRY II Y-22-13167 ORANGE	経口; 錠剤	25MG
OPADRY II Y-22-13167 ORANGE	経口; 錠剤, コントロールリリース	6MG
OPADRY II Y-22-13167 ORANGE	経口; 錠剤, 徐効性, フィルム被覆	17.19MG
OPADRY II Y-22-13526 ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	
OPADRY II Y-22-13603 ORANGE	経口; 錠剤	67.5MG
OPADRY II Y-22-13613 ORANGE	経口; 錠剤	
OPADRY II Y-22-13663 ORANGE	経口; 錠剤, 徐効性	5.25MG
OPADRY II Y-30-13091 ORANGE	経口-21; 錠剤	3MG
OPADRY II Y-30-13091 ORANGE	経口-28; 錠剤	3MG
OPADRY II Y-30-13242A ORANGE	経口; 錠剤	
OPADRY II Y-30-13616 ORANGE	経口; 錠剤	6MG
OPADRY II Y-30-13642A ORANGE	経口; 錠剤, 徐効性	24.5MG
OPADRY II YS-22-13571 ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	7.5MG
OPADRY II YS-30-13641A ORANGE	経口; 錠剤	15MG
OPADRY OY-23050 ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	
OPADRY OY-8764H ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	25.2MG
OPADRY OY-LS-23016 ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	6MG
OPADRY OY-LS-23018 ORANGE	経口; 錠剤, 徐法性, 腸溶性 被覆	6MG
OPADRY OY-LS-33111 ORANGE	経口; 錠剤	7MG
OPADRY OY-S-23049 ORANGE	経口-28; 錠剤	1.21MG
OPADRY OY-S-53010 ORANGE	経口; 錠剤	8.328MG
OPADRY Y-1-2516 ORANGE	経口; 錠剤, 徐効性	5MG
OPADRY Y-1-2553 ORANGE	経口; 錠剤	10.5MG
OPADRY Y-22-13558 ORANGE	経口; 錠剤	12.8MG
OPADRY Y-30-13168A ORANGE	経口; 錠剤	7MG
OPADRY Y-5-13512 ORANGE	経口; 錠剤	25.2MG
OPADRY Y-5-13513 ORANGE	経口; 錠剤, 徐効性	5MG
OPADRY Y-5-2328 ORANGE	経口; 錠剤	24.6MG
OPADRY Y-5-2371 ORANGE	経口; 錠剤	28.875MG
OPADRY Y-5-2394 ORANGE	経口; 錠剤	31.5MG
OPADRY Y-5-2450 ORANGE	経口; 錠剤	20.895MG
OPADRY Y-5-2450 ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	7.875MG
OPADRY Y-5-2451 ORANGE	経口; 錠剤	6MG
OPADRY Y-5-6233 LIGHT ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	6MG
OPADRY YS-1-13065A ORANGE	経口; 錠剤	41MG
OPADRY YS-1-13119 ORANGE	経口; 錠剤	4.2MG
OPADRY YS-1-13148A ORANGE	経口; 錠剤	10MG
OPADRY YS-1-13148A ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	5MG
OPADRY YS-1-13214 ORANGE	経口; 錠剤, コントロールリリース	7.68MG
OPADRY YS-1-13269 ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	5MG
OPADRY YS-1-13271 ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	20MG
OPADRY YS-1-13555 ORANGE	経口; 錠剤	6MG
OPADRY YS-1-13591A ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	9MG
OPADRY YS-1-13664A ORANGE	経口; 錠剤	10.11MG
OPADRY YS-1-13673A ORANGE	経口; 錠剤	5.09MG
OPADRY YS-1-13675A ORANGE	経口; 錠剤	5.09MG
OPADRY YS-1-2305 ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	1.2MG
OPADRY YS-1-2308 DARK ORANGE	経口; 錠剤, フィルム被覆	3MG
OPADRY YS-1-2383 ORANGE	経口; 錠剤	12.755MG
OPADRY YS-1-2398 ORANGE	経口; 錠剤	25.3MG
OPADRY YS-1-2449 ORANGE	経口; 錠剤, 持続放出	15MG
OPADRY YS-1-2487 ORANGE	経口; 錠剤	

OPADRY YS-1-2522 ORANGE	経口；錠剤		22.5MG
OPADRY YS-1-2526 ORANGE	経口；錠剤		
OPADRY YS-1-2527 ORANGE	経口；錠剤		20MG
OPADRY YS-1-2527 ORANGE	経口；錠剤, 徐効性		
OPADRY YS-1-2546 ORANGE	経口；錠剤		11.7MG
OPADRY YS-1-2546 ORANGE	経口；錠剤, フィルム被覆		14MG
OPADRY YS-1-2548 ORANGE	経口；錠剤		6.9MG
OPADRY YS-1-2548 ORANGE	経口；錠剤, フィルム被覆		13MG
OPADRY YS-1-2549 ORANGE	経口；錠剤		120MG
OPADRY YS-1-2558 ORANGE	経口；錠剤		25MG
OPADRY YS-1-2558 ORANGE	経口；錠剤, フィルム被覆		14MG
OPADRY YS-1-2563 ORANGE	経口；錠剤		11.25MG
OPADRY YS-1-2578 ORANGE	経口；錠剤, 徐効性		21MG
OPADRY YS-1-2596 ORANGE	経口；錠剤, フィルム被覆		20MG
OPADRY YS-1-6275 ORANGE	経口；錠剤		3MG
OPADRY YS-1-8608 ORANGE	経口；錠剤, フィルム被覆		10MG
OPADRY YS-1-8619 ORANGE	経口；錠剤, フィルム被覆		11MG
OPADRY YS-5-2370 ORANGE	経口；錠剤		
OPADRY YS-5-2370 ORANGE	経口；錠剤, フィルム被覆		
OPALUX AS 2324 ORANGE	経口；錠剤, 被覆		10.6MG
OPALUX AS 2336 ORANGE	経口；錠剤		0.972MG
OPALUX AS 2433 ORANGE	経口；錠剤		0.8MG
OPALUX AS 2498 ORANGE	経口；錠剤		0.2MG
OPALUX AS 2498 ORANGE	経口；錠剤, 被覆		3MG
OPALUX AS 2553 ORANGE	経口；錠剤		
OPAsプレー K-1-2303 ORANGE	経口；錠剤		0.35MG
OPAsプレー K-1-2304 ORANGE	経口；錠剤		1.8MG
OPAsプレー K-1-2314 ORANGE	経口；錠剤		3.74MG
OPAsプレー K-1-2327 ORANGE	経口；錠剤, 徐効性		6MG
OPAsプレー K-1-2330 ORANGE	経口；錠剤		11.1MG
OPAsプレー K-1-2335 ORANGE	経口；錠剤, フィルム被覆		0.525MG
OPAsプレー K-1-2406 ORANGE	経口；錠剤		4.42MG
OPAsプレー K-1-2406 ORANGE	経口；錠剤, フィルム被覆		2.1MG
OPAsプレー K-1-2410 ORANGE	経口；錠剤, フィルム被覆		
OPAsプレー K-1-2417 ORANGE	経口；錠剤, 被覆		9MG
OPAsプレー K-1-2441 ORANGE	経口；錠剤		4.48MG
OPAsプレー K-1-2471 ORANGE	経口；錠剤		6.02MG
OPAsプレー K-1-2533 ORANGE	経口；錠剤, 徐効性		
OPAsプレー K-1-2568 ORANGE	経口；錠剤		1.2MG
OPAsプレー K-1-2570 ORANGE	経口；錠剤		5.25MG
OPAsプレー K-1-2570 ORANGE	経口；錠剤, フィルム被覆		
OPAsプレー K-1-2588 ORANGE	経口；錠剤		5.44MG
OPAsプレー K-1-2626 ORANGE	経口；錠剤		4MG
OPAsプレー M-1-3459 B ORANGE	経口；錠剤		4MG
OPATINT DD-13009 ORANGE	経口；錠剤		1.52MG
ORANGE JUICE	経口；粉末		1.25%
ORANGE JUICE	経口；溶液		0.01%
ORANGE JUICE	経口；懸濁		
ORANGE JUICE,SYNTHETIC	経口；溶液		
ORANGE OIL	経口；微粒, 起泡性	8008579	
ORANGE OIL	経口；溶液	8008579	
ORANGE OIL	経口；溶液, エリキシル	8008579	0.12%
ORANGE OIL	経口；懸濁	8008579	0.05%
ORANGE OIL	経口；錠剤 (即時型/複合型リリース) 被覆なし, 咀嚼剤	8008579	0.002MG
ORANGE OIL, TERPENELESS	経口；懸濁		0.26%
ORANGE OIL, TERPENELESS	経口；シロップ		0.00%
ORANGE PEEL EXTRACT	経口；シロップ		0.90%

Orange Oil(オレンジ油)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
オレンジ油	経口; 微粒, 起泡性	8008579	
オレンジ油	経口; 溶液	8008579	
オレンジ油	経口; 溶液, エリキシル	8008579	0.12%
オレンジ油	経口; 懸濁	8008579	0.05%
オレンジ油	経口; 錠剤 (即時型／複合型リリース), 被覆なし, 咀嚼剤	8008579	0.002MG
オレンジ油, TERPENELESS	経口; 懸濁		0.26%
オレンジ油, TERPENELESS	経口; シロップ		0.00%

casein(カゼイン製ペプトン)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
カゼインNa	経口; 錠剤	9005463	100MG

Carrageenan(カラギーナン)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
カラギーナン 塩	局所; ローション		0.27%
CARRAGEENAN SODIUM	経口; シロップ		

Carmines(カルミン)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
(カルミン50	経口; 懸濁	8001807	
(カルミン 50	経口; シロップ	8001807	
DYE (カルミン09349	経口; 錠剤, フィルム被覆		0.54MG

Lanolin(還元ラノリン)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
ラノリン	眼; 軟膏	8020846	2%
ラノリン	局所; 乳剤, クリーム	8020846	2%
ラノリン	局所; ローション	8020846	2.50%
ラノリン	局所; 軟膏	8020846	2%
ラノリン	腔; 乳剤, クリーム	8020846	2%
ラノリンアルコール -流動パラフィン	局所; 乳剤, クリーム		5%
ラノリンアルコール -流動パラフィン	局所; ローション		11%
ラノリンアルコール	眼; 軟膏	8013341	10%
ラノリンアルコール	局所L; 乳剤, クリーム	8013341	6%
ラノリンアルコール	局所L; ジェル	8013341	
ラノリンアルコール	局所L; 軟膏	8013341	3.01%
ラノリンアルコール酢酸エステル	局所L; スポンジ	8028986	
ラノリン コレステロール	局所L; 乳剤		

ラノリン コレステロール	局所L; スポンジ		
ラノリン 非イオン性誘導体	眼;軟膏		
ラノリン 無水物,	眼;軟膏	8006540	3%
ラノリン 無水物,	局所L; 乳剤, クリーム	8006540	2%
ラノリン 無水物,	局所L;軟膏	8006540	
ラノリン 無水物,	経皮;軟膏	8006540	35%
ラノリン 無水物,	腔; 乳剤, クリーム	8006540	0.20%
水素添加ラノリン	局所L;軟膏	8031445	10%
POE(75) ラノリン	局所L; エアゾール		1.50%
POE(75) ラノリン	局所L; 乳剤		1.50%
POE(75) ラノリン	局所L; 溶液		1%
POLYOXYL LANOLIN	局所L; 溶液		0.94%

Glycyrrhiza (カンゾウ)

添加物 (INACT 静脈E INGREDIENT)	投与経路/剤型 (ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
グリチルリチン酸アンモニウム	経口; 微粒	53956040	3.125MG
グリチルリチン酸アンモニウム	経口; 溶液	53956040	0.80%

Xanthan Gum (キサンタンガム)

添加物 (INACT 静脈E INGREDIENT)	投与経路/剤型 (ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
キサンタンガム	眼; 溶液, ジェル FORMING, 持続放出	11138662	0.60%
キサンタンガム	経口; カプセル, 腸溶性 被覆 粒剤	11138662	75MG
キサンタンガム	経口; ドロップ	11138662	0.29%
キサンタンガム	経口; FOR 懸濁	11138662	3.75MG
キサンタンガム	経口; 微粒	11138662	
キサンタンガム	経口; 微粒, FOR 経口 懸濁	11138662	75MG
キサンタンガム	経口; 微粒, FOR 懸濁	11138662	15MG
キサンタンガム	経口; 粉末	11138662	9%
キサンタンガム	経口; 粉末, FOR 経口 懸濁	11138662	6.70%
キサンタンガム	経口; 粉末, FOR 再形成	11138662	2.50%
キサンタンガム	経口; 粉末, FOR 溶液	11138662	4.10%
キサンタンガム	経口; 粉末, FOR 懸濁	11138662	8%
キサンタンガム	経口; 懸濁	11138662	1.20%
キサンタンガム	経口; 懸濁, 液体	11138662	0.23%
キサンタンガム	経口; 懸濁, 徐効性	11138662	18.68%
キサンタンガム	経口; 錠剤	11138662	14MG
キサンタンガム	経口; 錠剤, 持続放出	11138662	101.2MG
キサンタンガム	経口; 錠剤, 経口LY 崩壊性	11138662	0.15MG
キサンタンガム	経口; 錠剤, 徐効性	11138662	50MG
キサンタンガム	経口; 錠剤, 徐効性, 被覆	11138662	74.25MG
キサンタンガム	経口; トローチ	11138662	63.2MG
キサンタンガム	直腸; かん腸	11138662	0.25%
キサンタンガム	局所L; クリーム, 増強	11138662	0.22%
キサンタンガム	局所L; クリーム, 乳剤, 持続放出	11138662	0.30%
キサンタンガム	局所L; 乳剤, クリーム	11138662	0.75%
キサンタンガム	局所L; ローション	11138662	0.18%
キサンタンガム	局所L; 懸濁	11138662	0.11%

Guar Gum(グアーガム)

添加物 (INACT 静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型 (ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
グアーガム	頬/舌下; 錠剤	9000300	1.1MG
グアーガム	経口; 棒状, 咀嚼剤	9000300	40MG
グアーガム	経口; カプセル	9000300	3.3MG
グアーガム	経口; FOR 懸濁	9000300	10MG
グアーガム	経口; 粉末, FOR 懸濁	9000300	0.20%
グアーガム	経口; 懸濁	9000300	0.49%
グアーガム	経口; 錠剤	9000300	12.9597MG
グアーガム	経口; 錠剤, フィルム被覆	9000300	35.4MG
グアーガム	経口; 錠剤, 徐効性	9000300	5.04MG
グアーガム	局所L; ローション	9000300	
グアーガム	腔; 錠剤	9000300	2.76MG

Citric Acid(クエン酸)

添加物 (INACT 静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型 (ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
クエン酸	AN,CNBLK 鞘内; 注射	77929	
クエン酸	AN,湿潤N; 注射	77929	0.02%
クエン酸	耳介(耳性); 溶液	77929	1%
クエン酸	耳介(耳性); 溶液, ドロップ	77929	0.04%
クエン酸	仙骨ブロック; 注射	77929	
クエン酸	硬膜外; 注射	77929	0.02%
クエン酸	伝染性単核球症－静注－幹細胞; 注射	77929	1.26%
クエン酸	伝染性単核球症－静注; 注射	77929	0.05%
クエン酸	伝染性単核球症－静注; 注射	77929	0.33%
クエン酸	伝染性単核球症－静注; 溶液, 注射	77929	0.08%
クエン酸	伝染性単核球症－幹細胞; 注射	77929	0.22%
クエン酸	吸入; エアゾール, 定量式	77929	0.00%
クエン酸	吸入; 吸入剤	77929	
クエン酸	吸入; 溶液	77929	0.44%
クエン酸	INTRA-AMNI耳性; 注射	77929	
クエン酸	動脈内L; 溶液, 注射	77929	
クエン酸	関節内; 注射	77929	
クエン酸	滑液内; 注射	77929	
クエン酸	心臓; 注射	77929	0.20%
クエン酸	病巣内; 注射	77929	
クエン酸	筋肉内; 注射	77929	2%
クエン酸	筋肉内; 粉末, 注射用 溶液	77929	0.03%
クエン酸	筋肉内; 溶液, 注射	77929	
クエン酸	胸膜内; 注射	77929	
クエン酸	胸膜内; 粉末, 注射用 溶液	77929	0.03%
クエン酸	滑液嚢内; 注射	77929	
クエン酸	鞘内; 注射	77929	
クエン酸	鞘内; 粉末, 注射用 溶液	77929	0.03%
クエン酸	脈管内; 溶液, 注射	77929	
クエン酸	静脈; 輸液	77929	

クエン酸	静脈; 注射	77929	
クエン酸	静脈; 注射	77929	20%
クエン酸	静脈; 粉末, 注射用 溶液	77929	50%
クエン酸	静脈; 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	77929	7.69%
クエン酸	静脈; 溶液	77929	0.50%
クエン酸	静脈; 溶液, 注射	77929	0.08%
クエン酸	イオン導入; 薬物送達システム	77929	1.4MG
クエン酸	イオン導入; 貼付 コントロールリ リース	77929	0.2MG
クエン酸	イオン導入; 溶液	77929	0.02%
クエン酸	静注(輸液); 注射	77929	5.10%
クエン酸	静注(輸液); 粉末, 注射用 溶液	77929	6.92%
クエン酸	静注(輸液); 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	77929	
クエン酸	静注(輸液); 溶液, 注射	77929	0.20%
クエン酸	鼻; ジェル	77929	
クエン酸	鼻; 溶液	77929	20%
クエン酸	鼻; スプレー	77929	0.26%
クエン酸	鼻; スプレー, 定量式	77929	3.50%
クエン酸	神経ブロック; 注射	77929	0.02%
クエン酸	眼; 溶液	77929	0.04%
クエン酸	眼; 溶液, ドロップ	77929	0.05%
クエン酸	眼; 懸濁	77929	
クエン酸	経口; 棒状, 咀嚼剤	77929	500MG
クエン酸	経口; カプセル	77929	30.75MG
クエン酸	経口; カプセル, 腸溶性 被覆 粒剤	77929	4.9MG
クエン酸	経口; カプセル, 持続放出	77929	18.8MG
クエン酸	経口; カプセル, HARD ジェルATIN	77929	
クエン酸	経口; カプセル, ソフトゼラチン	77929	1MG
クエン酸	経口; カプセル, 徐効性	77929	
クエン酸	経口; カプセル, 徐効性, ハードゼラチ ン	77929	18.8MG
クエン酸	経口; 濃縮	77929	1.85%
クエン酸	経口; ドロップ	77929	0.18%
クエン酸	経口; 懸濁	77929	5MG
クエン酸	経口; 微粒	77929	6.25MG
クエン酸	経口; 微粒, FOR 経口 懸濁	77929	4.9MG
クエン酸	経口; 微粒, FOR 再形成	77929	6MG
クエン酸	経口; 微粒, FOR 懸濁	77929	9.1MG
クエン酸	経口; 液体	77929	1.35%
クエン酸	経口; 粉末	77929	9.50%
クエン酸	経口; 粉末, FOR 経口 懸濁	77929	8.10%
クエン酸	経口; 粉末, FOR 再形成	77929	0.25%
クエン酸	経口; 粉末, FOR 溶液	77929	
クエン酸	経口; 粉末, FOR 懸濁	77929	60%
クエン酸	経口; 溶液	77929	0.80%
クエン酸	経口; 溶液, エリキシル	77929	2%
クエン酸	経口; 溶液, 液体	77929	0.70%
クエン酸	経口; 懸濁	77929	1.41%
クエン酸	経口; 懸濁, ドロップ	77929	0.24%
クエン酸	経口; 懸濁, FOR 吸入	77929	0.03%
クエン酸	経口; 懸濁, 液体	77929	0.18%
クエン酸	経口; 懸濁, 徐効性	77929	0.50%
クエン酸	経口; シロップ	77929	72.20%
クエン酸	経口; 錠剤	77929	78MG