

クエン酸	経口；錠剤（即時型／複合型リリース）フィルム被覆	77929	0.945MG
クエン酸	経口；錠剤（即時型／複合型リリース）被覆なし、咀嚼剤	77929	4.26MG
クエン酸	経口；錠剤、被覆	77929	
クエン酸	経口；錠剤、徐法性、腸溶性 被覆	77929	1MG
クエン酸	経口；錠剤、持続放出	77929	5MG
クエン酸	経口；錠剤、フィルム被覆	77929	42MG
クエン酸	経口；錠剤、経口LY 崩壊性	77929	63MG
クエン酸	経口；錠剤、経口LY 崩壊性、除法性	77929	3.08MG
クエン酸	経口；錠剤、徐効性	77929	
クエン酸	経口；錠剤、徐効性、フィルム被覆	77929	40MG
クエン酸	経口；錠剤、被覆なし、トローチ	77929	
クエン酸	経口-28；錠剤	77929	
クエン酸	硬膜外；注射	77929	
クエン酸	軟組織；注射	77929	
クエン酸	舌下；錠剤	77929	5.92MG
クエン酸	局所L；エアゾール	77929	0.08%
クエン酸	局所L；クリーム、増強	77929	0.05%
クエン酸	局所L；乳剤	77929	0.11%
クエン酸	局所L；乳剤、エアゾール泡	77929	0.11%
クエン酸	局所L；乳剤、クリーム	77929	5%
クエン酸	局所L；ジェル	77929	0.05%
クエン酸	局所L；ローション	77929	0.85%
クエン酸	局所L；軟膏	77929	0.01%
クエン酸	局所L；貼付 コントロールリリース	77929	0.2MG
クエン酸	局所L；粉末、FOR 溶液	77929	
クエン酸	局所L；シャンプー	77929	2.30%
クエン酸	局所L；シャンプー、懸濁	77929	1%
クエン酸	局所L；溶液	77929	40%
クエン酸	局所L；綿棒	77929	40MG
クエン酸	経皮；薬物送達システム	77929	1.4MG
クエン酸	腔；乳剤、クリーム	77929	
クエン酸	腔；スポンジ	77929	7.5MG
クエン酸水和物	AN、湿潤N；注射	5949291	0.16%
クエン酸水和物	伝染性単核球症－静注－幹細胞；注射	5949291	1.26%
クエン酸水和物	伝染性単核球症－静注；注射	5949291	0.05%
クエン酸水和物	伝染性単核球症－静注；注射	5949291	0.36%
クエン酸水和物	伝染性単核球症－静注；溶液	5949291	0.05%
クエン酸水和物	伝染性単核球症－静注；溶液、注射	5949291	0.09%
クエン酸水和物	心臓；注射	5949291	1.05%
クエン酸水和物	筋肉内；注射	5949291	0.50%
クエン酸水和物	眼内；溶液	5949291	0.05%
クエン酸水和物	静脈；注射	5949291	0.05%
クエン酸水和物	静脈；注射	5949291	52.50%
クエン酸水和物	静脈；粉末、注射用 溶液	5949291	21.90%
クエン酸水和物	静脈；粉末、注射用 溶液、凍結乾燥	5949291	41.36%
クエン酸水和物	静脈；溶液	5949291	0.16%
クエン酸水和物	静脈；溶液、注射	5949291	0.08%
クエン酸水和物	静注（輸液）；注射	5949291	1.05%
クエン酸水和物	静注（輸液）；溶液、注射	5949291	0.14%
クエン酸水和物	鼻；溶液	5949291	0.42%
クエン酸水和物	鼻；スプレー、定量式	5949291	0.17%

クエン酸水和物	神経ブロック；注射	5949291	0.16%
クエン酸水和物	眼；溶液	5949291	0.05%
クエン酸水和物	眼；溶液, ドロップ	5949291	0.05%
クエン酸水和物	経口；溶液	5949291	0.50%
クエン酸水和物	経口；懸濁	5949291	0.30%
クエン酸水和物	経口；懸濁, 徐効性	5949291	14.08%
クエン酸水和物	経口；シロップ	5949291	0.96%
クエン酸水和物	経口；錠剤	5949291	50MG
クエン酸水和物	経口；錠剤, フィルム被覆	5949291	10MG
クエン酸水和物	局所L；乳剤, クリーム	5949291	0.05%
クエン酸水和物	局所L；ジェル	5949291	0.10%
クエン酸水和物	局所L；シャンプー	5949291	0.24%
クエン酸水和物	局所L；シャンプー, 懸濁	5949291	
クエン酸水和物	局所L；溶液	5949291	0.19%
クエン酸水和物	腔；乳剤, クリーム	5949291	0.49%
CITRIC ACID, HYDROUS	伝染性単核球症－静注－幹細胞；注射	15686654	1.26%
CITRIC ACID, HYDROUS	静脈；注射	15686654	10.50%
CITRIC ACID, HYDROUS	静注（輸液）；注射	15686654	0.00%
CITRIC ACID, HYDROUS	経口；微粒, 懸濁用	15686654	14.1MG
CITRIC ACID, HYDROUS	経口；溶液	15686654	
CITRIC ACID, HYDROUS	経口；懸濁	15686654	0.75%
CITRIC ACID, HYDROUS	経口；シロップ	15686654	0.26%
CITRIC ACID, HYDROUS	経口；錠剤, フィルム被覆	15686654	10MG
CITRIC ACID, HYDROUS	局所L；乳剤, クリーム	15686654	0.10%
CITRIC ACID, HYDROUS	局所L；乳剤, ローション	15686654	0.05%

Calcium Citrate(クエン酸カルシウム)

添加物(INACT 静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
クエン酸カルシウム	経口；粉末	813945	42.90%
クエン酸カルシウム	経口；錠剤	813945	98.95MG

Triethyl Citrate(クエン酸トリエチル)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
クエン酸トリエチル	経口; カプセル	77930	8.9MG
クエン酸トリエチル	経口; カプセル, 徐法性	77930	3.848MG
クエン酸トリエチル	経口; カプセル, 腸溶性 被覆 粒剤	77930	9.16MG
クエン酸トリエチル	経口; カプセル, 持続放出	77930	15.03MG
クエン酸トリエチル	経口; カプセル, 徐効性	77930	7.5MG
クエン酸トリエチル	経口; カプセル, 徐効性, ハードゼラチン	77930	3.3MG
クエン酸トリエチル	経口; 微粒, 経口 用懸濁	77930	3.8MG
クエン酸トリエチル	経口; 錠剤	77930	5.1MG
クエン酸トリエチル	経口; 錠剤 (即時型／複合型リリース), 被覆なし, 咀嚼剤	77930	2.8MG
クエン酸トリエチル	経口; 錠剤, 徐法性, 腸溶性 被覆	77930	20.177MG
クエン酸トリエチル	経口; 錠剤, 持続放出	77930	0.348MG
クエン酸トリエチル	経口; 錠剤, フィルム被覆	77930	3.6MG
クエン酸トリエチル	経口; 錠剤, 経口LY 崩壊性, 除法性	77930	18.7MG
クエン酸トリエチル	経口; 錠剤, 徐効性	77930	1.6MG
クエン酸トリエチル	経口; 錠剤, 徐効性, 被覆	77930	2.31MG
クエン酸トリエチル	経口; 錠剤, 徐効性, フィルム被覆	77930	0.5MG

Sodium Gluconate(グルコン酸ナトリウム)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
グルコン酸ナトリウム	静脈; 注射	527071	2.30%
グルコン酸ナトリウム	静注 (輸液); 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	527071	0.30%
グルコン酸ナトリウム	経口; シロップ	527071	

Creatinine(クレアチニン)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
クレアチニン	耳介(耳性); 溶液	60275	0.50%
クレアチニン	伝染性単核球症－静注－幹細胞; 注射	60275	
クレアチニン	伝染性単核球症－静注; 注射	60275	0.80%
クレアチニン	関節内; 注射	60275	0.80%
クレアチニン	関節内; 注射, 徐効性	60275	
クレアチニン	滑液内; 注射	60275	
クレアチニン	経皮; 注射, 徐効性	60275	
クレアチニン	病巣内; 注射	60275	0.80%
クレアチニン	病巣内; 注射, 徐効性	60275	
クレアチニン	筋肉内; 注射	60275	0.50%
クレアチニン	筋肉内; 注射, 徐効性	60275	
クレアチニン	滑液嚢内; 注射	60275	0.80%
クレアチニン	滑液嚢内; 注射, 徐効性	60275	
クレアチニン	眼; 溶液	60275	0.50%
クレアチニン	眼; 溶液, ドロップ	60275	0.20%
クレアチニン	軟組織; 注射	60275	0.80%
クレアチニン	局所L; 乳剤, クリーム	60275	

Cresol(クレゾール)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
クレゾール	局所L; クリーム, 増強	59507	0.10%
クレゾール	局所L; 乳剤, クリーム	59507	0.75%
クレゾール	皮下; 注射	8026946	
クレゾール, M-	伝染性単核球症－静注－幹細胞; 注射	108394	0.10%
クレゾール, M-	伝染性単核球症－幹細胞; 注射	108394	0.25%
クレゾール, M-	経皮; 注射	108394	0.16%
クレゾール, M-	筋肉内; 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	108394	0.30%
クレゾール, M-	静注(輸液); 注射	108394	0.10%
クレゾール, M-	皮下; 注射	108394	0.32%
クレゾール, M-	皮下; 注射	108394	0.45%
クレゾール, M-		108394	0.30%
クレゾール, M-	皮下; 溶液, 注射	108394	0.22%
クレゾール, M-	皮下; 懸濁, 注射	108394	0.17%

cro幹細胞armellose sodium(クロスカルメロースナトリウム)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
クロスカルメロースナトリウム	筋肉内; 注射		1%
クロスカルメロースナトリウム	経口; カプセル		50MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; カプセル (即時型／複合型リリース) ハードゼラチン		30MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; カプセル, 腸溶性 被覆 粒剤		20MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; カプセル, ハードゼラチン		20MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 微粒, 再形成用		143.5MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 微粒, 懸濁用		35.3MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 溶液		
クロスカルメロースナトリウム	経口; 錠剤		180MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 錠剤 (即時型／複合型リリース) フィルム被覆		50MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 錠剤 (即時型／複合型リリース) 被覆なし, 咀嚼剤		18MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 錠剤, 被覆		35.2MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 錠剤, 徐法性		12MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 錠剤, 徐法性, 腸溶性 被覆		32.44MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 錠剤, 徐法性		
クロスカルメロースナトリウム	経口; 錠剤, 持続放出		15MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 錠剤, フィルム被覆		165MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 錠剤, 経口 崩壊性		6MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 錠剤, 砂糖 被覆		2.5MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 錠剤, 徐効性		28MG
クロスカルメロースナトリウム	経口; 錠剤, 被覆なし, トローチ		10MG
クロスカルメロースナトリウム	経口-21; 錠剤		3MG
クロスカルメロースナトリウム	経口-28; 錠剤		3MG
クロスカルメロースナトリウム	経口-28; 錠剤, 被覆		2MG
クロスカルメロースナトリウム	舌下; 錠剤		6.5MG

crospovidone(クロスポビドン)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
クロスポビドン	インプラント; ペレット	9003398	2MG
クロスポビドン	関節内; 注射	9003398	0.02%
クロスポビドン	筋肉内; 注射	9003398	0.02%
クロスポビドン	子宮内; 溶液	9003398	
クロスポビドン	経口; カプセル	9003398	30MG
クロスポビドン	経口; カプセル, 被覆, ソフトゼラチン	9003398	14MG
クロスポビドン	経口; カプセル, 腸溶性 被覆 粒剤	9003398	75MG
クロスポビドン	経口; カプセル, ハードゼラチン	9003398	70MG
クロスポビドン	経口; カプセル, 徐効性	9003398	10.71MG
クロスポビドン	経口; 分散性粒子錠剤	9003398	340MG
クロスポビドン	経口; 微粒, 経口用 懸濁	9003398	75MG
クロスポビドン	経口; 粘液	9003398	9MG
クロスポビドン	経口; 粉末, 懸濁用	9003398	5%
クロスポビドン	経口; 懸濁	9003398	0.05%
クロスポビドン	経口; 懸濁, 徐効性	9003398	18.68%

クロスボビドン	経口；錠剤	9003398	300MG
クロスボビドン	経口；錠剤（即時型／複合型リリース）、フィルム被覆	9003398	15MG
クロスボビドン	経口；錠剤（即時型／複合型リリース）、被覆なし、咀嚼剤	9003398	100MG
クロスボビドン	経口；錠剤、被覆	9003398	792MG
クロスボビドン	経口；錠剤、コントロールリリース	9003398	
クロスボビドン	経口；錠剤、徐法性、腸溶性 被覆	9003398	50MG
クロスボビドン	経口；錠剤、分散性	9003398	6MG
クロスボビドン	経口；錠剤、腸溶性 被覆 砂粒	9003398	130MG
クロスボビドン	経口；錠剤、持続放出	9003398	39.2MG
クロスボビドン	経口；錠剤、フィルム被覆	9003398	196.7MG
クロスボビドン	経口；錠剤、多層、持続放出	9003398	5MG
クロスボビドン	経口；錠剤、経口 崩壊性	9003398	180MG
クロスボビドン	経口；錠剤、経口 崩壊性、除法性	9003398	15MG
クロスボビドン	経口；錠剤、複効	9003398	10MG
クロスボビドン	経口；錠剤、徐効性	9003398	144MG
クロスボビドン	経口；錠剤、徐効性、被覆	9003398	15.4MG
クロスボビドン	経口；錠剤、徐効性、フィルム被覆	9003398	5MG
クロスボビドン	経口-21；錠剤	9003398	4.45MG
クロスボビドン	舌下；錠剤	9003398	6.5MG
クロスボビドン	局所；乳剤	9003398	1%
クロスボビドン	局所；ローション	9003398	0.19%
クロスボビドン	膣；座薬	9003398	116.1MG
クロスボビドン	膣；錠剤	9003398	35MG

Chlorocresol(クロロクレゾール)

添加物 (INACT 静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型 (ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
クロロクレゾール	局所L；クリーム、増強	59507	0.10%
クロロクレゾール	局所L；乳剤、クリーム	59507	0.75%

Calcium Silicate(ケイ酸カルシウム)

添加物 (INACT 静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型 (ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
ケイ酸カルシウム	経口；カプセル、ソフトゼラチン	10101390	1.03MG
ケイ酸カルシウム	経口；錠剤	10101390	146.13MG
ケイ酸カルシウム	経口；錠剤、被覆	10101390	143MG
ケイ酸カルシウム	経口；錠剤、フィルム被覆	10101390	182.7MG
ケイ酸カルシウム	経口；錠剤、徐効性	10101390	15MG

Magnesium Silicate(ケイ酸マグネシウム)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
ケイ酸マグネシウム	経口; ドロップ	12511318	0.17%
ケイ酸マグネシウム	経口; 微粒	12511318	8.3MG
ケイ酸マグネシウム	経口; 懸濁	12511318	6.40%
ケイ酸マグネシウム	経口; 錠剤	12511318	24MG
ケイ酸マグネシウム	経口; 錠剤 (即時型／複合型リリース) 被覆なし, 咀嚼剤	12511318	8MG
ケイ酸マグネシウム	直腸; 懸濁	12511318	1%
ケイ酸マグネシウム	局所; 乳剤, クリーム	12511318	1.50%
ケイ酸マグネシウム	局所; ローション	12511318	1.50%
ケイ酸マグネシウム	局所L; シャンプー, 懸濁	12511318	0.85%
ケイ酸マグネシウム	腔;軟膏	12511318	5%
ケイ酸マグネシウム	経口; カプセル	1343880	40MG
ケイ酸マグネシウム	経口; 錠剤	1343880	10MG
ケイ酸マグネシウム	経口; 錠剤, 被覆	1343880	29.03MG
ケイ酸マグネシウム	経口; 錠剤, 腸溶性 被覆 砂粒	1343880	30MG
ケイ酸マグネシウム	経口; 錠剤, フィルム被覆	1343880	14.3MG

Aluminum Magnesium Silicate(ケイ酸マグネシウムアルミニウム)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
ケイ酸マグネシウムアルミニウム	経口; ドロップ	12511318	0.17%
ケイ酸マグネシウムアルミニウム	経口; 微粒	12511318	8.3MG
ケイ酸マグネシウムアルミニウム	経口; 懸濁	12511318	6.40%
ケイ酸マグネシウムアルミニウム	経口; 錠剤	12511318	24MG
ケイ酸マグネシウムアルミニウム	経口; 錠剤 (即時型／複合型リリース) 被覆なし, 咀嚼剤	12511318	8MG
ケイ酸マグネシウムアルミニウム	直腸; 懸濁	12511318	1%
ケイ酸マグネシウムアルミニウム	局所L; 乳剤, クリーム	12511318	1.50%
ケイ酸マグネシウムアルミニウム	局所L; ローション	12511318	1.50%
ケイ酸マグネシウムアルミニウム	局所L; シャンプー, 懸濁	12511318	0.85%
ケイ酸マグネシウムアルミニウム	腔;軟膏	12511318	5%

Lecithin(レシチン)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
ヤシ油レシチン	経口; カプセル, ソフトゼラチン		
ジミリスチルレシチン	静脈; 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	18194246	7.05%
ジミリスチルレシチン	静注 (輸液); 懸濁, 注射	18194246	0.34%
ジオレイルレシチン	硬膜外; 注射, 懸濁, 細胞内脂肪粒子		0.42%
ジステアリルレシチン	静脈; 溶液, 細胞内微粒子, 注射	92129129	2.80%
プロピレングリコール - レシチン	頬; 貼付 コントロールリリース		49.4MG
プロピレングリコール - レシチン	経口; 溶液		99.32%

Sesame Oi(ゴマ油)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
ゴマ油	伝染性単核球症－幹細胞；注射	8008740	
ゴマ油	伝染性単核球症－幹細胞；注射，徐効性	8008740	
ゴマ油	筋肉内；注射	8008740	
ゴマ油	筋肉内；注射	8008740	70%
ゴマ油	経口；カプセル	8008740	162.5MG
ゴマ油	経口；濃縮	8008740	
ゴマ油	経口；乳剤	8008740	
ゴマ油	経口；錠剤，被覆	8008740	

Cholesterol(コレステロール)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
コレステロール	硬膜外；注射，懸濁，細胞内脂肪粒子	57885	0.33%
コレステロール	静脈；注射，粉末，凍結乾燥，FOR 細胞内脂肪粒子 懸濁	57885	5.20%
コレステロール	静脈；注射，懸濁，細胞内脂肪粒子	57885	0.32%
コレステロール	静脈；溶液，細胞内微粒子，注射	57885	0.68%
コレステロール	眼；粉末，FOR 懸濁	57885	
コレステロール	局所L；乳剤，クリーム	57885	1%
コレステロール	局所L；ローション	57885	1.50%
コレステロール	局所L；軟膏	57885	5%
コレステロール	腔；乳剤，クリーム	57885	0.50%
ラノリン コレステロール	局所L；乳剤		
ラノリン コレステロール	局所L；スポンジ		

Saccharin(サッカリン)

添加物(INACT静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
サッカリン	吸入；エアゾール，定量式	81072	0.11%
サッカリン	経口；エアゾール，定量式	81072	
サッカリン	経口；微粒，FOR 懸濁	81072	16MG
サッカリン	経口；粉末，FOR 溶液	81072	
サッカリン	経口；溶液	81072	1%
サッカリン	経口；懸濁	81072	1%
サッカリン	経口；シロップ	81072	0.10%
サッカリン	経口；錠剤	81072	
サッカリン	経口；錠剤（即時型／複合型リリース）被覆なし，咀嚼剤	81072	
サッカリン	舌下；錠剤	81072	0.2MG
サッカリン	局所L；軟膏	81072	0.50%
サッカリン	局所L；溶液	81072	
サッカリンカルシウム	経口；溶液	6381915	1.75%

サッカリンカルシウム	経口；シロップ	6381915	0.05%
サッカリンナトリウム	頬/舌下；錠剤	6155573	0.4MG
サッカリンナトリウム	歯科；ジェル	6155573	0.30%
サッカリンナトリウム	歯科；PASTE	6155573	
サッカリンナトリウム	歯科；溶液	6155573	0.15%
サッカリンナトリウム	伝染性単核球症－静注；注射	6155573	0.09%
サッカリンナトリウム	吸入；エアゾール，定量式	6155573	0.05%
サッカリンナトリウム	吸入；溶液	6155573	
サッカリンナトリウム	筋肉内；注射	6155573	0.09%
サッカリンナトリウム	静脈；注射	6155573	0.09%
サッカリンナトリウム	静注（輸液）；注射	6155573	0.09%
サッカリンナトリウム	経口；カプセル	6155573	2.02MG
サッカリンナトリウム	経口；カプセル，ソフトゼラチン	6155573	0.51MG
サッカリンナトリウム	経口；濃縮	6155573	0.15%
サッカリンナトリウム	経口；液体	6155573	0.06%
サッカリンナトリウム	経口；粉末，経口用懸濁	6155573	0.07%
サッカリンナトリウム	経口；粉末，再形成用	6155573	0.31%
サッカリンナトリウム	経口；粉末，溶液用	6155573	53.32%
サッカリンナトリウム	経口；粉末，懸濁用	6155573	1.34%
サッカリンナトリウム	経口；溶液	6155573	5%
サッカリンナトリウム	経口；溶液，エリキシル	6155573	1.50%
サッカリンナトリウム	経口；懸濁	6155573	1.40%
サッカリンナトリウム	経口；懸濁，液体	6155573	0.05%
サッカリンナトリウム	経口；懸濁，徐効性	6155573	
サッカリンナトリウム	経口；シロップ	6155573	5%
サッカリンナトリウム	経口；錠剤	6155573	20MG
サッカリンナトリウム	経口；錠剤（即時型／複合型リリース），被覆なし，咀嚼剤	6155573	9MG
サッカリンナトリウム	経口；錠剤，フィルム被覆	6155573	1MG
サッカリンナトリウム	直腸；溶液	6155573	0.09%
サッカリンナトリウム	直腸；懸濁	6155573	0.02%
サッカリンナトリウム	直腸；錠剤	6155573	0.6MG
サッカリンナトリウム	舌下；錠剤	6155573	1MG
サッカリンナトリウム	局所；軟膏	6155573	
サッカリンナトリウム，無水物	伝染性単核球症－静注；注射	128449	0.09%
サッカリンナトリウム，無水物	筋肉内；注射	128449	
サッカリンナトリウム，無水物	静注（輸液）；注射	128449	0.09%
サッカリンナトリウム，無水物	経口；粉末，溶液用	128449	
サッカリンナトリウム，無水物	経口；粉末，懸濁用	128449	1.88%
サッカリンナトリウム，無水物	経口；溶液	128449	66.70%
サッカリンナトリウム，無水物	経口；溶液，エリキシル	128449	
サッカリンナトリウム，無水物	経口；懸濁	128449	0.33%
サッカリンナトリウム，無水物	経口；シロップ	128449	0.08%
サッカリンナトリウム，無水物	経口；錠剤	128449	2.08MG
サッカリンナトリウム，無水物	経口；錠剤（即時型／複合型リリース），被覆なし，咀嚼剤	128449	7.5MG
サッカリンナトリウム，無水物	直腸；溶液	128449	66.70%

Beeswax(サラシミツロウ)

添加物(INACTIVE 静脈E INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAX筋肉内UM POTENCY最大投与量)
ミツロウ	経口; カプセル		2MG
ミツロウ	経口; カプセル, ソフトゼラチン		16.8MG
ミツロウ	経口; カプセル, 徐効性		15.7857MG
ミツロウ	経口; 錠剤		0.44MG
ミツロウ	経口; 錠剤, 被覆		0.53MG
ミツロウ	経口; 錠剤, 徐法性, 腸溶性 被覆		0.1MG
ミツロウ	経口; 錠剤, 徐法性		
ミツロウ	局所; 乳剤, クリーム		5%
ミツロウ	局所; 軟膏		20%
ミツロウ, 合成	局所; 乳剤, クリーム		3.50%

Diisopropanolamine(ジイソプロパノールアミン)

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
ジイソプロパノールアミン	局所; 乳剤, クリーム	110974	0.12%
ジイソプロパノールアミン	局所; ジェル	110974	0.20%
ジイソプロパノールアミン	局所; 溶液	110974	

Diethanolamine(ジエタノールアミン)

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
ヤシ油脂肪酸時エタノールアミド	局所; エアゾール, 定量	61791319	3%
ヤシ油脂肪酸時エタノールアミド	局所; 乳剤, クリーム	61791319	4%
ヤシ油脂肪酸時エタノールアミド	局所; シャンプー	61791319	3.50%
ヤシ油脂肪酸時エタノールアミド	局所; 溶液	61791319	4%
ヤシ油脂肪酸時エタノールアミド	局所; スポンジ	61791319	20.2MG
ヤシ油脂肪酸時エタノールアミド	局所; 懸濁	61791319	4%
ジエタノールアミン	静脈(輸液); 注射	111422	1.50%
ジエタノールアミン	眼; 溶液	111422	
ジエタノールアミン	局所; 乳剤, クリーム	111422	0.30%

Dipropylene Glycol(ジプロピレングリコ

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
ジプロピレングリコール	口腔; パッチ, コントロールリリース	110985	29.9MG
ジプロピレングリコール	経皮; フィルム, コントロールリリース	110985	12MG
ジプロピレングリコール	経皮; パッチ, コントロールリリース	110985	0.218MG

Tartaric Acid(酒石酸)

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
酒石酸	筋肉内;注射	87694	0.35%
酒石酸	静脈;注射	87694	0.20%
酒石酸	静脈; 溶液;注射	87694	0.20%
酒石酸	静脈(輸液); 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	87694	2%
酒石酸	経口; カプセル	87694	9MG
酒石酸	経口; カプセル, 持続性	87694	215.1MG
酒石酸	経口; 粉末, 溶液用	87694	
酒石酸	経口; 溶液	87694	0.75%
酒石酸	経口; 錠剤	87694	15MG
酒石酸	経口; 錠剤, 被覆	87694	10MG
酒石酸	経口; 錠剤, フィルム 被覆	87694	30MG
酒石酸	経口; 錠剤, 経口 崩壊	87694	45MG
酒石酸	経口; 錠剤, 持続性	87694	29.2MG
酒石酸	舌下; 錠剤	87694	
酒石酸	局所; フィルム, コントロールリリース	87694	
酒石酸(DL)	筋肉－静脈;注射	133379	
酒石酸(DL)	静脈;注射	133379	
酒石酸(DL)	静脈(輸液);注射	133379	
酒石酸(DL)	経口; 溶液, エリキシル剤	133379	
酒石酸(DL)	経口; シロップ	133379	0.20%
酒石酸(DL)	経口; 錠剤	133379	13.74MG
酒石酸(DL)	経口; 錠剤, 持続性	133379	30MG
酒石酸(DL)	直腸; 坐薬	133379	21.5MG
酒石酸(DL)	舌下; 錠剤	133379	1.5MG
酒石酸(DL)	腔; 坐薬	133379	32.3MG

Potassium Bitartrate(酒石酸水素カリウム)

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
e(酒石酸水素カリウム	経口; 錠剤, コントロールリリース	868144	10MG

Squalane(スクワラン)

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
スクワラン	局所; 乳剤, クリーム	111013	6%
スクワラン	局所; 溶液	111013	1%

Acetic Acid(酢酸)

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
酢酸	耳；懸濁		
酢酸	筋肉－静脈－皮下;注射		
酢酸	筋肉－静脈;注射		
酢酸	筋肉内－皮下;注射		
酢酸	筋肉内;注射		0.02%
酢酸	静脈; 注射		0.01%
酢酸	静脈;注射		12.75%
酢酸	静脈（輸液）;注射		1%
酢酸	眼; 粉末, 溶液用		
酢酸	眼; 溶液		0.04%
酢酸	経口; カプセル, 持続性		
酢酸	皮下;注射		
酢酸	皮下; 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥		
酢酸	皮下; 溶液;注射		
酢酸	局所; 溶液		
酢酸	局所; スポンジ		
酢酸	局所; 懸濁		0.04%
酢酸(氷酢酸)	AN,浸潤;注射	64197	
酢酸(氷酢酸)	耳 溶液	64197	
酢酸(氷酢酸)	耳；懸濁	64197	
酢酸(氷酢酸)	耳; 懸濁, 液体	64197	2.55%
酢酸(氷酢酸)	体外; 溶液	64197	
酢酸(氷酢酸)	筋肉－静脈－皮下;注射	64197	0.35%
酢酸(氷酢酸)	筋肉－静脈－皮下; 粉末, 注射用 溶液	64197	
酢酸(氷酢酸)	筋肉－静脈;注射	64197	0.25%
酢酸(氷酢酸)	筋肉内－皮下;注射	64197	0.20%
酢酸(氷酢酸)	筋肉内－皮下;注射, 持続性	64197	
酢酸(氷酢酸)	関節内;注射	64197	
酢酸(氷酢酸)	病巣内;注射	64197	
酢酸(氷酢酸)	筋肉内;注射	64197	0.25%
酢酸(氷酢酸)	滑液嚢内;注射	64197	
酢酸(氷酢酸)	静脈; 注射	64197	0.05%
酢酸(氷酢酸)	静脈;注射	64197	0.36%
酢酸(氷酢酸)	静脈; 溶液;注射	64197	0.05%
酢酸(氷酢酸)	洗浄; 溶液	64197	
酢酸(氷酢酸)	静脈－皮下;注射	64197	0.20%
酢酸(氷酢酸)	静脈－皮下; 液体	64197	0.20%
酢酸(氷酢酸)	静脈（輸液）;注射	64197	0.44%
酢酸(氷酢酸)	静脈(輸液); 粉末, 注射 溶液用, 凍結乾燥	64197	0.27%
酢酸(氷酢酸)	静脈（輸液）; 溶液;注射	64197	0.72%
酢酸(氷酢酸)	鼻; 溶液	64197	
酢酸(氷酢酸)	鼻; 噴霧, 定量	64197	
酢酸(氷酢酸)	神経ブロック;注射	64197	
酢酸(氷酢酸)	眼; 溶液	64197	0.20%
酢酸(氷酢酸)	眼; 溶液, ドロップ	64197	0.09%
酢酸(氷酢酸)	経口; カプセル	64197	
酢酸(氷酢酸)	経口; カプセル, ハードゼラチン	64197	
酢酸(氷酢酸)	経口; 濃縮	64197	
酢酸(氷酢酸)	経口; 溶液, エリキシル剤	64197	0.11%

酢酸(氷酢酸)	経口; 溶液, シロップ	64197	0.10%
酢酸(氷酢酸)	経口; 錠剤	64197	0.002MG
酢酸(氷酢酸)	PHOTOPHERESIS; 溶液	64197	
酢酸(氷酢酸)	軟組織; 注射	64197	
酢酸(氷酢酸)	皮下; 注射	64197	
酢酸(氷酢酸)	皮下; 液体	64197	0.01%
酢酸(氷酢酸)	皮下; 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	64197	0.04%
酢酸(氷酢酸)	皮下; 溶液, 注射	64197	0.11%
酢酸(氷酢酸)	局所; ローション	520456	11.60%
酢酸(氷酢酸)	局所; シャンプー	520456	
トリフロロ酢酸	静脈(輸液); 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥		

Potassium Acetate(酢酸カリウム)

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路/剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
酢酸カリウム	眼; 粉末, 溶液用	127082	4%
酢酸カリウム	直腸; かん腸	127082	0.41%

Calcium Acetate(酢酸カルシウム)

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路/剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
酢酸カルシウム	経口; 懸濁	62544	
酢酸カルシウム	経口-20; 錠剤	62544	
酢酸カルシウム	経口-21; 錠剤	62544	10MG
酢酸カルシウム	経口-28; 錠剤	62544	10MG
酢酸カルシウム	局所; 乳剤, クリーム	62544	0.09%
酢酸カルシウム	局所; ローション	62544	

Sodium Acetate (酢酸ナトリウム水和物)

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型 (ROUTE; DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
酢酸ナトリウム水和物	耳 (OTIC); 溶液	6131904	0.08%
酢酸ナトリウム水和物	耳 (OTIC); 溶液, ドロップ	6131904	0.03%
酢酸ナトリウム水和物	耳 (OTIC); 懸濁	6131904	0.04%
酢酸ナトリウム水和物	耳 (OTIC); 懸濁, 液体	6131904	6.80%
酢酸ナトリウム水和物	体外; 溶液	6131904	0.18%
酢酸ナトリウム水和物	筋肉－静脈 - 皮下; 注射	6131904	0.65%
酢酸ナトリウム水和物	筋肉－静脈; 注射	6131904	0.97%
酢酸ナトリウム水和物	筋肉内 - 皮下; 注射	6131904	0.20%
酢酸ナトリウム水和物	間質; 注射	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	関節内; 注射	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	空洞内; 注射	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	皮内; 注射	6131904	0.16%
酢酸ナトリウム水和物	病巣内; 注射	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	筋肉内; 注射	6131904	0.40%
酢酸ナトリウム水和物	眼球内 溶液	6131904	0.39%
酢酸ナトリウム水和物	腹腔内; 注射	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	胸膜内; 注射	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	滑液嚢内; 注射	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	静脈; 注射	6131904	0.05%
酢酸ナトリウム水和物	静脈; 注射	6131904	12.25%
酢酸ナトリウム水和物	静脈; 溶液	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	静脈; 溶液, 注射	6131904	0.02%
酢酸ナトリウム水和物	静脈 - 皮下; 注射	6131904	0.20%
酢酸ナトリウム水和物	静脈 - 皮下; 液体	6131904	0.20%
酢酸ナトリウム水和物	静脈 (輸液); 注射	6131904	59.40%
酢酸ナトリウム水和物	静脈 (輸液); 溶液, 注射	6131904	1.70%
酢酸ナトリウム水和物	鼻; 溶液	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	眼; 粉末, 溶液用	6131904	0.39%
酢酸ナトリウム水和物	眼; 溶液	6131904	0.35%
酢酸ナトリウム水和物	眼; 溶液, ドロップ	6131904	1.28%
酢酸ナトリウム水和物	眼; 懸濁, ドロップ	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	経口; カプセル, 持続性	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	経口; 濃縮	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	経口; 粉末, 溶液用	6131904	9.93%
酢酸ナトリウム水和物	経口; 溶液	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	経口; 溶液, シロップ	6131904	0.11%
酢酸ナトリウム水和物	軟組織; 注射	6131904	
酢酸ナトリウム水和物	皮下; 注射	6131904	0.14%
酢酸ナトリウム水和物	皮下; 液体	6131904	0.15%
酢酸ナトリウム水和物	皮下; 溶液, 注射	6131904	0.16%
酢酸ナトリウム水和物	局所; 懸濁	6131904	0.03%
酢酸ナトリウム, 無水物	筋肉－静脈; 注射	127093	
酢酸ナトリウム, 無水物	筋肉内 - 皮下; 注射	127093	0.07%
酢酸ナトリウム, 無水物	筋肉内; 注射	127093	0.47%
酢酸ナトリウム, 無水物	静脈; 注射	127093	0.01%
酢酸ナトリウム, 無水物	静脈; 溶液	127093	17.70%
酢酸ナトリウム, 無水物	静脈 (輸液); 注射	127093	6.25%
酢酸ナトリウム, 無水物	経口; 溶液	127093	17.70%
酢酸ナトリウム, 無水物	皮下; 注射	127093	0.16%
酢酸ナトリウム, 無水物	皮下; 粉末, 注射用 溶液, 凍結乾燥	127093	0.01%
酢酸ナトリウム, 無水物	局所; 乳剤, クリーム	127093	0.02%

Zinc Acetate (酢酸亜鉛)

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型 (ROUTE; DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
酢酸亜鉛	皮下; 注射	557346	
酢酸亜鉛	皮下; 粉末, 注射用 懸濁	557346	0.23%
酢酸亜鉛	局所; ローション	557346	1.20%
酢酸亜鉛	局所; 溶液	557346	0.00%
酢酸亜鉛	局所; スワブ	557346	12000MG

Aluminum Hydroxide Gel (水酸化アルミニウムゲル)

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型 (ROUTE; DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
水酸化アルミニウムゲル	経口; 懸濁	12040594	
水酸化アルミニウムゲル	経口; 錠剤	12040594	85MG
水酸化アルミニウムゲル	局所; 乳剤, クリーム	12040594	5%
水酸化アルミニウムゲル F 500	局所; 乳剤, クリーム		2%
水酸化アルミニウムゲル F 5000	局所; 乳剤, クリーム		3%
A水酸化アルミニウムゲル, DRIED	経口; 錠剤	8012633	0.173MG

Magnesium Hydroxide (水酸化マグネシウム)

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型 (ROUTE; DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
水酸化マグネシウム	経口; カプセル, 腸 被覆 小球	1309428	
水酸化マグネシウム	経口; 粉末, 経口 用懸濁	1309428	25%
水酸化マグネシウム	経口; 錠剤	1309428	40MG
水酸化マグネシウム	経口; 錠剤 (筋肉内即時型／複合型リリース), 被覆されていない, 咀嚼剤	1309428	450MG
水酸化マグネシウム	経口; 錠剤, コントロールリリース	1309428	0.42MG
水酸化マグネシウム	経口; 錠剤, フィルム 被覆	1309428	43.4MG
水酸化マグネシウム	経口; 錠剤, 持続性	1309428	0.794MG

Stearyl Alcohol(ステアリルアルコール)

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
イソステアリルアルコール	局所; 乳剤, クリーム		3%
イソステアリルアルコール	局所; ローション		25%
イソステアリルアルコール	局所; 軟膏		
イソステアリルアルコール	局所; 懸濁		2.50%
ステアリルアルコール	経口; カプセル, 持続性	112925	72MG
ステアリルアルコール	経口; 錠剤, コントロールリリース	112925	25MG
ステアリルアルコール	経口; 錠剤, 持続性	112925	244MG
ステアリルアルコール	経口; 錠剤, 持続性, フィルム 被覆	112925	60MG
ステアリルアルコール	局所; エアゾール	112925	0.52%
ステアリルアルコール	局所; クリーム, 増加	112925	4%
ステアリルアルコール	局所; クリーム, 乳剤, 持続放出	112925	3%
ステアリルアルコール	局所; 乳剤, エアゾール泡	112925	0.53%
ステアリルアルコール	局所; 乳剤, クリーム	112925	30%
ステアリルアルコール	局所; ローション	112925	12%
ステアリルアルコール	局所; 軟膏	112925	8%
ステアリルアルコール	局所; 懸濁	112925	2.01%
ステアリルアルコール	腔; 乳剤, クリーム	112925	42.50%
ステアリルアルコール	腔; 坐薬	112925	

Stearic Acid

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
イソステアリン酸	局所; 乳剤, クリーム		25%
イソステアリン酸	局所; 軟膏		
ステアリン酸	口腔/舌下; 錠剤	57114	6MG
ステアリン酸	口腔; 錠剤	57114	5MG
ステアリン酸	筋肉内PLANTATION; ペレット	57114	0.2MG
ステアリン酸	経口; カプセル	57114	52MG
ステアリン酸	経口; カプセル, 被覆, SOFT ジェル ATIN	57114	3MG
ステアリン酸	経口; カプセル, HARD ジェル ATIN	57114	15MG
ステアリン酸	経口; カプセル, 持続性	57114	9.32MG
ステアリン酸	経口; 粉末, FOR 懸濁	57114	24.06%
ステアリン酸	経口; 懸濁	57114	86.18%
ステアリン酸	経口; シロップ	57114	
ステアリン酸	経口; 錠剤	57114	72MG
ステアリン酸	経口; 錠剤 (筋肉内即時型／複合型リリース), 被覆していない, 咀嚼剤	57114	15MG
ステアリン酸	経口; 錠剤, 被覆	57114	42.4MG
ステアリン酸	経口; 錠剤, コントロールリリース	57114	1.75MG
ステアリン酸	経口; 錠剤, 遅延作用 腸 被覆	57114	8MG
ステアリン酸	経口; 錠剤, 腸 被覆粒子	57114	5MG

ステアリン酸	経口; 錠剤, 持続放出	57114	180MG
ステアリン酸	経口; 錠剤, フィルム 被覆	57114	22MG
ステアリン酸	経口; 錠剤, SUGAR 被覆	57114	0.9MG
ステアリン酸	経口; 錠剤, 持続性	57114	187.5MG
ステアリン酸	経口; 錠剤, 持続性, 多層, フィルム 被覆	57114	26.48MG
ステアリン酸	経口; 錠剤, 持続放出, フィルム 被覆	57114	9MG
ステアリン酸	経口-21; 錠剤	57114	1MG
ステアリン酸	経口-28; 錠剤	57114	1MG
ステアリン酸	皮下; 筋肉内PLANT	57114	1.02MG
ステアリン酸	舌下; 錠剤	57114	5.049MG
ステアリン酸	局所; クリーム, 増加	57114	3%
ステアリン酸	局所; クリーム, 乳剤, 持続放出	57114	4%
ステアリン酸	局所; 乳剤, クリーム	57114	22.60%
ステアリン酸	局所; ローション	57114	20%
ステアリン酸	局所; 軟膏	57114	15%
ステアリン酸	局所; 溶液	57114	
ステアリン酸	局所; 懸濁	57114	1.75%
ステアリン酸	腔; 乳剤, クリーム	57114	14%
ステアリン酸	腔; 錠剤	57114	60MG

Aluminum Stearate(ステアリン酸アル

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路/剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
ステアリン酸アルミニウム	経口; カプセル, 持続性	7047849	0.4MG
ステアリン酸アルミニウム	経口; 錠剤	7047849	2.8MG
ステアリン酸アルミニウム	経口; 錠剤, 持続性	7047849	105MG
ステアリン酸アルミニウム	局所; 乳剤, クリーム	7047849	0.01%
ステアリン酸アルミニウム	局所; 軟膏	7047849	0.01%

Calcium Stearate(ステアリン酸カルシ

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
ステアリン酸カルシウム	口腔/舌下; 錠剤	1592230	1.42MG
ステアリン酸カルシウム	経口; カプセル	1592230	21.1MG
ステアリン酸カルシウム	経口; カプセル,ハードゼラチン	1592230	1MG
ステアリン酸カルシウム	経口; カプセル, 持続性	1592230	91.9MG
ステアリン酸カルシウム	経口; 粉末	1592230	3%
ステアリン酸カルシウム	経口; 錠剤	1592230	42.9MG
ステアリン酸カルシウム	経口; 錠剤 (筋肉内即時型／複合型リリース), UN被覆, 咀嚼剤	1592230	47.5MG
ステアリン酸カルシウム	経口; 錠剤, 遅延作用 腸 被覆	1592230	3.2MG
ステアリン酸カルシウム	経口; 錠剤, フィルム 被覆	1592230	16MG
ステアリン酸カルシウム	経口; 錠剤, 持続性	1592230	24MG
ステアリン酸カルシウム	経口-21; 錠剤	1592230	0.7MG
ステアリン酸カルシウム	経口-28; 錠剤	1592230	
ステアリン酸カルシウム	舌下; 錠剤	1592230	2MG

Sodium Stearate(ステアリン酸ナトリウ

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
ステアリン酸ナトリウム	経口; 錠剤	822162	9.48MG
ステアリン酸ナトリウム	経口; 錠剤, 経口 崩壊	822162	0.85MG

Polyoxyl 40 Stearate(ステアリン酸ポリオキシシル40)

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路／剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
ステアリン酸ポリオキシシル40	耳 (OTIC); 懸濁	9004993	1%
ステアリン酸ポリオキシシル40	歯; 溶液	9004993	
ステアリン酸ポリオキシシル40	眼; 軟膏	9004993	
ステアリン酸ポリオキシシル40	眼; 溶液	9004993	7%
ステアリン酸ポリオキシシル40	眼; 懸濁	9004993	0.50%
ステアリン酸ポリオキシシル40	経口; カプセル	9004993	2.4MG
ステアリン酸ポリオキシシル40	経口; カプセル,ハードゼラチン	9004993	0.6MG
ステアリン酸ポリオキシシル40	経口; 濃縮	9004993	
ステアリン酸ポリオキシシル40	経口; 顆粒	9004993	
ステアリン酸ポリオキシシル40	経口; 粉末	9004993	
ステアリン酸ポリオキシシル40	経口; 錠剤, フィルム 被覆	9004993	2MG
ステアリン酸ポリオキシシル40	局所; 乳剤 エアゾール泡	9004993	1.08%
ステアリン酸ポリオキシシル40	局所; 乳剤 クリーム	9004993	8.80%
ステアリン酸ポリオキシシル40	局所; ローション	9004993	5.10%
ステアリン酸ポリオキシシル40	局所; 軟膏	9004993	
ステアリン酸ポリオキシシル40	局所; スポンジ	9004993	

Magnesium Stearate(ステアリン酸マグネシウム)

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路/剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
ステアリン酸マグネシウム	口腔/舌下; 錠剤	557040	17.5MG
ステアリン酸マグネシウム	口腔; 錠剤	557040	2.5MG
ステアリン酸マグネシウム	筋肉内PLANTATION; 注射	557040	0.00%
ステアリン酸マグネシウム	硝子体内; 筋肉内PLANT	557040	0.0048MG
ステアリン酸マグネシウム	硝子体内; 注射	557040	0.00%
ステアリン酸マグネシウム	経口; カプセル	557040	256.4MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; カプセル (筋肉内即時型/複合型リリース),ハードゼラチン	557040	10MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; カプセル, 被覆 小球	557040	0.15MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; カプセル, 被覆, Sソフトゼラチン	557040	3MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; カプセル, 遅延作用	557040	2.604MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; カプセル, 腸 被覆 小球	557040	34.87MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; カプセル, 持続放出	557040	9.157MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; カプセル,ハードゼラチン	557040	11.4MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; カプセル, ソフトゼラチン	557040	9MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; カプセル, 持続性	557040	100MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 濃縮	557040	
ステアリン酸マグネシウム	経口; 分散性 錠剤	557040	
ステアリン酸マグネシウム	経口; ドロップ	557040	
ステアリン酸マグネシウム	経口; 顆粒	557040	1.25MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 顆粒, 経口用 懸濁	557040	2.6MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 粘液	557040	4.5MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 粉末, 懸濁用	557040	0.65%
ステアリン酸マグネシウム	経口; 懸濁	557040	5.76%
ステアリン酸マグネシウム	経口; 懸濁, 持続性	557040	2.70%
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤	557040	400.748MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤 (筋肉内即時型/複合型リリース),フィルム 被覆	557040	10MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤 (筋肉内即時型/複合型リリース), 被覆なし, 咀嚼剤	557040	50MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 被覆	557040	40MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, コントロールリリース	557040	3.335MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 遅延作用	557040	3MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 遅延作用 腸 被覆	557040	53.8MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 遅延作用	557040	
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 腸 被覆粒子	557040	7MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 持続放出	557040	15MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤,フィルム 被覆	557040	28.31MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 多層, 被覆	557040	3MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 多層, 持続放出	557040	1.2MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 経口LY 崩壊	557040	28.07MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 経口LY 崩壊, 遅延作用E	557040	6MG

ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 複効	557040	1.2MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 持続性	557040	150MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 持続性, 被覆	557040	10MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 持続性, フィルム 被覆	557040	15.8MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; 錠剤, 被覆なし, トローチ	557040	9MG
ステアリン酸マグネシウム	経口; トローチ	557040	21MG
ステアリン酸マグネシウム	経口-20; 錠剤	557040	1.5MG
ステアリン酸マグネシウム	経口-21; 錠剤	557040	1.5MG
ステアリン酸マグネシウム	経口-21; 錠剤, 被覆	557040	0.88MG
ステアリン酸マグネシウム	経口-28; 錠剤	557040	75MG
ステアリン酸マグネシウム	経口-28; 錠剤, 被覆	557040	0.88MG
ステアリン酸マグネシウム	皮下; 筋肉内PLANT	557040	0.5MG
ステアリン酸マグネシウム	舌下; 錠剤	557040	3MG
ステアリン酸マグネシウム	局所; 乳剤 クリーム	557040	0.00%
ステアリン酸マグネシウム	腔; スポンジ	557040	0.85MG
ステアリン酸マグネシウム	腔; 錠剤	557040	17MG
ステアリン酸マグネシウム	腔; 錠剤, フィルム 被覆	557040	0.4MG

Zinc Stearate(ステアリン酸亜鉛)

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路/剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
ステアリン酸亜鉛	経口; カプセル	557051	2.04MG
ステアリン酸亜鉛	経口; シロップ	557051	
ステアリン酸亜鉛	経口; 錠剤	557051	10.2MG
ステアリン酸亜鉛	経口; 錠剤, フィルム 被覆	557051	4.615MG
ステアリン酸亜鉛	経口; 錠剤, 持続性	557051	36MG

Sucrose(精製白糖)

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	投与経路/剤型(ROUTE;DOSAGE FORM)	CAS NUMBER	MAXIMUM POTENCY最大投与量)
水酸化アルミニウム - 精製白糖, 水和	局所; 乳剤 クリーム		
リン酸カルシウム水和物-白糖 塊	経口; 錠剤, 被覆		
DC ANTIFOAM AF TRITURATION 1% ON SUCROSE	経口; 粉末, FOR 溶液		0.26%
DC ANTIFOAM AF TRITURATION 1% ON SUCROSE	経口; 粉末, FOR 懸濁		
精製白糖	口腔/舌下; 錠剤	57501	91MG
精製白糖	口腔; 錠剤	57501	16.6MG
精製白糖	筋肉内; 粉末, FOR 注射 溶液, 凍結乾燥	57501	6.84%
精製白糖	筋肉内; 溶液, 注射	57501	4.43%
精製白糖	静脈; 注射	57501	19.50%
精製白糖	静脈; 注射, 粉末, 凍結乾燥, FOR リポソーム 懸濁	57501	90%
精製白糖	静脈; 注射, 懸濁, リポソーム	57501	9.40%
精製白糖	静脈; 粉末, FOR 注射 溶液, 凍結乾燥	57501	7.78%