

は困難である。およその目標として、一般病院における入院者のおむつ使用率を20%以下、老人施設における入所者のおむつ使用率を50%以下に設定することは実現可能な目標である。在宅看護関連施設においては、おむつはずしの数値目標の設定は難しいものの、可能例については積極的におむつはずしを考慮することが望ましい。長期尿道カテーテル留置については、病院、施設、在宅関連施設においても10%以下を目標とすることが望ましい。

#### 5. 退院・対処時の排泄管理に関する申し送り

施設の移動時において適切な排泄管理が継続されるためには、施設からの退院・退所時の排泄状態の評価について、移動先への情報伝達（申し送り）が行われなければならない。可能であれば、地域において、各施設間で共通の評価にもとづいた申し送りが望ましい。

### IV. 排泄環境に関する要件（病院、老人施設など入院・入居施設を有する施設）

排泄は極めて個人的な行動であり、適切な排泄管理の実践のためには、快適性、安全性、プライバシー保持の観点からみた排泄環境の保持に関する要件が必要である。下記に示されたトイレ環境に関する条件は、認知、身体機能に障害のある高齢者においても必要となるものである。

1. トイレ配置について：寝室（ベッド）からトイレまでの適切な距離の配慮
2. トイレのスペース：排泄介助可能な十分なスペース
3. トイレのスペース：車椅子利用に適した出入口とスペース
4. 排泄動作をサポートする手すりの配置
5. 適切な洋式便器の設置
6. トイレまで移動するための動線の配慮（段差解消、手すり、照明）
7. 温水洗浄便座（ウォッシュレット）の設置
8. トイレ内の冷暖房の配慮
9. トイレ内の感染症対策の配慮
10. トイレ内の採光・照明などの配慮
11. トイレ内の非常時連絡方法の配慮

## 病院、老人施設、在宅における高齢者排泄管理向上に関する提言

排泄は生活の基本動作であり、排泄の自立は高齢者の尊厳の維持、生活の質の保持につながる重要な課題で、高齢者が健康で幸福な生活を送るためには重要な要件である。超高齢化社会に突入したわが国においては、老人施設や在宅での介護・看護を支える上でその意義が益々高まる一方、その対応については極めて不十分な状況にある。不適切な排泄管理は、離床の阻害、廃用症候群の進行、寝たきり状態への移行の要因となり、また認知症患者では、排泄の問題は介護者の介護負担を増大し、介護者の生活の質も大きく阻害し、寝かせきりや介護放棄といった問題へ発展する事例が少なくない。逆に適切で積極的な排泄リハビリテーションは短に排泄ケアにとどまらず、ADLの改善、高齢者の心身機能の保持、改善、寝たきり防止に有効な、介護予防の機能を担うものである。本邦では、従来高齢者の排泄の問題に関する研究は不十分で、特に在宅あるいは施設における高齢者の介護に直接還元できる現実的な研究は不足しており、医師・看護師、および介護に関わる各専門職の排泄に関する意識、知識、技術の不足、さらに現場での不十分な排泄管理の要因となっている。

適切な排泄リハビリテーションは、一個人あるいは一施設単位で行い得るものではなく、標準指針の作成、人材の育成などの具体的条件やツールを整備した上で、一定の地域単位において行政、高齢者の介護・看護・医療に関わる施設、団体、あるいは種々の専門職が連携をもって行うためのシステムの構築が必要となる。また、システムの運用には、専門知識・技術を有し、システム稼動に力を発揮し得る人材の育成が必須要件となる。さらに、適切な排泄管理を全国的に推進するためには、排泄管理システムについての標準モデルの開発と普及が必要となる。本長寿科学研究主任研究者は他の分担研究者と協力し、すでに高齢者排泄リハビリテーション推進のために、長寿科学総合研究事業を含む研究において、高齢者尿失禁の評価・治療ガイドライン（平成 12-長寿-018）、介護・看護者のための排尿障害診断チェック票（平成 12-長寿-018）、高齢者排泄管理マニュアル（平成 16-長寿-008）、オムツ選択基準（平成 16-長寿-008）、排泄評価票（平成 17-長寿-006）、老人施設・在宅での排泄リハビリテーション施設評価基準（平成 17-長寿-006）などを作成してきた。今回の研究では、高齢者の排泄管理・ケアを介護予防も念頭においた排泄リハビリテーションと位置づけ、高齢者介護・看護の現場において排泄管理の状態を評価し、さらに適切な排泄リハビリテーションを実践するための具体的目標を提示する施設評価基準を作成し、また地域における排泄リハビリテーション実践のための地域モデルの開発を行った。今回作成した施設評価基準、また従来長寿科学研究にて開発した種々のツールが、高齢者介護・看護に関する行政プランニングにおいて活用されることを期待するものである。

研究成果の刊行に関する一覧表  
研究成果の刊行物・別刷り

## 研究成果の刊行に関する一覧表

### 平成 17 年度

1. 後藤百万：在宅高齢者の排泄管理、日経メディカル編「診療・診断法アップデート」、日経 BP 社、東京、57-61、2005
2. 後藤百万：夜間頻尿患者に対する薬物療法の考え方と生活指導、Urology View、3：40-43、2005
3. 後藤百万：頻尿・尿失禁の治療、カレントセラピー、24：19-21、2006
4. 後藤百万：おむつに頼りすぎない「自立支援」の排尿ケア；高齢者における排尿障害の症状と原因疾患、通所ケア、3：32-38、2005
5. Arai Y, Zarit SH, Dennoh H, Kitamoto M Angst in Shangri-la, Japanese fear of growing old, J Am Geriatr Soc, 53:1641-1642, 2005
6. 荒井由美子、熊本圭吾、杉浦ミドリ、鷲尾昌一、三浦宏子、工藤啓：在宅ケアの質評価法 (Home care quality assessment index: HCQAI) の開発、日本老年医学会雑誌、42：432-443、2005
7. 荒井由美子 要介護高齢者を介護する者の介護負担とその軽減について：日本老年医学会雑誌、42：195-198、2005
8. 荒井由美子：家族介護者の介護負担、日本内科学会雑誌、94：1548-1554、2005
9. 岡村菊夫：排尿障害の知識レベルの向上と排泄を専門とする看護師・介護士の育成が急務、GPnet、52 14-19：2005
10. 岡村菊夫、長浜克志、野尻佳克、加納英人、宮崎政美：高齢者のための排尿障害重症度評価基準、日本排尿機能学会誌、16：202-207、2005

### 平成 18 年度

1. 後藤百万：病院から地域（施設・在宅）への排尿ケアの現状と問題、泌尿器ケア、11：10-14、2006
2. 後藤百万：一般内科医が知っておくべき過活動膀胱の診断と治療、クリニカ、33：24-21、2006
3. 後藤百万：頻尿・尿失禁の治療、カレントセラピー、3：32-38、2005
4. 後藤百万：尿流測定と残尿測定、泌尿器外科、19：17-23、2006
5. 後藤百万：過活動膀胱の治療：行動療法、neuromodulation、Pharma Medica、24：33-36、2006
6. 後藤百万 高齢者の過活動膀胱の治療：どのような治療方針が QOL の改善に結びつくのか、Urology View、4：60-65、2006
7. 後藤百万：下部尿路機能障害とは、薬局、57：3-11、2006
8. Gotoh, M, Yoshikawa Y, Ohshima S Pathophysiology and subjective symptoms in women with impaired bladder emptying. International Journal of Urology, 13: 1053-1057, 2006
9. 岡村菊夫、他：一般内科医向きの高齢者排尿障害診断法、クリニカ、33：17-23、2006

10. 岡村菊夫、他：一般内科医向きの排尿障害重症度評価基準、日本泌尿器科学会雑誌、97：568-574、2006
11. 岡村菊夫、他：高齢者の下部尿路機能障害 性差と医療、3：39-44、2006
12. 岡村菊夫、他：診療所における下部尿路症状アンケート調査、日本老年医学会雑誌、43：498-504、2006
13. 岡村菊夫：高齢者のための排尿障害重症度評価基準、日本排尿機能学会雑誌、16：202-207、2005
14. Arai Y: Family caregiver burden and quality of home care in the context of the long-term care insurance scheme: an overview. Psychogeriatrics, 6:134-138, 2006
15. 新田順子、荒井由美子、他：訪問看護師から見た介護者の介護負担の実態、日本老年医学会雑誌、42：181-185、2005
16. 荒井由美子：家族介護者の介護負担と居宅ケアの質の評価、精神科、7：339-344、2005
17. 荒井由美子：家族の介護負担および在宅ケアの質の評価、Modern Physician、25：1150-1153、2005

#### 平成 19 年度

1. 倉澤茂樹、荒井由美子、ほか：訪問看護を利用する要介護高齢者における家族の介護負担感の地域差、老年精神医学雑誌、18：771 - 780、2007
2. 荒井由美子：高齢者を介護する家族の負担、シンプル衛生公衆衛生学（南江堂）、284 - 287、2007
3. 岡村菊夫：水分を控えると梗塞性疾患が予防できるか？Geriat. Med.、45：459-461、2007
4. 岡村菊夫：男性の患者さんが排尿障害を訴えていたら？一般内科における診断・治療のすすめ方、LUTS プライマリケア、3：8-11、2007
5. 岡村菊夫：一般内科医向きの高齢者排尿障害診断法、クリニカ、33：349-355、2007
6. 安部幸志、荒井由美子、後藤百万：看護・介護スタッフにおける排泄ケアに関する自己効力感尺度作成の試み、日本排尿機能学会雑誌、18：275-279、2007
7. 後藤百万：過活動膀胱に対する行動療法、Urology View、5：50-53、2007
8. 後藤百万：高齢者下部尿路機能障害の診断、Geriat. Med.、45：404-411、2007
9. 後藤百万：尿失禁に関わる要因とアセスメント、泌尿器ケア、12：10-14、2007

# 夜間頻尿患者に対する薬物療法の考え方と生活指導

後藤百万

名古屋大学大学院医学系研究科  
泌尿器科学講師

排尿障害の領域において、最近、夜間頻尿が注目されている。その理由は、夜間頻尿の罹患率が高く（本邦で夜間1回以上の夜間頻尿を有する者は4,000万人以上）、生活の質（QOL）の障害度が高い症状であるからである<sup>1)</sup>。また、高齢者では、夜間頻尿は転倒に関与し、骨折、寝たきり状態を誘発することもあり、介護予防の点からも重視すべき症状である。夜間頻尿に対する一般的対処は生活指導と薬物治療であるが、実際の診療では、生活指導は不十分で、安易に薬物治療が行われているのではなかろうか。夜間頻尿の病態、診断、薬物治療については、他稿で詳細に述べられるので、本稿では、生活指導が一次的に重要であり、生活指導のみにより改善できる場合も少なくなく、薬物治療は二次的治療法であるという立場に立ち、薬物治療の考え方と生活指導について述べる。

## 治療方針決定

本号の“Clinical Science”の各項解説されているように、夜間頻尿の病因は

多岐にわたり、膀胱機能（過活動膀胱）、夜間多尿、睡眠障害が単独あるいは合併して症状を引き起こす。治療方針決定は、その病態を正確に把握してから行うべきであり、安易に頻尿・尿失禁治療薬としての抗コリン薬を処方すべきではない。症状・既往歴の問診、身体所見、尿検査、排尿記録、尿流測定、残尿測定により、夜間頻尿の病態の把握はほぼ可能であり、その病態に応じた生活指導、および薬物治療を考慮する。

## 病態による薬物治療の考え方

前述のように、一般医あるいは泌尿器科専門医においても、夜間頻尿に対して抗コリン薬を安易に投与することが少なくない。しかし、夜間頻尿に関与する因子を評価して、生活指導を行い、そのうえで病態に応じた適切な薬剤を投与することが副作用発現の抑制、および十分な治療効果の獲得に重要である。

## 膀胱機能障害（過活動膀胱）

過活動膀胱による夜間頻尿は、機能的膀胱容量の減少がその病態であり、薬物治療では、抗コリン薬による機能的膀胱容量の増加を期待する。現在、抗コリン薬としてはプロピペリン、オキシブチニンが投与されるが、他方、高齢者においては、抗コリン薬長期投与の副作用が問題となる。高齢者は便秘傾向を示すことが多いが、抗コリン薬の投与はさらに便秘を助長する。また、抗コリン薬の中樞神経に対する副作用として認知障害があり、これは認知症を誘発する合併症として注意を要する。最近開発中の抗コリン薬については、脳血管閥門を通過しにくく、認知障害が起りにくくといわれるが、厳密な意味でその安全性が確認されているわけではないので、投与に際しては、十分注意して経過観察を行う必要がある。また、最も頻度の高い副作用である口内乾燥は、高齢者では食事摂取障害をきたすこともある。このように、抗コリン薬による副作用を含めた総合的なQOLを考慮すれば、薬物治療を開始する前に生活指導による改善を図ることは重要である。

前立腺肥大症に伴う夜間頻尿に対しては、 $\alpha_1$ ブロッカーが有効であるとの報告があり、実際に排尿症状のみでなく、蓄尿症状も改善することが示されている<sup>2)</sup>。特に膀胱には $\alpha_{1d}$ 受容体が多く存在すること<sup>3)</sup>、閉塞ラットの膀胱において $\alpha_{1d}$ 受容体のup-regulationが報告されていること<sup>4)</sup>、 $\alpha_{1a}$ に比べ $\alpha_{1d}$ 受容体により選択性の高いナフトピジルが $\alpha_{1a}$ に選択性の高いタムスロシンに比べて夜間

頻尿などの蓄尿症状の改善効果が高いとの臨床報告<sup>5)</sup>より、前立腺肥大症に伴う夜間頻尿に対するナフトピジルの有用性も指摘されている。しかし、最近、下部尿路閉塞を有するヒト膀胱では $\alpha_{1d}$ 受容体に変化のないことが報告され<sup>6)</sup>、さらにナフトピジルとタムスロシンの無作為比較試験において、排尿症状、蓄尿症状いずれにおいても両薬に差のないことが示されている<sup>7)</sup>。

## 夜間多尿

夜間多尿では、治療に先立って循環器系障害、腎機能障害、糖尿病などの内分泌障害など、全身疾患の検索が重要である。明らかな心機能障害、BNP (brain natriuretic peptide; 脳性ナトリウム利尿ペプチド) 測定などにより疑われる潜在性心機能障害、腎機能障害が原因として考えられる場合には、利尿薬の投与により夜間尿量の減少により症状の改善がみられることがある。夜間の抗利尿ホルモン分泌不全により夜間多尿をきたしている場合には、寝前のデスマプレシンの投与（経鼻）により劇的に症状が改善する例がみられるが、心機能障害や腎機能障害を有する例では低ナトリウム血症をきたし、死亡例も報告されていることやデスマプレシン点鼻薬は小児夜尿症には適応認可されているが、夜間頻尿の適応の記載はないこともあり、高齢者では慎重に考慮する必要がある。昼間・夜間の多尿を伴う例では、過剰な水分摂取が関与していることがあり、水分摂取に関する生活指導が一次的な対処となる。

## 睡眠障害

睡眠障害が夜間頻尿の原因となる場合があり、高齢者では、入眠障害より睡眠維持障害が多い。頻尿のために睡眠障害が起こっているのか、睡眠障害のために夜間頻尿が起こっているのかは鑑別の難しいこともあるが、大多数の症例では十分に問診をすることにより推測が可能である。睡眠障害の薬物治療、特に長期にわたる治療は専門医に譲るべきと考えるが、睡眠障害に対する生活指導は泌尿器科においても行うべきであろう。

### 生活指導（図1）

夜間頻尿の病態は必ずしも単一とは限らず、特に高齢者においては複数の因子が重なることが少なくない。その意味でも、薬物治療のみに依存することなく、幅広い生活指導が重要である。

## 水分・食餌摂取指導

### ◆水分摂取量

水分の多量摂取が、血液粘度を下げ、脳梗塞、あるいは虚血性心疾患の予防に有用であるとの考え方が、マスコミなどにより社会に浸透し、過剰な水分摂取が多尿を引き起こし、夜間頻尿の原因となっていることが少なくない。しかし、論文のsystematic reviewによるEBMの観点からは、脱水が脳梗塞や虚血性心疾患の発症因子となることは示されているが、水分摂取がその予防に有用とのエビデンスはない<sup>8)</sup>。水分摂取による脳梗塞・虚血性心疾患予防の概念は、内科医にも浸透し、内科

医の指示により過剰な水分摂取を行う患者は少なくないが、過剰な水分摂取が夜間頻尿につながっている例では、水分摂取抑制を指導すべきである。

◆食餌摂取

食餌と排尿症状との関係についての根拠は必ずしも十分ではないが、カフェインの摂取と頻尿との関連が無作為試験により確認されている<sup>9)</sup>。カフェイ

ンを含む飲料の摂取は、利尿作用による多尿、入眠抑制作用により夜間頻尿に関与することが考えられ、就寝前に摂取しないよう指導する。

アルコールは、就寝前の摂取により(いわゆるナイト・カップ)、よく眠れて夜間頻尿が改善するとの一般的な意見もあるが、実際にはアルコールによる利尿作用、また睡眠に対する障害作


用のため、医学的には推奨されない。

運動

高齢者では、健常者においても、循環器系・腎機能の低下などにより、体液貯留傾向になり、夜間安静時に尿が産生され夜間尿量増加につながる傾向がある。夕方の散歩などの軽運動により、体液貯留を修正することにより夜

図1 夜間頻尿に対する薬物療法の考え方と生活指導

夜間頻尿の病態を診断後、1次的対処として生活指導を行ったうえで、2次的に病態に応じた薬物治療を行う。





間尿量の減少が得られ、夜間頻尿の改善につながることもある。また、夕方の軽運動は睡眠障害に対しても改善効果を有する。

### 着衣・トイレ環境

夜間頻尿の改善に直接かかわるものではないが、身体運動機能低下を伴う高齢者では、夜間は介護者による十分な援助が得られにくいので、トイレへの移動やトイレでの排尿動作が間に合わず尿失禁につながることも多い。さらに、夜間の頻回のトイレ移動が転倒につながることも少なくない。自分ですぐ着脱できるような下着や寝巻きの着用、おむつが必要な例ではパンツ型おむつの使用など、着衣の工夫を指導する。また、特に転倒が心配されるような高齢者では、夜間のポータブルト

イレ、採尿器の使用などを指導する。

### 生活全般

規則正しい就寝・起床時間や食事時間の維持、30分程度の午睡、昼間の活気的な活動など、覚醒状態の質の向上、生活リズムの調整が良好な睡眠につながる。また、安定した睡眠には十分な夜間のメラトニン分泌が必要であり、高齢者ではメラトニン生体リズムの異常が不眠に関与することもあり、昼間の日光浴がリズムの調整に有用といわれる。就寝前1時間以内のぬるめの入浴が交感神経活動亢進の抑制・深部体温低下促進による入眠改善に有用なことがある。

### 行動療法

生活指導ではないが、患者自身が生

活のなかで行うことができる治療として行動療法がある。

#### ◆膀胱訓練

過活動膀胱など、機能的膀胱容量減少がみられる場合に、膀胱訓練は抗コリン薬と同等の有効性を示すことが無作為比較試験により示されている<sup>10)</sup>。膀胱訓練は、少しずつ排尿間隔を延長するもので、尿意あるいは尿意切迫感があっても慌ててトイレに行かずに我慢し、4週間から8週間かけて徐々に機能的膀胱容量の増大を図るものであり、排尿日誌を利用して行うとよい。

#### ◆骨盤底筋訓練

骨盤底筋収縮により、膀胱不随意収縮の抑制が得られることが示され、また臨牀的にも骨盤底筋訓練が過活動膀胱の改善に有効であることが示されている<sup>11)</sup>。

### ◎文献

- 1) 本間之夫, 柿崎秀宏, 後藤百万ほか: 排尿に関する疫学的研究, 日排尿会誌, 14: 1-12, 2003.
- 2) Lepor H, Nieder A, Feser J, et al: Effect of terazosin on prostatism in men with normal and abnormal peak urinary flow rates. *Urology*, 49: 476-480, 1997.
- 3) Malloy BJ, Price DT, Price RR, et al:  $\alpha_1$  adrenergic receptor subtypes in human bladder. *J Urol*, 160: 937-943, 1998.
- 4) Hampel C, Dolber PC, Smith MP, et al: Modulation of bladder  $\alpha_1$  adrenergic receptor subtype expression by bladder outlet obstruction. *J Urol*, 167: 1513-1521, 2002.
- 5) Nishino Y, Ogura T, Yamada T, et al: Assessment of two  $\alpha_1$  adrenoceptor antagonists, naftopidil and tamsulosin hydrochloride, on voiding disturbance in benign prostatic hyperplasia, a randomized cross-over study. *ICS proceedings*, p116, 2002.
- 6) Nomiya M, Yamaguchi O: A quantitative analysis of mRNA expression of  $\alpha_1$  and  $\beta$ -adrenoceptor subtypes and their functional roles in human normal and obstructed bladders. *J Urol*, 170: 649-653, 2003.
- 7) Gotoh M, Kamihira O, Kinukawa T, et al: Comparison of tamsulosin and naftopidil for efficacy and safety in the treatment of benign prostatic hyperplasia: a randomized controlled trial. *BJU Int*, in press.
- 8) 岡村菊夫, 野尻佳克: 水分を多く摂取することで、虚血性心疾患・脳血管障害を予防できるか? 日泌会誌, 96: p371, 2005.
- 9) Bryant CM, Dowell CJ, Fairbrother G: A randomized trial of effects of caffeine upon frequency, urgency and urge incontinence. *Neurology and Urodynamics*, 19: 501-502, 2000.
- 10) Columbo M, Zanetta G, Acalambrino SEA: Oxybutynin and bladder training in the management of female urinary urge incontinence: A randomized study. *Int Urogyn J*, 6: 6-67, 1995.
- 11) Good PS, Burgio KL, Lcher JL, et al: Urodynamic changes associated with behavioral and drug treatment of urge incontinence in older women. *J Am Geriatr Soc*, 50: 801-806, 2002.

# 頻尿・尿失禁の治療

後藤百万\*

## abstract

頻尿・尿失禁の病態は多岐にわたり、種々の下部尿路機能障害に加え、高齢者では循環器系、内分泌系等の全身的異常、他疾患に対して投与されている種々の薬剤の下部尿路機能に対する影響、トイレ環境、生活習慣、介護力等の環境因子などが症状を修飾する。これらの病態が複合的に関与することが少なくないため、適切な対処を行うためには病態の正確な把握が重要であり、病態に基づいて生活指導、行動療法、薬物治療、外科的治療等の治療選択を行う必要がある。

### I はじめに

頻尿・尿失禁などの蓄尿障害は、下部尿路症状のなかでも生活の質（QOL）を障害し、困窮度の高い症状である<sup>1)</sup>。特に高齢者における罹患率は高く、本人のみならず介護者のQOLも障害し、さらに不適切な対処は寝たきりや認知症の助長、治療機会の喪失につながる。逆に適切な治療は生活の質の向上につながり、高齢者においては介護予防としての役割も大きい。他方、頻尿・尿失禁の病態は多岐にわたり、また高齢者では多くの病因が複合して存在することも少なくないため、適切な治療選択においては病態を正確に診断することがきわめて重要となる。病態や各治療法の詳細については他稿にて詳細に述べられるため、本稿では頻尿・尿失禁の治療について、総論的な解説を行う。

### II 頻尿・尿失禁にかかわる病態と疾患

頻尿・尿失禁に関与する病態を、下部尿路機能障

害タイプの観点から表1に分類した。前述のごとく、適切な治療選択のためには頻尿・尿失禁の病態を把握することが重要であるが、実際の症例ではこれらの下部尿路機能障害が複合して存在することがあり、また高齢者においては下部尿路機能障害に加え、循環器系、内分泌系などの全身的異常、他疾患に対して投与されている種々の薬剤の下部尿路機能に対する影響、トイレ環境、生活習慣、介護力等の環境因子なども症状を修飾し、診断や治療を難しくすることがある。

### III 治療の種類

頻尿・尿失禁の治療としては生活指導、行動療法、薬物治療、外科的治療、清潔間歇導尿が挙げられ、行動療法には骨盤底筋訓練等の理学療法、膀胱訓練、排尿誘導等が含まれる。また、そのほかに電気刺激療法、磁気刺激療法等のneuromodulationの有効性が近年報告されている。

\* 名古屋大学大学院医学系研究科泌尿器科学講師

下部尿路機能障害	頻尿・尿失禁の病態	疾患
排尿筋過活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓄尿時の膀胱不随意収縮による機能的膀胱容量の減少</li> <li>尿失禁タイプ（切迫性尿失禁）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中枢神経障害（脳血管障害、パーキンソン病、多発性硬化症、多系統萎縮症等）</li> <li>加齢</li> <li>下部尿路閉塞</li> </ul>
排尿筋低活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>尿排出障害による残尿の増加に基づく機能的膀胱容量の減少</li> <li>膀胱コンプライアンス低下による器質的膀胱容量の減少</li> <li>尿失禁タイプ（溢流性尿失禁）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>末梢神経障害（糖尿病、腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊椎管狭窄症、子宮癌・直腸癌手術等）</li> <li>加齢</li> </ul>
下部尿路閉塞	<ul style="list-style-type: none"> <li>残尿増加による機能的膀胱容量の減少</li> <li>下部尿路閉塞に基づく排尿筋過活動</li> <li>尿失禁タイプ（切迫性尿失禁、溢流性尿失禁）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>前立腺肥大症</li> <li>尿道狭窄、膀胱頸部硬化症</li> </ul>
尿道括約筋不全	<ul style="list-style-type: none"> <li>尿道抵抗の低下</li> <li>尿失禁タイプ（腹圧性尿失禁）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>尿道過可動（妊娠、出産、加齢、婦人科手術による骨盤底筋弛緩）</li> <li>内因性括約筋不全（閉経後の女性ホルモン低下、婦人科手術、放射線治療等による括約筋障害）</li> </ul>
炎症	<ul style="list-style-type: none"> <li>排尿筋過活動</li> <li>知覚神経過敏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>細菌性膀胱炎</li> <li>間質性膀胱炎</li> <li>前立腺炎</li> </ul>
下部尿路機能以外の要因（特に高齢者）		
全身的要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>多尿</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>潜在性心不全、腎機能障害、多飲、抗利尿ホルモン分泌障害、糖尿病等</li> <li>認知症、身体運動障害</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>トイレ習慣や動作の異常</li> </ul>	
環境的要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>トイレ環境の不備</li> <li>着衣の不備</li> <li>介護力の不足</li> <li>薬剤の影響（polypharmacy）</li> </ul>	

表1  
下部尿路機能障害タイプからみた頻尿・尿失禁の病態と疾患

## 生活指導

### 1 水分・食餌摂取指導

水分の多量摂取が血液粘稠度を下げ、脳梗塞、あるいは虚血性心疾患の予防に有用であるとの考え方がマスコミなどにより社会に浸透し、過剰な水分摂取が多尿を引き起こし、夜間頻尿の原因となっていることが少なくない。しかし、論文のsystematic reviewによるEBMの観点からは、脱水が脳梗塞や虚血性心疾患の発症因子となることは示されているが、水分摂取がその予防に有用とのエビデンスはない<sup>2)</sup>。水分摂取による脳梗塞、虚血性心疾患予防の概念は内科医にも浸透し、内科医の指示により過剰な水分摂取を行う患者は少なくないが、過剰な水分摂取が頻尿に関与している例では、水分摂取抑制を

考慮する必要がある<sup>3)</sup>。

食餌と排尿症状との関係についての根拠は必ずしも十分ではないが、カフェインの摂取と頻尿との関連が無作為比較試験により確認されている<sup>4)</sup>。カフェインを含む飲料の摂取は、利尿作用による多尿に伴う頻尿、入眠抑制作用による夜間頻尿に関与することが考えられる。また寝前のアルコール摂取は利尿作用や睡眠障害作用のため、夜間頻尿を悪化させる。

### 2 運動

高齢者では、健常者においても循環器系、腎機能の低下などにより体液貯留傾向となり、夜間安静時に尿が産生され夜間尿量増加につながる傾向がある。夕方の散歩などの軽運動により、体液貯留を修正することで夜間尿量の減少が得られ、夜間頻尿の改善につながる可能性がある。

### 3 着衣・トイレ環境

外出・運動などの前に排尿し、膀胱を空虚にしておくことにより尿失禁発生のリスクを減らすことができる。また外出先でトイレの位置をあらかじめ確認しておく、尿意切迫感を感じたときにあわてず、速やかにトイレへ行けることにより切迫性尿失禁の予防に役立つ。身体運動機能低下を伴う高齢者では、介護者による十分な援助が得られないと、トイレへの移動やトイレでの排尿動作が間に合わず尿失禁につながることも多い。さらに、頻回のトイレ移動が転倒につながることも少なくない。自分ですぐ着脱できるような下着や寝巻きの着用、おむつが必要な例ではパンツ型おむつの使用など、着衣の工夫を指導し、また特に転倒が心配されるような高齢者では、ポータブルトイレ、採尿器の使用などを指導する。

### 4 生活全般

規則正しい就寝・起床時間や食事時間の維持、30分程度の午睡、昼間の活気的な活動など、覚醒状態の質の向上、生活リズムの調整が良好な睡眠、ひいては夜間頻尿の改善に役立つ。

## V 理学療法

### 1 骨盤底筋訓練

腹圧性尿失禁に対する骨盤底筋訓練は標準的治療として確立されているが、女性における混合性尿失禁、切迫性尿失禁に対しても無作為比較試験において有効な成績が報告されている<sup>5), 6)</sup>。しかし、尿意切迫感や頻尿に対する骨盤底筋訓練の有効性についての検討は不十分で、男性に関するエビデンスはない。

### 2 バイオフィードバック療法

バイオフィードバック療法は、通常は自覚しにくい生理的現象を種々の方法で患者自身に認知させて治療に応用する方法である。尿失禁におけるバイオフィードバック療法は骨盤底筋訓練を基本として、骨盤底筋の収縮・収縮程度の認知を促進し、訓練の効率化を図る治療法である。骨盤底筋訓練のバイオフィードバック療法には腔内コーン、腔圧計、筋電図によるものなどがある。バイオフィードバック療法の有効性については、無作為比較試験により無治療に対する優越性、薬物治療との同等性が示されて

いる<sup>7)</sup>。

## VI 膀胱訓練

過活動膀胱による頻尿、切迫性尿失禁に対し、膀胱訓練は抗コリン薬と同等の有効性を示すことが無作為比較試験により示されている<sup>8)</sup>。膀胱訓練は、少しずつ排尿間隔を延長するもので、尿意あるいは尿意切迫感があってもあわててトイレに行かずに我慢し、4~8週間かけて徐々に機能的膀胱容量の増大を図るものであり、排尿日誌を利用して行うとよい。

## VII 排尿誘導

排尿誘導は、高齢者の排尿管理において有用な方法であるが、現場の介護者や看護者が認識していないことも少なくなく、専門医が患者の排尿状態や環境因子を把握したうえで指導する必要がある。過活動膀胱を有する高齢者に対する排泄介助法には、時間排尿誘導とパターン排尿誘導がある。排尿日誌により、患者の排尿間隔や1日の排尿パターンを把握したうえで、尿失禁が起こる前に一定の時間、あるいは排尿パターンにあわせてトイレ誘導を介護・看護者が行うもので、無作為比較試験による有用性が報告されている<sup>9)</sup>。

## VIII 薬物治療

近年、頻尿・尿失禁に対する薬剤開発が盛んであるが、現時点でその有効性が科学的根拠により保証されている薬剤はそれほど多くはない。

腹圧性尿失禁の標準的治療は、骨盤底筋訓練などの理学療法、あるいは外科的治療であり、薬物治療は補助的な役割を担う。腹圧性尿失禁に対して保険適用を有する交感神経β刺激薬のクレンブテロールでは、骨盤底筋・外尿道括約筋の緊張亢進作用により腹圧性尿失禁の改善を期待できる。ところが、骨盤底筋訓練との併用については無作為比較試験で有効性が示されているものの<sup>10)</sup>、単独治療としては十分なエビデンスが得られていない。また、三環系抗うつ薬のイミプラミンは交感神経α刺激作用による

尿道抵抗増大効果を期待して用いられることがあるが、有効性に関する根拠は得られていない。エストロゲン製剤は、閉経後の腹圧性尿失禁に対して尿道粘膜増生、尿道の交感神経感受性亢進を期待して投与されることがあるが、やはり有効性に関する十分なエビデンスはなく、最近では否定的な意見が多い。

排尿筋過活動に伴う頻尿、切迫性尿失禁に対する標準治療薬は抗コリン薬であり、有効性に関する十分なエビデンスが得られている。オキシブチニン、プロピペリンが現在保険上使用可能な抗コリン薬であり、tolterodine, solifenacinが治験を終了し、承認申請中である。抗コリン薬以外の薬剤については求心性C線維抑制作用を有するカリウムチャンネル開口薬が治験中であり、カブサイシン・レジニフェラトキシンの膀胱内注入療法、ボツリヌス毒素の膀胱壁注入療法は、抗コリン薬による治療抵抗性の排尿筋過活動に対する新しい治療として検討されている。

前立腺肥大症に伴う頻尿、尿意切迫感、切迫性尿失禁などの蓄尿症状に対しては、交感神経 $\alpha_1$ 遮断薬の効果が示されており、前立腺肥大症に保険適用のタムスロシン、ナフトピジル、プラゾシン、ウラピジル、テラゾシンなどの $\alpha_1$ 遮断薬は、排尿症状のみならず蓄尿症状も改善することが無作為比較試験により示されている<sup>11)~13)</sup>。抗コリン薬の単独使用については、膀胱収縮抑制による排尿状態の悪化、尿閉発生のリスクのため、下部尿路閉塞例での使用は一般的には禁忌と考えられているが、tolterodine単独投与の安全性に関する報告もみられる<sup>14)</sup>。 $\alpha_1$ 遮断薬と抗コリン薬の併用は実地臨床でしばしば行われるが、安全性と有効性に関するエビデンスは示されていない。しかし近年、残尿の少ない前立腺肥大症例においては、 $\alpha_1$ 遮断薬とtolterodine、プロピペリンなどの併用に関する安全性と有効性の無作為比較試験結果が報告されている<sup>15), 16)</sup>。本邦でも日本排尿機能学会によりタムスロシンとプロピペリン併用に関する無作為比較試験が進行中であり、今後の成果が待たれる。

潜在性心不全や腎機能低下を背景とした、体内水分貯留に基づく夜間頻尿については、利尿薬の投与が症状を改善することをしばしば経験するが、エビデンスは報告されていない。また、夜間多尿例にお

いて、寝前のバソプレシン（点鼻）が有効との報告もあるが、心機能障害を有する例や高齢者での低ナトリウム血症や死亡例も報告されており、注意を要する。

---

## 外科的治療

---

女性腹圧性尿失禁に対する標準的な手術は、膀胱頸部あるいは尿道スリング手術であり、尿失禁消失については85~90%程度の長期成績が報告されている<sup>17)</sup>。現在本邦で最も広く行われている術式は、TVT (tension-free vaginal tape) スリング手術である。また、コラーゲンなどを用いた傍尿道注入療法は外来手術として行うことができる低侵襲手術であり、再発率が高いことや長期成績が不明であるなどの問題点もあるが、活動性の低い高齢女性には有用な方法である。

前立腺肥大症に対する手術治療は、経尿道的前立腺切除術が標準的方法であり、残尿低下による溢流性尿失禁や頻尿の改善はもとより、下部尿路閉塞解除に伴い60%程度で排尿筋過活動の消失、尿意切迫感や切迫性尿失禁の改善が得られる<sup>18)</sup>。

---

## Neuromodulation

---

Neuromodulationは、膀胱・尿道機能を支配する末梢神経を種々の方法で刺激し、神経機能変調により膀胱・尿道機能の調整を図る治療法である。行動療法や薬物治療に抵抗性の排尿筋過活動に対する二次治療として、欧米では種々のneuromodulation治療が行われている。経膣的・経肛門的あるいは経皮的電気刺激療法、磁気刺激療法は非侵襲的なneuromodulation治療に含まれ、より侵襲的な方法としては体内埋め込み式装置による治療がある。

電気刺激療法は経皮的、経膣的あるいは経肛門的な電気刺激装置を用いて骨盤底に電気刺激を加えるもので、従来主に腹圧性尿失禁に対して行われていたが、近年では切迫性尿失禁に対する報告もみられる。干渉低周波療法は、電気刺激療法に属するもので、中周波電流により発生する干渉波（低周波）により骨盤底を刺激するものである。本邦において、

頻尿, 尿意切迫感, 尿失禁(腹圧性)に対する偽治療との無作為比較試験による有効性<sup>19)</sup> および長期成績が示されており<sup>20)</sup>, 刺激装置は認可され, 本邦で保険適用が認められた唯一の電気刺激療法である。

磁気刺激療法は, 骨盤底への磁気刺激により神経を興奮させ, 骨盤底筋を収縮させるもので, 受動的に骨盤底筋訓練と同様の効果を期待するものである。着衣を着けたままの治療が可能で, 低侵襲である。治療期間やプロトコルの詳細は標準化されておらず, 女性の過活動膀胱に対する無作為比較試験による有効性の報告はあるが<sup>21)</sup>, 十分な検証はなされていない。本法は保険未収載で, 治療機器も厚生労働省未認可である。

## XI 清潔間歇導尿

下部尿路閉塞あるいは排尿筋低活動による尿排出障害があり, 多量の残尿による頻尿あるいは溢流性尿失禁がみられる例において, 薬物治療で効果が得られない場合や外科的治療を行うことのできない場合には, 清潔間歇導尿が有用な治療法となる。

## XII おわりに

頻尿, 尿失禁の病態は多岐にわたり, また, 複数の病態が関与することも少なくない。十分な治療効果を得て患者のQOLを改善するためには, 正確な病態の診断と病態に応じた治療法の選択が重要である。

### 参考文献


- 1) 本間之夫, 柿崎秀宏, 後藤百万ほか: 排尿に関する疫学的研究. 日排尿会誌 14 : 266~277, 2003
- 2) 岡村菊夫, 野尻佳克: 水分を多く摂取することで虚血性心疾患・脳血管障害を予防できるか? 日泌尿会誌 96 : 371, 2005
- 3) Dowd TT, Campbell JM, Jones JA : Fluid intake and urinary incontinence in older community-dwelling women. J Community Health Nurs 13 : 179~186, 1996
- 4) Bryant CM, Dowell CJ, Fairbrother G : A randomized trial of the effects of caffeine upon frequency, urgency and urge incontinence. Neurourol Urodyn 19 : 501~502, 2000
- 5) Burns PA, Pranikoff K, Nochajski TH, et al : A comparison of effectiveness of biofeedback and pelvic muscle exercise treatment of stress incontinence in older community-dwelling women. J Gerontol 48 : M167~M174, 1993
- 6) Nygaard IE, Kreder KJ, Lopic MM, et al : Efficacy of pelvic floor muscle exercises in women with stress, urge, and mixed urinary incontinence. Am J Obstet Gynecol 174 : 120~125, 1996
- 7) Burgio KL, Locher JL, Goode PS : Combined behavioral and drug therapy for urge incontinence in older women. J Am Geriatr Soc 48 : 370~374, 2000
- 8) Columbo M, Zanetta G, Scalabrino S : Oxybutinin and bladder training in the management of female urinary urge incontinence : A randomized study. Int Urogynecol J 6 : 6~67, 1995
- 9) Colling J, Ouslander J, Hadley BJ, et al : The effects of patterned urge-response toileting (PURT) on urinary incontinence among nursing home residents. J Am Geriatr Soc 40 : 135~141, 1992
- 10) Ishiko O, Ushiroyama T, Saji F, et al :  $\beta_2$ -adrenergic agonists and pelvic floor exercises for female stress incontinence. Int J Gynaecol Obstet 71 : 39~44, 2000
- 11) Elhilali MM, Ramsey EW, Barkin J, et al : A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the safety and efficacy of terazosin in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Urology 47 : 355~342, 1996
- 12) Lepor H : Phase III multicenter placebo-controlled study of tamsulosin in benign prostatic hyperplasia. Urology 51 : 892~900, 1998
- 13) Gotoh M, Kamihira O, Kinukawa T, et al : Comparison of tamsulosin and naftopidil for efficacy and safety in the treatment of benign prostatic hyperplasia : a randomized controlled trial. BJU Int 96 : 581~586, 2005
- 14) Abrams P, Kaplan S, Millard R : Tolterodine treatment is safe in men with bladder outlet obstruction (BOO) and symptomatic detrusor overactivity (DO). Neurourol Urodyn 20 : 547~548, 2001
- 15) Athanasopoulos A, Gyftopoulos K, Giannitsas K, et al : Combination treatment with an alpha-blocker plus an anticholinergic for bladder outlet obstruction : a prospective, randomized, controlled study. J Urol 169 : 2253~2256, 2003
- 16) Lee KS, Kim DY, Kim JC, et al : Combination treatment with propiverine hydrochloride plus doxazosin in men with overactive bladder coexisting benign prostatic obstruction : a prospective, randomized, controlled, multicenter study. ICS/TUGA Paris, 207, 2004
- 17) Nilsson CG, Kuuva N : The tension-free vaginal tape procedure is successful in the majority of women with indications for surgical treatment of urinary stress incontinence. BJOG 108 : 414~419, 2001
- 18) Abrams PH, Farrar DJ, Turner-Warwick RT, et al : The results of prostatectomy : a symptomatic and urodynamic analysis of 152 patients. J Urol 121 : 640~642, 1979
- 19) 安田耕作, 河邊香月, 佐藤昭夫ほか: 頻尿・尿意切迫感・尿失禁に対する干涉低周波治療器“TEU-20”の二重盲検交差比較試験. 泌尿外 7 : 297~324, 1994
- 20) 鈴木俊秀, 河邊香月, 影山慎二ほか: 頻尿・尿意切迫感・尿失禁に対する干涉低周波治療器の長期使用経験. 泌尿外 7 : 529~540, 1994
- 21) Fujishiro T, Takahashi S, Enomoto H, et al : Magnetic stimulation of the sacral roots for the treatment of urinary frequency and urge incontinence : an investigational study and placebo controlled trial. J Urol 168 : 1036~1039, 2002

## 特集 2

# おむつに頼りすぎない 「自立支援」の 排泄ケア

排泄の自立は、高齢者の活動性を高め、生活の活性化につながる。また、在宅生活においては、排泄が自立することで、介護者の負担が軽減し、在宅生活の継続が可能となる。

そこで特集2では、高齢者の排泄障害のメカニズムを知ると共に、排泄の自立に向けたアプローチ方法について、実践例を通して解説する。



# 高齢者における 排尿障害の症状と原因疾患

名古屋大学大学院 医学系研究科 泌尿器科学 講師

後藤百万

## はじめに

わが国における排尿症状に関する疫学調査では、60歳以上の高齢者の約78%が何らかの排尿の問題を有することが示されている<sup>1)</sup>。排尿の問題が直接生命にかかわることはまれであるが、生活の種々の領域でQOL（生活の質）を低下させ、本人のみならず、介護者や看護者にも大きな支障となる。また、不適切な排尿管理は、褥瘡の発生、治療機会の喪失、認知症や寝たきり状態の誘発などにつながる。

現在、排尿の問題を抱える高齢者に対する評価やケアが、必ずしも適切に行われているとはいえず、安易なおむつの使用やカテーテル留置が行われることが少なくない<sup>2)</sup>。排尿障害に対して適切に対処し、QOLの改善や寝たきりの防止を図るためには、介護や看護に従事する現場の専門職が、排尿障害についての正しい知識やアセスメント方法、適切な対処方法を知ることが重要である。

本稿では、高齢者における排尿障害について概説する。

## 1. 正常な排尿のメカニズム

### 1) 蓄尿と尿排出 (図1)

正常な排尿は、蓄尿と尿排出という2つの下部尿路の働きにより行われる。膀胱は平滑筋でできた袋状の臓器で、尿がたまると徐々に弛緩して広がり、膀胱内の圧を上昇させることなく尿をため






図1 男女の下部尿路と蓄尿・尿排出機能

る（蓄尿）。また、尿道には括約筋があり、内尿道括約筋と外尿道括約筋から成る。内尿道括約筋は平滑筋から成り、膀胱出口にある。外尿道括約筋は骨格筋から成り、男性では前立腺の遠位、女性では尿道の中ほどにある。蓄尿時には、膀胱が弛緩するだけでなく、これらの括約筋が収縮して尿が漏れるのを防いでいる。

膀胱に200～400ml程度の尿が充満すると、尿意を感じ、自分の意思に基づいて尿排出を行う。尿排出時には、まず尿道括約筋が弛緩して尿道抵抗を低下させ、引き続き起こる膀胱平滑筋の収縮に

よって、膀胱内の尿を尿道から体外へ排出する。

## 2) 排尿の神経生理 (図2)

蓄尿と尿排出は、自律神経の働きにより巧妙に調節されている。膀胱に尿が充満し、膀胱壁が伸展すると、その刺激は末梢神経を通過して、脊髄の仙髄にある排尿反射中枢へ伝わり、さらに脊髄を上行し、橋排尿中枢を介して大脳前頭葉へと伝わる。排尿に関与する末梢神経は、骨盤神経（副交感神経）、下腹神経（交感神経）、および陰部神経（体性神経）から成




図2 排尿の神経生理

り、骨盤神経、下腹神経は膀胱、尿道、内尿道括約筋に分布し、陰部神経は外尿道括約筋に分布する。

蓄尿時は、下腹神経が興奮して膀胱を弛緩、膀胱の出口を収縮させ、さらに陰部神経が興奮して外尿道括約筋を収縮させる。この際、膀胱の収縮をつかさどる骨盤神経は抑制状態にある。大脳前頭葉から排尿の命令が発せられると、その刺激は橋排尿中枢を介して、脊髄を下降し、仙髄の排尿反射中枢から末梢神経へ伝わる。末梢神経では、下腹神経が抑制されて膀胱出口を弛緩、また陰部神経が抑制されて外尿道括約筋を弛緩、尿道抵

抗を低下させ、さらに骨盤神経が興奮して膀胱を強く収縮させ、尿を尿道から排出する。

## 2. 加齢による排尿機能の変化

加齢により、下部尿路に種々の解剖的、あるいは神経学的な変化が起こり、蓄尿・尿排出の機能にさまざまな変化を来すことがある。これらは、種々の疾患による膀胱・尿道機能の変化に加えて、高齢者における尿排出障害の要因となる。

## 1) 膀胱の変化

加齢により、膀胱に分布する神経、あるいは平滑筋の機能が低下し、膀胱平滑筋の収縮力が低下すると、尿排出障害が起こりやすい状態になる。このように膀胱収縮機能が低下した状態を、排尿筋低活動という。

逆に、蓄尿時に、自分の意思に反して膀胱が勝手に収縮すること（膀胱不随意収縮）がある。このように蓄尿時に膀胱不随意収縮が起こる状態を、排尿筋過活動という。排尿筋過活動があると、急に強い尿意があり尿が漏れそうになったり（尿意切迫感）、頻尿になったり、間に合わずに尿が漏れたりする（切迫性尿失禁）ことがあり、このような症状を呈する状態を過活動膀胱という。

高齢者では、加齢による膀胱変化としての排尿筋低活動と排尿筋過活動の両者が同時にみられ、蓄尿障害と尿排出障害の両者を呈することがある。

## 2) 尿道の変化

男性では、加齢と共に前立腺が肥大して尿道を圧迫し、尿が出にくくなる傾向がある。逆に女性では、閉経後、女性ホルモンの低下により、尿道の粘膜が萎縮して尿道抵抗が減少し、尿が漏れやすくなる。さらに、女性では妊娠、出産、あるいは加齢により、骨盤の底で膀胱や尿道を支える骨盤底筋が緩み、膀胱が下垂して（膀胱瘤）、これも尿道の抵抗を低下させ、尿が漏れやすくなる。

## 3) 排尿量の変化

一般に、高齢になると夜間尿量が多くなり、就寝中の尿量が増えることにより、夜間に排尿のために何回も起きたり（夜間頻尿）、尿失禁が起こりやすくなったりする。

夜間多尿には、心機能や腎機能の低下、腎臓での尿産生量を調節するホルモン（抗利尿ホルモン）の分泌障害、多飲など、種々の要因が関与する。水分の過剰摂取は、口渇や認知症による場合もあるが、脳血管障害や虚血性心疾患の予防に、水分摂取による血液粘稠度の低下が有用であるという一般的な常識に基づいて、医師などから指導され、行われていることが少なくない。しかし、水分摂取による脳血管障害や虚血性心疾患の予防についての科学的根拠は示されていない。

## 4) 排尿動作への影響

疾患の有無にかかわらず、加齢により身体運動機能やADL（日常生活動作）が低下することにより、種々の排尿動作（トイレまで行く、下着を下ろす、便座に座るなど）がうまく行えず、排尿の問題が起こりやすくなる。また、認知障害などにより、トイレでの排尿や正常な排尿動作ができなくなることがある。このような、膀胱・尿道機能以外の要因により起こる尿失禁を、機能性尿失禁という。

### 3. 排尿障害の分類と症状 (表)

排尿障害は、蓄尿障害と尿排出障害に分けられる。

蓄尿障害においてみられる症状は、頻尿（排尿の回数が多い）、夜間頻尿（就寝後に何回もトイレに起きる）、尿意切迫感（突然、強い尿意が起こり、我慢することが困難となる）、切迫性尿失禁（尿意切迫感があり、トイレまで間に合わずに尿が漏れる）、腹圧性尿失禁（咳、くしゃみなどにより腹圧がかかると尿が漏れる）などである。

蓄尿障害の原因は、膀胱因子と尿道因子に分けられる。膀胱因子としては、過活動膀胱が挙げられ、蓄尿時に自分の意思に反して膀胱が勝手に収縮する、すなわち膀胱の不随意収縮により、頻尿、尿意切迫感、切迫性尿失禁が起こる。尿道因子としては、尿道抵抗の低下が挙げられ、腹圧性尿失禁が起こる。

尿排出障害では、尿勢低下（尿の勢いが弱い）、残尿感、尿線途絶（尿が途中で途切れる）、腹圧排尿（おなかに力を入れて腹圧をかけないと排尿できない）などの症状がみられ、残尿（排尿後に膀胱

表 高齢者における排尿障害の症状と原因疾患

	症状	病態	原因疾患
蓄尿障害	頻尿 夜間頻尿 尿意切迫感 切迫性尿失禁 腹圧性尿失禁 など	過活動膀胱 (排尿筋過活動)	加齢
			神経因性膀胱 脳血管障害、パーキンソン病、多発性硬化症、脊髄損傷など
			尿道通過障害 前立腺肥大症、尿道狭窄、高度膀胱瘤（女性）など
蓄尿障害	尿勢低下 残尿感 尿線途絶 腹圧排尿 頻尿 溢流性尿失禁 など	尿道抵抗低下 (女性)	加齢
			膀胱瘤
			内因性尿道括約筋不全
尿排出障害	尿勢低下 残尿感 尿線途絶 腹圧排尿 頻尿 溢流性尿失禁 など	尿道通過障害	前立腺肥大症、尿道狭窄、高度膀胱瘤（女性）など
		膀胱収縮障害 (排尿筋低活動)	加齢  神経因性膀胱 糖尿病、腰部椎間板ヘルニア、腰部脊椎管狭窄症、子宮癌・直腸癌手術など
そのほか	頻尿 夜間頻尿 排尿時痛 機能性尿失禁 など	多尿	糖尿病、多飲、潜在性心不全、腎機能障害など
		尿路感染症	膀胱炎、前立腺炎など
		機能性	身体運動障害、認知症など