

表 7-46 タイプ1 時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (19 時台)

19 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	413	カーデクス、看護記録等	8.4	6	141	日常会話、声かけ	3.1	60	42.6
2	91	食間食の後始末等	4.0	1	136	脳・神経系の観察・測定	2.7	52	36.9
3	206	持続的静脈内注射の準備等	4.0	1	142	ニード、訴えを知る	2.6	41	29.1
4	205	静脈内注射の準備等	3.8	2	135	(夜間)巡視、容態観察	1.3	28	19.9
5	118	歩行の介助	3.4	3	152	寝具を整える	1.0	14	9.9
6	141	日常会話、声かけ	3.1	60	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.4	12	8.5
7	16	陰部洗浄、肛門部洗浄(坐浴)	3.0	1	162	採光・防音調整	0.6	11	7.8
8	223	人工呼吸器使用中の観察	3.0	1	147	患者自身への教育・心理的支援	1.8	10	7.1
9	266	予防着、ガウンテクニックつける	3.0	1	202	薬を患者に配布	1.2	10	7.1
10	267	手洗い、消毒液の交換	3.0	1	85	食事の後始末、配茶後の後始末	1.0	9	6.4
11	224	温・冷あん法の準備、後始末等	2.9	6	143	ナースコールの受理応答	1.0	9	6.4
12	136	脳・神経系の観察・測定	2.7	52	5	洗面の必要物品準備	1.3	8	5.7
13	244	便、尿等採取の実施	2.7	1	106	ギャッチベッドの操作	1.3	8	5.7
14	148	家族への教育・心理的支援	2.7	2	53	衣服を整える	0.6	7	5.0
15	142	ニード、訴えを知る	2.6	41	59	排尿時の見守り	1.8	7	5.0
16	216	吸入療法・ネブライザー準備等	2.6	3	3	洗面一部介助	1.1	6	4.3
17	62	ポータブルトイレの準備・後始末	2.4	4	117	歩行の見守り	2.0	6	4.3
18	263	検査用物品の準備・後始末	2.3	2	201	処方箋と処方薬の照合	1.4	6	4.3
19	76	おむつ除去、装着	2.1	3	224	温・冷あん法の準備、後始末等	2.9	6	4.3
20	217	酸素吸入の準備・実施・後始末	2.1	4	413	カーデクス、看護記録等	8.4	6	4.3

表 7-47 タイプ1 時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (20 時台)

20 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	12	使用物品の後始末	7.0	1	141	日常会話、声かけ	2.0	67	47.5
2	148	家族への教育・心理的支援	6.0	1	136	脳・神経系の観察・測定	2.5	41	29.1
3	269	使用物品の消毒等	5.7	1	142	ニード、訴えを知る	2.5	41	29.1
4	216	吸入療法・ネブライザー準備等	4.1	4	135	(夜間)巡視、容態観察	1.2	28	19.9
5	16	陰部洗浄、肛門部洗浄(坐浴)	4.0	1	202	薬を患者に配布	1.1	28	19.9
6	205	静脈内注射の準備等	4.0	1	143	ナースコールの受理応答	0.6	15	10.6
7	6	使用物品の後始末	3.7	2	162	採光・防音調整	0.6	14	9.9
8	146	手術前指導のオリエンテーション	3.7	5	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.1	13	9.2
9	224	温・冷あん法の準備、後始末等	3.1	5	152	寝具を整える	0.6	10	7.1
10	58	排尿動作援助	2.8	3	60	排尿後の後始末	0.9	9	6.4

11	136	脳・神経系の観察・測定	2.5	41	59	排尿時の見守り	1.4	8	5.7
12	142	ニード、訴えを知る	2.5	41	413	カーデクス、看護記録等	2.4	7	5.0
13	413	カーデクス、看護記録等	2.4	7	201	処方箋と処方薬の照合	0.8	7	5.0
14	96	経口栄養の後始末	2.3	1	118	歩行の介助	1.7	6	4.3
15	76	おむつ除去、装着	2.2	4	147	患者自身への教育・心理的支援	1.4	6	4.3
16	117	歩行の見守り	2.2	4	146	手術前指導のオリエンテーション	3.7	5	3.5
17	234	褥創、外科創等の処置等	2.2	2	224	温・冷あん法の準備、後始末等	3.1	5	3.5
18	79	おむつの後始末	2.2	2	61	尿収器の後始末	1.3	5	3.5
19	141	日常会話、声かけ	2.0	67	51	更衣動作の一部介助	0.6	5	3.5
20	210	点滴、中心静脈栄養の実施	2.0	1	216	吸入療法・ネブライザー準備等	4.1	4	2.8

表 7-48 タイプ1 時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (21 時台)

21 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	71	人工肛門のケアの準備、後始末	9.0	1	141	日常会話、声かけ	1.8	53	37.6
2	413	カーデクス、看護記録等	8.6	5	135	(夜間)巡視、容態観察	1.4	49	34.8
3	3	洗面一部介助	8.0	1	162	採光・防音調整	0.6	31	22.0
4	104	体位変換の使用物品後始末	6.3	1	142	ニード、訴えを知る	1.3	25	17.7
5	235	点眼液・眼用軟膏の処置	5.3	1	202	薬を患者に配布	1.2	19	13.5
6	134	その他の問題行動への対応	5.0	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.3	14	9.9
7	8	うがい	4.3	1	136	脳・神経系の観察・測定	2.3	13	9.2
8	223	人工呼吸器使用中の観察	4.0	1	152	寝具を整える	0.9	12	8.5
9	79	おむつの後始末	3.7	2	143	ナースコールの受理応答	0.9	11	7.8
10	118	歩行の介助	3.4	6	201	処方箋と処方薬の照合	1.1	9	6.4
11	117	歩行の見守り	3.3	6	59	排尿時の見守り	1.6	7	5.0
12	140	新聞、手紙、雑誌等の配布	3.0	1	118	歩行の介助	3.4	6	4.3
13	76	おむつ除去、装着	2.8	2	117	歩行の見守り	3.3	6	4.3
14	14	全身清拭	2.7	1	413	カーデクス、看護記録等	8.6	5	3.5
15	153	寝具、リネン交換	2.7	1	51	更衣動作の一部介助	0.9	4	2.8
16	136	脳・神経系の観察・測定	2.3	13	120	車椅子による移動の介助	1.7	3	2.1
17	56	Pトイレからベッドへの移乗介助	2.0	2	60	排尿後の後始末	1.3	3	2.1
18	215	吸引の実施・準備・後始末	2.0	1	61	尿収器の後始末	0.8	3	2.1
19	409	医師からの指示を受ける	2.0	1	224	温・冷あん法の準備、後始末等	0.8	3	2.1
20	141	日常会話、声かけ	1.8	53	108	ベッドから、車椅子へ	0.7	3	2.1

表 7-49 タイプ1 時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (22 時台)

22 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	419	職員室の整理・整頓、掃除	15.0	1	135	(夜間)巡視、容態観察	1.1	55	39.0
2	210	点滴、中心静脈栄養の実施	5.7	1	141	日常会話、声かけ	1.6	19	13.5
3	413	カーデクス、看護記録等	4.6	11	162	採光・防音調整	0.7	14	9.9
4	409	医師からの指示を受ける	3.0	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.0	14	9.9
5	209	点滴、中心静脈栄養の準備等	2.3	2	413	カーデクス、看護記録等	4.6	11	7.8
6	54	車椅子から便器便座への移乗介助	2.0	1	136	脳・神経系の観察・測定	1.9	9	6.4
7	117	歩行の見守り	2.0	1	152	寝具を整える	0.5	8	5.7
8	136	脳・神経系の観察・測定	1.9	9	142	ニード、訴えを知る	1.0	7	5.0
9	118	歩行の介助	1.8	4	61	尿収器の後始末	1.0	6	4.3
10	213	点滴、中心静脈栄養の後始末	1.8	3	143	ナースコールの受理応答	0.6	6	4.3
11	141	日常会話、声かけ	1.6	19	118	歩行の介助	1.8	4	2.8
12	57	便器便座から車椅子への移乗介助	1.5	2	202	薬を患者に配布	0.9	4	2.8
13	108	ベッドから、車椅子へ	1.3	2	59	排尿時の見守り	0.6	3	2.1
14	58	排尿動作援助	1.3	1	66	排尿頻度、量、間隔のチェック	0.9	3	2.1
15	135	(夜間)巡視、容態観察	1.1	55	213	点滴、中心静脈栄養の後始末	1.8	3	2.1
16	61	尿収器の後始末	1.0	6	217	酸素吸入の準備・実施・後始末	0.4	3	2.1
17	64	留置カテーテルの観察等	1.0	2	57	便器便座から車椅子への移乗介助	1.5	2	1.4
18	105	起居の援助	1.0	1	64	留置カテーテルの観察等	1.0	2	1.4
19	134	その他の問題行動への対応	1.0	1	65	排尿時必要物品準備	0.3	2	1.4
20	201	処方箋と処方薬の照合	1.0	1	108	ベッドから、車椅子へ	1.3	2	1.4

表 7-50 タイプ1 時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (23 時台)

23 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	104	体位変換の使用物品後始末	8.0	1	135	(夜間)巡視、容態観察	1.0	64	45.4
2	118	歩行の介助	6.3	2	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.6	16	11.3
3	269	使用物品の消毒等	6.0	1	141	日常会話、声かけ	1.3	14	9.9
4	412	ケース会議	6.0	1	136	脳・神経系の観察・測定	1.8	10	7.1
5	52	更衣動作の全介助	5.3	1	152	寝具を整える	0.6	10	7.1
6	13	部分清拭	5.0	1	143	ナースコールの受理応答	0.8	9	6.4
7	59	排尿時の見守り	5.0	4	142	ニード、訴えを知る	3.3	8	5.7
8	238	持続吸引等のカテーテルの管理	5.0	1	413	カーデクス、看護記録等	5.0	7	5.0
9	413	カーデクス、看護記録等	5.0	7	117	歩行の見守り	1.9	6	4.3
10	51	更衣動作の一部介助	4.7	2	217	酸素吸入の準備・実施・後始末	1.6	6	4.3

11	142	ニード、訴えを知る	3.3	8	162	採光・防音調整	0.9	5	3.5
12	209	点滴、中心静脈栄養の準備等	3.2	2	59	排尿時の見守り	5.0	4	2.8
13	408	職員間の連絡	3.0	1	64	留置カテーテルの観察等	1.8	4	2.8
14	266	予防着、ガウンテクニックつける	2.3	1	76	おむつ除去、装着	1.0	4	2.8
15	267	手洗い、消毒液の交換	2.3	1	79	おむつの後始末	0.5	4	2.8
16	117	歩行の見守り	1.9	6	62	ポータブルトイレの準備・後始末	1.1	3	2.1
17	64	留置カテーテルの観察等	1.8	4	108	ベッドから、車椅子へ	0.6	3	2.1
18	136	脳・神経系の観察・測定	1.8	10	109	車椅子から、ベッドへ	1.1	3	2.1
19	213	点滴、中心静脈栄養の後始末	1.7	2	51	更衣動作の一部介助	4.7	2	1.4
20	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.6	16	54	車椅子から便器便座への移乗介助	1.2	2	1.4

## (2) 高齢者タイプ2に時間帯別に提供されていたケアの特徴

深夜帯での発生率が高かったケアは、「(夜間) 巡視、容態観察」で0時台では、49.5%に発生していた。次いで、「日常会話、声かけ」は、21.1%、「脳・神経系の観察・測定」14.7%、「点滴・IVHの滴下の調整等」11.0%、「寝具を整える」10.1%と10%以上の発生率のケアが5種類あった。これは、高齢者タイプ1よりもかなり高い発生率であった。

次いで、「体位変換介助」9.2%、「ニード、訴えを知る」8.3%、「おむつの後始末」、「採光・防音調整」7.3%、「おむつの除去・装着」、「褥創防止具使用等」6.4%、「衣服を整える、おむつの点検」5.5%、「起居の援助」、「ナースコールの受理応答」、「申し送り」4.6%、「排尿後の後始末」、「留置カテーテルの観察等」、「おむつ交換の必要物品準備」、「体位変換一部介助」3.7%と示され、このタイプ2は、タイプ1に比較すると、全体的にケアの発生率が高く示されていた。また、起居、体位変換のケアや褥創防止具使用等のケアがあることから、タイプ1と異なり、日常生活動作能力が低いため、更衣や排泄に関連するケアが必要であることを示していた。

1時台では、「(夜間) 巡視、容態観察」は55.5%に上昇していた。「日常会話、声かけ」も21.1%と変わらなかったが、「点滴・IVHの滴下の調整」が18.3%と発生率が上昇していた。0時台になかったケアとして、「尿収器の後始末」が追加されていた。また「カーデクス・看護記録」という行為も追加されていた。

2時～5時台には、「排尿時の見守り」、「排尿動作援助」、「排尿後の後始末」といった排泄の介助がみられ、歩行の見守りも示された。深夜帯は、観察や排泄に関するケアの発生率が比較的高いケアとして示されていた。

6時台のケアとして発生率が高いケアで6時台までのケアにはなかったものは、吸引の実施と飲み物の用意%であった。

7時～8時台は、「食事の準備」、「食事の後始末」、「食事部分介助」、「食事中的見守り」、「飲み物の用意」、「オーバーテーブルの準備・後始末」といった食事に関するケアが多く発生し、さらに、「尿比重」、「尿酸等の検査」、「食事摂取量・水分量測定」といった検査や測定に関するケアや「処方箋と処方薬の照合」といったケアが提供されていた。

9時台から10時台にかけては、職員が多く、ケアの提供時間が最も長くなる時間帯であるが、この時間帯には、「全身清拭」、「陰部洗浄、肛門部洗浄(坐浴)」といった清潔に関する

るケアや衣服を整える、「更衣動作の一部介助」や「起居の援助」、「車椅子による移動の介助」といった移動に関するケアや「点滴・IVHの滴下の調整等」が発生率の高いケアとして示されるようになっていた。

11時台から12時台にかけては、とくに12時台は、「食事の準備」、「食事の見守り」、「入れ歯の手入れ」、「食事の後始末」、「食事の部分介助」といった食事に関連する行為や、それに伴って行う「ギャッチベッドの操作」や「体位変換一部介助」といった行為の発生率が高くなっていった。また12時台から13時台は、「車椅子による移動の介助」、「車椅子からベッドへ」、「車椅子の操作・準備等」、「ベッドから車椅子へ」という車椅子による移動の介助が10%を超えた発生率として示されていた。

また発生率は低いが生者によって、13時台から17時台にかけては、機能回復に関する多様なリハビリテーションとして「排泄動作訓練」、「耐久性訓練」、「整容動作訓練」、「座位訓練」、「車いす操作」などが提供されていた。また褥創、外科創等の処置等も行われていた。

これに17時～18時台になると「食事の準備」、「食事の後始末」、「配茶後の後始末」、「食事の見守り」といった食事に関するケアと「薬を患者に配布」、「食事摂取量・水分量測定」、「処方箋と処方薬の照合」といったケアが追加されていた。また18時台には、「食事後に入れ歯の手入れ」、「うがい」といった口腔清潔に関してのケアも行われていた。

19時から23時台にかけては、「日常会話、声かけ」、「ニード、訴えを知る」、「寝具を整える」、「脳・神経系の観察・測定」、「点滴・IVHの滴下の調整等」、「採光・防音調整」、「おむつ除去、装着」、「(夜間)巡視、容態観察」、「ギャッチベッドの操作」、「ナースコールの受理応答」、「起居の援助」、「衣服を整える」、「薬を患者に配布」、「体位変換一部あるいは全介助」、「留置カテーテルの観察等」といったケアが提供され、これに23時台では、「カーデクス・看護記録等」が追加されていた。

全時間帯を通して基本的に提供されていたケアとしては、「(夜間)巡視、容態観察」、「点滴・IVHの滴下の調整等」、「脳・神経系の観察・測定」、「人工呼吸器の観察」、「留置カテーテルの観察等」といった観察や、「日常会話・声かけ」、「ニード、訴えを知る」といったニーズの把握やアセスメント、コミュニケーションに係るケアに「体位変換全介助」、「寝具を整える」、「おむつの点検」、「おむつ除去、装着」、「吸引の実施・準備・後始末」、「衣服を整える」といった主に排泄や更衣に関連するケアが終日行われており、時間帯によって食事に関するケアが実施されるというスケジュールでケアが提供されていた。

すべての時間帯別において発生率が高かったケアは、「(夜間)巡視、容態観察」と「日常会話、声かけ」であった。「日常会話、声かけ」は、日勤帯で高いと70%以上になることもあるが、「容態観察」は、深夜帯に最も発生率が高くなる容態観察も50%程度と示され、高齢者タイプ1よりは、全体的に発生率が高く示されていた。

表 7-51 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (0 時台)

0時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	206	持続的静脈内注射の準備等	24.0	1	135	(夜間) 巡視、容態観察	1.8	54	49.5
2	410	申し送り	6.3	5	141	日常会話、声かけ	1.6	23	21.1
3	127	マッサージ、さする	5.3	2	136	脳・神経系の観察・測定	3.3	16	14.7
4	234	褥創、外科創等の処置等	5.0	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.3	12	11.0
5	413	カーデクス、看護記録等	4.0	1	152	寝具を整える	0.6	11	10.1
6	270	汚物・注射針等の処理廃棄	3.3	1	101	体位変換全介助	2.2	10	9.2
7	136	脳・神経系の観察・測定	3.3	16	142	ニード、訴えを知る	1.2	9	8.3
8	117	歩行の見守り	3.0	1	79	おむつの後始末	1.3	8	7.3
9	76	おむつ除去、装着	2.5	7	162	採光・防音調整	0.7	8	7.3
10	52	更衣動作の全介助	2.3	2	76	おむつ除去、装着	2.5	7	6.4
11	101	体位変換全介助	2.2	10	102	褥創防止具使用等	0.7	7	6.4
12	210	点滴、中心静脈栄養の実施	2.0	2	53	衣服を整える	0.6	6	5.5
13	408	職員間の連絡	2.0	1	77	おむつの点検	1.1	6	5.5
14	135	(夜間) 巡視、容態観察	1.8	54	105	起居の援助	1.1	5	4.6
15	51	更衣動作の一部介助	1.7	2	143	ナースコールの受理応答	1.3	5	4.6
16	141	日常会話、声かけ	1.6	23	410	申し送り	6.3	5	4.6
17	201	処方箋と処方薬の照合	1.5	2	60	排尿後の後始末	0.8	4	3.7
18	215	吸引の実施・準備・後始末	1.5	2	64	留置カテーテルの観察等	1.0	4	3.7
19	79	おむつの後始末	1.3	8	78	おむつ交換の必要物品準備	1.0	4	3.7
20	100	体位変換一部介助	1.3	4	100	体位変換一部介助	1.3	4	3.7

表 7-52 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (1 時台)

1時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	252	心電図検査等の準備等	10.0	1	135	(夜間) 巡視、容態観察	1.0	60	55.0
2	362	耐久性の評価、作業能力評価	9.3	1	141	日常会話、声かけ	5.0	23	21.1
3	78	おむつ交換の必要物品準備	6.0	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.3	20	18.3
4	59	排尿時の見守り	5.8	5	142	ニード、訴えを知る	2.8	15	13.8
5	413	カーデクス、看護記録等	5.0	4	152	寝具を整える	0.8	12	11.0
6	141	日常会話、声かけ	5.0	23	136	脳・神経系の観察・測定	2.3	10	9.2
7	117	歩行の見守り	4.7	3	53	衣服を整える	1.6	8	7.3
8	62	ポータブルトイレの準備・後始末	4.2	2	76	おむつ除去、装着	2.5	8	7.3
9	52	更衣動作の全介助	4.0	2	77	おむつの点検	1.1	8	7.3

10	217	酸素吸入の準備・実施・後始末	3.3	3	143	ナースコールの受理応答	0.8	7	6.4
11	238	持続吸引等のカテーテルの管理	3.2	2	105	起居の援助	2.2	6	5.5
12	79	おむつの後始末	3.2	2	58	排尿動作援助	1.7	5	4.6
13	101	体位変換全介助	3.1	3	59	排尿時の見守り	5.8	5	4.6
14	102	褥創防止具使用等	3.0	3	60	排尿後の後始末	1.6	5	4.6
15	142	ニード、訴えを知る	2.8	15	64	留置カテーテルの観察等	2.3	5	4.6
16	120	車椅子による移動の介助	2.8	3	100	体位変換一部介助	1.1	5	4.6
17	97	経管栄養（経鼻、胃瘻）の準備	2.7	1	51	更衣動作の一部介助	1.2	4	3.7
18	177	その他の見守り	2.7	1	61	尿収器の後始末	1.3	4	3.7
19	337	歩行訓練：口頭指示、見守り	2.7	1	162	採光・防音調整	1.2	4	3.7
20	134	その他の問題行動への対応	2.7	3	413	カーデクス、看護記録等	5.0	4	3.7

表 7-53 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位（2 時台）

2時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	234	褥創、外科創等の処置等	5.0	1	135	（夜間）巡視、容態観察	1.1	47	43.1
2	265	診察の介助・準備・後始末	4.0	1	141	日常会話、声かけ	2.7	31	28.4
3	117	歩行の見守り	3.2	2	152	寝具を整える	0.7	22	20.2
4	52	更衣動作の全介助	3.2	2	76	おむつ除去、装着	2.2	17	15.6
5	118	歩行の介助	2.8	2	101	体位変換全介助	1.8	15	13.8
6	141	日常会話、声かけ	2.7	31	77	おむつの点検	0.9	13	11.9
7	142	ニード、訴えを知る	2.7	13	142	ニード、訴えを知る	2.7	13	11.9
8	215	吸引の実施・準備・後始末	2.7	2	136	脳・神経系の観察・測定	1.5	12	11.0
9	51	更衣動作の一部介助	2.4	8	53	衣服を整える	1.5	10	9.2
10	8	うがい	2.3	1	60	排尿後の後始末	0.8	9	8.3
11	11	口腔清潔の必要物品準備	2.3	1	211	点滴・I V Hの滴下の調整等	0.6	9	8.3
12	12	使用物品の後始末	2.3	1	51	更衣動作の一部介助	2.4	8	7.3
13	100	体位変換一部介助	2.3	6	143	ナースコールの受理応答	1.2	8	7.3
14	76	おむつ除去、装着	2.2	17	162	採光・防音調整	0.8	8	7.3
15	59	排尿時の見守り	2.1	6	58	排尿動作援助	1.0	7	6.4
16	134	その他の問題行動への対応	2.0	1	61	尿収器の後始末	1.1	7	6.4
17	144	患者からのコール等による移動	2.0	3	59	排尿時の見守り	2.1	6	5.5
18	223	人工呼吸器使用中の観察	2.0	1	79	おむつの後始末	0.5	6	5.5
19	101	体位変換全介助	1.8	15	100	体位変換一部介助	2.3	6	5.5
20	62	ポータブルトイレの準備・後始末	1.7	1	64	留置カテーテルの観察等	1.0	5	4.6

表 7-54 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位（3 時台）

3時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	16	陰部洗浄、肛門部洗浄(坐浴)	5.7	1	135	(夜間) 巡視、容態観察	1.1	58	53.2
2	205	静脈内注射の準備等	4.0	1	141	日常会話、声かけ	1.9	20	18.3
3	75	ポータブルトイレの準備・後始末	3.0	1	142	ニード、訴えを知る	2.0	15	13.8
4	177	その他の見守り	3.0	2	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.4	14	12.8
5	413	カーデクス、看護記録等	2.8	3	152	寝具を整える	0.4	12	11.0
6	209	点滴、中心静脈栄養の準備等	2.7	1	136	脳・神経系の観察・測定	2.5	11	10.1
7	238	持続吸引等のカテーテルの管理	2.7	3	76	おむつ除去、装着	1.1	10	9.2
8	136	脳・神経系の観察・測定	2.5	11	59	排尿時の見守り	1.7	8	7.3
9	142	ニード、訴えを知る	2.0	15	162	採光・防音調整	0.6	8	7.3
10	217	酸素吸入の準備・実施・後始末	2.0	3	60	排尿後の後始末	1.2	7	6.4
11	409	医師からの指示を受ける	2.0	1	64	留置カテーテルの観察等	0.6	7	6.4
12	141	日常会話、声かけ	1.9	20	100	体位変換一部介助	1.1	7	6.4
13	59	排尿時の見守り	1.7	8	53	衣服を整える	0.6	6	5.5
14	70	浣腸の準備・実施・後始末	1.7	1	61	尿収器の後始末	0.9	5	4.6
15	153	寝具、リネン交換	1.7	1	77	おむつの点検	0.9	5	4.6
16	58	排尿動作援助	1.7	4	143	ナースコールの受理応答	0.8	5	4.6
17	56	Pトイレからベッドへの移乗介助	1.7	2	51	更衣動作の一部介助	1.1	4	3.7
18	134	その他の問題行動への対応	1.7	2	58	排尿動作援助	1.7	4	3.7
19	215	吸引の実施・準備・後始末	1.5	2	101	体位変換全介助	0.8	4	3.7
20	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.4	14	117	歩行の見守り	0.9	4	3.7

表 7-55 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (4 時台)

4時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	413	カーデクス、看護記録等	5.3	1	135	(夜間) 巡視、容態観察	1.0	52	47.7
2	117	歩行の見守り	3.0	1	141	日常会話、声かけ	2.7	16	14.7
3	118	歩行の介助	3.0	1	152	寝具を整える	0.9	13	11.9
4	127	マッサージ、さする	3.0	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.1	9	8.3
5	141	日常会話、声かけ	2.7	16	53	衣服を整える	0.5	8	7.3
6	234	褥創、外科創等の処置等	2.3	1	77	おむつの点検	1.0	8	7.3
7	101	体位変換全介助	2.3	8	101	体位変換全介助	2.3	8	7.3
8	215	吸引の実施・準備・後始末	2.0	2	136	脳・神経系の観察・測定	1.2	8	7.3
9	62	ポータブルトイレの準備・後始末	1.8	2	142	ニード、訴えを知る	1.5	7	6.4
10	60	排尿後の後始末	1.8	4	64	留置カテーテルの観察等	1.0	5	4.6
11	61	尿収器の後始末	1.7	1	143	ナースコールの受理応答	0.7	5	4.6
12	51	更衣動作の一部介助	1.7	4	51	更衣動作の一部介助	1.7	4	3.7



13	142	ニード、訴えを知る	1.5	7	60	排尿後の後始末	1.8	4	3.7
14	100	体位変換一部介助	1.3	1	79	おむつの後始末	0.7	4	3.7
15	173	洗濯物を手洗いする	1.3	1	102	褥創防止具使用等	0.6	4	3.7
16	213	点滴、中心静脈栄養の後始末	1.3	1	267	手洗い、消毒液の交換	0.7	4	3.7
17	238	持続吸引等のカテーテルの管理	1.3	2	59	排尿時の見守り	1.1	3	2.8
18	136	脳・神経系の観察・測定	1.2	8	76	おむつ除去、装着	0.9	3	2.8
19	217	酸素吸入の準備・実施・後始末	1.2	2	78	おむつ交換の必要物品準備	0.3	3	2.8
20	144	患者からのコール等による移動	1.2	2	162	採光・防音調整	0.8	3	2.8

表 7-56 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (5 時台)

5時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	234	褥創、外科創等の処置等	14.0	1	135	(夜間) 巡視、容態観察	1.1	42	38.5
2	264	継続的な評価を伴うモニター監視	7.7	2	141	日常会話、声かけ	2.5	40	36.7
3	204	皮下・筋肉注射の準備等	6.0	2	136	脳・神経系の観察・測定	3.4	20	18.3
4	127	マッサージ、さする	5.3	1	142	ニード、訴えを知る	2.6	18	16.5
5	16	陰部洗浄、肛門部洗浄(坐浴)	4.3	1	76	おむつ除去、装着	2.3	17	15.6
6	117	歩行の見守り	4.0	1	77	おむつの点検	1.2	16	14.7
7	413	カーデクス、看護記録等	4.0	6	152	寝具を整える	0.6	15	13.8
8	118	歩行の介助	3.5	2	79	おむつの後始末	0.9	10	9.2
9	136	脳・神経系の観察・測定	3.4	20	211	点滴・I V Hの滴下の調整等	2.3	10	9.2
10	100	体位変換一部介助	3.3	4	64	留置カテーテルの観察等	1.0	9	8.3
11	5	洗面の必要物品準備	2.8	2	101	体位変換全介助	0.7	9	8.3
12	58	排尿動作援助	2.8	5	143	ナースコールの受理応答	0.6	8	7.3
13	51	更衣動作の一部介助	2.7	6	162	採光・防音調整	0.7	8	7.3
14	142	ニード、訴えを知る	2.6	18	53	衣服を整える	0.5	7	6.4
15	141	日常会話、声かけ	2.5	40	60	排尿後の後始末	0.6	7	6.4
16	146	手術前指導のオリエンテーション	2.5	2	51	更衣動作の一部介助	2.7	6	5.5
17	59	排尿時の見守り	2.4	6	59	排尿時の見守り	2.4	6	5.5
18	211	点滴・I V Hの滴下の調整等	2.3	10	105	起居の援助	1.0	6	5.5
19	145	励まし、慰め、術後の心理的ケア	2.3	1	413	カーデクス、看護記録等	4.0	6	5.5
20	76	おむつ除去、装着	2.3	17	52	更衣動作の全介助	2.0	5	4.6

表 7-57 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (6 時台)

6時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	264	継続的な評価を伴うモニター監視	10.1	3	141	日常会話、声かけ	3.0	73	67.0

2	153	寝具、リネン交換	9.0	1	136	脳・神経系の観察・測定	3.2	60	55.0
3	11	口腔清潔の必要物品準備	3.8	2	142	ニード、訴えを知る	3.0	32	29.4
4	52	更衣動作の全介助	3.4	5	162	採光・防音調整	0.8	24	22.0
5	127	マッサージ、さする	3.3	1	135	(夜間)巡視、容態観察	1.1	21	19.3
6	118	歩行の介助	3.2	2	152	寝具を整える	0.9	21	19.3
7	136	脳・神経系の観察・測定	3.2	60	53	衣服を整える	0.7	15	13.8
8	141	日常会話、声かけ	3.0	73	76	おむつ除去、装着	1.5	12	11.0
9	142	ニード、訴えを知る	3.0	32	77	おむつの点検	1.0	12	11.0
10	8	うがい	2.8	4	101	体位変換全介助	1.5	12	11.0
11	125	装具の装着を介助する	2.3	1	211	点滴・I V Hの滴下の調整等	1.0	12	11.0
12	412	ケース会議	2.3	1	244	便、尿等採取の実施	1.7	12	11.0
13	117	歩行の見守り	2.2	3	413	カーデクス、看護記録等	2.2	12	11.0
14	3	洗面一部介助	2.2	6	64	留置カテーテルの観察等	1.2	11	10.1
15	413	カーデクス、看護記録等	2.2	12	5	洗面の必要物品準備	1.0	9	8.3
16	59	排尿時の見守り	2.0	5	143	ナースコールの受理応答	0.4	9	8.3
17	74	さしこみ便器の後始末	2.0	1	215	吸引の実施・準備・後始末	1.1	9	8.3
18	75	ポータブルトイレの準備・後始末	2.0	1	60	排尿後の後始末	0.9	8	7.3
19	93	飲み物摂取介助	2.0	3	61	尿収器の後始末	0.9	8	7.3
20	234	褥創、外科創等の処置等	2.0	1	92	飲み物の用意	1.5	8	7.3

表 7-58 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位20位(7時台)

7時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	153	寝具、リネン交換	5.8	3	141	日常会話、声かけ	3.7	73	67.0
2	245	採取の準備・後始末	4.2	2	80	食事の準備	1.6	45	41.3
3	14	全身清拭	4.0	1	142	ニード、訴えを知る	2.6	34	31.2
4	141	日常会話、声かけ	3.7	73	136	脳・神経系の観察・測定	1.9	20	18.3
5	134	その他の問題行動への対応	3.6	4	135	(夜間)巡視、容態観察	1.3	19	17.4
6	18	清拭の必要物品準備	3.3	2	202	薬を患者に配布	1.1	18	16.5
7	27	髭剃り等の準備、後始末	3.3	1	159	オーバーテーブルの準備・後始末	0.8	18	16.5
8	81	食事時の見守り	3.2	9	106	ギャッチベッドの操作	1.1	17	15.6
9	332	移乗訓練：部分介助	3.0	1	92	飲み物の用意	0.8	17	15.6
10	209	点滴、中心静脈栄養の準備等	2.8	3	152	寝具を整える	0.7	14	12.8
11	142	ニード、訴えを知る	2.6	34	53	衣服を整える	0.6	14	12.8
12	117	歩行の見守り	2.4	3	105	起居の援助	0.8	13	11.9
13	7	口腔清潔(歯みがき等)	2.3	5	76	おむつ除去、装着	1.2	11	10.1
14	82	食事部分介助	2.1	10	100	体位変換一部介助	1.0	11	10.1

15	118	歩行の介助	2.1	4	211	点滴・IVHの滴下の調整等	0.7	11	10.1
16	413	カーデクス、看護記録等	2.1	9	82	食事部分介助	2.1	10	9.2
17	65	排尿時必要物品準備	2.0	1	248	尿比重、尿糖等の検査	1.1	10	9.2
18	177	その他の見守り	2.0	1	81	食事中の見守り	3.2	9	8.3
19	204	皮下・筋肉注射の準備等	2.0	6	413	カーデクス、看護記録等	2.1	9	8.3
20	206	持続的静脈内注射の準備等	2.0	1	120	車椅子による移動の介助	1.4	9	8.3

表 7-59 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (8 時台)

8時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	88	食間食の食べ物を食べさせる	12.7	1	141	日常会話、声かけ	5.9	88	80.7
2	412	ケース会議	11.3	5	142	ニード、訴えを知る	3.7	49	45.0
3	83	食べ物を食べさせる	11.3	9	202	薬を患者に配布	1.3	45	41.3
4	153	寝具、リネン交換	10.7	1	85	食事の後始末、配茶後の後始末	1.1	40	36.7
5	264	継続的な評価を伴うモニター監視	10.2	3	80	食事の準備	1.3	38	34.9
6	28	耳掃除の準備、後始末	8.0	1	152	寝具を整える	1.1	27	24.8
7	141	日常会話、声かけ	5.9	88	106	ギャッチベッドの操作	1.3	25	22.9
8	81	食事中の見守り	5.3	13	12	使用物品の後始末	0.8	18	16.5
9	67	排便動作援助	5.0	1	135	(夜間) 巡視、容態観察	2.8	15	13.8
10	228	透析関連のケア	5.0	1	136	脳・神経系の観察・測定	2.3	15	13.8
11	410	申し送り	5.0	11	11	口腔清潔の必要物品準備	0.8	15	13.8
12	206	持続的静脈内注射の準備等	4.7	2	86	食事摂取量・水分量測定	1.1	14	12.8
13	413	カーデクス、看護記録等	4.2	5	81	食事中の見守り	5.3	13	11.9
14	15	手指浴・足浴	4.1	3	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.2	13	11.9
15	101	体位変換全介助	4.0	4	9	入れ歯の手入れ	1.1	13	11.9
16	14	全身清拭	4.0	1	163	病室内の掃除	2.4	12	11.0
17	244	便、尿等採取の実施	4.0	1	105	起居の援助	0.7	12	11.0
18	58	排尿動作援助	3.9	3	201	処方箋と処方薬の照合	0.7	12	11.0
19	145	励まし、慰め、術後の心理的ケア	3.8	7	410	申し送り	5.0	11	10.1
20	142	ニード、訴えを知る	3.7	49	143	ナースコールの受理応答	0.7	11	10.1

表 7-60 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (9 時台)

9時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	123	歩行訓練、立位訓練等の補助	14.0	1	141	日常会話、声かけ	7.1	94	86.2
2	47	リフトの操作、移動の介助	11.0	1	142	ニード、訴えを知る	3.5	59	54.1
3	14	全身清拭	9.5	20	136	脳・神経系の観察・測定	3.4	49	45.0

4	46	浴室内の監視	8.0	1	152	寝具を整える	1.1	37	33.9
5	177	その他の見守り	7.3	6	53	衣服を整える	0.8	30	27.5
6	412	ケース会議	7.3	5	16	陰部洗浄、肛門部洗浄(坐浴)	4.0	28	25.7
7	141	日常会話、声かけ	7.1	94	211	点滴・I V Hの滴下の調整等	1.7	28	25.7
8	63	膀胱訓練の準備、後始末等	7.0	1	76	おむつ除去、装着	2.2	27	24.8
9	407	家族への連絡・対応等	7.0	1	18	清拭の必要物品準備	1.0	23	21.1
10	264	継続的な評価を伴うモニター監視	6.3	5	52	更衣動作の全介助	3.0	23	21.1
11	26	爪切り(準備・後始末含む)	6.0	1	106	ギャッチベッドの操作	1.8	21	19.3
12	341	装具装着訓練: 介助しながら	6.0	1	14	全身清拭	9.5	20	18.3
13	45	洗身全介助	5.7	2	51	更衣動作の一部介助	2.3	19	17.4
14	424	職員自身の移動	5.7	2	105	起居の援助	1.4	19	17.4
15	234	褥創、外科創等の処置等	5.2	5	120	車椅子による移動の介助	2.9	18	16.5
16	24	結髪・整髪(準備・後始末含む)	5.0	1	158	床頭台を整頓	1.1	18	16.5
17	303	筋緊張の評価、感覚検査等	4.7	2	413	カーデクス、看護記録等	1.3	18	16.5
18	266	予防着、ガウンテクニックつける	4.3	3	163	病室内の掃除	2.6	16	14.7
19	161	換気・温度調節	4.2	2	79	おむつの後始末	0.5	15	13.8
20	16	陰部洗浄、肛門部洗浄(坐浴)	4.0	28	162	採光・防音調整	1.2	15	13.8

表 7-61 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位20位(10時台)

10時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	46	浴室内の監視	20.0	1	141	日常会話、声かけ	7.1	92	84.4
2	410	申し送り	15.0	1	136	脳・神経系の観察・測定	3.7	58	53.2
3	304	関節可動域訓練	10.0	1	142	ニード、訴えを知る	4.7	55	50.5
4	306	嚥下訓練	10.0	1	211	点滴・I V Hの滴下の調整等	2.7	32	29.4
5	244	便、尿等採取の実施	8.3	1	152	寝具を整える	1.1	27	24.8
6	14	全身清拭	7.9	12	53	衣服を整える	1.0	25	22.9
7	45	洗身全介助	7.5	7	76	おむつ除去、装着	1.6	22	20.2
8	141	日常会話、声かけ	7.1	92	106	ギャッチベッドの操作	0.9	20	18.3
9	123	歩行訓練、立位訓練等の補助	6.0	1	105	起居の援助	0.9	20	18.3
10	205	静脈内注射の準備等	5.1	10	16	陰部洗浄、肛門部洗浄(坐浴)	2.6	18	16.5
11	69	排便の準備・実施・後始末	4.8	2	52	更衣動作の全介助	3.1	17	15.6
12	142	ニード、訴えを知る	4.7	55	51	更衣動作の一部介助	1.1	17	15.6
13	85	食事の後始末、配茶後の後始末	4.7	1	120	車椅子による移動の介助	2.3	16	14.7
14	413	カーデクス、看護記録等	4.6	12	100	体位変換一部介助	1.5	14	12.8
15	177	その他の見守り	4.6	6	158	床頭台を整頓	0.5	13	11.9
16	224	温・冷あん法の準備、後始末等	4.6	3	14	全身清拭	7.9	12	11.0

17	101	体位変換全介助	4.5	7	413	カーデクス、看護記録等	4.6	12	11.0
18	47	リフトの操作、移動の介助	4.3	1	234	褥創、外科創等の処置等	4.0	12	11.0
19	407	家族への連絡・応対等	4.3	2	18	清拭の必要物品準備	2.7	12	11.0
20	15	手指浴・足浴	4.1	3	64	留置カテーテルの観察等	1.3	12	11.0

表 7-62 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (11 時台)

11時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	357	マッサージ	16.3	1	141	日常会話、声かけ	5.4	84	77.1
2	264	継続的な評価を伴うモニター監視	15.0	2	142	ニード、訴えを知る	3.2	45	41.3
3	336	車いす操作：かなり介助して	14.7	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	3.0	34	31.2
4	210	点滴、中心静脈栄養の実施	9.8	6	136	脳・神経系の観察・測定	2.0	33	30.3
5	128	体操介助	9.7	1	80	食事の準備	1.2	29	26.6
6	304	関節可動域訓練	9.7	1	152	寝具を整える	1.2	26	23.9
7	121	ストレッチャーによる移動	8.2	2	53	衣服を整える	0.8	19	17.4
8	14	全身清拭	7.3	5	100	体位変換一部介助	1.5	18	16.5
9	253	レントゲン検査等の準備等	7.0	1	105	起居の援助	1.9	18	16.5
10	303	筋緊張の評価、感覚検査等	6.9	3	106	ギャッチベッドの操作	1.1	17	15.6
11	44	洗身一部介助	6.5	2	120	車椅子による移動の介助	3.7	16	14.7
12	75	ポータブルトイレの準備・後始末	6.0	1	108	ベッドから、車椅子へ	1.5	14	12.8
13	141	日常会話、声かけ	5.4	84	76	おむつ除去、装着	1.3	13	11.9
14	153	寝具、リネン交換	5.2	5	114	車椅子の操作、準備等	2.7	13	11.9
15	26	爪切り（準備・後始末含む）	5.0	1	160	ベッド柵つけはずし	0.8	12	11.0
16	325	立位訓練：口頭指示、見守り	4.8	2	143	ナースコールの受理応答	0.8	11	10.1
17	27	髭剃り等の準備、後始末	4.0	2	248	尿比重、尿糖等の検査	0.9	11	10.1
18	134	その他の問題行動への対応	3.9	4	135	(夜間) 巡視、容態観察	1.0	10	9.2
19	209	点滴、中心静脈栄養の準備等	3.8	4	158	床頭台を整頓	0.6	10	9.2
20	120	車椅子による移動の介助	3.7	16	52	更衣動作の全介助	3.1	9	8.3

表 7-63 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (12 時台)

12時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	83	食べ物を食べさせる	11.1	9	141	日常会話、声かけ	5.1	73	67.0
2	264	継続的な評価を伴うモニター監視	10.4	3	80	食事の準備	1.4	56	51.4
3	88	食間食の食べ物を食べさせる	7.3	2	142	ニード、訴えを知る	3.3	49	45.0
4	234	褥創、外科創等の処置等	7.2	2	85	食事の後始末、配茶後の後始末	1.6	45	41.3
5	210	点滴、中心静脈栄養の実施	6.5	2	106	ギャッチベッドの操作	1.3	27	24.8

6	81	食事中的見守り	6.2	18	202	薬を患者に配布	1.2	27	24.8
7	118	歩行の介助	5.7	1	86	食事摂取量・水分量測定	2.1	24	22.0
8	127	マッサージ、さする	5.3	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.0	21	19.3
9	59	排尿時の見守り	5.1	3	120	車椅子による移動の介助	1.9	19	17.4
10	141	日常会話、声かけ	5.1	73	81	食事中的見守り	6.2	18	16.5
11	29	沐浴の必要物品準備	4.3	1	12	使用物品の後始末	1.4	16	14.7
12	110	ベッドから、ストレッチャーへ	4.0	1	152	寝具を整える	0.8	16	14.7
13	153	寝具、リネン交換	4.0	1	11	口腔清潔の必要物品準備	1.2	15	13.8
14	82	食事部分介助	3.7	10	105	起居の援助	1.1	15	13.8
15	55	ベッドからトイレへの移乗介助	3.5	2	100	体位変換一部介助	0.7	13	11.9
16	142	ニード、訴えを知る	3.3	49	136	脳・神経系の観察・測定	1.7	13	11.9
17	15	手指浴・足浴	3.0	1	9	入れ歯の手入れ	2.7	10	9.2
18	7	口腔清潔（歯みがき等）	2.9	6	51	更衣動作の一部介助	0.9	10	9.2
19	147	患者自身への教育・心理的支援	2.9	5	82	食事部分介助	3.7	10	9.2
20	9	入れ歯の手入れ	2.7	10	109	車椅子から、ベッドへ	0.8	10	9.2

表 7-64 タイプ2 時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位（13 時台）

13 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	121	ストレッチャーによる移動	24.0	1	141	日常会話、声かけ	4.9	63	57.8
2	234	褥創、外科創等の処置等	14.8	2	142	ニード、訴えを知る	3.7	33	30.3
3	344	排泄動作訓練	10.7	1	136	脳・神経系の観察・測定	2.9	29	26.6
4	45	洗身全介助	10.0	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.9	26	23.9
5	15	手指浴・足浴	8.3	1	152	寝具を整える	0.9	23	21.1
6	309	耐久性訓練	8.0	1	120	車椅子による移動の介助	3.2	20	18.3
7	347	整容動作訓練	8.0	1	105	起居の援助	1.1	19	17.4
8	117	歩行の見守り	7.3	3	106	ギャッチベッドの操作	1.2	16	14.7
9	321	座位訓練：かなり介助して	7.0	1	76	おむつ除去、装着	1.6	16	14.7
10	336	車いす操作：かなり介助して	7.0	2	53	衣服を整える	0.9	15	13.8
11	29	沐浴の必要物品準備	6.0	1	143	ナースコールの受理応答	0.6	15	13.8
12	177	その他の見守り	5.9	6	100	体位変換一部介助	1.3	14	12.8
13	319	座位訓練：口頭指示、見守り	5.0	1	114	車椅子の操作、準備等	1.1	13	11.9
14	141	日常会話、声かけ	4.9	63	77	おむつの点検	0.5	13	11.9
15	115	車椅子から椅子等への移乗介助	4.7	1	109	車椅子から、ベッドへ	1.0	12	11.0
16	30	沐浴の使用物品後始末	4.3	1	108	ベッドから、車椅子へ	1.7	10	9.2
17	212	輸液・輸血中の固定等	4.3	1	79	おむつの後始末	0.6	10	9.2
18	153	寝具、リネン交換	4.2	2	162	採光・防音調整	1.0	9	8.3

19	303	筋緊張の評価、感覚検査等	4.0	1	160	ベッド柵つけはずし	0.3	9	8.3
20	210	点滴、中心静脈栄養の実施	4.0	4	85	食事の後始末、配茶後の後始末	0.9	8	7.3

表 7-65 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (14 時台)

14 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	121	ストレッチャーによる移動	18.0	1	141	日常会話、声かけ	5.1	85	78.0
2	264	継続的な評価を伴うモニター監視	15.2	2	142	ニード、訴えを知る	3.8	47	43.1
3	361	発声・発語器官の運動	15.0	1	136	脳・神経系の観察・測定	3.7	46	42.2
4	15	手指浴・足浴	12.7	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.5	31	28.4
5	14	全身清拭	11.1	3	152	寝具を整える	1.1	30	27.5
6	335	車いす操作:部分介助	10.0	1	53	衣服を整える	0.8	22	20.2
7	303	筋緊張の評価、感覚検査等	9.0	3	76	おむつ除去、装着	1.3	21	19.3
8	306	嚥下訓練	8.0	1	106	ギャッチベッドの操作	1.2	20	18.3
9	234	褥創、外科創等の処置等	7.9	5	108	ベッドから、車椅子へ	1.4	19	17.4
10	307	上肢機能・手指巧緻性の訓練	7.3	3	100	体位変換一部介助	1.1	17	15.6
11	150	散歩	6.7	2	109	車椅子から、ベッドへ	1.3	17	15.6
12	412	ケース会議	6.7	4	105	起居の援助	1.5	16	14.7
13	309	耐久性訓練	6.2	3	413	カーデクス、看護記録等	2.4	15	13.8
14	68	排便時の見守り	6.2	2	64	留置カテーテルの観察等	1.1	14	12.8
15	148	家族への教育・心理的支援	6.0	1	120	車椅子による移動の介助	3.4	14	12.8
16	337	歩行訓練:口頭指示、見守り	5.7	3	162	採光・防音調整	1.2	14	12.8
17	318	起き上がり訓練:かなり介助して	5.3	3	143	ナースコールの受理応答	0.5	13	11.9
18	84	えんげ困難の援助	5.3	1	160	ベッド柵つけはずし	0.7	13	11.9
19	141	日常会話、声かけ	5.1	85	51	更衣動作の一部介助	2.2	11	10.1
20	210	点滴、中心静脈栄養の実施	5.0	4	77	おむつの点検	1.7	11	10.1

表 7-66 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (15 時台)

15 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	412	ケース会議	20.3	3	141	日常会話、声かけ	5.0	77	70.6
2	360	コミュニケーション、失語の評価	19.7	1	142	ニード、訴えを知る	2.6	47	43.1
3	148	家族への教育・心理的支援	15.0	2	136	脳・神経系の観察・測定	2.4	35	32.1
4	177	その他の見守り	14.5	5	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.4	24	22.0
5	45	洗身全介助	12.7	1	106	ギャッチベッドの操作	1.2	20	18.3
6	311	基本動作のデモンストレーション	12.0	1	135	(夜間)巡視、容態観察	1.1	16	14.7
7	265	診察の介助・準備・後始末	11.2	2	152	寝具を整える	1.0	15	13.8

8	270	汚物・注射針等の処理廃棄	11.0	1	120	車椅子による移動の介助	3.8	14	12.8
9	21	洗髪全介助	10.2	2	53	衣服を整える	1.3	14	12.8
10	361	発声・発語器官の運動	9.7	1	413	カーデクス、看護記録等	5.4	13	11.9
11	264	継続的な評価を伴うモニター監視	8.3	5	76	おむつ除去、装着	1.6	13	11.9
12	150	散歩	8.0	1	105	起居の援助	1.1	13	11.9
13	252	心電図検査等の準備等	8.0	1	101	体位変換全介助	1.6	12	11.0
14	234	褥創、外科創等の処置等	7.9	5	77	おむつの点検	1.3	12	11.0
15	147	患者自身への教育・心理的支援	7.8	8	64	留置カテーテルの観察等	1.2	11	10.1
16	14	全身清拭	6.3	2	109	車椅子から、ベッドへ	1.0	11	10.1
17	89	食間食の部分介助	6.3	1	143	ナースコールの受理応答	0.4	10	9.2
18	70	浣腸の準備・実施・後始末	6.0	1	100	体位変換一部介助	1.0	9	8.3
19	303	筋緊張の評価、感覚検査等	5.7	1	147	患者自身への教育・心理的支援	7.8	8	7.3
20	26	爪切り(準備・後始末含む)	5.7	2	51	更衣動作の一部介助	2.5	8	7.3

表 7-67 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (16 時台)

16 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	134	その他の問題行動への対応	29.0	1	141	日常会話、声かけ	4.0	78	71.6
2	201	処方箋と処方薬の照合	13.0	1	142	ニード、訴えを知る	2.8	42	38.5
3	360	コミュニケーション、失語の評価	13.0	1	136	脳・神経系の観察・測定	2.7	26	23.9
4	361	発声・発語器官の運動	13.0	2	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.5	21	19.3
5	177	その他の見守り	13.0	2	143	ナースコールの受理応答	0.8	15	13.8
6	412	ケース会議	11.7	1	152	寝具を整える	1.1	15	13.8
7	117	歩行の見守り	8.8	4	77	おむつの点検	0.8	14	12.8
8	132	暴力行為、暴言等への対応	8.3	1	53	衣服を整える	1.1	13	11.9
9	408	職員間の連絡	8.0	2	76	おむつ除去、装着	4.2	12	11.0
10	413	カーデクス、看護記録等	7.8	11	120	車椅子による移動の介助	4.1	12	11.0
11	145	励まし、慰め、術後の心理的ケア	6.5	2	105	起居の援助	1.1	11	10.1
12	409	医師からの指示を受ける	6.5	2	413	カーデクス、看護記録等	7.8	11	10.1
13	238	持続吸引等のカテーテルの管理	6.3	2	51	更衣動作の一部介助	1.0	10	9.2
14	101	体位変換全介助	6.2	6	106	ギャッチベッドの操作	0.7	10	9.2
15	26	爪切り(準備・後始末含む)	5.7	1	100	体位変換一部介助	1.6	9	8.3
16	216	吸入療法・ネブライザー準備等	5.2	2	108	ベッドから、車椅子へ	1.4	9	8.3
17	7	口腔清潔(歯みがき等)	5.2	2	92	飲み物の用意	1.0	8	7.3
18	16	陰部洗浄、肛門部洗浄(坐浴)	4.7	2	135	(夜間)巡視、容態観察	1.4	8	7.3
19	410	申し送り	4.4	7	215	吸引の実施・準備・後始末	2.2	8	7.3
20	76	おむつ除去、装着	4.2	12	133	抑制帯の脱着、拘束着の鍵の開閉	1.7	7	6.4



表 7-68 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (17 時台)

17 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	335	車いす操作:部分介助	14.0	1	141	日常会話、声かけ	4.4	83	76.1
2	264	継続的な評価を伴うモニター監視	10.2	3	136	脳・神経系の観察・測定	2.8	53	48.6
3	45	洗身全介助	9.7	1	142	ニード、訴えを知る	3.2	47	43.1
4	52	更衣動作の全介助	7.5	2	80	食事の準備	1.4	31	28.4
5	104	体位変換の使用物品後始末	7.0	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.4	25	22.9
6	412	ケース会議	6.6	5	152	寝具を整える	1.2	23	21.1
7	336	車いす操作:かなり介助して	6.3	1	135	(夜間)巡視、容態観察	1.4	15	13.8
8	158	床頭台を整頓	6.2	4	202	薬を患者に配布	1.1	15	13.8
9	234	褥創、外科創等の処置等	5.5	2	413	カーデクス、看護記録等	3.2	15	13.8
10	153	寝具、リネン交換	5.2	2	53	衣服を整える	0.8	14	12.8
11	84	えんげ困難の援助	5.0	1	51	更衣動作の一部介助	2.1	13	11.9
12	83	食べ物を食べさせる	4.7	1	106	ギャッチベッドの操作	1.2	13	11.9
13	141	日常会話、声かけ	4.4	83	76	おむつ除去、装着	2.7	12	11.0
14	408	職員間の連絡	3.7	6	105	起居の援助	1.0	12	11.0
15	8	うがい	3.7	1	143	ナースコールの受理応答	0.6	12	11.0
16	134	その他の問題行動への対応	3.6	4	162	採光・防音調整	0.8	12	11.0
17	218	タッピング、体位排痰の実施等	3.5	2	77	おむつの点検	0.6	11	10.1
18	410	申し送り	3.3	5	64	留置カテーテルの観察等	0.8	10	9.2
19	413	カーデクス、看護記録等	3.2	15	120	車椅子による移動の介助	2.4	10	9.2
20	142	ニード、訴えを知る	3.2	47	201	処方箋と処方薬の照合	1.4	10	9.2

表 7-69 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (18 時台)

18 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	68	排便時の見守り	29.0	1	141	日常会話、声かけ	5.1	75	68.8
2	83	食べ物を食べさせる	16.0	7	80	食事の準備	1.6	58	53.2
3	264	継続的な評価を伴うモニター監視	15.0	2	202	薬を患者に配布	1.2	51	46.8
4	148	家族への教育・心理的支援	7.0	2	85	食事の後始末、配茶後の後始末	1.2	49	45.0
5	238	持続吸引等のカテーテルの管理	7.0	1	142	ニード、訴えを知る	3.4	38	34.9
6	410	申し送り	6.6	5	106	ギャッチベッドの操作	1.6	29	26.6
7	93	飲み物摂取介助	5.6	7	105	起居の援助	1.6	18	16.5
8	59	排尿時の見守り	5.3	6	11	口腔清潔の必要物品準備	0.7	17	15.6
9	141	日常会話、声かけ	5.1	75	152	寝具を整える	0.8	17	15.6
10	234	褥創、外科創等の処置等	4.7	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.2	16	14.7
11	81	食事中の見守り	4.5	14	12	使用物品の後始末	0.6	15	13.8

12	408	職員間の連絡	4.2	3	86	食事摂取量・水分量測定	1.0	15	13.8
13	67	排便動作援助	4.0	1	136	脳・神経系の観察・測定	2.5	15	13.8
14	409	医師からの指示を受ける	3.8	2	143	ナースコールの受理応答	0.5	15	13.8
15	210	点滴、中心静脈栄養の実施	3.7	2	9	入れ歯の手入れ	1.4	14	12.8
16	142	ニード、訴えを知る	3.4	38	81	食事中的見守り	4.5	14	12.8
17	177	その他の見守り	3.2	4	201	処方箋と処方薬の照合	1.0	14	12.8
18	118	歩行の介助	3.0	2	162	採光・防音調整	1.0	12	11.0
19	153	寝具、リネン交換	3.0	1	8	うがい	1.0	10	9.2
20	82	食事部分介助	2.7	5	53	衣服を整える	0.8	10	9.2

表 7-70 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位20位（19時台）

19時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	168	患者用補助器具の管理	7.7	1	141	日常会話、声かけ	4.2	62	56.9
2	205	静脈内注射の準備等	6.2	3	142	ニード、訴えを知る	2.5	43	39.4
3	409	医師からの指示を受ける	5.3	1	152	寝具を整える	0.8	31	28.4
4	177	その他の見守り	5.2	2	136	脳・神経系の観察・測定	2.6	28	25.7
5	408	職員間の連絡	5.0	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.2	20	18.3
6	153	寝具、リネン交換	4.3	1	162	採光・防音調整	0.6	19	17.4
7	141	日常会話、声かけ	4.2	62	76	おむつ除去、装着	2.1	15	13.8
8	68	排便時の見守り	4.0	1	135	(夜間)巡視、容態観察	1.4	15	13.8
9	101	体位変換全介助	3.8	6	106	ギャッチベッドの操作	1.3	15	13.8
10	118	歩行の介助	3.7	4	143	ナースコールの受理応答	1.0	15	13.8
11	201	処方箋と処方薬の照合	3.3	4	105	起居の援助	0.8	13	11.9
12	134	その他の問題行動への対応	3.0	4	51	更衣動作の一部介助	1.9	12	11.0
13	12	使用物品の後始末	2.8	4	53	衣服を整える	1.5	12	11.0
14	215	吸引の実施・準備・後始末	2.7	4	202	薬を患者に配布	1.3	12	11.0
15	136	脳・神経系の観察・測定	2.6	28	100	体位変換一部介助	1.3	11	10.1
16	142	ニード、訴えを知る	2.5	43	77	おむつの点検	0.4	11	10.1
17	59	排尿時の見守り	2.4	8	158	床頭台を整頓	0.6	10	9.2
18	206	持続的静脈内注射の準備等	2.3	3	59	排尿時の見守り	2.4	8	7.3
19	210	点滴、中心静脈栄養の実施	2.2	7	85	食事の後始末、配茶後の後始末	1.1	8	7.3
20	11	口腔清潔の必要物品準備	2.2	6	210	点滴、中心静脈栄養の実施	2.2	7	6.4

表 7-71 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (20 時台)

20 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	264	継続的な評価を伴うモニター監視	10.1	3	141	日常会話、声かけ	2.9	61	56.0
2	54	車椅子から便器便座への移乗介助	9.7	1	142	ニード、訴えを知る	2.2	43	39.4
3	134	その他の問題行動への対応	8.3	1	136	脳・神経系の観察・測定	2.0	32	29.4
4	205	静脈内注射の準備等	7.7	5	152	寝具を整える	1.1	25	22.9
5	216	吸入療法・ネブライザー準備等	6.7	4	135	(夜間)巡視、容態観察	1.2	21	19.3
6	408	職員間の連絡	6.7	1	143	ナースコールの受理応答	0.5	21	19.3
7	223	人工呼吸器使用中の観察	5.7	1	202	薬を患者に配布	1.4	20	18.3
8	412	ケース会議	5.3	1	76	おむつ除去、装着	1.8	18	16.5
9	177	その他の見守り	5.2	3	162	採光・防音調整	0.8	18	16.5
10	68	排便時の見守り	5.0	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.1	18	16.5
11	7	口腔清潔(歯みがき等)	4.9	3	77	おむつの点検	1.6	15	13.8
12	212	輸液・輸血中の固定等	3.8	2	105	起居の援助	1.2	12	11.0
13	215	吸引の実施・準備・後始末	3.2	7	53	衣服を整える	0.6	11	10.1
14	141	日常会話、声かけ	2.9	61	106	ギャッチベッドの操作	0.8	11	10.1
15	409	医師からの指示を受ける	2.8	3	100	体位変換一部介助	1.4	10	9.2
16	75	ポータブルトイレの準備・後始末	2.7	1	79	おむつの後始末	1.0	9	8.3
17	209	点滴、中心静脈栄養の準備等	2.4	5	101	体位変換全介助	1.5	9	8.3
18	118	歩行の介助	2.3	2	413	カーデクス、看護記録等	1.2	8	7.3
19	234	褥創、外科創等の処置等	2.3	2	59	排尿時の見守り	0.7	7	6.4
20	8	うがい	2.2	3	144	患者からのコール等による移動	0.4	7	6.4

表 7-72 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (21 時台)

21 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	68	排便時の見守り	14.0	1	141	日常会話、声かけ	2.4	52	47.7
2	234	褥創、外科創等の処置等	6.2	2	135	(夜間)巡視、容態観察	0.9	39	35.8
3	217	酸素吸入の準備・実施・後始末	5.8	2	162	採光・防音調整	0.6	28	25.7
4	223	人工呼吸器使用中の観察	5.0	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.2	19	17.4
5	7	口腔清潔(歯みがき等)	4.0	1	142	ニード、訴えを知る	2.5	18	16.5
6	231	泌尿科処置の準備・実施・後始末	4.0	1	152	寝具を整える	0.8	18	16.5
7	75	ポータブルトイレの準備・後始末	3.5	2	136	脳・神経系の観察・測定	2.9	17	15.6
8	216	吸入療法・ネブライザー準備等	3.3	2	77	おむつの点検	0.7	13	11.9
9	215	吸引の実施・準備・後始末	3.1	4	76	おむつ除去、装着	1.9	11	10.1
10	408	職員間の連絡	3.0	2	202	薬を患者に配布	1.2	11	10.1

11	136	脳・神経系の観察・測定	2.9	17	53	衣服を整える	0.7	10	9.2
12	59	排尿時の見守り	2.7	4	105	起居の援助	1.9	10	9.2
13	142	ニード、訴えを知る	2.5	18	143	ナースコールの受理応答	0.5	9	8.3
14	141	日常会話、声かけ	2.4	52	413	カーデクス、看護記録等	1.5	9	8.3
15	62	ポータブルトイレの準備・後始末	2.0	3	101	体位変換全介助	1.3	8	7.3
16	73	排便後の始末	2.0	1	102	褥創防止具使用等	0.9	8	7.3
17	238	持続吸引等のカテーテルの管理	2.0	1	79	おむつの後始末	1.9	7	6.4
18	105	起居の援助	1.9	10	51	更衣動作の一部介助	1.8	6	5.5
19	76	おむつ除去、装着	1.9	11	100	体位変換一部介助	1.4	6	5.5
20	79	おむつの後始末	1.9	7	158	床頭台を整頓	0.9	5	4.6

表 7-73 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (22 時台)

22 時	TCC	平均値順	平均値	度数	TCC	発生率順	平均値	度数	発生率
1	117	歩行の見守り	6.0	1	135	(夜間)巡視、容態観察	1.1	40	36.7
2	59	排尿時の見守り	5.4	4	141	日常会話、声かけ	2.9	29	26.6
3	134	その他の問題行動への対応	4.7	1	152	寝具を整える	0.7	16	14.7
4	412	ケース会議	4.7	1	211	点滴・IVHの滴下の調整等	1.0	14	12.8
5	145	励まし、慰め、術後の心理的ケア	4.5	2	136	脳・神経系の観察・測定	1.4	13	11.9
6	146	手術前指導のオリエンテーション	4.5	2	142	ニード、訴えを知る	2.0	11	10.1
7	413	カーデクス、看護記録等	4.2	7	64	留置カテーテルの観察等	1.3	10	9.2
8	222	気管切開、気管切開口のケア等	4.0	1	143	ナースコールの受理応答	0.4	9	8.3
9	120	車椅子による移動の介助	3.3	2	162	採光・防音調整	0.9	9	8.3
10	215	吸引の実施・準備・後始末	3.3	3	60	排尿後の後始末	0.9	8	7.3
11	105	起居の援助	3.0	1	77	おむつの点検	1.5	7	6.4
12	209	点滴、中心静脈栄養の準備等	3.0	1	413	カーデクス、看護記録等	4.2	7	6.4
13	141	日常会話、声かけ	2.9	29	53	衣服を整える	0.8	6	5.5
14	408	職員間の連絡	2.5	2	101	体位変換全介助	1.6	6	5.5
15	102	褥創防止具使用等	2.2	4	58	排尿動作援助	2.1	5	4.6
16	58	排尿動作援助	2.1	5	61	尿収器の後始末	1.2	5	4.6
17	142	ニード、訴えを知る	2.0	11	76	おむつ除去、装着	0.7	5	4.6
18	62	ポータブルトイレの準備・後始末	2.0	1	100	体位変換一部介助	2.0	5	4.6
19	100	体位変換一部介助	2.0	5	51	更衣動作の一部介助	1.0	4	3.7
20	201	処方箋と処方薬の照合	2.0	1	59	排尿時の見守り	5.4	4	3.7

表 7-74 タイプ2時間帯別提供されたケアの平均時間とケアの発生率上位 20 位 (23 時台)