

図-1c GC/MSとHPLCによるBaP測定値の関係




図-2 たばこ主流煙中の各PAH存在比率




図-3 ニコチン量(表示値)と総PAH濃度の関係

Ⅲ. 研究成果の刊行に関する一覧表

研究成果の刊行に関する一覧表

雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
藤田博子、米倉明、遠藤治、鈴木元	海上自衛隊における分煙効果に関する研究—自衛隊関連施設でのニコチンおよび多環芳香族炭化水素の測定—	防衛衛生	54	123-132	2007
遠藤治、鈴木元、緒方裕光、後藤純雄	たばこの煙の有害性と諸外国の動向	日本禁煙医師連盟通信	16	1-4	2007
松本真理子、杉田和俊、中島大介、後藤純雄、小谷野道子、遠藤治、鈴木元	喫煙装置を用いて捕集されたたばこ煙中の水分分析	室内環境学会誌	10	74-75	2007
杉田和俊、小谷野道子、松本真理子、中島大介、後藤純雄、緒方裕光、遠藤治、鈴木元	喫煙装置を用いて捕集されたたばこ煙中多環芳香族炭化水素の分析	室内環境学会誌	10	86-87	2007
Endo O, Matsumoto M, Inaba Y, Sugita K, Nakajima D, Goto S, Ogata H, Suzuki G	Chemical toxicants in mainstream smoke of major cigarettes in Japan with smoking machine – Nicotine, Tar and its mutagenicity –	Tobacco Control			