

表8 いつ吸うタバコが一番やめられるのがむずかしいか

		21歳~24歳	25歳~29歳	30歳~	計	P
男	朝の最初の一服以外のとき	113	31	7	151	0.027
	%	84.3	66.0	77.8	79.5	
	朝の最初の一服	21	16	2	39	
	%	15.7	34.0	22.2	20.5	
	計	134	47	9	190	
女	朝の最初の一服以外のとき	24	2	1	27	0.940
	%	96.0	100.0	100.0	96.4	
	朝の最初の一服	1	0	0	1	
	%	4.0	0.0	0.0	3.6	
	計	25	2	1	28	

表9 午前中により多く喫煙するかどうか

		21歳～24歳	25歳～29歳	30歳～	計	P
男	いいえ	137	45	7	189	0.102
	%	95.1	93.8	77.8	94.0	
	はい	7	3	2	12	
	%	4.9	6.3	22.2	6.0	
	計	144	48	9	201	
女	いいえ	25	2	1	28	0.942
	%	96.2	100.0	100.0	96.6	
	はい	1	0	0	1	
	%	3.8	0.0	0.0	3.4	
	計	26	2	1	29	

表10 病気の時でも喫煙するか

		計			P	
		21歳～24歳	25歳～29歳	30歳～		
男	いいえ	111	32	4	147	0.062
	%	77.1	68.1	44.4	73.5	
	はい	33	15	5	53	
	%	22.9	31.9	55.6	26.5	
	計	144	47	9	200	
<hr/>						
女	いいえ	22	2	1	25	0.717
	%	81.5	100.0	100.0	83.3	
	はい	5	0	0	5	
	%	18.5	0.0	0.0	16.7	
	計	27	2	1	30	

表11 ニコチンの程度

		21歳~24歳	25歳~29歳	30歳~	計	P
男	低ニコチン	37	14	5	56	0.395
	%	28.0	31.1	55.6	30.1	
	中ニコチン	70	21	2	93	
	%	53.0	46.7	22.2	50.0	
	高ニコチン	25	10	2	37	
	%	18.9	22.2	22.2	19.9	
	計	132	45	9	186	
<hr/>						
女	低ニコチン	13	2	1	16	0.641
	%	52.0	100.0	100.0	57.1	
	中ニコチン	11	0	0	11	
	%	44.0	0.0	0.0	39.3	
	高ニコチン	1	0	0	1	
	%	4.0	0.0	0.0	3.6	
	計	25	2	1	28	

表12 どのくらいの程度で深く吸入するか

		21歳～24歳	25歳～29歳	30歳～	計	P
男	決してない	6	1	1	8	0.729
	%	4.2	2.2	12.5	4.0	
	ときどき	81	25	4	110	
	%	56.3	54.3	50.0	55.6	
	いつも	57	20	3	80	
	%	39.6	43.5	37.5	40.4	
	計	144	46	8	198	
<hr/>						
女	決してない	2	0	0	2	0.606
	%	7.7	0.0	0.0	6.9	
	ときどき	13	2	1	16	
	%	50.0	100.0	100.0	55.2	
	いつも	11	0	0	11	
	%	42.3	0.0	0.0	37.9	
	計	26	2	1	29	

表13 受動喫煙日数

		計			P	
		21歳~24歳	25歳~29歳	30歳~		
男	0-3日	650	99	29	778	0.038
	%	77.3	67.8	80.6	76.1	
	4-7日	191	47	7	245	
	%	22.7	32.2	19.4	23.9	
計		841	146	36	1023	
女	0-3日	379	37	14	430	0.226
	%	82.6	84.1	100.0	83.2	
	4-7日	80	7	0	87	
	%	17.4	15.9	0.0	16.8	
計		459	44	11	517	

表13 受動喫煙日数と性別

		計		P
		0-3日	4-7日	0.001
男		778	245	1023
	%	76.1	23.9	100
女		430	87	517
	%	83.2	16.8	100
計		1208	332	1540
	%	78.4	21.6	100

表13 喫煙の有無と受動喫煙日数

		計		P
		0-3日	4-7日	<0.001
喫煙の有無	吸っていない	1119	221	1340
	%	83.5	16.5	100
	吸っている	89	111	200
	%	44.5	55.5	100
計		1208	332	1540
%		78.4	21.6	100

表14 タバコを吸うべきでないと思うか

		計			P
		いいえ	はい	わからない	<0.001
男		214	705	153	1072
	%	20.0	65.8	14.3	100
女		60	426	55	541
	%	11.1	78.7	10.2	100
計		274	1131	208	1613
	%	17.0	70.1	12.9	100

		計			P
		21歳～24歳	25歳～29歳	30歳～	
男	いいえ	181	27	6	214
	%	20.6	17.5	15.4	20.0
	わからない	124	25	4	153
	%	14.1	16.2	10.3	14.3
	はい	574	102	29	705
	%	65.3	66.2	74.4	65.8
	計	879	154	39	1072
女	いいえ	54	3	3	60
	%	11.2	6.7	20.0	11.1
	わからない	51	4	0	55
	%	10.6	8.9	0.0	10.2
	はい	376	38	12	426
	%	78.2	84.4	80.0	78.7
	計	481	45	15	541

表14 喫煙の有無とタバコを吸うべきでないと思うか

		計			P
		いいえ	わからない	はい	<0.001
喫煙の有無	吸っていない	205	160	1026	1391
	%	14.7	11.5	73.8	100
	吸っている	69	48	105	222
	%	31.1	21.6	47.3	100
	計	274	208	1131	1613
	%	17.0	12.9	70.1	100

表15 患者さんの喫煙についてどう思うか

		計				P
		疾患を持って いるので吸う べきではない	疾患によって は吸ってもよ い	患者の自由 にゆだねる べき	わからない	<0.001
男		398	263	357	51	1069
	%	37.2	24.6	33.4	4.8	100
女		255	85	159	40	539
	%	47.3	15.8	29.5	7.4	100
計		653	348	516	91	1608
	%	40.6	21.6	32.1	5.7	100

表15 喫煙の有無と患者さんの喫煙についてどう思うか

		計				P
		疾患を持つ ているので 吸うべきでは ない	疾患によっ ては吸って もよい	患者の自由 にゆだねる べき	わからな い	<0.001
喫煙の有 無	吸っていない	609	287	420	70	1386
	%	43.9	20.7	30.3	5.1	100
	吸っている	44	61	96	21	222
	%	19.8	27.5	43.2	9.5	100
	計	653	348	516	91	1608
	%	40.6	21.6	32.1	5.7	100

		計			P	
		21歳~24歳	25歳~29歳	30歳~		
	疾患を持って いるので吸う べきではない	322	58	18	398	0.325
	%	36.8	37.7	46.2	37.2	
男	疾患によつて は吸ってもよ い	219	37	7	263	
	%	25.0	24.0	17.9	28.2	
	患者の自由 にゆだねる	299	47	11	357	
	%	34.1	30.5	28.2	33.4	
	わからない	36	12	3	51	
	%	4.1	7.8	7.7	4.8	
	計	876	154	33	1069	

	疾患を持って いるので吸う べきではない	232	16	7	255	0.213
	%	48.3	35.6	50.0	47.3	
女	疾患によつて は吸ってもよ い	69	12	4	85	
	%	14.4	26.7	28.6	15.8	
	患者の自由 にゆだねる	142	14	3	159	
	%	29.6	31.1	21.4	29.5	
	わからない	37	3	0	40	
	%	7.7	6.7	0.0	7.4	
	計	480	45	14	539	

表16 喫煙防止対策について賛成するもの(年齢別・複数回答可)

表16 公共の場では禁煙すべき

		計						
		21歳～24歳	25歳～29歳	30歳～34歳	35歳～39歳	40歳以上	計	
男	公共の場では禁煙すべき	回答なし	159	32	5	1	2	199
			18.2	20.8	15.2	25.0	66.7	18.6
		はい	715	122	28	3	1	869
		%	81.8	79.2	84.8	75.0	33.3	81.4
	計	874	154	33	4	3	1068	
女	公共の場では禁煙すべき	回答なし	57	7	3	0	0	67
			11.8	15.6	27.3	0.0	0.0	12.3
		はい	426	38	8	2	2	476
		%	88.2	84.4	72.7	100.0	100.0	87.7
	計	483	45	11	2	2	543	
		100	100	100	100	100	100	

表16 医師は禁煙技術を身につけるべき

		計						
		21歳～24歳	25歳～29歳	30歳～34歳	35歳～39歳	40歳以上	計	
男	医師は禁煙技術を身につける	回答なし	457	68	13	0	2	540
			52.3	44.2	39.4	0.0	66.7	50.6
		はい	417	86	20	4	1	528
		%	47.7	55.8	60.6	100.0	33.3	49.4
	計	874	154	33	4	3	1068	
女	医師は禁煙技術を身につける	回答なし	198	13	2	0	1	214
			41.0	28.9	18.2	0.0	50.0	39.4
		はい	285	32	9	2	1	329
		%	59.0	71.1	81.8	100.0	50.0	60.6
	計	483	45	11	2	2	543	

表16 医師は患者の模範的モデルであるべき

		計						
		21歳～24歳	25歳～29歳	30歳～34歳	35歳～39歳	40歳以上	計	
男	医師は患者の模範的モデルで	回答なし	494	90	17	2	1	604
			56.5	58.4	51.5	50.0	33.3	56.6
		はい	380	64	16	2	2	464
		%	43.5	41.6	48.5	50.0	66.7	43.4
	計	874	154	33	4	3	1068	
女	医師は患者の模範的モデルで	回答なし	292	23	3	1	2	321
			60.5	51.1	27.3	50.0	100.0	59.1
		はい	191	22	8	1	0	222
		%	39.5	48.9	72.7	50.0	0.0	40.9
	計	483	45	11	2	2	543	

表16 医師は患者に吸わないようにアドバイスすべき

		計						
		21歳～24歳	25歳～29歳	30歳～34歳	35歳～39歳	40歳以上	計	
男	医師は患者に吸わないように	回答なし	535	90	16	2	1	644
			61.2	58.4	48.5	50.0	33.3	60.3
		はい	339	64	17	2	2	424
		%	38.8	41.6	51.5	50.0	66.7	39.7
	計	874	154	33	4	3	1068	
女	医師は患者に吸わないように	回答なし	269	22	5	1	1	298
			55.7	48.9	45.5	50.0	50.0	54.9
		はい	214	23	6	1	1	245
		%	44.3	51.1	54.5	50.0	50.0	45.1
	計	483	45	11	2	2	543	

表16 医師は患者に禁煙の情報を与えるべき

							計
		21歳～24歳	25歳～29歳	30歳～34歳	35歳～39歳	40歳以上	
男	医師は患者に禁煙の情報を与 回答なし	303	48	10	0	1	362
		34.7	31.2	30.3	0.0	33.3	33.9
	はい	571	106	23	4	2	706
	計	874	154	33	4	3	1068
女	医師は患者に禁煙の情報を与 回答なし	130	8	4	0	0	142
		26.9	17.8	36.4	0.0	0.0	26.2
	はい	353	37	7	2	2	401
	計	483	45	11	2	2	543

表16 医師が禁煙すれば患者も禁煙しやすい

							計
		21歳～24歳	25歳～29歳	30歳～34歳	35歳～39歳	40歳以上	
男	医師が禁煙すれば患者のしや 回答なし	579	102	21	1	1	704
		66.2	66.2	63.6	25.0	33.3	65.9
	はい	295	52	12	3	2	364
	計	874	154	33	4	3	1068
女	医師が禁煙すれば患者のしや 回答なし	290	23	6	1	2	322
		60.0	51.1	54.5	50.0	100.0	59.3
	はい	193	22	5	1	0	221
	計	483	45	11	2	2	543

表16 他の職業と区別なく吸ってよい

							計
		21歳～24歳	25歳～29歳	30歳～34歳	35歳～39歳	40歳以上	
男	他の職業と区別なく吸ってよい 回答なし	787	140	30	4	2	963
		90.0	90.9	90.9	100.0	66.7	90.2
	はい	87	14	3	0	1	105
	計	874	154	33	4	3	1068
女	他の職業と区別なく吸ってよい 回答なし	467	43	11	2	2	525
		96.7	95.6	100.0	100.0	100.0	96.7
	はい	16	2	0	0	0	18
	計	483	45	11	2	2	543

表16-1 喫煙防止対策について賛成するもの(複数回答可)

		男	女	計	P
公共の場では禁煙すべき					0.001
	回答なし	199	67	266	
	%	18.6	12.3	16.5	
	回答あり	869	476	1345	
	%	81.4	87.7	83.5	
	計	1068	543	1611	
医師は禁煙技術を身につけるべき					<0.001
	回答なし	540	214	754	
	%	50.6	39.4	46.8	
	回答あり	528	329	857	
	%	49.4	60.6	53.2	
	計	1068	543	1611	
医師は患者の模範的モデルであるべき					0.326
	回答なし	604	321	925	
	%	56.6	59.1	57.4	
	回答あり	464	222	686	
	%	43.4	40.9	42.6	
	計	1068	543	1611	
医師は患者に吸わないようにアドバイスすべき					0.037
	回答なし	644	298	942	
	%	60.3	54.9	58.5	
	回答あり	424	245	669	
	%	39.7	45.1	41.5	
	計	1068	543	1611	
医師は患者に禁煙の情報を与えるべき					0.002
	回答なし	362	142	504	
	%	33.9	26.2	31.3	
	回答あり	706	401	1107	
	%	66.1	73.8	68.7	
	計	1068	543	1611	
医師が禁煙すれば患者も禁煙しやすい					0.009
	回答なし	704	322	1026	
	%	65.9	59.3	63.7	
	回答あり	364	221	585	
	%	34.1	40.7	36.3	
	計	1068	543	1611	
他の職業と区別なく吸ってよい					<0.001
	回答なし	963	525	1488	
	%	90.2	96.7	92.4	
	回答あり	105	18	123	
	%	9.8	3.3	7.6	
	計	1068	543	1611	

表16-2 喫煙防止対策について賛成するもの(男女年齢階級別・複数回答可)

		21歳~24歳	25歳~29歳	30歳~34歳	35歳~39歳	40歳以上	計	P
公共の場では禁煙すべき	男 回答あり	715	122	28	3	1869		0.004
	%	81.8	79.2	84.8	75.0	33.3	81.4	
	874	154	33	4	3	1068		
	女 回答あり	426	38	8	2	2476		
	%	88.2	84.4	72.7	100.0	100.0	87.7	
	483	45	11	2	2543			
医師は禁煙技術を身につけるべき	男 回答あり	417	86	20	4	1528		0.071
	%	47.7	55.8	60.6	100.0	33.3	49.4	
	874	154	33	4	3	1068		
	女 回答あり	285	32	9	2	1329		
	%	59.0	71.1	81.8	100.0	50.0	60.6	
	483	45	11	2	2543			
医師は患者の模範的モデルであるべき	男 回答あり	380	64	16	2	2464		0.544
	%	43.5	41.6	48.5	50.0	66.7	43.4	
	874	154	33	4	3	1068		
	女 回答あり	191	22	8	1	0222		
	%	39.5	48.9	72.7	50.0	0.0	40.9	
	483	45	11	2	2543			
医師は患者に吸わないようにアドバイスすべき	男 回答あり	339	64	17	2	2424		0.196
	%	38.8	41.6	51.5	50.0	66.7	39.7	
	874	154	33	4	3	1068		
	女 回答あり	214	23	6	1	1245		
	%	44.3	51.1	54.5	50.0	50.0	45.1	
	483	45	11	2	2543			
医師は患者に禁煙の情報を与えるべき	男 回答あり	571	106	23	4	2706		0.030
	%	65.3	68.8	69.7	100.0	66.7	66.1	
	874	154	33	4	3	1068		
	女 回答あり	353	37	7	2	2401		
	%	73.1	82.2	63.6	100.0	100.0	73.8	
	483	45	11	2	2543			
医師が禁煙すれば患者も禁煙しやすい	男 回答あり	295	52	12	3	2364		0.321
	%	33.8	33.8	36.4	75.0	66.7	34.1	
	874	154	33	4	3	1068		
	女 回答あり	193	22	5	1	0221		
	%	40.0	48.9	45.5	50.0	0.0	40.7	
	483	45	11	2	2543			
他の職業と区別なく吸ってよい	男 回答あり	87	14	3	0	1105		0.847
	%	10.0	9.1	9.1	0.0	33.3	9.8	
	874	154	33	4	3	1068		
	女 回答あり	16	2	0	0	0	18	
	%	3.3	4.4	0.0	0.0	0.0	3.3	
	483	45	11	2	2543			

表16-3 喫煙の有無と公共の場では禁煙すべき

		計		P	
		回答なし	はい	<0.001	
喫煙の有無	吸っていない	192	1201	1393	
	%	13.8	86.2	100	
無	吸っている	74	144	218	
	%	33.9	66.1	100	
計		266	1345	1611	
		%	16.5	83.5	100

表16-3 喫煙の有無と医師は禁煙技術を身につけるべきのクロス表

		計		P	
		回答なし	はい	0.004	
喫煙の有無	吸っていない	632	761	1393	
	%	45.4	54.6	100	
無	吸っている	122	96	218	
	%	56.0	44.0	100	
計		754	857	1611	
		%	46.8	53.2	100

表16-3 喫煙の有無と医師は患者の模範的モデルであるべき

		計		P	
		回答なし	はい	<0.001	
喫煙の有無	吸っていない	766	627	1393	
	%	55.0	45.0	100	
無	吸っている	159	59	218	
	%	72.9	27.1	100	
計		925	686	1611	
		%	57.4	42.6	100

表16-3 喫煙の有無と医師は患者に吸わないようにアドバイスすべき

		計		P	
		回答なし	はい	<0.001	
喫煙の有無	吸っていない	781	612	1393	
	%	56.1	43.9	100	
無	吸っている	161	57	218	
	%	73.9	26.1	100	
計		942	669	1611	
		%	58.5	41.5	100

表16-3 喫煙の有無と医師は患者に禁煙の情報を与えるべき

		計		P	
		回答なし	はい	<0.001	
喫煙の有無	吸っていない	413	980	1393	
	%	29.6	70.4	100	
無	吸っている	91.0	127	218	
	%	41.7	58.3	100	
計		504	1107	1611	
		%	31.3	68.7	100

表16-3 喫煙の有無と医師が禁煙すれば患者のしやすい

		計		P	
		回答なし	はい	0.165	
喫煙の有無	吸っていない	878	515	1393	
	%	63.0	37.0	100	
無	吸っている	148	70	218	
	%	67.9	32.1	100	
計		1026	585	1611	
		%	63.7	36.3	100

表16-3 喫煙の有無と他の職業と区別なく吸ってよい

		計		P	
		回答なし	はい	<0.001	
喫煙の有無	吸っていない	1314	79	1393	
	%	94.3	5.7	100	
無	吸っている	174	44	218	
	%	79.8	20.2	100	
計		1488	123	1611	
		%	92.4	7.6	100

表17 喫煙について学んだか

		計		P
		学んだ	学んでいない	<0.001
男		835	234	1069
	%	78.1	21.9	100
女		463	77	540
	%	85.7	14.3	100
計		1298	311	1609
	%	80.7	19.3	100

表17 喫煙の有無と喫煙について学んだか

		計		P
		学んだ	学んでいない	0.351
喫煙の有無	吸っていない	1124	263	1387
	%	81.0	19.0	100
	吸っている	174	48	222
	%	78.4	21.6	100
	計	1298	311	1609
	%	80.7	19.3	100

表17 喫煙について学んだか(年齢階級・性別)

		計			P	
		21歳～24歳	25歳～29歳	30歳～		
男	学んだ	686	119	30	835	0.880
	%	78.3	77.8	75.0	78.1	
	学んでいない	190	34	10	234	
	%	21.7	22.2	25.0	21.9	
	計	876	153	40	1069	
女	学んだ	413	42	8	463	0.003
	%	85.9	93.3	57.1	85.7	
	学んでいない	68	3	6	77	
	%	14.1	6.7	42.9	14.3	
	計	481	45	14	540	

表18 カリキュラムで学んだ内容

		計		P	
		男	女		
喫煙の危険性について学んだ	回答なし	57	34	91	0.718
	%	6.9	7.4	7.1	
	学んだ	771	424	1195	
	%	93.1	92.6	92.9	
	計	828	458	1286	
人はなぜタバコを吸うかの話し合い	回答なし	774	426	1200	0.749
	%	93.5	93.0	93.3	
	学んだ	54	32	86	
	%	6.5	7.0	6.7	
	計	828	458	1286	
喫煙歴を記録することを学ぶ	回答なし	457	246	703	0.609
	%	55.2	53.7	54.7	
	学んだ	371	212	583	
	%	44.8	46.3	45.3	
	計	828	458	1286	
禁煙アプローチについて研修を受けた	回答なし	759	427	1186	0.316
	%	91.7	93.2	92.2	
	学んだ	69	31	100	
	%	8.3	6.8	7.8	
	計	828	458	1286	
禁煙をサポートする資料の提供の重要性を学ぶ	回答なし	602	329	931	0.738
	%	72.7	71.8	72.4	
	学んだ	226	129	355	
	%	27.3	28.2	27.6	
	計	828	458	1286	
ニコチン代用品について聞いたことがある	回答なし	212	111	323	0.588
	%	25.6	24.2	25.1	
	学んだ	616	347	963	
	%	74.4	75.8	74.9	
	計	828	458	1286	

表19 父がタバコを吸っているかどうか

		吸っていた 吸っていないが、今は吸 っていない			お父さん がいない	計	P
							0.942
男		478	289	273	32	1072	
	%	44.6	27.0	25.5	3.0	100	
女		249	148	132	15	544	
	%	45.8	27.2	24.3	2.8	100	
	計	727	437	405	47	1616	
	%	45.0	27.0	25.1	2.9	100	

表19 母がタバコを吸っているかどうか

		吸っていた 吸っていないが、今は吸 っていない			お母さん がいない	計	P
							0.379
男		957	39	68	9	1073	
	%	89.2	3.6	6.3	0.8	100	
女		484	19	40	1	544	
	%	89.0	3.5	7.4	0.2	100	
	計	1441	58	108	10	1617	
	%	89.1	3.6	6.7	0.6	100	

表19 兄弟で吸っている人がいるかどうか

		兄弟はいない 兄弟はいる タバコを吸う 兄弟がいる		兄弟はいる が、だれも 吸っていない	計	P
						<0.001
男		362	205	503	1070	
	%	33.8	19.2	47.0	100	
女		233	75	232	540	
	%	43.1	13.9	43.0	100	
	計	595	280	735	1610	
	%	37.0	17.4	45.7	100	

表19 性別と姉妹で吸っている人がいるかどうか

		姉妹はいない 姉妹はいる タバコを吸う 姉妹がいる		姉妹はいる が、だれも 吸っていない	計	P
						0.101
男		447	74	542	1063	
	%	42.1	7.0	51.0	100	
女		220	25	299	544	
	%	40.4	4.6	55.0	100	
	計	667	99	841	1607	
	%	41.5	6.2	52.3	100	

表20 喫煙の有無と父がタバコを吸っているかどうか

		計			P	
		吸って いない	吸っていた	吸っている	お父さん がいない	
喫煙の有 無	吸っていない	650	366	339	39	1394
	%	46.6	26.3	24.3	2.8	100
	吸っている	77	71	66	8	222
	%	34.7	32.0	29.7	3.6	100
	計	727	437	405	47	1616
	%	45.0	27.0	25.1	2.9	100

表20 喫煙の有無(男性)と父がタバコを吸っているかどうか

		計			P	
		吸って いない	吸っていた	吸っている	お父さん がいない	
喫煙の有 無(男性)	吸っていない	407	229	217	25	878
	%	46.4	26.1	24.7	2.8	100
	吸っている	71	60	56	7	194
	%	36.6	30.9	28.9	3.6	100
	計	478	289	273	32	1072
	%	44.6	27.0	25.5	3.0	100

表20 喫煙の有無(女性)と父がタバコを吸っているかどうか

		計			P	
		吸って いない	吸っていた	吸っている	お父さん がいない	
喫煙の有 無(女性)	吸っていない	243	137	122	14	516
	%	47.1	26.6	23.6	2.7	100
	吸っている	6	11	10	1	28
	%	21.4	39.3	35.7	3.6	100
	計	249	148	132	15	544
	%	45.8	27.2	24.3	2.8	100

表20 喫煙の有無と母がタバコを吸っているかどうか

		計			P	
		吸って いない	吸っていた	吸っている	お母さん がいない	
喫煙の有 無	吸っていない	1256	42	87	10	1395
	%	90.0	3.0	6.2	0.7	100
	吸っている	185	16	21	0	222
	%	83.3	7.2	9.5	0.0	100
	計	1441	58	108	10	1617
	%	89.1	3.6	6.7	0.6	100

表20 喫煙の有無(男性)と母がタバコを吸っているかどうか

		計			P	
		吸って いない	吸っていた	吸っている	お母さん がいない	
喫煙の有 無(男性)	吸っていない	792	27	51	9	879
	%	90.1	3.1	5.8	1.0	100
	吸っている	165	12	17	0	194
	%	85.1	6.2	8.8	0.0	100
	計	957	39	68	9	1073
	%	89.2	3.6	6.3	0.8	100

表20 喫煙の有無(女性)と母がタバコを吸っているかどうか

		計			P	
		吸って いない	吸っていた	吸っている	お母さん がいない	
喫煙の有 無(女性)	吸っていない	464	15	36	1	516
	%	89.9	2.9	7.0	0.2	100
	吸っている	20	4	4	0	28
	%	71.4	14.3	14.3	0.0	100
	計	484	19	40	1	544
	%	89.0	3.5	7.4	0.2	100

表20 喫煙の有無と兄弟で吸っている人がいるかどうか

		兄弟はいない			計	P
		兄弟はいない	タバコを吸う兄弟がいる	兄弟はいないが、だれも吸っていない		<0.001
喫煙の有無	吸っていない	514	214	660	1388	
	%	37.0	15.4	47.6	100	
	吸っている	81	66	75	222	
	%	36.5	29.7	33.8	100	
計		595	280	735	1610	
%		37.0	17.4	45.7	100	

表20 喫煙の有無(男性)と兄弟で吸っている人がいるかどうか

		兄弟はいない			計	P
		兄弟はいない	タバコを吸う兄弟がいる	兄弟はいないが、だれも吸っていない		<0.001
喫煙の有無	吸っていない	294	148	434	876	
	%	33.6	16.9	49.5	100	
	吸っている	68	57	69	194	
	%	35.1	29.4	35.6	100	
計		362	205	503	1070	
%		33.8	19.2	47.0	100	

表20 喫煙の有無(女性)と兄弟で吸っている人がいるかどうか

		兄弟はいない			計	P
		兄弟はいない	タバコを吸う兄弟がいる	兄弟はいないが、だれも吸っていない		0.006
喫煙の有無	吸っていない	220	66	226	512	
	%	43.0	12.9	44.1	100	
	吸っている	13	9	6	28	
	%	46.4	32.1	21.4	100	
計		233	75	232	540	
%		43.1	13.9	43.0	100	

表20 喫煙の有無(全体数で)と姉妹で吸っている人がいるかどうか

		姉妹はいない			計	P
		姉妹はいない	タバコを吸う姉妹がいる	姉妹はいないが、だれも吸っていない		0.001
喫煙の有無	吸っていない	581	73	734	1388	
	%	41.9	5.3	52.9	100	
	吸っている	86	26	107	219	
	%	39.3	11.9	48.9	100	
計		667	99	841	1607	
%		41.5	6.2	52.3	100	

表20 喫煙の有無(男性)と姉妹で吸っている人がいるかどうか

		姉妹はいない			計	P
		姉妹はいない	タバコを吸う姉妹がいる	姉妹はいないが、だれも吸っていない		0.001
喫煙の有無	吸っていない	374	49	449	872	
	%	¥42.9	¥5.6	¥51.5	100	
	吸っている	73	25	93	191	
	%	¥38.2	¥13.1	¥48.7	100	
計		447	74	542	1063	
%		¥42.1	¥7.0	¥51.0	100	

表20 喫煙の有無(女性)と姉妹で吸っている人がいるかどうか

		姉妹はいない			計	P
		姉妹はいない	タバコを吸う姉妹がいる	姉妹はいないが、だれも吸っていない		0.794
喫煙の有無	吸っていない	207	24	285	516	
	%	40.1	4.7	55.2	100	
	吸っている	13	1	14	28	
	%	46.4	3.6	50.0	100	
計		220	25	299	544	
%		40.4	4.6	55.0	100	

表21 喫煙の有無とアルコールを飲むかどうか

		計		P
		飲まない	飲む	<0.001
喫煙の有無	吸っていない	1151	245	1396
	%	82.4	17.6	100
	吸っている	140	81	221
	%	63.3	36.7	100
	計	1291	326	1617
	%	79.8	20.2	100

表21 喫煙の有無(男性)とアルコールを飲むかどうか

		計		P
		飲まない	飲む	<0.001
喫煙の有無	吸っていない	696	184	880
	%	79.1	20.9	100
	吸っている	119	74	193
	%	61.7	38.3	100
	計	815	258	1073
	%	76.0	24.0	100

表21 喫煙の有無(女性)とアルコールを飲むかどうか

		計		P
		飲まない	飲む	0.040
喫煙の有無	吸っていない	455	61	516
	%	88.2	11.8	100
	吸っている	21	7	28
	%	75.0	25.0	100
	計	476	68	544
	%	87.5	12.5	100

表21 喫煙の有無とコーヒーを飲むかどうか

		計		P
		飲まない	飲む	<0.001
喫煙の有無	吸っていない	688	709	1397
	%	49.2	50.8	100
	吸っている	73	149	222
	%	32.9	67.1	100
	計	761	858	1619
	%	47.0	53.0	100

表21 喫煙の有無(男性)とコーヒーを飲むかどうか

		計		P
		飲まない	飲む	<0.001
喫煙の有無	吸っていない	430	450	880
	%	48.9	51.1	100
	吸っている	63	131	194
	%	32.5	67.5	100
	計	493	581	1074
	%	45.9	54.1	100

表21 喫煙の有無(女性)とコーヒーを飲むかどうか

		計		P
		飲まない	飲む	0.144
喫煙の有無	吸っていない	258	259	517
	%	49.9	50.1	100
	吸っている	10	18	28
	%	35.7	64.3	100
	計	268	277	545
	%	49.2	50.8	100

表22 喫煙と部活動の関係

		計		P
		していない	している	
喫煙の有 無	吸っていない	289	1106	0.068
	%	20.7	79.3	
	吸っている	58	164	100
	%	26.1	73.9	
計		347	1270	100
		%	21.5	78.5

表22 喫煙と意識して運動しているかの関係

		計		P
		していない	している	
喫煙の有 無	吸っていない	843	554	0.895
	%	60.3	39.7	
	吸っている	135	87	100
	%	60.8	39.2	
計		978	641	100
		%	60.4	39.6