

キャンペーン項目と考えられる。また、HIVに関しては、大阪で流行していること、STDに感染しているとHIVに感染しやすいことが、重要度の高いキャンペーン項目と考えられ、感染がわかつても国に報告されないことが、それにつぐ重点項目である。

- d. 若者集団では、男性は、STDで副睾丸炎になること、女性ではSTDで不妊になることに関心が高いため、男女分けたキャンペーンも考慮するべきである。
- e. STD受診者については、HIVについてのみ質問したが、大阪での流行、女性が感染しやすいこと、夜間休日検査が、重要度の高いキャンペーン項目である。

(2) 検査サービスの改善に関する戦略

＜短期戦略：2007年度から＞

- a. どこの保健所でもHIV検査を受けられることについて周知を図る。
- b. 中高年の人々がプライバシー漏洩に不安を持つことのない検査システムを導入する。
- c. 匿名でも誤通知が生じないことについて周知を図る。
- d. 若者にHIV検査がどういうものか（方法、手順、カウンセリング）について周知を図る。
- e. HIV検査について治療法の紹介やカウンセリングが受けられること等について周知を図る。
→以上は、広報、雑誌、Webサイトの中で初年度から周知していく。aの周知はbの問題の解消にも役立つ。
- f. 若者が受けやすい場所での検査機会を創出する。
→自治体、地元コミュニティとアメリカ村における若者向けの検査プログラムをスタートする。

＜中期戦略＞

1) 保健所の検査

- g. 何の検査に来たかを受付で言わなくてよい方法を導入する。
- h. 保健所等での待合室のあり方について改善する。
- i. 保健所等での告知の際のプライバシー確保を十分に行う。
- j. 保健所職員の対応や言動のあり方について改善する。
- k. 性的指向の配慮したサービスを導入する。

→以上は、調査結果を行政担当者に具体的な記述をつけたレポートとして還元して、現場で改善の方向を検討してもらう。

- l. 若者向けに無料匿名のSTD検査を導入する。

→これについては、gのプログラムの中への盛り込みを自治体とともに検討していく。また、東京都港区が地元の医療機関と2007年度から実施した無料HIV/STD検査プロジェクト(AIプロジェクト)を紹介して導入の可能性について検討を開始する。

2) 医療機関の検査

- m. 何の検査に来たかを受付で言わなくてよい方法を導入する。
- n. 医療機関における告知や対応のあり方について改善する。
- o. 医療機関におけるHIV/STD検査の価格のインターネット上の公開を進める。
→関連研究会・医会(TI研究会、泌尿器科医会、産婦人科医会、皮膚科医会)に本調査結果を還元し、研究班やNGOと交流を促進して、これらの改善点や可能性を検討していく。
- p. 中高年の人々がプライバシー漏洩に不安を持つことのない検査システムを導入する。

→医療機関でも自由診療なら匿名検査が可能であるが、現時点では医療機関の足並みが揃っていない（匿名でしている医療機関は3割程度）ので、2007年度中に関連医会とその点の合意を取り付け、2008年度より広報の中に加えていく。

- a. STDの検査が尿検査でできることを啓発する。

→検査の進歩で、尿検査の信頼度が上がっているが、まだ現時点では医療機関の足並みが揃っていないと思われる所以、2007年度中に関連医会とその点の合意を取り付け、2008年度より広報の中に加えていく。

<長期戦略>

- r. 公的な検査機会の数を増やし、場所、日時のバラエティーを増やす。

- s. 即日検査のニーズにもっと応えられるようにする。

→調査結果を行政に還元し、現実的可行性について検討してもらう。

- t. 一般検診や健康診断時のHIV/STD検査導入の可能性を検討する。

→実際すでに一部で行われているので、その現状の把握を行い、その是非を含めて検討する。

基礎調査

	性別	数	10−19歳	20−29歳	30−39歳	40−49歳	50−59歳	60歳以上	無回答
基礎1 教習所	男性	7980	63.9	28.3	2.0	1.0	0.9	0.8	3.1
	女性	7582	64.4	30.3	1.7	0.5	0.3	0.3	2.5
	無回答	387	7.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	87.9
基礎2 PCモニター	男性	13426	0.9	19.2	39.2	29.4	11.4	0.0	0.0
	女性	12324	1.1	27.8	45.3	19.5	6.4	0.0	0.0
	無回答	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
基礎3 世帯	男性	3068	0.3	4.0	12.1	14.2	20.3	49.0	0.0
	女性	11944	0.2	5.7	22.4	23.6	23.1	25.0	0.0
	無回答	6	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0	66.7	0.0

APPENDIX1 (全調査属性分析)

表1.形成調査の回収数

	性別	数	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	無回答
形成調査1 自動車教習所受講者	男性	240	45.8	35.0	10.4	5.8	1.7	1.3	0.0
	女性	286	35.0	46.5	10.5	4.2	2.4	1.4	0.0
	無回答	17	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	94.1	0.0
形成調査2 パソコンモニター	男性	399	1.3	17.0	30.1	35.6	16.0	0.0	0.0
	女性	407	0.5	19.4	29.5	37.8	12.8	0.0	0.0
	無回答	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
形成調査3 世帯モニター	男性	247	0.0	0.0	0.0	46.6	53.4	0.0	0.0
	女性	288	0.0	0.0	0.0	52.8	47.2	0.0	0.0
	無回答	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
形成調査6 パソコンモニター	男性	56	0.0	8.9	39.3	39.3	12.5	0.0	0.0
	女性	53	0.0	20.8	49.1	22.6	7.5	0.0	0.0
	無回答	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
形成調査7 保健所受検者(大阪府)	男性	173	3.5	46.8	31.2	7.5	5.8	5.2	0.0
	女性	134	14.9	53.7	22.4	5.2	1.5	2.2	0.0
	その他	6	16.7	16.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
形成調査8 STDクリニック受診者	男性	134	1.5	25.4	30.6	29.1	11.2	1.5	0.7
	女性	174	4.6	34.5	39.1	16.1	2.9	1.7	1.1
	無回答	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

APPENDIX2-1 (形成調査1-3,8 : 知識重要度 ; 男女合計)

◆形成調査1-3、8の知識及び重要性認識の割合に関する分析結果（男女合計）

	形成1：教習所 (n=543)	形成2：PCモニター (n=506)		形成3：世帯 (n=535)		形成8：STIリサーチ (n=512)						
		知つてゐる 重要 差	知つてゐる 重要 差	知つてゐる 重要 差	知つてゐる 重要 差	知つてゐる 重要 差	知つてゐる 重要 差					
HIV-1. 最近、中国でも、エイズウイルス感染者が増えていること	31.7	18.4	-13.3	36.9	12.2	-24.6	45.2	11.0	-34.2	45.4	26.7	-18.7
HIV-2. 最近、台湾でも、大きなエイズ流行が起きたこと	17.9	18.2	0.3	21.5	11.2	-10.3	22.2	10.5	-11.8	29.3	26.4	-2.9
HIV-3. 最近、日本でも、エイズウイルス感染者が増えていること	81.0	63.7	-17.3	84.5	53.0	-31.5	85.8	34.4	-51.4	89.8	78.5	-11.4
HIV-4. 最近、大阪でも、エイズウイルス感染者が増えていること	31.5	68.5	37.0	27.9	58.2	30.2	29.9	38.3	8.4	38.7	30.5	41.8
HIV-5. 治療の進歩で、早期発見・早期治療をすれば、エイズが人に感染しても、普通に近い生活ができるようになつたこと	54.3	51.2	-3.1	61.6	43.0	-18.6	65.0	26.9	-38.1	56.7	58.3	1.6
HIV-6. エイズウイルスに感染しても、5-10年は症状がなく、自分では感染しているかどうかわからなないこと	73.8	54.3	-19.5	82.3	42.8	-39.5	77.6	27.9	-49.7	81.0	64.9	-16.2
HIV-7. 男女間の性交渉では男性より女性の方が感染しやすいこと	31.5	55.6	24.1	25.8	40.6	14.8	32.7	26.0	-6.7	28.1	68.9	40.8
HIV-8. 保健所（保健センター）では、名前を言わずに無料でエイズ検査ができるること	68.1	56.9	-11.2	82.3	45.2	-37.0	74.4	26.5	-47.9	80.4	64.3	-16.1
HIV-9. 大阪には、友間や体日にエイズ検査を受けられる公的な検査所があるること	18.0	54.0	36.0	24.5	45.6	21.1	18.5	25.6	7.1	34.1	59.6	25.5
HIV-10. 自分の住んでいる地域に関わらず、日本中どこの保健所でもエイズ検査を受けることができること	36.8	53.4	16.6	43.8	43.1	-0.7	40.6	25.0	-15.5	53.6	64.0	10.4
HIV-11. 病院や医院では、金額自費ですが、専門でなくともエイズ検査ができること	36.8	49.9	13.1	34.9	38.2	3.3	33.8	21.1	-12.7	48.4	59.3	10.9
HIV-12. 検査で感染がつかっても、名前や性所が個人に報告されることはないこと	34.3	55.8	21.5	35.5	41.2	5.7	34.4	24.1	-10.3	47.7	59.6	11.9
STI-1. 今、日本で非常に増えていること	48.1	58.4	10.3	43.9	41.8	-2.1	38.7	27.7	-11.0			
STI-2. 今、大阪でも非常に増えていること	23.4	63.7	40.3	17.4	47.3	30.0	17.2	29.3	12.1			
STI-3. 女性に多い性病（男性の1.5倍）ということ	40.9	60.0	19.1	49.9	40.2	-9.8	49.2	25.8	-23.4			
STI-4. 若い人に多く、10人に1人が感染していること	25.4	55.6	30.2	33.0	34.6	1.5	25.4	29.0	3.6			
STI-5. オーラルセックス（口を使った性行為）でもうつるということ	32.4	49.0	16.6	29.8	37.6	7.8	19.8	19.6	-0.2			
STI-6. 感染していても男性の半分、女性は8割でいたみもかゆみも出ないこと	26.3	56.5	30.2	26.5	45.2	18.7	22.1	29.5	7.5			
STI-7. でも、放つておくと、女性では卵管が傷ついて不妊になりやすくなるということ	33.0	56.0	23.0	38.4	37.8	-0.6	34.6	18.5	-16.1			
STI-8. でも、放つておくと、男性では副こう丸炎になることがあること	10.5	43.5	33.0	13.1	33.2	20.1	9.7	21.3	11.6			
STI-9. 放つておくと、エイズウイルスに何倍もかかりやすくなること	17.7	62.8	45.1	15.0	44.4	29.4	10.1	29.2	19.1			
STI-10. 出産のとき赤ちゃんの肺や目にうつるという困ったことが起こること	19.5	64.1	44.6	24.7	39.7	15.0	24.5	20.7	-3.7			
STI-11. 医療機関で頼めば尿で検査できること	21.4	58.6	37.2	21.8	43.2	21.5	19.1	27.9	8.8			

あなたはセックの経験がありますか（はい）

これまでに性交渉の相手は2人以上になりますか（はい）（性経験者：世=506、数=370、Pc=751、STI=291）

これまでにコンドームを使わない性交渉の経験はありませんか（はい）（性経験者：世=506、数=370、Pc=551、STI=291）

経験者 99.3%

経験者 97.2%

経験者 93.1%

経験者 90.6%

経験者 95.7%

APPENDIX2-2 (形成調査1・3・8 : 知識前度 : 男性)

◆形成調査1-3、8の知識及び重要性認識の割合に関する分析結果（男性）

	形成1：教習所 (n=240)			形成2：PCモニター (n=399)			形成3：世帯 (n=247)			形成8：STIクリニック (n=134)		
	知つてる 差	重要な 差	知つてる 差	重要な 差	知つてる 差	重要な 差	知つてる 差	重要な 差	知つてる 差	重要な 差	知つてる 差	重要な 差
HIV-1. 最近、中国でも、エイズウイルス感染者が増えていること	34.6	19.3	-15.3	44.3	14.3	-30.0	52.2	15.0	-37.2	54.9	21.7	-33.2
HIV-2. 最近、台湾でも、大きなエイズ流行が起きたこと	19.6	18.1	-1.5	26.5	13.0	-13.5	23.9	14.6	-9.3	25.6	21.7	-3.9
HIV-3. 最近、日本でも、エイズウイルス感染者が増えていること	80.0	61.3	-18.7	85.4	54.9	-30.5	87.0	38.5	-48.5	90.2	75.0	-15.2
HIV-4. 最近、大陸でも、エイズウイルス感染者が増えていること	34.6	66.0	31.4	31.2	61.2	30.0	33.2	44.9	11.7	37.1	76.0	37.9
HIV-5. 治療の進歩で、早期発見・早期治療をすれば、10年は症状がなく、普通に新しい生活ができるようになつたこと	50.8	45.4	-5.4	59.7	42.6	-17.1	64.0	28.3	-35.7	60.9	50.0	-10.9
HIV-6. エイズウイルスに感染しても、自分では感染しているかどうかわからぬないこと	73.8	49.6	-24.2	82.1	41.1	-41.0	82.6	27.9	-54.7	83.5	61.2	-22.3
HIV-7. 男女間の性交渉では男性より女性の方が感染しやすいこと	27.5	38.7	11.2	24.7	27.1	2.4	34.4	19.4	-15.0	27.8	50.4	22.6
HIV-8. 保健所（保健センター）では、名前を書わずに無料でエイズ検査ができること	66.3	49.6	-16.7	81.7	45.4	-36.3	68.0	29.1	-38.9	75.2	57.4	-17.8
HIV-9. 大阪には、夜間や休日にはエイズ検査を受けられる公的な検査所があること	20.4	50.0	29.6	26.2	45.4	19.2	18.6	28.3	9.7	40.2	56.3	16.1
HIV-10. 自分の生んんでいる地域に問わらず、日本中どここの保健所でもエイズ検査を受けることができるること	35.0	48.3	13.3	42.7	41.9	-0.8	40.9	26.7	-14.2	46.6	58.9	12.3
HIV-11. 病院や医療では、全額自費ですが、匿名でなくともエイズ検査ができること	40.8	42.9	2.1	37.9	34.8	-3.1	31.2	22.3	-8.9	45.9	51.9	6.0
HIV-12. 検査で感染がわかつても、名前や住所が国に報告されることはないこと	31.7	51.3	19.6	35.9	39.8	3.9	33.2	24.7	-8.5	42.9	50.4	7.5
STI-1. 今、日本で非常に増えていること	47.5	58.8	11.3	38.6	40.6	2.0	36.0	25.9	-10.1			
STI-2. 今、大阪でも非常に増えていること	26.3	63.0	36.7	17.7	47.1	29.4	15.4	27.5	12.1			
STI-3. 女性に多い性病（男性の1.5倍）ということ	34.2	57.6	23.4	41.2	27.8	-13.4	48.2	21.5	-26.7			
STI-4. 若い人に多く、10人に1人が以上が感染していると言われていること	21.3	39.5	18.2	28.5	30.8	2.3	25.5	25.1	-0.4			
STI-5. オーラルセックス（口を使った性行為）でもうつるということ	35.0	50.0	15.0	33.8	40.4	6.6	29.1	19.4	-9.7			
STI-6. 感染していても男性の半分、女性の8割でいたみのがゆみも出ないことが多い	25.8	50.4	24.6	24.2	39.6	15.4	24.3	28.3	4.0			
STI-7. でも、放つておくと、女性では卵管が傷ついて不妊になりやすくなるということ	24.2	38.2	14.0	29.0	31.8	2.8	30.4	16.2	-14.2			
STI-8. でも、放つておくと、男性では副うが炎になることがあること	12.5	63.4	50.9	15.9	43.9	28.0	15.4	30.0	14.6			
STI-9. 放つておくと、エイズウイルスに何倍もかかりやすくなること	20.0	61.3	41.3	16.4	43.6	27.2	9.7	30.0	20.3			
STI-10. 出産のとき赤ちゃんの肺や目にうつるという困ったことが起こること	16.7	55.9	39.2	20.2	35.1	14.9	19.0	21.9	2.9			
STI-11. 医療機関で細めは尿で検査できること	23.3	57.6	34.3	21.5	38.8	17.3	24.3	25.9	1.6			

あなたはセカリの経験がありますか（はい）

これまでの性交渉の相手は大人以上になりますか（はい）

（性験者：世=238、数=173、PC=371、STI=127）

72.1

76.3

71.1

93.5

83.0

89.5

96.4

79.0

95.0

100.0

98.4

92.1

◆形成調査1-3、8の知識及び重要性認識の割合に関する分析結果（女性）

	形成1： 教習所 (n=286)	形成2： PCミニター (n=40)	形成3： 世帯 (n=288)	形成8： STIクリニック (n=174)
	知つてる 差	知つてる 差	知つてる 差	知つてる 差
HIV-1. 最近、中国でも、エイズウイルス感染者が増えていていること	29.7 -11.0	18.7 2.3	29.6 9.3	10.1 -7.4
HIV-2. 最近、台湾でも、大きなエイズ流行が起きたこと	17.1 85.3	19.4 68.6	16.7 83.5	9.3 50.6
HIV-3. 最近、日本でも、エイズウイルス感染者が増えていること	29.7 -16.7	73.5 43.8	24.7 54.5	29.8 27.1
HIV-4. 最近、大阪でも、エイズウイルス感染者が増えていること	58.7 -16.5	58.3 82.5	63.5 44.0	43.0 -38.5
HIV-5. 治療の進歩で、早期発見・早期治療をすれば、エイズが間に感染しても、普通に新しい生活ができるようになつたこと	77.3 36.4	60.8 72.1	82.5 26.8	25.7 27.8
HIV-6. エイズウイルスに感染しても、5-10年は症状がなく、自分では感染しているかどうかわからぬこと	73.1 66.1	66.1 7.0	82.8 53.3	26.5 31.3
HIV-7. 男女間の性交渉では男性より女性の方が感染しやすいこと	16.4 39.9	60.1 60.1	43.7 20.2	44.7 45.0
HIV-8. 保健所（保健センター）では、名前を言わずに無料でエイズ検査ができること	37.4 35.0	62.5 58.7	22.9 32.0	45.2 40.8
HIV-9. 大阪には、夜間や休日にエイズ検査を受けられる公的な検査所があること	50.0 30.8	61.5 50.9	11.5 20.1	42.3 33.9
HIV-10. 自分の住んでいる地域に関わらず、日本中どこの保健所でもエイズ検査を受けることができるること	21.3 28.0	67.5 64.3	46.2 36.3	46.9 49.9
HIV-11. 病院や医院では、全額自費ですが、実名でなくてもエイズ検査ができること	47.6 41.3	65.4 73.1	17.8 31.8	51.6 47.5
HIV-12. 検査で感染がわかつても、名前や住所が国に報告されることはないこと	35.1 25.1	25.1 35.1	41.8 41.8	23.6 6.7
STI-1. 今、日本で非常に増えていること	50.0 29.4	61.5 72.1	11.5 42.7	49.0 37.5
STI-2. 今、大阪でも非常に増えていること	21.3 30.8	67.5 50.9	46.2 20.1	29.9 25.9
STI-3. 女性に多い性病（男性の1.5倍）ということ	47.6 30.8	65.4 64.3	17.8 20.1	51.6 28.8
STI-4. 若い人に多く、10人に1人以上が感染していると言われていること	47.6 28.0	65.4 64.3	17.8 20.1	51.6 28.8
STI-5. オーラルセックス（口を使った性行為）でもうつるということ	41.3 39.1	73.1 28.3	31.8 19.2	43.0 10.4
STI-6. 感染していても男性の半分、女性の8割でいたみもかゆみも出ないこと	41.3 15.4	73.1 67.1	31.8 51.7	43.0 44.2
STI-7. でも、放っておくと、女性では阴嚢が壊ついて不妊になりますということ	41.3 22.0	73.1 73.9	31.8 51.9	43.0 43.2
STI-8. でも、放っておくと、男性では副にうれ炎になることがあること	20.3 15.4	62.2 67.1	41.9 51.7	22.1 13.6
STI-9. 放っておくと、エイズウイルスに何倍もかかりやすくなること	67.5 22.0	94.1 71.0	46.7 44.2	29.5 30.6
STI-10. 出産のとき赤ちゃんの肺や目にうつるという困ったことが起こること	71.5 20.3	93.1 71.5	46.7 44.2	14.6 10.4
STI-11. 医療機関で頼めば尿で検査できること	68.6 91.8	96.3 91.8	43.7 43.0	28.5 29.2

あなたはせひの経験がありますか（はい）
これまでの性交渉の相手は2人以上になりますか（はい）（性経験者：世=268数=193、PO=380、STI=164）
これまでにコンドームを使わない性交渉の経験はありませんか（はい）（性経験者：世=268数=193、PO=380、STI=164）

APPENDIX3-1-1 (形成調査1：自動車教習所受講生) 検査評価)

◆形成調査1 (自動車教習所受講生) の分析結果

J1. 保健所HIV検査に抵抗を感じると思うか (N=543)					
男性 (n=240)		女性 (n=286)		不明 (n=17)	
N	%	N	%	N	%
非常に感じると思う	35	14.6	70	24.5	1
かなり感じると思う	29	12.1	55	19.2	1
感じると思う	80	33.3	76	26.6	2
あまり感じないと思う	41	17.1	51	17.8	1
全く感じないとと思う	49	20.4	26	9.1	0
無回答	6	2.5	8	2.8	12
合計	240	100.0	286	100.0	17
	100.0		100.0		100.0

J2. 何に抵抗を感じるか
<保健所のHIV検査に抵抗を感じる場合のみ> (N=442)

保健所自体に行きにくい、 知り合いに会うかも、 エイズ検査と受付で言う必要 性がない扱いをされる不安					
男性 (n=185)		女性 (n=252)		不明 (n=5)	
N	%	N	%	N	%
保健所自体に行きにくい、 知り合いに会うかも、 エイズ検査と受付で言う必要 性がない扱いをされる不安	77	41.6	113	44.8	2
無回答	2	1.1	0	0.0	0
プライバシーの不安	63	34.1	109	43.3	2
無回答	2	1.1	0	0.0	0
プライベートを聞かれる不安	56	30.3	93	36.9	1
無回答	2	1.1	0	0.0	0
軽蔑的な扱いをされる不安	37	20.0	76	30.2	1
無回答	2	1.1	0	0.0	0
プライベートを聞かれる不安	38	20.5	85	33.7	1
無回答	2	1.1	0	0.0	0
いろいろ注意される不安	20	10.8	28	11.1	0
無回答	2	1.1	0	0.0	0
どういう検査かわからない不安	79	42.7	138	54.8	2
無回答	2	1.1	0	0.0	0
その他	7	3.8	11	4.4	0
無回答	2	1.0	0	0.0	0

J4. 何に抵抗を感じるか
<医療機関のHIV検査に抵抗を感じる場合のみ> (N=457)

医療機関HIV検査に抵抗を感じると思うか (N=543)					
男性 (n=240)		女性 (n=286)		不明 (n=17)	
N	%	N	%	N	%
非常に感じると思う	46	19.2	88	30.8	0
かなり感じると思う	39	16.3	56	19.6	2
感じると思う	76	31.7	78	27.3	2
あまり感じないと思う	34	14.2	36	12.6	0
全く感じないとと思う	38	15.8	22	7.7	1
無回答	7	2.9	6	2.1	12
合計	240	100.0	286	100.0	17
	100.0		100.0		100.0

J5. どうしたら保健所や医療機関でのエイズ検査が受けやすいか (N=543)

	男性 (n=240)		女性 (n=286)		不明 (n=17)	
	N	%	N	%	N	%
すぐ結果がわかる	129	53.8	160	55.9	2	11.8
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6
繁華街一角で気軽に受検可	31	12.9	35	12.2	1	5.9
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6
検査料金が安い、	52	21.7	87	30.4	1	5.9
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6
健康診断の一部として選べる	100	41.7	153	53.5	3	17.6
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6
祝祭日・日曜に受検可	57	23.8	64	22.4	2	11.8
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6
駅近くで受検可	24	10.0	28	9.8	1	5.9
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6
夜間に受検可	69	28.8	65	22.7	2	11.8
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6
郵送で受検可	75	31.3	103	36.0	1	5.9
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6
窓口で言わず申込用紙で受検可	107	44.6	164	57.3	2	11.8
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6
事前電話予約で当日は番号で受検可	59	24.6	103	36.0	1	5.9
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6
事前ネット予約で当日番号で受検可	67	27.9	101	35.3	2	11.8
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6
その他	5	2.1	8	2.8	1	5.9
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6

APPENDIX3-1-1 (形成調査1：自動車教習所受講生：検査評価)

K1. 医療機関STI検査に抵抗感じると思うか (N=543)						K3. どうしたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=543)											
男性 (n=240)			女性 (n=286)			不明 (n=17)			男性 (n=240)			女性 (n=286)			不明 (n=17)		
	N	%		N	%		N	%		N	%		N	%		N	%
非常に感じると思う	40	16.7	65	22.7	1	5.9			153	63.8	182	63.6	2	11.8			
かなり感じると思う	31	12.9	66	23.1	0	0.0	保健所で無料匿名で受検可		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
感じると思う	79	32.9	73	25.5	3	17.6	無回答		120	50.0	141	49.3	2	11.8			
あまり感じないと思う	29	12.1	40	14.0	0	0.0	尿検査できる		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
全く感じないと思う	51	21.3	32	11.2	1	5.9	無回答		26	10.8	34	11.9	1	5.9			
無回答	10	4.2	10	3.5	12	70.6	繁華街一角で気軽に受検可		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
合計	240	100.0	286	100.0	17	100.0	無回答		52	21.7	88	30.8	1	5.9			
K2. 何に抵抗を感じるか <医療機関のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かない感じる・感じる、あまり感じないを選択した場合のみ> (N=427)						K3. どうしたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=543)											
K1. 医療機関STD検査に抵抗感じると思うか (N=543)						K3. どうしたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=543)											
男性 (n=240)			女性 (n=286)			不明 (n=17)			男性 (n=240)			女性 (n=286)			不明 (n=17)		
	N	%		N	%		N	%		N	%		N	%		N	%
非常に感じると思う	40	16.7	65	22.7	1	5.9	保健所で無料匿名で受検可		153	63.8	182	63.6	2	11.8			
かなり感じると思う	31	12.9	66	23.1	0	0.0	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
感じると思う	79	32.9	73	25.5	3	17.6	尿検査できる		120	50.0	141	49.3	2	11.8			
あまり感じないと思う	29	12.1	40	14.0	0	0.0	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
全く感じないと思う	51	21.3	32	11.2	1	5.9	繁華街一角で気軽に受検可		26	10.8	34	11.9	1	5.9			
無回答	10	4.2	10	3.5	12	70.6	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
合計	240	100.0	286	100.0	17	100.0	無回答		52	21.7	88	30.8	1	5.9			
K2. 何に抵抗を感じるか <医療機関のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かない感じる・感じる、あまり感じないを選択した場合のみ> (N=427)						K3. どうしたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=543)											
K1. 医療機関STD検査に抵抗感じると思うか (N=543)						K3. どういたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=543)											
男性 (n=240)			女性 (n=286)			不明 (n=17)			男性 (n=240)			女性 (n=286)			不明 (n=17)		
	N	%		N	%		N	%		N	%		N	%		N	%
非常に感じると思う	40	16.7	65	22.7	1	5.9	保健所で無料匿名で受検可		153	63.8	182	63.6	2	11.8			
かなり感じると思う	31	12.9	66	23.1	0	0.0	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
感じると思う	79	32.9	73	25.5	3	17.6	尿検査できる		120	50.0	141	49.3	2	11.8			
あまり感じないと思う	29	12.1	40	14.0	0	0.0	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
全く感じないと思う	51	21.3	32	11.2	1	5.9	繁華街一角で気軽に受検可		26	10.8	34	11.9	1	5.9			
無回答	10	4.2	10	3.5	12	70.6	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
合計	240	100.0	286	100.0	17	100.0	無回答		52	21.7	88	30.8	1	5.9			
K2. 何に抵抗を感じるか <医療機関のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かない感じる・感じる、あまり感じないを選択した場合のみ> (N=427)						K3. どういたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=543)											
K1. 医療機関STD検査に抵抗感じると思うか (N=543)						K3. どういたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=543)											
男性 (n=240)			女性 (n=286)			不明 (n=17)			男性 (n=240)			女性 (n=286)			不明 (n=17)		
	N	%		N	%		N	%		N	%		N	%		N	%
非常に感じると思う	40	16.7	65	22.7	1	5.9	保健所で無料匿名で受検可		153	63.8	182	63.6	2	11.8			
かなり感じると思う	31	12.9	66	23.1	0	0.0	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
感じると思う	79	32.9	73	25.5	3	17.6	尿検査できる		120	50.0	141	49.3	2	11.8			
あまり感じないと思う	29	12.1	40	14.0	0	0.0	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
全く感じないと思う	51	21.3	32	11.2	1	5.9	繁華街一角で気軽に受検可		26	10.8	34	11.9	1	5.9			
無回答	10	4.2	10	3.5	12	70.6	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
合計	240	100.0	286	100.0	17	100.0	無回答		52	21.7	88	30.8	1	5.9			
K2. 何に抵抗を感じるか <医療機関のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かない感じる・感じる、あまり感じないを選択した場合のみ> (N=427)						K3. どういたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=543)											
K1. 医療機関STD検査に抵抗感じると思うか (N=543)						K3. どういたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=543)											
男性 (n=240)			女性 (n=286)			不明 (n=17)			男性 (n=240)			女性 (n=286)			不明 (n=17)		
	N	%		N	%		N	%		N	%		N	%		N	%
非常に感じると思う	40	16.7	65	22.7	1	5.9	保健所で無料匿名で受検可		153	63.8	182	63.6	2	11.8			
かなり感じると思う	31	12.9	66	23.1	0	0.0	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
感じると思う	79	32.9	73	25.5	3	17.6	尿検査できる		120	50.0	141	49.3	2	11.8			
あまり感じないと思う	29	12.1	40	14.0	0	0.0	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
全く感じないと思う	51	21.3	32	11.2	1	5.9	繁華街一角で気軽に受検可		26	10.8	34	11.9	1	5.9			
無回答	10	4.2	10	3.5	12	70.6	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
合計	240	100.0	286	100.0	17	100.0	無回答		52	21.7	88	30.8	1	5.9			
K2. 何に抵抗を感じるか <医療機関のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かない感じる・感じる、あまり感じないを選択した場合のみ> (N=427)						K3. どういたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=543)											
K1. 医療機関STD検査に抵抗感じると思うか (N=543)						K3. どういたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=543)											
男性 (n=240)			女性 (n=286)			不明 (n=17)			男性 (n=240)			女性 (n=286)			不明 (n=17)		
	N	%		N	%		N	%		N	%		N	%		N	%
非常に感じると思う	40	16.7	65	22.7	1	5.9	保健所で無料匿名で受検可		153	63.8	182	63.6	2	11.8			
かなり感じると思う	31	12.9	66	23.1	0	0.0	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
感じると思う	79	32.9	73	25.5	3	17.6	尿検査できる		120	50.0	141	49.3	2	11.8			
あまり感じないと思う	29	12.1	40	14.0	0	0.0	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
全く感じないと思う	51	21.3	32	11.2	1	5.9	繁華街一角で気軽に受検可		26	10.8	34	11.9	1	5.9			
無回答	10	4.2	10	3.5	12	70.6	無回答		5	2.1	11	3.8	13	76.5			
合計	240	100.0	286	100.0	17	100.0	無回答		52	21.7	88	30.8	1	5.9			
K2. 何に抵抗を感じるか <医療機関のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かない感じる・感じる、あまり感じないを選択した場合のみ> (N=427)						K3. どういたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=543)											
K1. 医療機関STD検査に抵抗感じると思うか (N=543)						K3. どういたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=543)											
男性 (n=240)			女性 (n=286)			不明 (n=17)											

◆形成調査2（パソコンモニター）の分析結果

		J1. 保健所HIV検査に抵抗感じると思うか (N=806)		J3. 医療機関HIV検査に抵抗感じると思うか (N=806)	
		男性 (n=399)	女性 (n=407)	男性 (n=399)	女性 (n=407)
非常に感じると思う	40	10.0	9.5	23.3	14.3
かなり感じると思う	108	27.1	104	25.6	30.6
感じると思う	149	37.3	142	34.9	140
あまり感じないと思う	74	18.5	53	13.0	53
全く感じないと思う	26	6.5	11	2.7	23
無回答	2	0.5	2	0.5	4
合計	399	100.0	407	100.0	399

J2. 何に抵抗を感じるか
<保健所のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じる、あまり感じないを選択した場合のみ> (N=765)

		男性 (n=371)		女性 (n=394)	
		N	%	N	%
保健所 자체に行きにくい	173	46.6	170	43.1	152
無回答	5	1.3	0	0.0	2
知り合いに会うかも	128	34.5	181	45.9	180
無回答	5	1.3	0	0.0	2
エイズ検査と受付で言う必要	213	57.4	289	73.4	117
無回答	5	1.3	0	0.0	2
プライバシーの不安	184	49.6	215	54.6	145
無回答	5	1.3	0	0.0	2
軽蔑的な扱いをされる不安	96	25.9	152	38.6	39.0
無回答	5	1.3	0	0.0	2
プライベートを聞かれる不安	124	33.4	193	49.0	221
無回答	5	1.3	0	0.0	2
いろいろ注意される不安	40	10.8	64	16.2	59.4
無回答	5	1.3	0	0.0	2
どういう検査かわからない不安	123	33.2	182	46.2	110
無回答	5	1.3	0	0.0	2
その他	2	0.5	12	3.0	38
無回答	5	1.3	0	0.0	2

		J4. 何に抵抗を感じるか <医療機関のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じる、あまり感じないを選択した場合のみ> (N=769)		J4. 何に抵抗を感じるか <医療機関のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じる、あまり感じないを選択した場合のみ> (N=769)	
		男性 (n=372)	女性 (n=397)	男性 (n=372)	女性 (n=397)
医療機関 자체に行きにくい				152	40.9
無回答				2	0.5
検査費用がわからぬ				180	48.4
無回答				2	0.5
保険証から家族に知られる恐れ				117	31.5
無回答				2	0.5
知り合いに会うかも				145	39.0
無回答				2	0.5
エイズ検査と受付で言う必要				221	59.4
無回答				2	0.5
プライバシーの不安				184	49.5
無回答				2	0.5
軽蔑的な扱いをされる不安				96	25.8
無回答				2	0.5
プライベートを聞かれる不安				110	29.6
無回答				2	0.5
いろいろ注意される不安				38	10.2
無回答				2	0.5
どういう検査かわからぬ				96	25.8
不安				2	0.5
無回答				2	0.5
その他				3	0.8
無回答				2	0.5

J5. どうしたら保健所や医療機関でのエイズ検査が受けやすいか (N=806)

	男性 (n=399)		女性 (n=407)	
	N	%	N	%
すぐ結果がわかる	220	55.1	224	55.0
繁華街一角で気軽に受検可	2	0.5	1	0.2
検査料金が安い	63	15.8	59	14.5
健康診断の一部として選べる	2	0.5	1	0.2
祝祭日・日曜に受検可	203	50.9	271	66.6
駅近くで受検可	2	0.5	1	0.2
夜間に受検可	139	34.8	114	28.0
郵送で受検可	42	10.5	41	10.1
窓口で言わば申込用紙で受検可	118	29.6	87	21.4
事前電話予約で当日は番号で受検可	2	0.5	1	0.2
事前ネット予約で当日番号で受検可	97	24.3	150	36.9
その他	4	1.0	9	2.2
無回答	2	0.5	1	0.2

APPENDIX3-1-2(形成調査2：パソコンモニター：検査評価)

K1. 医療機関STD検査に抵抗感じると思うか (N=806)				K3. どうしたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=806)	
		男性 (n=399) N %	女性 (n=407) N %	男性 (n=399) N %	女性 (n=407) N %
非常に感じると思う	45 133	11.3 33.3	97 124	23.8 30.5	50.6 1.0
かなり感じると思う	147	36.8	145	35.6	4 4
感じると思う	49	12.3	33	8.1	60.0 244
あまり感じないとと思う	23	5.8	7	1.7	1.0 4
全く感じないとと思う	2	0.5	1	0.2	1.0 37
無回答	399	100.0	407	100.0	4 9.1
合計					

K2. 何に抵抗を感じるか

<医療機関のSTD検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じる、あまり感じないとと思う場合のみ> (N=733)			
		男性 (n=374) N %	女性 (n=399) N %
検査費用がわからぬい、無回答	188 1	50.3 0.3	201 2
保険証から家族に知られる恐れ、無回答	123 1	32.9 0.3	131 2
知り合いに会うかも、無回答	134 1	35.8 0.3	179 2
STI検査を受付で言う必要、無回答	219 1	58.6 0.3	289 2
プライバシーの不安、無回答	174 1	46.5 0.3	187 2
軽蔑的な扱いをされる不安、無回答	95 1	25.4 0.3	138 2
プライベートを聞かれれる不安、無回答	119 1	31.8 0.3	175 2
検査がばかしい不安、無回答	137 1	36.6 0.3	228 2
検査が痛い不安、無回答	83 1	22.2 0.3	156 2
いろいろ注意される不安、無回答	37 1	9.9 0.3	51 2
その他、無回答	3 1	0.8 0.3	2 0.5

◆形成調査3（世帯モニター）の分析結果

		J1. 保健所HIV検査に抵抗を感じると思うか (N=535)		J2. 何に抵抗を感じるか <保健所のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じる、		J3. 医療機関HIV検査に抵抗を感じると思うか (N=535)	
		男性 (n=247)	女性 (n=288)	男性 (n=217)	女性 (n=273)	男性 (n=247)	女性 (n=288)
非常に感じると思う		39.0	15.8	85	29.5	56	22.7
かなり感じると思う		68.0	27.5	78	27.1	70	28.3
感じると思う		74.0	30.0	89	30.9	67	27.1
あまり感じないと思う		36	14.6	21	7.3	29	11.7
全く感じないと思う		26	10.5	14	4.9	23	9.3
無回答		4	1.6	1	0.3	2	0.8
合計		247	100	288	100.0	247	100.0

		J4. 何に抵抗を感じるか <医療機関のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じる、		J5. 医療機関自体に行きにくい		J6. 医療機関費用がわからぬ	
		男性 (n=222)	女性 (n=214)	男性 (n=217)	女性 (n=213)	男性 (n=247)	女性 (n=288)
医療機関費用がわからぬ		0	0	0	0	2	0.9
保険証から家族に知られる恐れ		92	42.4	144	52.7	51	23.0
知り合いに会うかも		0	0	1	0.4	2	0.9
エイズ検査と受付で言う必要		126	58.1	201	73.6	75	33.8
プライバシーの不安		113	52.1	155	56.8	115	51.8
軽蔑的な扱いをされる不安		56	25.8	80	29.3	54	24.3
プライベートを聞かれる不安		82	37.8	113	41.4	71	32.0
いろいろ注意される不安		16	7.4	21	7.7	2	0.9
どういう検査かわからない不安		52	24.0	98	35.9	50	22.5
その他		9	4.1	12	4.4	5	2.3
無回答		0	0	1	0.4	2	0.9

J5. どうしたら保健所や医療機関でのエイズ検査が受けやすいか (N=535)

	男性 (n=247)		女性 (n=288)	
	N	%	N	%
すぐ結果がわかる	114	46.2	135	46.9
繁華街一角で気軽に受検可	3	1.2	2	0.7
無回答	32	13.0	32	11.1
検査料金が安い	3	1.2	2	0.7
無回答	54	21.9	64	22.2
健康診断の一部として選べる	3	1.2	2	0.7
無回答	156	63.2	212	73.6
祝祭日・日曜に受検可	3	1.2	2	0.7
無回答	62	25.1	50	17.4
駅近くで受検可	3	1.2	2	0.7
無回答	16	6.5	7	2.4
夜間に受検可	3	1.2	2	0.7
無回答	50	20.2	37	12.8
郵送で受検可	3	1.2	2	0.7
無回答	76	30.8	157	54.5
窓口で言わず申込用紙で受検可	3	1.2	2	0.7
無回答	131	53.0	176	61.1
事前電話予約で当日は番号で受検可	3	1.2	2	0.7
無回答	76	30.8	126	43.8
事前ネット予約で当日番号で受検可	3	1.2	2	0.7
無回答	73	29.6	102	35.4
その他	8	3.2	12	4.2
無回答	3	1.2	2	0.7

APPENDIX3-1-3 (形成調査3 : 世帯モニター : 検査評価)

K1. 医療機関STI検査に抵抗感じると思うか (N=535)		K2. 何に抵抗を感じるか <医療機関のSTI検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じる、あまり感じないを選択した場合のみ> (N=487)		K3. どうしたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=535)	
男性 (n=247)	女性 (n=288)	男性 (n=217)	女性 (n=270)	男性 (n=247)	女性 (n=288)
N	%	N	%	N	%
非常に感じると思う	39	15.8	68	23.6	51.0
かなり感じると思う	72	29.1	87	30.2	130
感じると思う	86	34.8	97	33.7	45.1
あまり感じないと思う	20	8.1	18	6.3	1.0
全く感じないと思う	28	11.3	14	4.9	65.6
無回答	2	0.8	4	1.4	1.0
合計	247	100.0	288	100.0	100.0
検査費用がわからない					
保険証から家族に知られる恐れ	0	0.0	3	1.1	2.8
STI検査を受付で言う必要	70	32.3	43	15.9	1.0
プライバシーの不安	0	0.0	3	1.1	1.2
軽度的な扱いをされる不安	71	32.7	119	44.1	35
プライベートを聞かれる不安	0	0.0	3	1.1	1.0
検査がはずかしい不安	136	62.7	205	75.9	148
検査が痛い不安	0	0.0	3	1.1	52.1
いろいろ注意される不安	98	45.2	147	54.4	30.2
その他	0	0.0	3	1.1	1.0

◆形成調査8 (STD受診者) の分析結果

F1. 保健所HIV検査に抵抗感じると思うか (N=312)

	男性			女性			不明		
	(n=134)	N	%	(n=174)	N	%	(n=4)	N	%
非常に感じると思う	12	9.0	24	13.8	0	0.0	非常 に感じると思う	13	9.7
かなり感じると思う	21	15.7	19	10.9	1	5.0	かなり感じると思う	20	14.9
感じると思う	46	34.3	41	23.6	2	50.0	感じると思う	44	32.8
あまり感じないと思う	22	16.4	36	20.7	0	0.0	あまり感じないと思う	21	15.7
全く感じないとと思う	23	17.2	41	23.6	1	25.0	全く感じないとと思う	24	17.9
無回答	10	7.5	13	7.5	0	0.0	無回答	12	9.0
合計	134	100.0	174	100.0	4	100.0	合計	134	100.0

F2. 何に抵抗を感じるか
<保健所のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる、
あまり感じないを選択した場合のみ> (N=224)

	男性			女性			不明		
	(n=101)	N	%	(n=120)	N	%	(n=3)	N	%
保健所自体に行きにくい	43	42.6	53	44.2	2	66.7	医療機関自体に行きにくい	37	37.8
知り合いに会うかも	1	1.0	2	1.7	0	0.0	無回答	3	3.1
無回答	28	27.7	46	38.3	2	66.7	検査費用がわからぬ	31	31.6
エイズ検査と受付で言う必要	1	1.0	2	1.7	0	0.0	無回答	3	3.1
無回答	46	45.5	62	51.7	1	33.3	保険証から家族に知られる恐れ	28	28.6
プライバシーの不安	1	1.0	2	1.7	0	0.0	無回答	3	3.1
無回答	45	44.6	51	42.5	3	100.0	知り合いに会うかも	23	23.5
軽蔑的な扱いをされる不安	1	1.0	2	1.7	0	0.0	無回答	3	3.1
無回答	23	22.8	29	24.2	0	0.0	エイズ検査と受付で言う必要	39	39.8
プライベートを聞かれる不安	1	1.0	2	1.7	0	0.0	無回答	3	3.1
無回答	19	18.8	37	30.8	0	0.0	プライバシーの不安	35	35.7
いろいろ注意される不安	7	6.9	12	10.0	0	0.0	無回答	3	3.1
無回答	1	1.0	2	1.7	0	0.0	軽蔑的な扱いをされる不安	17	17.3
どういう検査かわからない不安	21	20.8	29	24.2	0	0.0	無回答	3	3.1
無回答	1	1.0	2	1.7	0	0.0	プライベートを聞かれる不安	20	20.4
その他	6	5.9	7	5.8	0	0.0	無回答	3	3.1
無回答	1	1.0	2	1.7	0	0.0	いろいろ注意される不安	6	6.1

その他の無回答

どういう検査かわからない不安

その他の無回答

どういう検査かわかるしない不安

その他の無回答

F3. 医療機関HIV検査に抵抗感じると思うか (N=312)

	男性			女性			不明		
	(n=134)	N	%	(n=174)	N	%	(n=4)	N	%
非常に感じると思う	12	9.0	24	13.8	0	0.0	非常に感じると思う	13	9.7
かなり感じると思う	21	15.7	19	10.9	1	5.0	かなり感じると思う	20	14.9
感じると思う	46	34.3	41	23.6	2	50.0	感じると思う	44	32.8
あまり感じないとと思う	22	16.4	36	20.7	0	0.0	あまり感じないとと思う	21	15.7
全く感じないとと思う	23	17.2	41	23.6	1	25.0	全く感じないとと思う	24	17.9
無回答	10	7.5	13	7.5	0	0.0	無回答	12	9.0
合計	134	100.0	174	100.0	4	100.0	合計	134	100.0

F4. 何に抵抗を感じるか
<医療機関のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じる、
あまり感じないを選択した場合のみ> (N=210)

	男性			女性			不明		
	(n=98)	N	%	(n=112)	N	%	(n=2)	N	%
医療機関自体に行きにくい	37	37.8	28	25.0					
検査費用がわからぬ	3	3.1	5	4.5					
保険証から家族に知られる恐れ	31	31.6	55	49.1					
知り合いに会うかも	28	28.6	39	34.8					
エイズ検査と受付で言う必要	3	3.1	5	4.5					
プライバシーの不安	23	23.5	30	26.8					
軽蔑的な扱いをされる不安	3	3.1	5	4.5					
プライベートを聞かれる不安	39	39.8	47	42.0					
いろいろ注意される不安	3	3.1	5	4.5					
どういう検査かわかるしない不安	20	20.4	26	23.2					
その他の不安	3	3.1	5	4.5					
その他の無回答	3	3.1	5	4.5					
どういう検査かわかるしない不安	13	13.3	15	13.4					
その他の無回答	3	3.1	5	4.5					
どういう検査かわかるしない不安	2	2.0	4	3.6					
その他の無回答	3	3.1	5	4.5					

F5. どうしたら保健所や医療機関でのエイズ検査が受けやすいか (N=312)

	男性 (n=134)		女性 (n=174)		不明 (n=4)	
	N	%	N	%	N	%
すぐ結果がわかる	77	57.5	108	62.1	1	25.0
繁華街一角で気軽に受検可	8	6.0	7	4.0	3	75.0
検査料金が安い	27	20.1	33	19.0	0	0.0
健康診断の一部として運べる	8	6.0	7	4.0	3	75.0
祝祭日・日曜に受検可	32	23.9	67	38.5	0	0.0
駅近くで受検可	46	34.3	78	44.8	0	0.0
夜間に受検可	8	6.0	7	4.0	3	75.0
郵送で受検可	56	41.8	55	31.6	0	0.0
窓口で言わず申込用紙で受検可	90	67.2	126	72.4	3	75.0
事前電話予約で当日は番号で受検可	23	17.2	58	33.3	0	0.0
事前ネット予約で当日番号で受検可	24	17.9	56	32.2	1	25.0
その他	1	0.7	6	3.4	0	0.0
	8	6.0	7	4.0	3	75.0

**形成調査 1-3 及び 8 の保健所、医療機関における HIV/STD 検査の問題点と
改善方向に関する自由記載回答のまとめ**

1. 質問内容と該当質問項目

質問内容	形成調査質問項目番号			
	1	2	3	8
保健所でのエイズの検査の何に抵抗を感じると思うか	J2	Q16	J2	F2
医療機関でのエイズ検査の何に抵抗を感じると思うか	J4	Q18	J4	F4
どうしたら保健所や医療機関でのエイズ検査が受けやすいと思うか	J5	Q19	J5	F5
医療機関での性感染症検査の何に抵抗を感じると思うか	K2	Q21	K2	-
どうしたら医療機関での性感染症検査が受けやすいと思うか	K3	Q22	K3	-

2. 調査別回答数 (回答内容はデータシート 1)

質問内容	形成調査番号			
	1 (n=543)	2 (n=806)	3 (n=535)	8 (n=312)
保健所でのエイズの検査の何に抵抗を感じると思うか	15	2	21	13
医療機関でのエイズ検査の何に抵抗を感じると思うか	6	8	13	6
どうしたら保健所や医療機関でのエイズ検査が受けやすいと思うか	8	12	16	7
医療機関での性感染症検査の何に抵抗を感じると思うか	7	3	3	-
どうしたら医療機関での性感染症検査が受けやすいと思うか	4	7	7	-

3. 全調査回答内容のカテゴリー分類 (回答内容はデータシート 2)**1) 保健所でのエイズの検査の何に抵抗を感じると思うか**

カテゴリー	件数
① 結果を知ることの不安	20
② プライバシー漏洩への不安	6
③ 検査の曜日・時間帯の不便	4
④ 行きづらさ：雰囲気と場所	11
⑤ 検査への不信感	3
⑥ 時間がかかることへの不満	2
⑦ 男性に応対されることへの抵抗感	3
⑧ 費用の問題	2
⑨ 色々質問されることへの不安	1
⑩ 隔離不安	1
⑪ エイズへの抵抗感	6
⑫ その他	3

2) 医療機関でのエイズ検査の何に抵抗を感じると思うか

カテゴリー	件数
① 結果をすることの不安	10
② プライバシー漏洩への不安	7
③ 医療従事者の対応・態度への不安	2
④ 行きづらさ	3
⑤ 男性に応対されることへの抵抗感	2
⑥ 検査費用への不安	1

3) どうしたら保健所や医療機関でのエイズ検査が受けやすいと思うか

カテゴリー	件数
① 健康診断の一部に入る	5
② 検査を義務付ける	6
③ 受け易い検査機会の工夫	2
④ 顔を合わさずに受けられるようにする	3
⑤ 自己検査	2
⑥ 往診検査	2
⑦ 他の土地でも検査できること	2
⑧ メール等で結果を知れるようにする	2
⑨ 女性による対応	2
⑩ 検査費用を安く、もしくは値段がわかるように	4
⑪ PR・情報提供の強化	7
⑫ プライバシーの不安がないこと	1
⑬ 陽性告知後の対応	1
⑭ 結果が早くわかること	1

4) 医療機関での性感染症検査の何に抵抗を感じると思うか

カテゴリー	件数
① 検査に対する不安	3
② プライバシー漏洩への不安	1
③ 受診の恥ずかしさ	3
④ 男性に応対されることへの抵抗	2
⑤ その他	3

5) どうしたら医療機関での性感染症検査が受けやすいと思うか

カテゴリー	件数
① 健康診断の一部に入る	2
② 検査を義務づける	2
③ 受け易い検査機会の工夫	1
④ 顔を合わさずに受けられるようにする	1
⑤ 自己検査	1
⑥ 往診検査	1
⑦ メール等による結果を知れるようにする	1
⑧ 女性による対応	2
⑨ 検査費用に関するこ	1