

- :36-48, 1999.
- 11) 和田 清、菊池安希子、尾崎 茂、菊池周一：薬物使用に関する全国住民調査。平成11年度厚生科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存等の疫学的研究及び中毒性精神病患者等に対する適切な医療のあり方についての研究（主任研究者：和田 清）研究報告書。pp.17-70, 2000. 3.
  - 12) Wada K.: Lifetime Prevalence of Alcohol Drinking, Cigarette Smoking, and Solvent Inhalation among Junior High School Students in Japan: Tradition and Urbanization. Jpn. J. Alcohol & Drug Dependence 36 (2): 124-141, 2001.
  - 13) 和田 清、菊池安希子、尾崎米厚、勝野眞吾：薬物乱用に関する全国中学生意識・実態調査。平成12年度厚生科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存等の疫学的研究及び中毒性精神病患者等に対する適切な医療のあり方についての研究（主任研究者：和田 清）研究報告書。pp. 15-76, 2001.
  - 14) 和田 清：薬物乱用の現状と歴史。神経精神薬理 19: 913-923, 1997.
  - 15) 和田 清、菊池安希子、尾崎 茂：薬物使用に関する全国住民調査。平成13年度厚生科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社会経済的損失に関する研究（主任研究者：和田 清）研究報告書。pp. 15-77, 2002. 3.
  - 16) 和田 清、畢 穎、鈴木紀美子、尾崎米厚、勝野眞吾：薬物乱用に関する全国中学生意識・実態調査（2002年）。平成14年度厚生労働科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社会経済的損失に関する研究（主任研究者：和田 清）研究報告書。pp. 19-86, 2003.
  - 17) SAMHSA: Results from the National Survey on Drug Use and Health (SAMHSA)
  - 18) EMCDDA
  - 19) Drug Demand Reduction Bureau, Office of the Narcotics Control Board, Thailand: Preliminary Report of Project, Estimation of Population Related with Substance Abuse, Status of Drug and Substance Use: 2001, National Household Survey. pp. 3, 20 02.
  - 20) 和田 清、高橋伸彰、尾崎 茂：薬物使用に関する全国住民調査。平成15年度厚生労働科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存の実態とその社会的影響・対策に関する研究（主任研究者：和田 清）研究報告書。pp. 17-87, 2004. 3.
  - 21) 和田 清、嶋根卓也、近藤あゆみ：薬物使用に関する全国住民調査。平成17年度厚生労働科学研究費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）「薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究（主任研究者：和田 清）研究報告書。pp. 17-105, 2006. 3. 31.

表5 対象の性・年齢・学歴 (%)

	男		女		全体	
年齢 15-19歳	74	(5.3)	80	(5.2)	154	(5.3)
20-24歳	58	(4.2)	79	(5.2)	137	(4.7)
25-29歳	62	(4.4)	86	(5.6)	148	(5.1)
30-34歳	103	(7.4)	133	(8.7)	236	(8.1)
35-39歳	105	(7.5)	136	(8.9)	241	(8.2)
40-44歳	111	(8.0)	147	(9.6)	258	(8.8)
45-49歳	126	(9.0)	118	(7.7)	244	(8.3)
50-54歳	124	(8.9)	138	(9.0)	262	(9.0)
55-59歳	163	(11.7)	174	(11.4)	337	(11.5)
60-64歳	140	(10.0)	132	(8.6)	272	(9.3)
65-69歳	111	(8.0)	109	(7.1)	220	(7.5)
70歳以上	219	(15.7)	195	(12.8)	415	(14.2)
学歴 小学校 (尋常小学校も含む)	18	(1.3)	20	(1.3)	39	(1.3)
中学校 (尋常高等小学校も含む)	206	(14.8)	182	(11.9)	388	(13.3)
専門学校 (中卒後)	36	(2.6)	55	(3.6)	91	(3.1)
専門学校 (高校中退後、ないし高卒後)	92	(6.6)	183	(12.0)	275	(9.4)
高等学校 (旧制中学校・高女も含む)	607	(43.5)	688	(45.1)	1295	(44.3)
短大・大学以上 (旧制高等学校も含む)	421	(30.2)	378	(24.8)	799	(27.3)
その他	4	(.3)	8	(.5)	12	(.4)
無回答	12	(.9)	13	(.9)	25	(.9)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表6 対象の職業・身分 (%)

	男		女		全体	
中学生	7	(.5)	9	(.6)	16	(.5)
高校生	45	(3.2)	51	(3.3)	96	(3.3)
予備校生	5	(.4)	1	(.1)	6	(.2)
専門学校、各種学校生徒	4	(.3)	10	(.7)	14	(.5)
短大生、大学生、大学院生	29	(2.1)	17	(1.1)	46	(1.6)
農林漁業自営者	64	(4.6)	28	(1.8)	92	(3.1)
商店主	48	(3.4)	34	(2.2)	82	(2.8)
工場主	23	(1.6)	6	(.4)	29	(1.0)
土木建設業種	50	(3.6)	17	(1.1)	67	(2.3)
医療関係業種	7	(.5)	6	(.4)	13	(.4)
サービス業事業主	34	(2.4)	30	(2.0)	64	(2.2)
その他の事業主	39	(2.8)	14	(.9)	53	(1.8)
販売従業者	117	(8.4)	121	(7.9)	238	(8.1)
保安従業者	41	(2.9)	4	(.3)	45	(1.5)
運輸従業者	69	(4.9)	6	(.4)	75	(2.6)
通信従事者	1	(.1)	2	(.1)	3	(.1)
サービス業従事者	20	(1.4)	85	(5.6)	105	(3.6)
技能職従事者	10	(.7)	29	(1.9)	39	(1.3)
土木建築業従事者	61	(4.4)	4	(.3)	65	(2.2)
工場労働者、工業作業員	135	(9.7)	55	(3.6)	190	(6.5)
その他の労務従事者	18	(1.3)	27	(1.8)	45	(1.5)
専務従事者	90	(6.4)	155	(10.2)	245	(8.4)
管理的職業	60	(4.3)	8	(.5)	68	(2.3)
医療職従事者	12	(.9)	67	(4.4)	79	(2.7)
その他の専門、技術職従事者	86	(6.2)	50	(3.3)	136	(4.7)
専業主婦	6	(.4)	502	(32.9)	508	(17.4)
無職	272	(19.5)	146	(9.6)	419	(14.3)
その他	28	(2.0)	32	(2.1)	60	(2.1)
無回答	15	(1.1)	11	(.7)	26	(.9)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表7 これまでの飲酒経験の有無 (%)

		男		女		全体	
飲酒経験	なし	47	(3.4)	112	(7.3)	160	(5.5)
	あり	1345	(96.3)	1414	(92.6)	2759	(94.4)
	無回答	4	(.3)	1	(.1)	5	(.2)
合計		1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表7-2 生涯飲酒経験率(%) 未補正

男		なし 度数 (%)	あり 度数 (%)	無回答 度数 (%)	合計 度数 (%)
年代別	10歳代	35 (47.3)	39 (52.7)	0 (.0)	74 (100.0)
	20歳代	1 (.8)	119 (99.2)	0 (.0)	120 (100.0)
	30歳代	1 (.5)	207 (99.5)	0 (.0)	208 (100.0)
	40歳代	2 (.8)	235 (99.2)	0 (.0)	237 (100.0)
	50歳代	2 (.7)	285 (99.3)	0 (.0)	287 (100.0)
	60歳代	3 (1.2)	247 (98.4)	1 (.4)	251 (100.0)
	70歳代以上	3 (1.4)	213 (97.3)	3 (1.4)	219 (100.0)
	無回答	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
全体		47 (3.4)	1345 (96.3)	4 (.3)	1396 (100.0)

  

女		なし 度数 (%)	あり 度数 (%)	無回答 度数 (%)	合計 度数 (%)
年代別	10歳代	21 (26.3)	59 (73.8)	0 (.0)	80 (100.0)
	20歳代	3 (1.8)	162 (98.2)	0 (.0)	165 (100.0)
	30歳代	3 (1.1)	266 (98.9)	0 (.0)	269 (100.0)
	40歳代	6 (2.3)	259 (97.7)	0 (.0)	265 (100.0)
	50歳代	9 (2.9)	302 (96.8)	1 (.3)	312 (100.0)
	60歳代	29 (12.0)	212 (88.0)	0 (.0)	241 (100.0)
	70歳代以上	41 (21.0)	154 (79.0)	0 (.0)	195 (100.0)
	無回答	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
全体		112 (7.3)	1414 (92.6)	1 (.1)	1527 (100.0)

  

全体		なし 度数 (%)	あり 度数 (%)	無回答 度数 (%)	合計 度数 (%)
年代別	10歳代	56 (36.4)	98 (63.6)	0 (.0)	154 (100.0)
	20歳代	4 (1.4)	281 (98.6)	0 (.0)	285 (100.0)
	30歳代	4 (.8)	473 (99.2)	0 (.0)	477 (100.0)
	40歳代	8 (1.6)	494 (98.4)	0 (.0)	502 (100.0)
	50歳代	11 (1.8)	587 (98.0)	1 (.2)	599 (100.0)
	60歳代	32 (6.5)	459 (93.3)	1 (.2)	492 (100.0)
	70歳代以上	45 (10.8)	367 (88.4)	3 (.7)	415 (100.0)
	無回答	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
全体		160 (5.5)	2759 (94.4)	5 (.2)	2924 (100.0)

表8 これまでに飲酒した機会（生涯飲酒経験者のみ）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
冠婚葬祭	1016	(75.5)	924	(65.3)	1940	(70.3)
仕事・商売上の必要	735	(54.6)	417	(29.5)	1152	(41.8)
上司とのつきあい	662	(49.2)	369	(26.1)	1031	(37.4)
友人・同僚と	1069	(79.5)	994	(70.3)	2063	(74.8)
その他つきあい	564	(41.9)	296	(20.9)	860	(31.2)
家の食事・団らん	990	(73.6)	951	(67.3)	1941	(70.4)
外の食事・団らん	748	(55.6)	680	(48.1)	1428	(51.8)
仕事で嫌なこと	282	(21.0)	174	(12.3)	456	(16.5)
家で面白くないこと	181	(13.5)	127	(9.0)	308	(11.2)
寝る前	393	(29.2)	317	(22.4)	710	(25.7)
その他	36	(2.7)	34	(2.4)	70	(2.5)
飲酒機会ありだが機会不明	15	(1.1)	18	(1.3)	33	(1.2)
合計	1345	(100.0)	1414	(100.0)	2759	(100.0)

表9 初めての飲酒経験年齢（初飲年齢）（飲酒経験者のみ）、（%）、[累積%]

	男			女			全体		
小学校以前	56	(4.2)	[4.2]	71	(5.0)	[5.0]	127	(4.6)	[4.6]
小学校時代	210	(15.6)	[19.8]	186	(13.2)	[18.2]	396	(14.4)	[19.0]
中学校時代	211	(15.7)	[35.5]	130	(9.2)	[27.4]	341	(12.4)	[31.3]
中卒後～17歳	215	(16.0)	[51.4]	145	(10.3)	[37.6]	360	(13.0)	[44.4]
18-19歳	349	(25.9)	[77.4]	323	(22.8)	[60.5]	672	(24.4)	[68.7]
20歳以降	292	(21.7)	[99.1]	539	(38.1)	[98.6]	831	(30.1)	[98.8]
初飲酒年齢不明	5	(.4)	[99.5]	9	(.6)	[99.2]	14	(.5)	[99.3]
無回答	7	(.5)	[100.0]	11	(.8)	[100.0]	18	(.7)	[100.0]
合計	1345	(100.0)		1414	(100.0)		2759	(100.0)	

表10 それなりに飲酒するようになった時期（飲酒経験者のみ）、（%）、[累積%]

	男			女			全体		
それなりに 至ったことない	143	(10.6)	[10.6]	307	(21.7)	[21.7]	450	(16.3)	[16.3]
小学校以前	0	(.0)	[10.6]	0	(.0)	[21.7]	0	(.0)	[16.3]
小学校時代	0	(.0)	[10.6]	0	(.0)	[21.7]	0	(.0)	[16.3]
中学校時代	21	(1.6)	[12.2]	14	(1.0)	[22.7]	35	(1.3)	[17.6]
中卒後～17歳	80	(5.9)	[18.1]	32	(2.3)	[25.0]	112	(4.1)	[21.6]
18-19歳	412	(30.6)	[48.8]	234	(16.5)	[41.5]	646	(23.4)	[45.1]
20歳以降	648	(48.2)	[97.0]	738	(52.2)	[93.7]	1386	(50.2)	[95.3]
飲酒開始時期不明	21	(1.6)	[98.5]	41	(2.9)	[96.6]	62	(2.2)	[97.5]
無回答	20	(1.5)	[100.0]	48	(3.4)	[100.0]	68	(2.5)	[100.0]
合計	1345	(100.0)		1414	(100.0)		2759	(100.0)	

表11 過去1年での飲酒経験（飲酒1年経験率）（%）

		男		女		全体	
過去1年飲酒経験	なし	152	(10.9)	311	(20.4)	464	(15.9)
	あり	1236	(88.5)	1208	(79.1)	2444	(83.6)
	無回答	8	(.6)	8	(.5)	16	(.5)
合計		1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表11-2 1年飲酒経験率(%) 未補正

		なし		あり		無回答		合計	
		度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
男	10歳代	42	56.8	32	43.2	0	0	74	100
	20歳代	6	5	114	95	0	0	120	100
	30歳代	11	5.3	195	93.8	2	0.9	208	100
	40歳代	13	5.5	222	93.7	2	0.8	237	100
	50歳代	19	6.6	267	93	1	0.4	287	100
	60歳代	23	9.2	227	90.4	1	0.4	251	100
	70歳代以上	38	17.4	179	81.7	2	0.9	219	100
	男全体	152	10.9	1236	88.5	8	0.6	1396	100
女	10歳代	33	41.3	46	57.5	1	1.2	80	100
	20歳代	14	8.5	151	91.5	0	0	165	100
	30歳代	40	14.9	229	85.1	0	0	269	100
	40歳代	37	14	227	85.7	1	0.3	265	100
	50歳代	52	16.7	260	83.3	0	0	312	100
	60歳代	55	22.8	182	75.5	4	1.7	241	100
	70歳代以上	80	41	113	58	2	1	195	100
	女全体	311	20.4	1208	79.1	8	0.5	1527	100
全体	10歳代	75	48.7	78	50.7	1	0.6	154	100
	20歳代	20	7	265	93	0	0	285	100
	30歳代	51	10.7	424	88.9	2	0.4	477	100
	40歳代	50	10	449	89.4	3	0.6	502	100
	50歳代	71	11.9	527	88	1	0.1	599	100
	60歳代	78	15.9	409	83.1	5	1	492	100
	70歳代以上	119	28.7	292	70.4	4	0.9	415	100
	全体	464	15.9	2444	83.6	16	0.5	2924	100

表12 過去1年に飲酒した機会（過去1年飲酒経験者のみ）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
(冠婚葬祭)	719	(58.2)	497	(41.1)	1216	(49.8)
(仕事・商売上の必要)	524	(42.4)	191	(15.8)	715	(29.3)
(上司とのつきあい)	427	(34.5)	155	(12.8)	582	(23.8)
(友人・同僚と)	890	(72.0)	706	(58.4)	1596	(65.3)
(その他つきあい)	426	(34.5)	179	(14.8)	605	(24.8)
(家の食事・団らん)	898	(72.7)	809	(67.0)	1707	(69.8)
(外の食事・団らん)	637	(51.5)	514	(42.5)	1151	(47.1)
(仕事で嫌なこと)	177	(14.3)	75	(6.2)	252	(10.3)
(家で面白くないこと)	122	(9.9)	72	(6.0)	194	(7.9)
(寝る前)	331	(26.8)	248	(20.5)	579	(23.7)
(その他)	26	(2.1)	17	(1.4)	43	(1.8)
(飲酒機会ありだが機会不明)	6	(.5)	5	(.4)	11	(.5)
合計	1236	(100.0)	1208	(100.0)	2444	(100.0)

表13 過去1年での飲酒頻度（過去1年飲酒経験者のみ）（%）

	男		女		全体	
1年間に数回（年5回以内）	194	(15.7)	433	(35.8)	627	(25.7)
2ヶ月に1回（年間約6-11回）	71	(5.7)	131	(10.8)	202	(8.3)
月に1-2回（年間約12-24回）	92	(7.4)	139	(11.5)	231	(9.5)
月に数回（年間約25-51回）	94	(7.6)	127	(10.5)	221	(9.0)
週に1-2回程度	144	(11.7)	148	(12.3)	292	(11.9)
週に3-6回程度	212	(17.2)	95	(7.9)	307	(12.6)
ほとんど毎日	420	(34.0)	121	(10.0)	541	(22.1)
飲んだが頻度不明	8	(.6)	12	(1.0)	20	(.8)
無回答	1	(.1)	2	(.2)	3	(.1)
合計	1236	(100.0)	1208	(100.0)	2444	(100.0)

表14 禁酒に対する考え・実態（生涯飲酒経験者のみ）（%）

	男		女		全体	
禁酒は考えたことない	713	(53.0)	981	(69.4)	1694	(61.4)
禁酒を考えたことはあるが実行したことはない	323	(24.0)	149	(10.5)	472	(17.1)
禁酒を試みたが現在禁酒に至っていない	112	(8.3)	55	(3.9)	167	(6.1)
禁酒中（初めての禁酒。1年未満。）	24	(1.8)	15	(1.1)	39	(1.4)
禁酒中（再挑戦の禁酒。1年未満。）	16	(1.2)	5	(.4)	21	(.8)
禁酒中（1年以上）	53	(3.9)	49	(3.5)	102	(3.7)
無回答	104	(7.7)	160	(11.3)	264	(9.6)
合計	1345	(100.0)	1414	(100.0)	2759	(100.0)

表15 禁酒理由（生涯飲酒経験があり、かつ、禁酒を考えたことのある人）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
健康上の不調は感じないが可能性が心配になったから	203	(38.4)	93	(34.1)	296	(37.0)
健康上の不調を感じたから	193	(36.6)	69	(25.3)	262	(32.7)
問題は起こしていないが自分の飲酒にその可能性を感じたから	23	(4.4)	11	(4.0)	34	(4.2)
飲酒で問題を起こしたから	13	(2.5)	5	(1.8)	18	(2.2)
その他	36	(6.8)	50	(18.3)	86	(10.7)
禁酒理由不明	80	(15.2)	55	(20.1)	135	(16.9)
無回答	14	(2.7)	6	(2.2)	20	(2.5)
合計	528	(100.0)	273	(100.0)	801	(100.0)

表16 これまでの喫煙経験（生涯喫煙経験）（%）

		男		女		全体	
喫煙経験	なし	190	(13.6)	758	(49.6)	948	(32.4)
	あり	1179	(84.5)	742	(48.6)	1922	(65.7)
	無回答	27	(1.9)	27	(1.8)	54	(1.8)
合計		1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表16-2 喫煙生涯経験率（%）（未補正）

		なし		あり		無回答		合計	
		度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
男	10歳代	60	(81.1)	14	(18.9)	0	(.0)	74	(100.0)
	20歳代	30	(25.0)	90	(75.0)	0	(.0)	120	(100.0)
	30歳代	28	(13.5)	179	(86.1)	1	(.5)	208	(100.0)
	40歳代	19	(8.0)	216	(91.1)	2	(.8)	237	(100.0)
	50歳代	18	(6.3)	264	(92.0)	5	(1.7)	287	(100.0)
	60歳代	13	(5.2)	232	(92.4)	6	(2.4)	251	(100.0)
	70歳代以上	22	(10.0)	184	(84.0)	13	(5.9)	219	(100.0)
	無回答	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
全体		190	(13.6)	1179	(84.5)	27	(1.9)	1396	(100.0)
女	10歳代	71	(88.8)	9	(11.3)	0	(.0)	80	(100.0)
	20歳代	64	(38.8)	100	(60.6)	1	(.6)	165	(100.0)
	30歳代	96	(35.7)	170	(63.2)	3	(1.1)	269	(100.0)
	40歳代	84	(31.7)	181	(68.3)	0	(.0)	265	(100.0)
	50歳代	138	(44.2)	172	(55.1)	2	(.6)	312	(100.0)
	60歳代	158	(65.6)	79	(32.8)	4	(1.7)	241	(100.0)
	70歳代以上	147	(75.4)	31	(15.9)	17	(8.7)	195	(100.0)
	無回答	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
全体		758	(49.6)	742	(48.6)	27	(1.8)	1527	(100.0)
全体	10歳代	131	(85.1)	23	(14.9)	0	(.0)	154	(100.0)
	20歳代	94	(33.0)	190	(66.7)	1	(.4)	285	(100.0)
	30歳代	124	(26.0)	349	(73.2)	4	(.8)	477	(100.0)
	40歳代	103	(20.5)	397	(79.1)	2	(.4)	502	(100.0)
	50歳代	156	(26.0)	436	(72.8)	7	(1.2)	599	(100.0)
	60歳代	171	(34.8)	311	(63.2)	10	(2.0)	492	(100.0)
	70歳代以上	169	(40.7)	216	(52.0)	30	(7.2)	415	(100.0)
	無回答	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
全体		948	(32.4)	1922	(65.7)	54	(1.8)	2924	(100.0)

表17 初めての喫煙時期（生涯喫煙経験者のみ）、（%）、〔累積%〕

	男			女			全体		
小学校以前	10	(.8)	[.8]	6	(.8)	[.8]	16	(.8)	[.8]
小学校時代	96	(8.1)	[9.0]	35	(4.7)	[5.5]	131	(6.8)	[7.6]
中学校時代	241	(20.4)	[29.4]	99	(13.3)	[18.9]	340	(17.7)	[25.3]
中卒後～17歳	210	(17.8)	[47.2]	101	(13.6)	[32.5]	311	(16.2)	[41.5]
18-19歳	347	(29.4)	[76.7]	193	(26.0)	[58.5]	540	(28.1)	[69.6]
20歳以降	270	(22.9)	[99.6]	295	(39.8)	[98.2]	566	(29.4)	[99.1]
初喫煙年齢不明	1	(.1)	[99.7]	7	(.9)	[99.2]	8	(.4)	[99.5]
無回答	4	(.3)	[100.0]	6	(.8)	[100.0]	10	(.5)	[100.0]
合計	1179	(100.0)		742	(100.0)		1922	(100.0)	

表18 それなりに喫煙するようになった時期（喫煙経験者のみ）、(%)、[累積%]

	男			女			全体		
それなりには至ったことない	116	(9.8)	[9.8]	254	(34.2)	[34.2]	370	(19.3)	[19.3]
小学校以前	0	(.0)	[0]	0	(.0)	[0]	0	(.0)	[0]
小学校時代	9	(.8)	[10.6]	1	(.1)	[34.4]	10	(.5)	[19.8]
中学校時代	75	(6.4)	[17.0]	15	(2.0)	[36.4]	90	(4.7)	[24.5]
中卒後～17歳	154	(13.1)	[30.0]	46	(6.2)	[42.6]	200	(10.4)	[34.9]
18-19歳	370	(31.4)	[61.4]	121	(16.3)	[58.9]	491	(25.5)	[60.4]
20歳以降	394	(33.4)	[94.8]	224	(30.2)	[89.1]	619	(32.2)	[92.6]
喫煙開始時期不明	47	(4.0)	[98.8]	59	(8.0)	[97.0]	106	(5.5)	[98.1]
無回答	14	(1.2)	[100.0]	22	(3.0)	[100.0]	36	(1.9)	[100.0]
合計	1179	(100.0)		742	(100.0)		1922	(100.0)	

表19 過去1年間での喫煙経験 (%)

	男		女		全体	
過去1年喫煙経験 なし	742	(53.2)	1205	(78.9)	1947	(66.6)
あり	625	(44.8)	260	(17.0)	886	(30.3)
無回答	29	(2.1)	62	(4.1)	91	(3.1)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表19-2 喫煙1年経験率(%) (未補正)

	なし		あり		無回答		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
男	10歳代	66 (89.2)	8 (10.8)	0 (.0)	74 (100.0)			
	20歳代	46 (38.3)	71 (59.2)	3 (2.5)	120 (100.0)			
	30歳代	94 (45.2)	111 (53.4)	3 (1.4)	208 (100.0)			
	40歳代	117 (49.4)	118 (49.8)	2 (.8)	237 (100.0)			
	50歳代	124 (43.2)	157 (54.7)	6 (2.1)	287 (100.0)			
	60歳代	147 (58.6)	99 (39.4)	5 (2.0)	251 (100.0)			
	70歳代以上	148 (67.6)	61 (27.9)	10 (4.6)	219 (100.0)			
	無回答	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)			
全体	742 (53.2)	625 (44.8)	29 (2.1)	1396 (100.0)				
女	10歳代	75 (93.8)	5 (6.3)	0 (.0)	80 (100.0)			
	20歳代	115 (69.7)	46 (27.9)	4 (2.4)	165 (100.0)			
	30歳代	193 (71.7)	68 (25.3)	8 (3.0)	269 (100.0)			
	40歳代	193 (72.8)	68 (25.7)	4 (1.5)	265 (100.0)			
	50歳代	261 (83.7)	42 (13.5)	9 (2.9)	312 (100.0)			
	60歳代	203 (84.2)	20 (8.3)	18 (7.5)	241 (100.0)			
	70歳代以上	165 (84.6)	11 (5.6)	19 (9.7)	195 (100.0)			
	無回答	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)			
全体	1205 (78.9)	260 (17.0)	62 (4.1)	1527 (100.0)				
全体	10歳代	141 (91.6)	13 (8.4)	0 (.0)	154 (100.0)			
	20歳代	161 (56.5)	117 (41.1)	7 (2.5)	285 (100.0)			
	30歳代	287 (60.2)	179 (37.5)	11 (2.3)	477 (100.0)			
	40歳代	310 (61.8)	186 (37.1)	6 (1.2)	502 (100.0)			
	50歳代	385 (64.3)	199 (33.2)	15 (2.5)	599 (100.0)			
	60歳代	350 (71.1)	119 (24.2)	23 (4.7)	492 (100.0)			
	70歳代以上	313 (75.4)	73 (17.6)	29 (7.0)	415 (100.0)			
	無回答	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)			
全体	1947 (66.6)	886 (30.3)	91 (3.1)	2924 (100.0)				



表20 過去1年の喫煙頻度（過去1年喫煙経験者のみ）（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
1年間に数回（年間5回以内）	26	(4.2)	44	(16.9)	70	(7.9)
2ヶ月に1回程度（年6-11回）	8	(1.3)	5	(1.9)	13	(1.5)
月に1-2回程度（年12-24回）	3	(.5)	4	(1.5)	7	(.8)
月に数回（年25-51回）	5	(.8)	6	(2.3)	11	(1.2)
週に1-2回程度	7	(1.1)	2	(.8)	9	(1.0)
週に3-6回程度	14	(2.2)	13	(5.0)	27	(3.0)
ほとんど毎日（1日1-10本）	107	(17.1)	68	(26.2)	175	(19.8)
ほとんど毎日（1日11-20本）	285	(45.6)	95	(36.5)	381	(43.0)
ほとんど毎日（1日21本以上）	163	(26.1)	21	(8.1)	184	(20.8)
ほとんど毎日（パイプたばこ）	7	(1.1)	2	(.8)	9	(1.0)
合計	625	(100.0)	260	(100.0)	886	(100.0)

表21 禁煙に対する考え方（生涯喫煙経験者のみ）（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
禁煙を考えたことはない	267	(22.6)	330	(44.5)	598	(31.1)
禁煙を考えたことはあるが実行したことはない	209	(17.7)	78	(10.5)	287	(14.9)
禁煙を試みたが現在禁煙に至っていない	234	(19.8)	96	(12.9)	330	(17.2)
禁煙中（初めての禁煙。1年未満。）	12	(1.0)	17	(2.3)	29	(1.5)
禁煙中（再挑戦の禁煙。1年未満。）	14	(1.2)	12	(1.6)	26	(1.4)
禁煙中（1年以上）	413	(35.0)	171	(23.0)	584	(30.4)
無回答	30	(2.5)	38	(5.1)	68	(3.5)
合計	1179	(100.0)	742	(100.0)	1922	(100.0)

表22 禁煙理由（喫煙経験者で、禁煙を考えたことがある人のみ）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
健康上の不調は感じないが可能性が心配になった	314	(35.6)	151	(40.4)	465	(37.0)
健康上の不調	280	(31.7)	79	(21.1)	359	(28.6)
喫煙者が白い目で見られるようになった	52	(5.9)	18	(4.8)	70	(5.6)
人から勧められた	102	(11.6)	24	(6.4)	126	(10.0)
家族や他者の健康への影響を考えて	214	(24.3)	101	(27.0)	315	(25.1)
その他	91	(10.3)	68	(18.2)	159	(12.7)
禁煙理由不明	31	(3.5)	21	(5.6)	52	(4.1)
無回答	13	(1.5)	4	(1.1)	17	(1.4)
合計	882	(100.0)	374	(100.0)	1256	(100.0)

表23 家庭の常備薬（複数回答）（%）

	男		女		全体	
とくになし	160	(11.5)	130	(8.5)	290	(9.9)
風邪薬	878	(62.9)	1038	(68.0)	1917	(65.6)
胃腸薬	794	(56.9)	911	(59.7)	1705	(58.3)
ビタミン剤	361	(25.9)	450	(29.5)	811	(27.7)
高血圧薬	229	(16.4)	227	(14.9)	456	(15.6)
糖尿病薬	79	(5.7)	56	(3.7)	135	(4.6)
精神安定薬	47	(3.4)	87	(5.7)	134	(4.6)
湿布薬	646	(46.3)	913	(59.8)	1559	(53.3)
強精強肝薬	15	(1.1)	7	(.5)	22	(.8)
睡眠薬	67	(4.8)	90	(5.9)	157	(5.4)
鎮痛薬	418	(29.9)	692	(45.3)	1110	(38.0)
抗生物質	83	(5.9)	125	(8.2)	208	(7.1)
便秘薬	178	(12.8)	317	(20.8)	495	(16.9)
目薬	737	(52.8)	942	(61.7)	1679	(57.4)
鼻炎薬	238	(17.0)	378	(24.8)	616	(21.1)
セットの置き薬	369	(26.4)	381	(25.0)	750	(25.6)
その他	28	(2.0)	57	(3.7)	85	(2.9)
無回答	21	(1.5)	13	(.9)	34	(1.2)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表24 過去1年間に一回でも使用したことがある医薬品（複数回答）（%）

	男		女		全体	
とくになし	112	(8.0)	79	(5.2)	191	(6.5)
風邪薬	867	(62.1)	975	(63.9)	1842	(63.0)
胃腸薬	605	(43.3)	655	(42.9)	1261	(43.1)
ビタミン剤	319	(22.9)	439	(28.7)	758	(25.9)
高血圧薬	252	(18.1)	219	(14.3)	472	(16.1)
糖尿病薬	77	(5.5)	41	(2.7)	118	(4.0)
湿布薬	532	(38.1)	744	(48.7)	1276	(43.6)
強精強肝薬	14	(1.0)	8	(.5)	22	(.8)
抗生物質	198	(14.2)	343	(22.5)	541	(18.5)
便秘薬	93	(6.7)	246	(16.1)	339	(11.6)
目薬	686	(49.1)	839	(54.9)	1525	(52.2)
鼻炎薬	206	(14.8)	306	(20.0)	512	(17.5)
セットの置き薬	134	(9.6)	144	(9.4)	278	(9.5)
その他	64	(4.6)	136	(8.9)	200	(6.8)
無回答	19	(1.4)	10	(.7)	29	(1.0)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表25 過去1年間での鎮痛薬使用頻度 (%)

	男		女		全体	
一度も飲んでいない	722	(51.7)	544	(35.6)	1267	(43.3)
1年間に数回 (年5回以内)	446	(31.9)	517	(33.9)	963	(32.9)
2ヶ月に1回 (年約6-11回)	60	(4.3)	111	(7.3)	171	(5.8)
月に1-2回 (年約12-24回)	45	(3.2)	151	(9.9)	196	(6.7)
月に数回 (年約25-51回)	28	(2.0)	86	(5.6)	114	(3.9)
週に1-2回程度	8	(.6)	28	(1.8)	36	(1.2)
週に3-6回程度	7	(.5)	14	(.9)	21	(.7)
ほとんど毎日	26	(1.9)	27	(1.8)	53	(1.8)
飲んだが頻度不明	35	(2.5)	29	(1.9)	64	(2.2)
無回答	19	(1.4)	20	(1.3)	39	(1.3)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表26 鎮痛薬の入手先 (鎮痛薬を過去1年間に使用した人のみ) (複数回答) (%)

	男		女		全体	
常備薬	122	(18.6)	191	(19.8)	313	(19.3)
医院・病院	27	(4.1)	40	(4.2)	67	(4.1)
薬局・薬店	357	(54.5)	440	(45.7)	797	(49.3)
家族	265	(40.5)	520	(54.0)	785	(48.5)
友人・知人	7	(1.1)	16	(1.7)	23	(1.4)
愛人・恋人	2	(.3)	2	(.2)	4	(.2)
その他	3	(.5)	7	(.7)	10	(.6)
飲んだが入手先不明	26	(4.0)	24	(2.5)	50	(3.1)
無回答	9	(1.4)	7	(.7)	16	(1.0)
合計	655	(100.0)	963	(100.0)	1618	(100.0)

表27 鎮痛薬の使用理由 (鎮痛薬を過去1年間使用した人のみ) (複数回答) (%)

	男		女		全体	
頭痛	358	(54.7)	668	(69.4)	1026	(63.4)
歯痛	193	(29.5)	150	(15.6)	343	(21.2)
腰痛	99	(15.1)	106	(11.0)	205	(12.7)
生理痛	0	(.0)	260	(27.0)	260	(16.1)
胃痛	48	(7.3)	89	(9.2)	137	(8.5)
肩こり	54	(8.2)	102	(10.6)	156	(9.6)
その他の痛み	49	(7.5)	66	(6.9)	115	(7.1)
遊び・快感目的	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
その他	27	(4.1)	25	(2.6)	52	(3.2)
使用目的不明	36	(5.5)	35	(3.6)	71	(4.4)
合計	655	(100.0)	963	(100.0)	1618	(100.0)

表28 鎮痛薬使用の実情・心情 (%)

	男		女		全体	
必要がないので考えたことがない	618	(44.3)	439	(28.7)	1058	(36.2)
必要なときは心配せずに使っている	416	(29.8)	489	(32.0)	905	(31.0)
心配もあるがどちらかといえば使う	176	(12.6)	349	(22.9)	525	(18.0)
心配だからどちらかというとならない	41	(2.9)	90	(5.9)	131	(4.5)
心配だからとにかく使わない	5	(.4)	16	(1.0)	21	(.7)
不明	108	(7.7)	113	(7.4)	221	(7.6)
無回答	32	(2.3)	31	(2.0)	63	(2.2)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表29 この1年間での精神安定薬（抗不安薬）の使用頻度 (%)

	男		女		全体	
一度も飲んでいない	1288	(92.3)	1359	(89.0)	2648	(90.6)
1年間に数回（年5回以内）	29	(2.1)	42	(2.8)	71	(2.4)
2ヶ月に1回（年約6-11回）	2	(.1)	8	(.5)	10	(.3)
月に1-2回（年約12-24回）	3	(.2)	16	(1.0)	19	(.6)
月に数回（年約25-51回）	8	(.6)	12	(.8)	20	(.7)
週に1-2回	7	(.5)	10	(.7)	17	(.6)
週に3-6回	8	(.6)	11	(.7)	19	(.6)
ほとんど毎日	24	(1.7)	38	(2.5)	62	(2.1)
飲んだが頻度不明	6	(.4)	9	(.6)	15	(.5)
無回答	21	(1.5)	22	(1.4)	43	(1.5)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表30 精神安定薬の入手先（過去1年間に精神安定薬を使った人）（複数回答） (%)

	男		女		全体	
常備薬	2	(2.3)	1	(.7)	3	(1.3)
医院・病院	1	(1.1)	7	(4.8)	8	(3.4)
薬局・薬店	67	(77.0)	121	(82.9)	188	(80.7)
家族	11	(12.6)	7	(4.8)	18	(7.7)
友人・知人	1	(1.1)	3	(2.1)	4	(1.7)
愛人・恋人	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
その他	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
飲んだが入手先不明	10	(11.5)	12	(8.2)	22	(9.4)
無回答	2	(2.3)	2	(1.4)	4	(1.7)
合計	87	(100.0)	146	(100.0)	233	(100.0)

表31 精神安定薬の使用理由（過去1年間に精神安定薬を使った人）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
不眠改善	42	(48.3)	83	(56.8)	125	(53.6)
不安解消	21	(24.1)	44	(30.1)	65	(27.9)
ストレス軽減	15	(17.2)	25	(17.1)	40	(17.2)
高血圧の治療	9	(10.3)	12	(8.2)	21	(9.0)
遊び・快感目的	1	(1.1)	0	(.0)	1	(.4)
その他	5	(5.7)	15	(10.3)	20	(8.6)
使用目的不明	13	(14.9)	11	(7.5)	24	(10.3)
合計	87	(100.0)	146	(100.0)	233	(100.0)

表32 精神安定薬使用の実情・心情（%）

	男		女		全体	
必要がないので考えたことがない	1221	(87.5)	1242	(81.3)	2464	(84.3)
必要なときは心配せずに使っている	64	(4.6)	91	(6.0)	155	(5.3)
心配もあるがどちらかというを使う	41	(2.9)	85	(5.6)	126	(4.3)
心配だからどちらかというを使わない	19	(1.4)	34	(2.2)	53	(1.8)
心配だからとにかく使わない	13	(.9)	25	(1.6)	38	(1.3)
不明	11	(.8)	13	(.9)	24	(.8)
無回答	27	(1.9)	37	(2.4)	64	(2.2)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表33 1年間での睡眠薬の使用頻度（%）

	男		女		全体	
一度も飲んでいない	1292	(92.6)	1379	(90.3)	2672	(91.4)
1年間に数回（年5回以内）	39	(2.8)	37	(2.4)	76	(2.6)
2ヶ月に1回（年約6-11回）	3	(.2)	9	(.6)	12	(.4)
月に1-2回（年約12-24回）	4	(.3)	12	(.8)	16	(.5)
月に数回（年約25-51回）	3	(.2)	15	(1.0)	18	(.6)
週に1-2回	9	(.6)	10	(.7)	19	(.6)
週に3-6回	3	(.2)	14	(.9)	17	(.6)
ほとんど毎日	28	(2.0)	33	(2.2)	61	(2.1)
飲んだが頻度不明	1	(.1)	4	(.3)	5	(.2)
無回答	14	(1.0)	14	(.9)	28	(1.0)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表34 睡眠薬の入手先（過去1年に睡眠薬を使用した人）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
常備薬	1	(1.1)	2	(1.5)	3	(1.3)
医院・病院	2	(2.2)	7	(5.2)	9	(4.0)
薬局・薬店	71	(78.9)	118	(88.1)	189	(84.4)
家族	16	(17.8)	11	(8.2)	27	(12.1)
友人・知人	3	(3.3)	1	(.7)	4	(1.8)
愛人・恋人	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
その他	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
入手先不明	2	(2.2)	2	(1.5)	4	(1.8)
無回答	1	(1.1)	0	(.0)	1	(.4)
合計	90	(100.0)	134	(100.0)	224	(100.0)

表35 睡眠薬の使用理由（過去1年に睡眠薬を使用した人）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
不眠改善	74	(82.2)	118	(88.1)	192	(85.7)
不安解消	8	(8.9)	15	(11.2)	23	(10.3)
ストレス軽減	5	(5.6)	7	(5.2)	12	(5.4)
高血圧の治療	5	(5.6)	8	(6.0)	13	(5.8)
遊び・快感目的	1	(1.1)	0	(.0)	1	(.4)
その他	5	(5.6)	3	(2.2)	8	(3.6)
使用目的不明	3	(3.3)	3	(2.2)	6	(2.7)
合計	90	(100.0)	134	(100.0)	224	(100.0)

表36 睡眠薬使用の実情・心情（%）

	男		女		全体	
必要がないので考えたことがない	1217	(87.2)	1235	(80.9)	2453	(83.9)
必要なときは心配せずに使っている	69	(4.9)	85	(5.6)	154	(5.3)
心配もあるがどちらかといえば使う	45	(3.2)	97	(6.4)	142	(4.9)
心配だからどちらかというとならない	21	(1.5)	32	(2.1)	53	(1.8)
心配だからとにかく使わない	11	(.8)	36	(2.4)	47	(1.6)
不明	3	(.2)	3	(.2)	6	(.2)
無回答	30	(2.1)	39	(2.6)	69	(2.4)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表37 聞いたことのある薬物名（複数回答）（%）

	男		女		全体	
有機溶剤	380	(27.2)	182	(11.9)	562	(19.2)
シンナー	1112	(79.7)	1198	(78.5)	2310	(79.0)
トルエン	686	(49.1)	478	(31.3)	1164	(39.8)
大麻	1234	(88.4)	1352	(88.5)	2586	(88.4)
マリファナ	1051	(75.3)	1129	(73.9)	2180	(74.6)
ハシッシ	314	(22.5)	161	(10.5)	475	(16.2)
覚せい剤	1174	(84.1)	1291	(84.5)	2466	(84.3)
ヒロポン	823	(59.0)	654	(42.8)	1477	(50.5)
シャブ	977	(70.0)	966	(63.3)	1943	(66.5)
スピード	577	(41.3)	524	(34.3)	1101	(37.7)
エス	194	(13.9)	202	(13.2)	396	(13.5)
麻薬	1150	(82.4)	1259	(82.4)	2410	(82.4)
モルヒネ	1101	(78.9)	1223	(80.1)	2324	(79.5)
ヘロイン	1034	(74.1)	1028	(67.3)	2062	(70.5)
コカイン	1132	(81.1)	1201	(78.7)	2333	(79.8)
クラック	314	(22.5)	154	(10.1)	468	(16.0)
LSD	729	(52.2)	496	(32.5)	1225	(41.9)
アシッド	92	(6.6)	41	(2.7)	133	(4.5)
MDMA	210	(15.0)	118	(7.7)	328	(11.2)
エックス	94	(6.7)	71	(4.6)	165	(5.6)
エクスタシー	414	(29.7)	371	(24.3)	785	(26.8)
マジック・マッシュルーム	438	(31.4)	421	(27.6)	859	(29.4)
すべて知らない	73	(5.2)	72	(4.7)	145	(5.0)
無回答	59	(4.2)	49	(3.2)	108	(3.7)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

左端のカッコは同じものであることを意味している。

表38 薬物乱用を繰り返すと依存状態になることを知っているか？（%）

	男		女		全体	
知っている	1329	(95.2)	1446	(94.7)	2776	(94.9)
知らない	48	(3.4)	61	(4.0)	109	(3.7)
無回答	19	(1.4)	20	(1.3)	39	(1.3)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表39 「シンナー遊び」で死亡すること（急性中毒死）があることを知っているか？（%）

	男		女		全体	
知っている	1213	(86.9)	1274	(83.4)	2487	(85.1)
知らない	166	(11.9)	234	(15.3)	401	(13.7)
無回答	17	(1.2)	19	(1.2)	36	(1.2)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表40 「シンナー遊び」で幻視・幻聴・妄想などの精神病状態になることがあることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	1248 (89.4)	1355 (88.7)	2604 (89.1)
知らない	135 (9.7)	153 (10.0)	288 (9.8)
無回答	13 (.9)	19 (1.2)	32 (1.1)
合計	1396 (100.0)	1527 (100.0)	2924 (100.0)

表41 「シンナー遊び」でフラッシュバック現象があることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	916 (65.6)	986 (64.6)	1903 (65.1)
知らない	458 (32.8)	522 (34.2)	980 (33.5)
無回答	22 (1.6)	19 (1.2)	41 (1.4)
合計	1396 (100.0)	1527 (100.0)	2924 (100.0)

表42 「シンナー遊び」で無動機症候群になることがあることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	918 (65.8)	1005 (65.8)	1924 (65.8)
知らない	451 (32.3)	503 (32.9)	954 (32.6)
無回答	27 (1.9)	19 (1.2)	46 (1.6)
合計	1396 (100.0)	1527 (100.0)	2924 (100.0)

表43 身近な人で「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1114 (79.8)	1256 (82.3)	2371 (81.1)
知っている	255 (18.3)	253 (16.6)	508 (17.4)
無回答	27 (1.9)	18 (1.2)	45 (1.5)
合計	1396 (100.0)	1527 (100.0)	2924 (100.0)



表44 身近な人で「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を知っているか？

(年齢群別) (%)

	「シンナー遊び」をした人						合計	
	知らない		知っている		無回答		度数	列 %
15-19歳	141	(5.9)	12	(2.4)	1	(2.2)	154	(5.3)
20-24歳	114	(4.8)	21	(4.1)	2	(4.4)	137	(4.7)
25-29歳	106	(4.5)	40	(7.9)	2	(4.4)	148	(5.1)
30-34歳	162	(6.8)	73	(14.4)	1	(2.2)	236	(8.1)
35-39歳	168	(7.1)	70	(13.8)	3	(6.7)	241	(8.2)
40-44歳	189	(8.0)	67	(13.2)	2	(4.4)	258	(8.8)
45-49歳	172	(7.3)	65	(12.8)	7	(15.6)	244	(8.3)
50-54歳	205	(8.6)	52	(10.2)	5	(11.1)	262	(9.0)
55-59歳	300	(12.7)	36	(7.1)	1	(2.2)	337	(11.5)
60-64歳	242	(10.2)	27	(5.3)	3	(6.7)	272	(9.3)
65-69歳	198	(8.4)	21	(4.1)	1	(2.2)	220	(7.5)
70歳以上	374	(15.8)	24	(4.7)	17	(37.8)	415	(14.2)
合計	2371	(100.0)	508	(100.0)	45	(100.0)	2924	(100.0)

表45 身近な人で、「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を何人知っているか？

(「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を知っている者のみ) (%)

	男		女		全体	
1人	59	(23.1)	81	(32.0)	140	(27.6)
2人	44	(17.3)	49	(19.4)	93	(18.3)
3人	33	(12.9)	36	(14.2)	69	(13.6)
4人	12	(4.7)	7	(2.8)	19	(3.7)
5人	24	(9.4)	30	(11.9)	54	(10.6)
6人	3	(1.2)	5	(2.0)	8	(1.6)
7人	1	(.4)	1	(.4)	2	(.4)
8人	1	(.4)	5	(2.0)	6	(1.2)
10人	27	(10.6)	14	(5.5)	41	(8.1)
13人	1	(.4)	0	(.0)	1	(.2)
14人	1	(.4)	0	(.0)	1	(.2)
15人	2	(.8)	1	(.4)	3	(.6)
16人	1	(.4)	0	(.0)	1	(.2)
20人	8	(3.1)	2	(.8)	10	(2.0)
25人	1	(.4)	0	(.0)	1	(.2)
28人	0	(.0)	1	(.4)	1	(.2)
30人	4	(1.6)	0	(.0)	4	(.8)
50人	4	(1.6)	0	(.0)	4	(.8)
60人	0	(.0)	1	(.4)	1	(.2)
100人	2	(.8)	0	(.0)	2	(.4)
無回答	27	(10.6)	20	(7.9)	47	(9.3)
合計	255	(100.0)	253	(100.0)	508	(100.0)
平均±SD	6.56±12.05		3.54±5.04		5.03±9.31	
	n=228		n=233		n=461	

表46 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1333	(95.5)	1485	(97.2)	2819	(96.4)
知っている	36	(2.6)	26	(1.7)	62	(2.1)
無回答	27	(1.9)	16	(1.0)	43	(1.5)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表47 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を知っているか？  
(年齢群別) (%)

	過去1年「シンナー遊び」をした人						合計	
	知らない		知っている		無回答		度数	列 %
15-19歳	149	(5.3)	5	(8.1)	0	(.0)	154	(5.3)
20-24歳	132	(4.7)	2	(3.2)	3	(7.0)	137	(4.7)
25-29歳	231	(8.2)	4	(6.5)	1	(2.3)	236	(8.1)
30-34歳	229	(8.1)	5	(8.1)	7	(16.3)	241	(8.2)
35-39歳	251	(8.9)	5	(8.1)	2	(4.7)	258	(8.8)
40-44歳	237	(8.4)	3	(4.8)	4	(9.3)	244	(8.3)
45-49歳	250	(8.9)	7	(11.3)	5	(11.6)	262	(9.0)
50-54歳	330	(11.7)	6	(9.7)	1	(2.3)	337	(11.5)
55-59歳	262	(9.3)	7	(11.3)	3	(7.0)	272	(9.3)
60-64歳	210	(7.4)	8	(12.9)	2	(4.7)	220	(7.5)
65-69歳	394	(14.0)	8	(12.9)	13	(30.2)	415	(14.2)
70歳以上	149	(5.3)	5	(8.1)	0	(.0)	154	(5.3)
合計	2819	(100.0)	62	(100.0)	43	(100.0)	2924	(100.0)

表48 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を何人知っているか？

(過去1年使用者を知っている人のみ) (%)

	男		女		全体	
1人	15	(41.7)	9	(34.6)	24	(38.7)
2人	6	(16.7)	7	(26.9)	13	(21.0)
3人	7	(19.4)	2	(7.7)	9	(14.5)
4人	0	(.0)	1	(3.8)	1	(1.6)
5人	3	(8.3)	0	(.0)	3	(4.8)
6人	0	(.0)	1	(3.8)	1	(1.6)
10人	3	(8.3)	1	(3.8)	4	(6.5)
13人	0	(.0)	1	(3.8)	1	(1.6)
50人	1	(2.8)	0	(.0)	1	(1.6)
無回答	1	(2.8)	4	(15.4)	5	(8.1)
合計	36	(100.0)	26	(100.0)	62	(100.0)
平均±SD	4.09±8.34		2.82±3.10		3.60±6.83	
	n=35		n=22		n=57	

表49 これまでに「シンナー遊び」に誘われたことがあるか？（生涯被誘惑経験）（%）

	男		女		全体	
ない	1316	(94.3)	1482	(97.1)	2799	(95.7)
1年より前にのみあった	60	(4.3)	26	(1.7)	86	(2.9)
1年より前にも、この1年間にもあった	1	(.1)	0	(.0)	1	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	1	(.1)	1	(.0)
無回答	19	(1.4)	18	(1.2)	37	(1.3)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表50 「シンナー遊び」生涯被誘惑経験（%）

	「シンナー遊び」に誘われた経験										合計	
	ない	1年より前にのみあった		1年より前にも、この1年間にもあった		この1年間にのみあった		無回答		度数	列%	
15-19歳	152	(5.4)	0	(.0)	1	(100.0)	1	(100.0)	0	(.0)	154	(5.3)
20-24歳	125	(4.5)	10	(11.6)	0	(.0)	0	(.0)	2	(5.4)	137	(4.7)
25-29歳	138	(4.9)	8	(9.3)	0	(.0)	0	(.0)	2	(5.4)	148	(5.1)
30-34歳	221	(7.9)	14	(16.3)	0	(.0)	0	(.0)	1	(2.7)	236	(8.1)
35-39歳	219	(7.8)	18	(20.9)	0	(.0)	0	(.0)	4	(10.8)	241	(8.2)
40-44歳	243	(8.7)	13	(15.1)	0	(.0)	0	(.0)	2	(5.4)	258	(8.8)
45-49歳	230	(8.2)	8	(9.3)	0	(.0)	0	(.0)	6	(16.2)	244	(8.3)
50-54歳	248	(8.9)	8	(9.3)	0	(.0)	0	(.0)	6	(16.2)	262	(9.0)
55-59歳	331	(11.8)	6	(7.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	337	(11.5)
60-64歳	269	(9.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(8.1)	272	(9.3)
65-69歳	218	(7.8)	1	(1.2)	0	(.0)	0	(.0)	1	(2.7)	220	(7.5)
70歳以上	405	(14.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	10	(27.0)	415	(14.2)
合計	2799	(100.0)	86	(100.0)	1	(100.0)	1	(100.0)	37	(100.0)	292	(100.0)

表52 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（生涯経験）（%）

	男		女		全体	
ない	1336	(95.7)	1498	(98.1)	2835	(97.0)
1年より前にのみあった	43	(3.1)	16	(1.0)	59	(2.0)
無回答	17	(1.2)	13	(.9)	30	(1.0)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)

表53 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（年齢群別）（%）

	「シンナー遊び」経験						合計	
	ない		1年より前にのみあった		無回答		度数	列 %
15-19歳	153	(5.4)	1	(1.7)	0	(.0)	154	(5.3)
20-24歳	131	(4.6)	4	(6.8)	2	(6.7)	137	(4.7)
25-29歳	142	(5.0)	5	(8.5)	1	(3.3)	148	(5.1)
30-34歳	229	(8.1)	7	(11.9)	0	(.0)	236	(8.1)
35-39歳	225	(7.9)	13	(22.0)	3	(10.0)	241	(8.2)
40-44歳	246	(8.7)	10	(16.9)	2	(6.7)	258	(8.8)
45-49歳	230	(8.1)	10	(16.9)	4	(13.3)	244	(8.3)
50-54歳	253	(8.9)	4	(6.8)	5	(16.7)	262	(9.0)
55-59歳	332	(11.7)	5	(8.5)	0	(.0)	337	(11.5)
60-64歳	269	(9.5)	0	(.0)	3	(10.0)	272	(9.3)
65-69歳	219	(7.7)	0	(.0)	1	(3.3)	220	(7.5)
70歳以上	406	(14.3)	0	(.0)	9	(30.0)	415	(14.2)
合計	2835	(100.0)	59	(100.0)	30	(100.0)	2924	(100.0)

表54 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（年齢群別）（%）

	「シンナー遊び」経験						合計	
	ない		1年より前にのみあった		無回答		度数	行 %
15-19歳	153	(99.4)	1	(.6)	0	(.0)	154	(100.0)
20-24歳	131	(95.6)	4	(2.9)	2	(1.5)	137	(100.0)
25-29歳	142	(95.9)	5	(3.4)	1	(.7)	148	(100.0)
30-34歳	229	(97.0)	7	(3.0)	0	(.0)	236	(100.0)
35-39歳	225	(93.4)	13	(5.4)	3	(1.2)	241	(100.0)
40-44歳	246	(95.3)	10	(3.9)	2	(.8)	258	(100.0)
45-49歳	230	(94.3)	10	(4.1)	4	(1.6)	244	(100.0)
50-54歳	253	(96.6)	4	(1.5)	5	(1.9)	262	(100.0)
55-59歳	332	(98.5)	5	(1.5)	0	(.0)	337	(100.0)
60-64歳	269	(98.9)	0	(.0)	3	(1.1)	272	(100.0)
65-69歳	219	(99.5)	0	(.0)	1	(.5)	220	(100.0)
70歳以上	406	(97.8)	0	(.0)	9	(2.2)	415	(100.0)
合計	2835	(97.0)	59	(2.0)	30	(1.0)	2924	(100.0)

表55 大麻を吸っている人の人数の印象（%）

	男		女		全体	
以前より増えている	387	(27.7)	499	(32.7)	886	(30.3)
変わらない	88	(6.3)	72	(4.7)	160	(5.5)
以前より減っている	21	(1.5)	15	(1.0)	36	(1.2)
わからない	870	(62.3)	917	(60.1)	1788	(61.1)
無回答	30	(2.1)	24	(1.6)	54	(1.8)
合計	1396	(100.0)	1527	(100.0)	2924	(100.0)