

H-001-4-1. それはいくつのおよみに更新されましたか。

	合計	1. 0~9歳	2. 10~19歳	3. 20~29歳	4. 30~39歳	5. 40~49歳	6. 50~59歳	7. 60~69歳	8. 70歳以上
全体	24	(4.2)	(4.2)	(4.2)	(4.2)	(8.3)	(33.3)	(41.7)	(4.2)
男性計	15	(0)	(0)	(0)	(0)	(6.7)	(46.7)	(46.7)	(0)
1. 男性50歳代	1	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 男性60歳代	12	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5)	(7)
3. 男性70歳代	2	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25.3)	(0)
4. 男性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(106.0)	(-)	(-)
女性計	9	(0)	(11.1)	(11.1)	(11.1)	(11.1)	(11.1)	(33.3)	(11.1)
1. 女性50歳代	3	(0)	(33.3)	(33.3)	(0)	(33.3)	(0)	(0)	(0)
2. 女性60歳代	4	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(2)
3. 女性70歳代	2	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25.0)	(25.0)
4. 女性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(50.0)	(0)	(0)	(59.0)	(0)
注：()内は77%未満を100とした割合									

H-001-4-2. その原因はどの状態にまでよるかお答えください。

	合計	1. 他に治療を受けた	2. 治療を受けなかった	3. 現在も治療を受けていない	4. 現在も治療を受けていない
全体	24	(8.3)	(0)	(6)	(17)
男性計	15	(0)	(0)	(4)	(10)
1. 男性50歳代	1	(0)	(0)	(0)	(1)
2. 男性60歳代	12	(0)	(0)	(4)	(7)
3. 男性70歳代	2	(8.3)	(0)	(33.3)	(58.3)
4. 男性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
女性計	9	(11.1)	(0)	(11.1)	(77.8)
1. 女性50歳代	3	(33.3)	(0)	(0)	(66.7)
2. 女性60歳代	4	(0)	(0)	(25.0)	(75.0)
3. 女性70歳代	2	(0)	(0)	(0)	(100.0)
4. 女性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
注：()内は77%未満を100とした割合					

11-001-5. これまで医師に診断をうけたり、検査で原因をうけたり、検査で原因をうけたことがありますか。5. 糖尿病

	1. 合計		2. 医師・検査師・検査士 あり		3. 医師・検査師・検査士 なし	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	276	(100.0)	49	(17.7)	227	(82.3)
男性計	123	(100.0)	31	(25.2)	92	(74.8)
1. 男性50歳代	52	(100.0)	14	(26.9)	38	(73.1)
2. 男性60歳代	45	(100.0)	13	(28.9)	32	(71.1)
3. 男性70歳代	26	(100.0)	4	(15.4)	22	(84.6)
4. 男性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)
女性計	153	(100.0)	18	(11.8)	135	(88.2)
1. 女性50歳代	64	(100.0)	7	(10.9)	57	(89.1)
2. 女性60歳代	53	(100.0)	9	(17.0)	44	(83.0)
3. 女性70歳代	36	(100.0)	2	(5.6)	34	(94.4)
4. 女性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)

注：()内は77%未満を100とした割合

	1. 合計		2. 医師・検査師・検査士 あり		3. 医師・検査師・検査士 なし		4. 20~29歳		5. 30~39歳		6. 40~49歳		7. 50~59歳		8. 60~69歳		9. 70歳以上	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	49	(100.0)	0	(-)	49	(100.0)	2	(4.1)	19	(38.8)	23	(46.9)	12	(24.3)	2	(4.1)	0	(-)
男性計	31	(100.0)	0	(-)	31	(100.0)	1	(3.2)	9	(29.0)	17	(54.8)	4	(12.9)	0	(-)	0	(-)
1. 男性50歳代	14	(100.0)	0	(-)	14	(100.0)	0	(-)	4	(28.6)	6	(42.9)	4	(28.6)	0	(-)	0	(-)
2. 男性60歳代	13	(100.0)	0	(-)	13	(100.0)	1	(7.7)	0	(-)	3	(23.1)	9	(69.2)	0	(-)	0	(-)
3. 男性70歳代	6	(100.0)	0	(-)	6	(100.0)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	2	(33.3)	4	(66.7)	0	(-)
4. 男性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
女性計	18	(100.0)	0	(-)	18	(100.0)	1	(5.6)	10	(55.6)	6	(33.3)	8	(44.4)	2	(11.1)	0	(-)
1. 女性50歳代	7	(100.0)	0	(-)	7	(100.0)	0	(-)	3	(42.9)	4	(57.1)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
2. 女性60歳代	9	(100.0)	0	(-)	9	(100.0)	0	(-)	1	(11.1)	8	(88.9)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
3. 女性70歳代	2	(100.0)	0	(-)	2	(100.0)	0	(-)	0	(-)	2	(100.0)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
4. 女性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)

注：()内は77%未満を100とした割合

H-001-5-2. その調査はどの程度にあてはまるか答えてください。

	1. 合計	2. 治療を受けた	3. 治療を受けたが十分な効果なかった	4. 現在も治療を受けていない
全体	49 (100.0)	10 (20.4)	0 (0)	2 (4.1)
男性計	31 (100.0)	8 (25.8)	0 (0)	1 (3.2)
1. 男性50歳代	14 (100.0)	5 (35.7)	0 (0)	1 (7.1)
2. 男性60歳代	15 (100.0)	2 (13.3)	0 (0)	0 (0)
3. 男性70歳代	4 (100.0)	1 (25.0)	0 (0)	0 (0)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性計	18 (100.0)	2 (11.1)	0 (0)	1 (5.6)
1. 女性50歳代	7 (100.0)	2 (28.6)	0 (0)	0 (0)
2. 女性60歳代	6 (100.0)	0 (0)	0 (0)	1 (16.7)
3. 女性70歳代	2 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. 女性不明	3 (100.0)	0 (0)	0 (0)	1 (33.3)

注: ()内は100%とした割合

H-001-5-3. 現在の治療の内容についてお答えください。

	合計	1. 薬のみで済まない	2. 薬の量を減らす	3. 薬の種類を変える	4. インスリン療法を行っている
全体	37 (100.0)	1 (2.7)	30 (81.1)	6 (16.2)	0 (0)
男性計	18 (100.0)	1 (5.6)	16 (89.4)	1 (5.6)	0 (0)
1. 男性50歳代	8 (100.0)	0 (0)	7 (87.5)	1 (12.5)	0 (0)
2. 男性60歳代	11 (100.0)	1 (9.1)	9 (81.8)	1 (9.1)	0 (0)
3. 男性70歳代	3 (100.0)	0 (0)	3 (100.0)	0 (0)	0 (0)
4. 男性不明	5 (100.0)	0 (0)	5 (100.0)	0 (0)	0 (0)
女性計	15 (100.0)	0 (0)	12 (80.0)	3 (20.0)	0 (0)
1. 女性50歳代	5 (100.0)	0 (0)	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0)
2. 女性60歳代	9 (100.0)	0 (0)	7 (77.8)	2 (22.2)	0 (0)
3. 女性70歳代	4 (100.0)	0 (0)	3 (75.0)	1 (25.0)	0 (0)
4. 女性不明	6 (100.0)	0 (0)	6 (100.0)	0 (0)	0 (0)

注: ()内は100%とした割合

注(1)内は177名を100とした割合、注(2)内は177名を100とした割合

	合計		1. 更新・増築あり		2. 更新・増築なし	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	276	(100.0)	3	(1.1)	273	(99.9)
男性計	123	(100.0)	0	(0.0)	122	(99.2)
1. 男性50歳代	45	(100.0)	0	(0.0)	45	(100.0)
2. 男性60歳代	26	(100.0)	0	(0.0)	26	(100.0)
3. 男性70歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性計	153	(100.0)	2	(1.3)	149	(97.7)
1. 女性50歳代	64	(100.0)	0	(0.0)	64	(100.0)
2. 女性60歳代	52	(100.0)	2	(3.8)	50	(96.2)
3. 女性70歳代	34	(100.0)	0	(0.0)	34	(100.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注(1)内は177名を100とした割合

	注(1)内は177名を100とした割合								
	合計	1. 0-9歳	2. 10-19歳	3. 20-29歳	4. 30-39歳	5. 40-49歳	6. 50-59歳	7. 60-69歳	8. 70歳以上
全体	3	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
男性計	1	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
1. 男性50歳代	1	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
2. 男性60歳代	0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
3. 男性70歳代	0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
女性計	2	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
1. 女性50歳代	0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
2. 女性60歳代	2	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
3. 女性70歳代	0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)

注(1)内は177名を100とした割合

11-001-6-2. その病気ほどの状態にあてまはるかかやえくたさい

各 計	1. 斜に治療 めたが中 かった		2. 治療を相 油ををし たが中 で治った かった		3. 現在も加 えはしな い治療 が続いて いる		4. 現在も加 えはしな い治療 が続いて いる	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
全 体	3	(100.0)	0	(-)	1	(33.3)	2	(66.7)
男性 計	1	(100.0)	0	(-)	0	(-)	1	(100.0)
1. 男性50歳代	1	(100.0)	0	(-)	0	(-)	1	(100.0)
2. 男性60歳代	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
3. 男性70歳代	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
4. 男性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
女性 計	2	(100.0)	0	(-)	1	(50.0)	1	(50.0)
1. 女性50歳代	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
2. 女性60歳代	2	(100.0)	0	(-)	1	(50.0)	1	(50.0)
3. 女性70歳代	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)
4. 女性不明	0	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(-)

注：()内は百分率を100とした割合

11-001-7. これまで医師に診断をうけたか、検査で診断をうけたことがありますか、7. 喘息

各 計	1. 診断・指 定あり		2. 診断・指 定なし	
	人数	割合	人数	割合
全 体	276	(100.0)	14	(5.1)
男性 計	123	(100.0)	3	(2.4)
1. 男性50歳代	52	(100.0)	1	(1.9)
2. 男性60歳代	52	(100.0)	1	(1.9)
3. 男性70歳代	20	(100.0)	2	(7.7)
4. 男性不明	0	(-)	0	(-)
女性 計	153	(100.0)	11	(7.2)
1. 女性50歳代	64	(100.0)	7	(11.0)
2. 女性60歳代	53	(100.0)	6	(11.3)
3. 女性70歳代	34	(100.0)	0	(-)
4. 女性不明	0	(-)	0	(-)

注：()内は百分率を100とした割合

H-001-7-1. それはいくつものときに診断されましたか

	合計	1 0～9歳	2 10～19歳	3 20～29歳	4 30～39歳	5 40～49歳	6 50～59歳	7 60～69歳	8 70歳以上
全体	14 (100.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	2 (14.3)	1 (7.1)	1 (42.9)	6 (42.9)	2 (14.3)	2 (14.3)
男性 計	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)
1. 男性50歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 男性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性 計	11 (100.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	2 (18.2)	1 (9.1)	4 (45.5)	5 (45.5)	1 (9.1)	1 (9.1)
1. 女性50歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 女性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：()内は177名を100とした割合

H-001-7-2. その病気はどのような状態にまで進みましたか

	合計	1 病状が 軽かった	2 病状が 中程度 だった	3 病状が 重かった	4 現在も 病状が 残っている
全体	14 (100.0)	2 (14.3)	2 (14.3)	4 (28.6)	6 (42.9)
男性 計	3 (100.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)
1. 男性50歳代	1 (100.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 男性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性 計	11 (100.0)	0 (0.0)	2 (18.2)	3 (27.3)	6 (54.5)
1. 女性50歳代	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	3 (60.0)
2. 女性60歳代	6 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (33.3)	4 (66.7)
3. 女性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：()内は177名を100とした割合

H-001-8. これまで病気に診断をつけたり、検査で指摘をうけたことがありますか。8. 肝臓の病気

	1. 合計		2. 医師・指 摘あり		3. 医師・指 摘なし	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	276	(100.0)	261	(94.2)	15	(5.4)
男性計	132	(100.0)	119	(90.1)	13	(9.9)
1. 男性50歳代	52	(100.0)	46	(88.5)	6	(11.5)
2. 男性60歳代	45	(100.0)	41	(91.1)	4	(8.9)
3. 男性70歳代	35	(100.0)	26	(74.3)	9	(25.7)
4. 男性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
女性計	144	(100.0)	142	(98.6)	2	(1.4)
1. 女性50歳代	64	(100.0)	62	(96.9)	2	(3.1)
2. 女性60歳代	53	(100.0)	52	(98.1)	1	(1.9)
3. 女性70歳代	27	(100.0)	22	(81.5)	5	(18.5)
4. 女性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

注：()内は100とした割合

H-001-8-1. それはいつのときに診断されましたか。

	1. 合計		2. 10~19歳		3. 20~29歳		4. 30~39歳		5. 40~49歳		6. 50~59歳		7. 60~69歳		8. 70歳以上	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	15	(100.0)	0	(0.0)	1	(6.7)	0	(0.0)	4	(26.7)	3	(20.0)	5	(33.3)	2	(13.3)
男性計	6	(100.0)	0	(0.0)	1	(16.7)	0	(0.0)	3	(50.0)	2	(33.3)	0	(0.0)	0	(0.0)
1. 男性50歳代	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(50.0)	2	(50.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 男性70歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
女性計	9	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(11.1)	1	(11.1)	2	(22.2)	2	(22.2)
1. 女性50歳代	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(50.0)	1	(50.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 女性60歳代	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 女性70歳代	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 女性不明	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

注：()内は100とした割合

II-001-8-2. その調査はどの状態にあてはまるかお答えください。

	1 合計	2 特別に指導 を受けた 人	3 指導を受け たが中 断した 人	4 現在も指 導を受け ていない 人
全体	15 (100.0)	7 (46.7)	0 (-)	8 (53.3)
男性	10 (100.0)	5 (50.0)	0 (-)	5 (50.0)
1. 男性50歳代	6 (100.0)	3 (50.0)	0 (-)	3 (50.0)
2. 男性60歳代	4 (100.0)	2 (50.0)	0 (-)	2 (50.0)
3. 男性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性	5 (100.0)	2 (40.0)	0 (-)	3 (60.0)
1. 女性50歳代	2 (100.0)	2 (100.0)	0 (-)	0 (-)
2. 女性60歳代	1 (100.0)	0 (-)	0 (-)	1 (100.0)
3. 女性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：()内は百分率を100とした割合

II-001-9. これまで医師に診断をうけたり、施設で指導をうけたことがありますか。3. 腰痛など腎臓の病気

	合計	1 男・指 導あり	2 男・指 導なし
全体	276 (100.0)	24 (8.7)	252 (91.3)
男性	123 (100.0)	16 (13.0)	107 (87.0)
1. 男性50歳代	52 (100.0)	8 (15.4)	44 (84.6)
2. 男性60歳代	40 (100.0)	8 (20.0)	32 (80.0)
3. 男性70歳代	26 (100.0)	0 (-)	26 (100.0)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性	153 (100.0)	8 (5.2)	145 (94.7)
1. 女性50歳代	64 (100.0)	7 (10.9)	57 (89.1)
2. 女性60歳代	38 (100.0)	1 (2.6)	37 (97.4)
3. 女性70歳代	34 (100.0)	0 (-)	34 (100.0)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：()内は百分率を100とした割合

H-001-10. これまで医師は診断をうけたり、薬品や治療をうけたことがありますか。10. 診断疾患

合 計	1. 医師・指 薬かた		2. 薬品 治療	
	人数	(%)	人数	(%)
全 体	518	(100.0)	428	(82.6)
男性 計	123	(100.0)	118	(95.9)
男 1. 男性50歳代	52	(100.0)	51	(98.1)
性 2. 男性60歳代	45	(100.0)	44	(97.8)
年 3. 男性70歳代	26	(100.0)	25	(96.2)
齢 4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)
女性 計	151	(100.0)	128	(84.8)
女 1. 女性50歳代	64	(100.0)	59	(92.2)
性 2. 女性60歳代	33	(100.0)	31	(93.9)
年 3. 女性70歳代	14	(100.0)	14	(100.0)
齢 4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)

注：()内は177 *数を100とした割合

合 計	1. 0-9歳		2. 10-19歳		3. 20-29歳		4. 30-39歳		5. 40-49歳		6. 50-59歳		7. 60-69歳		8. 70歳以上	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全 体	108	(100.0)	3	(2.8)	7	(6.5)	13	(12.0)	14	(12.9)	21	(19.4)	32	(29.6)	31	(28.8)
男性 計	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(20.0)	1	(60.0)	0	(0.0)
男 1. 男性50歳代	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
性 2. 男性60歳代	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
年 3. 男性70歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
齢 4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性 計	23	(100.0)	1	(4.3)	7	(30.4)	13	(56.5)	14	(60.9)	20	(87.0)	31	(134.8)	31	(134.8)
女 1. 女性50歳代	14	(100.0)	1	(7.1)	7	(50.0)	13	(92.9)	14	(100.0)	20	(142.9)	31	(221.4)	31	(221.4)
性 2. 女性60歳代	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
年 3. 女性70歳代	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
齢 4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注：()内は177 *数を100とした割合

H-001-10-2. その病気ほどの状態にあてはまるかお答えください。

	合計			
	1. 病名はしなかつた	2. 病名を少し悩まされた	3. 病名を悩まされたが中絶した	4. 病名を悩まされたが治療を断った
全体	28 (100.0)	1 (3.6)	4 (14.3)	1 (3.6)
男性	5 (100.0)	0 (-)	2 (40.0)	0 (0.0)
1. 男性50歳代	1 (100.0)	0 (-)	1 (100.0)	0 (-)
2. 男性60歳代	4 (100.0)	0 (-)	1 (25.0)	0 (0.0)
3. 男性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性	23 (100.0)	1 (4.3)	2 (8.7)	1 (4.3)
1. 女性50歳代	14 (100.0)	0 (-)	2 (14.3)	1 (7.1)
2. 女性60歳代	5 (100.0)	1 (20.0)	0 (-)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：()内は100%を100とした割合

H-001-10-3. これまでに手術を受けたことがありますか。

	合計			
	1. はい	2. いいえ	3. わからない	4. 不明
全体	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
男性	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
1. 男性50歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
2. 男性60歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
3. 男性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
1. 女性50歳代	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 女性60歳代	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注：()内は100%を100とした割合

注:001-10-4、それはいくつものまじらうけましか。

	1. 0-9歳	2. 10-19歳	3. 20-29歳	4. 30-39歳	5. 40-49歳	6. 50-59歳	7. 60-69歳	8. 70歳以上
全体	100.0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	14.3 (25.6)	41.9 (41.9)	14.3 (-)	0 (-)
男性計	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
1. 男性50歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
2. 男性60歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
3. 男性70歳代	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性計	100.0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	14.3 (28.6)	47.9 (47.9)	14.3 (-)	0 (-)
1. 女性50歳代	100.0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	59.0 (59.0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
2. 女性60歳代	100.0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	59.0 (59.0)	0 (-)	0 (-)
3. 女性70歳代	100.0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注:()内は177 *数を100とした割合

注:001-11、これはで医師に診断まうけたり、検査で診断をうけたことありましか、11. 次級者層部の分析

	1. 男性計	2. 女性計	3. 不明
全体	274 (100.0)	274 (100.0)	0 (0.0)
男性計	123 (100.0)	0 (-)	0 (-)
1. 男性50歳代	52 (100.0)	0 (-)	0 (-)
2. 男性60歳代	40 (100.0)	0 (-)	0 (-)
3. 男性70歳代	26 (100.0)	0 (-)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)
女性計	151 (100.0)	149 (100.0)	2 (1.3)
1. 女性50歳代	64 (100.0)	63 (98.4)	1 (1.6)
2. 女性60歳代	52 (100.0)	52 (100.0)	0 (-)
3. 女性70歳代	34 (100.0)	33 (97.1)	1 (2.9)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)

注:()内は177 *数を100とした割合

H-001-11-1. それはいくつものときに診断されましたか。

	1. 合計	2. 0～9歳	3. 10～19歳	4. 20～29歳	5. 30～39歳	6. 40～49歳	7. 50～59歳	8. 60～69歳	9. 70歳以上
全体	(100.0)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(50.0)	(--)	(50.0)
男性計	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
男性50歳代	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
男性60歳代	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
男性70歳代	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
男性不明	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
女性計	(100.0)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(50.0)	(--)	(50.0)
女性50歳代	(100.0)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(100.0)	(--)	(--)
女性60歳代	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
女性70歳代	(100.0)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(100.0)
女性不明	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)

注：()内は100%を100とした割合

H-001-11-2. その病気はどの状態にあてまはるかおぼえませんか。

	1. 合計	2. 病状も治療も始 めなかった	3. 病状も治療も 始めたが中 断した	4. 病状も治療も 始めたが中 断したまま 治療を 続けてい る
全体	(100.0)	(--)	(--)	(50.0)
男性計	(--)	(--)	(--)	(--)
男性50歳代	(--)	(--)	(--)	(--)
男性60歳代	(--)	(--)	(--)	(--)
男性70歳代	(--)	(--)	(--)	(--)
男性不明	(--)	(--)	(--)	(--)
女性計	(100.0)	(--)	(--)	(50.0)
女性50歳代	(100.0)	(--)	(--)	(100.0)
女性60歳代	(--)	(--)	(--)	(--)
女性70歳代	(100.0)	(--)	(--)	(100.0)
女性不明	(--)	(--)	(--)	(--)

注：()内は100%を100とした割合

11-001-12. これまで医師に診断をうけたら、検査で原因をうけたこと、検査で原因をうけたことがありますか。は、希望しように

	1.		2.	
	合計	割合・相対率 (%)	割合・相対率 (%)	割合・相対率 (%)
全体	276	21	255	
	(100.0)	(7.6)	(92.4)	
男性計	223	0.8	192	
	(100.0)	(0.8)	(92.2)	
1. 男性50歳代	52	0	52	
	(100.0)	(-)	(100.0)	
2. 男性60歳代	45	0	45	
	(100.0)	(-)	(100.0)	
3. 男性70歳代	26	1	25	
	(100.0)	(3.8)	(96.2)	
4. 男性不明	0	0	0	
	(-)	(-)	(-)	
女性計	151	20	131	
	(100.0)	(13.2)	(86.8)	
1. 女性50歳代	64	5	59	
	(100.0)	(7.8)	(92.2)	
2. 女性60歳代	53	11	42	
	(100.0)	(20.8)	(79.2)	
3. 女性70歳代	34	4	30	
	(100.0)	(11.8)	(88.2)	
4. 女性不明	0	0	0	
	(-)	(-)	(-)	

注：()内は2桁未満を100とした割合

	1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.						
	合計	割合・相対率 (%)	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	合計	割合・相対率 (%)	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	
全体	276	21	0	0	0	0	0	1	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(4.8)	(28.6)	(38.1)	(28.6)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
男性計	223	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1. 男性50歳代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2. 男性60歳代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3. 男性70歳代	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(100.0)
4. 男性不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
女性計	20	20	0	0	0	0	0	1	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(5.0)	(30.0)	(40.0)	(20.0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1. 女性50歳代	5	5	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(20.0)	(60.0)	(20.0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2. 女性60歳代	11	11	0	0	0	0	0	0	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	(100.0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(27.3)	(63.6)	(9.1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(9.1)
3. 女性70歳代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4. 女性不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

注：()内は2桁未満を100とした割合

H-001-12-2. その病気はどのような状態にあつてしまはるか尋ねるべきか

合計	1. 病に治療 がなされた か		2. 治療を 始めた か		3. 治療を 始めた が途中で やめた か		4. 現在も 病中 か	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
全体	21	(100.0)	2	(9.5)	14	(67.6)	0	0
男性 計	1	(100.0)	0	(0.0)	1	(100.0)	0	0
1. 男性50歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0
2. 男性60歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0
3. 男性70歳代	1	(100.0)	0	(0.0)	1	(100.0)	0	0
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0
女性 計	20	(100.0)	2	(10.0)	13	(65.0)	15	(75.0)
1. 女性50歳代	5	(100.0)	1	(20.0)	0	(0.0)	0	0
2. 女性60歳代	10	(100.0)	0	(0.0)	18	(180.0)	0	0
3. 女性70歳代	4	(100.0)	1	(25.0)	0	(0.0)	0	0
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	0

注：()内は177名を100とした割合

H-001-13. これまで医師に診断をうけたり、検査で病名をうけたりすることがありますか。1. 現在の病気

合計	1. 診断・検査 あり		2. 診断・検査 なし	
	人数	割合	人数	割合
全体	276	(100.0)	61	(22.1)
男性 計	123	(100.0)	24	(19.5)
1. 男性50歳代	32	(100.0)	6	(18.8)
2. 男性60歳代	66	(100.0)	11	(16.7)
3. 男性70歳代	25	(100.0)	7	(28.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)
女性 計	153	(100.0)	37	(24.2)
1. 女性50歳代	53	(100.0)	17	(32.1)
2. 女性60歳代	34	(100.0)	13	(38.2)
3. 女性70歳代	66	(100.0)	8	(12.1)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)

注：()内は177名を100とした割合

II-001-13-1. そのほかいくつかの項目に分類されましたか。

	1. 合計		2. 10~19歳		3. 20~29歳		4. 30~39歳		5. 40~49歳		6. 50~59歳		7. 60~69歳		8. 70歳以上	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	61	(100.0)	1	(1.6)	0	(0.0)	1	(1.6)	4	(6.6)	19	(31.1)	24	(39.3)	12	(19.7)
男性	37	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(2.7)	4	(10.8)	11	(29.7)	15	(40.5)	6	(16.3)
1. 男性50歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(2.7)	1	(2.7)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	11	(29.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(2.7)	2	(5.4)	1	(2.7)
3. 男性70歳代	7	(18.9)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(2.7)	2	(5.4)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性	24	(100.0)	1	(4.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	8	(33.3)	9	(37.5)	6	(25.0)
1. 女性50歳代	7	(29.2)	1	(4.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(8.3)	4	(16.7)	2	(8.3)
2. 女性60歳代	17	(70.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	6	(25.0)	5	(20.8)	4	(16.7)
3. 女性70歳代	13	(54.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(4.2)	2	(8.3)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
注：()内は100とした割合																

II-001-13-2. その病気は次の状態にあてはまるかを答えください。

	1. 合計		2. 現在も悩まれているか		3. 悩まれている期間		4. 悩まれている期間	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	61	(100.0)	7	(11.5)	2	(3.3)	17	(27.9)
男性	37	(100.0)	3	(8.1)	1	(2.7)	8	(21.6)
1. 男性50歳代	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	11	(29.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(5.4)
3. 男性70歳代	7	(18.9)	0	(0.0)	0	(0.0)	2	(5.4)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性	24	(100.0)	4	(16.7)	1	(4.2)	9	(37.5)
1. 女性50歳代	7	(29.2)	1	(4.2)	0	(0.0)	2	(8.3)
2. 女性60歳代	17	(70.8)	3	(17.6)	1	(5.9)	7	(40.6)
3. 女性70歳代	13	(54.2)	1	(7.7)	1	(7.7)	5	(38.5)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
注：()内は100とした割合								

H-001-12-3. これまでに手術を受けたことありますか

	1.はい	2.いいえ
全体	32 (100.0) (51.9) (48.1)	29 (85.7) (53.0) (47.0)
男性計	5 (100.0) (63.2)	2 (40.0)
1. 男性50歳代	8 (100.0) (75.0) (25.0)	2 (40.0)
2. 男性60歳代	7 (100.0) (57.1) (42.9)	3 (42.9)
3. 男性70歳代	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)
4. 男性不明	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)
女性計	32 (100.0) (43.8) (56.2)	19 (59.4)
1. 女性50歳代	4 (100.0) (25.0) (75.0)	3 (75.0)
2. 女性60歳代	16 (100.0) (59.0) (41.0)	8 (50.0)
3. 女性70歳代	12 (100.0) (41.7) (58.3)	7 (58.3)
4. 女性不明	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)

注：()内はア・Bを100とした割合

H-001-12-4. それはいくつの上まじうけましたか

	1. 0～9歳	2. 10～19歳	3. 20～29歳	4. 30～39歳	5. 40～49歳	6. 50～59歳	7. 60～69歳	8. 70歳以上	
全体	27 (100.0) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	1 (3.7) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	7 (25.9) (48.1) (32.2)	13 (48.1) (32.2) (22.2)	6 (22.2)
男性計	13 (100.0) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	3 (23.1)	9 (69.2)	0 (--) (--) (--)
1. 男性50歳代	6 (100.0) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	2 (33.3)	3 (50.0)	1 (16.7)
2. 男性60歳代	4 (100.0) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)
3. 男性70歳代	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)
4. 男性不明	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)
女性計	14 (100.0) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	4 (28.6)	4 (28.6)	2 (14.3)
1. 女性50歳代	1 (100.0) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	1 (100.0)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)
2. 女性60歳代	8 (100.0) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)
3. 女性70歳代	5 (100.0) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)
4. 女性不明	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)	0 (--) (--) (--)

注：()内はア・Bを100とした割合

H-001-14. これまで医師に診察をうけたり、薬物で治療をうけたことがありますか。14. 耳の病気

	合計		1. 0～9歳		2. 10～19歳		3. 20～29歳		4. 30～39歳		5. 40～49歳		6. 50～59歳		7. 60～69歳		8. 70歳以上	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	276	(100.0)	21	(9.7)	0	(0.0)	2	(9.5)	0	(0.0)	1	(4.8)	3	(14.3)	4	(19.0)	6	(21.0)
男性	132	(100.0)	11	(8.3)	0	(0.0)	1	(7.7)	0	(0.0)	1	(7.7)	2	(15.2)	3	(22.7)	5	(37.9)
女性	144	(100.0)	10	(7.0)	0	(0.0)	1	(7.0)	0	(0.0)	2	(14.3)	1	(7.0)	1	(7.0)	1	(7.0)
1. 男性50歳代	52	(100.0)	2	(3.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	45	(100.0)	5	(11.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 男性70歳代	26	(100.0)	4	(15.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性計	131	(100.0)	10	(7.6)	0	(0.0)	1	(7.6)	0	(0.0)	2	(15.3)	1	(7.6)	1	(7.6)	1	(7.6)
1. 女性50歳代	64	(100.0)	2	(3.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 女性60歳代	53	(100.0)	3	(5.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 女性70歳代	34	(100.0)	5	(14.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注：()内は7桁未満を100とした割合

	合計		1. 0～9歳		2. 10～19歳		3. 20～29歳		4. 30～39歳		5. 40～49歳		6. 50～59歳		7. 60～69歳		8. 70歳以上	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
全体	21	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
男性	11	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性	10	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
1. 男性50歳代	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 男性60歳代	5	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 男性70歳代	4	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 男性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
女性計	10	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
1. 女性50歳代	2	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
2. 女性60歳代	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
3. 女性70歳代	3	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
4. 女性不明	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

注：()内は7桁未満を100とした割合

H-001-E-2. その病気はどの状態にあてはまるかお答えください。

合計	1. 特に治療 はしな かった	2. 治療を 始めた	3. 治療を 始めたが中 断した	4. 現在も治 癒が望 まれない ままに治 療を 続けてい る
全体	21 (100.0)	12 (57.1)	2 (9.5)	4 (19.0)
男性	11 (100.0)	7 (63.0)	1 (9.1)	3 (27.3)
女性	10 (100.0)	5 (50.0)	1 (10.0)	4 (40.0)
1. 男性50歳代	2 (100.0)	2 (100.0)	0 (-)	0 (-)
2. 男性60歳代	4 (100.0)	4 (100.0)	0 (-)	0 (-)
3. 男性70歳代	3 (100.0)	3 (100.0)	0 (-)	0 (-)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
男性計	10 (100.0)	5 (50.0)	1 (10.0)	4 (40.0)
1. 女性50歳代	2 (100.0)	1 (50.0)	0 (-)	1 (50.0)
2. 女性60歳代	5 (100.0)	3 (60.0)	0 (-)	2 (40.0)
3. 女性70歳代	3 (100.0)	3 (100.0)	0 (-)	0 (-)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)

H-001-E. これまで医師に診察をうけたか、健診で診断をうけたことがありますか。15. 病状の問題

合計	1. 診断・指 導あり	2. 診断・指 導なし
全体	276 (100.0)	13 (4.7)
男性	123 (100.0)	10 (8.1)
女性	153 (100.0)	3 (2.0)
1. 男性50歳代	52 (100.0)	0 (-)
2. 男性60歳代	45 (100.0)	7 (15.6)
3. 男性70歳代	26 (100.0)	3 (11.5)
4. 男性不明	0 (-)	0 (-)
男性計	124 (100.0)	10 (8.1)
1. 女性50歳代	64 (100.0)	2 (3.1)
2. 女性60歳代	83 (100.0)	1 (1.2)
3. 女性70歳代	34 (100.0)	1 (2.9)
4. 女性不明	0 (-)	0 (-)

注：()内は100とした割合

H-001-15-1. それはいくつの上まに期間されましたか。

	合計	1. 0～9歳	2. 10～19歳	3. 20～29歳	4. 30～39歳	5. 40～49歳	6. 50～59歳	7. 60～69歳	8. 70歳以上
全体	13 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (15.4)	2 (15.4)	5 (38.5)	4 (30.8)
男性計	10 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	5 (50.0)	3 (30.0)
1. 男性50歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 男性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (38.0)	1 (14.3)	0 (0.0)
4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性計	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)
1. 女性50歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 女性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)
4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：()内は100とした割合

H-001-15-2. その病気などの状態に比べてまはるかた悪くはない。

	合計	1. 物に治療 はしな かった	2. 治療を特 めたが中 断した	3. 治療をし たが中 断した	4. 現在も治 療中、ま たは治療 後経過を 聞いてい る
全体	13 (100.0)	2 (15.4)	3 (23.1)	3 (23.1)	5 (38.5)
男性計	10 (100.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	4 (40.0)
1. 男性50歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 男性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 男性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 男性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
女性計	3 (100.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)
1. 女性50歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2. 女性60歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3. 女性70歳代	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
4. 女性不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

注：()内は100とした割合