

福岡県	避妊の知識の向上
福岡県	例数の減少
福岡県	緊急避妊ピルを内服する人が徐々であるが、増加傾向にあるので、それが理由かも
福岡県	避妊教育の普及、OCを含め避妊薬の普及、生命倫理観の変化
福岡県	当院では中絶は行っていないが、他院への紹介は減少しています。
福岡県	中絶件数が減っている
福岡県	実際にアウス件数が以前よりやや減った感じ
福岡県	人口の減少。避妊の知識の向上。ピルの発売などと思われる。
福岡県	ピルや緊急避妊ピルの使用の増加
福岡県	主として人口減と高齢化が原因と思います。
福岡県	人口減少。緊急避妊の普及。
福岡県	性病の増によりコンドームの使用。妊娠年齢人口減
福岡県	よく分からないが、①避妊がうまくなった②セックスレスで男性があまり興味をもたない若者が増えた③結婚しない男女が増えた④特に男性が家庭を持つという発想が少なくなっている（人生に目的意識がない）
福岡県	中絶数が減少
佐賀県	避妊に対する考え方が女性も変化した。（パートナーの言いなりにならない）
佐賀県	当院での実績。OCを中心とした避妊指導の成果
佐賀県	患者数が減っている
佐賀県	女性が賢くなった。女性が主体の性行動になってきた
長崎県	実数に変化はないが、外来患者数に対する割合は減少していると思う
長崎県	例数の減少
長崎県	自院での中絶手術の減少。
長崎県	OCの普及が考えられるが、実際はOC処方の増加は実感としてない
長崎県	妊娠可能年齢人口が減少。避妊意識が普及。方法（OC等）の普及。一部若年妊娠の件は残存するが、おおまかには減少している
長崎県	OCの普及。若者への性教育。
長崎県	OCなど避妊法の普及
長崎県	性教育（避妊）。趣味の多様化
長崎県	性教育とEC、OCについて説明
長崎県	明らかに減少している
熊本県	ピル内服者の増加
熊本県	OCやECの希望者が増加している

熊本県	避妊を求めて OC、緊急避妊の相談が増えており、実際望まない妊娠で中絶依頼の紹介を書くケースが減った。
熊本県	pill 普及による
熊本県	ピルの普及
大分県	全国的に減少傾向で、順位はほぼ同じ。地域特有の政策、取り組み（性教育）ではないと思われる。感染症は増加傾向にあるので、性行動の仕方ではなく、やはり OC と緊急避妊によるところではないかと思われる。
大分県	避妊方法の多様化。キャリアウーマンの増加。婚姻率の低下、特に 30 代
大分県	ピルの普及による
大分県	pill の普及。EC の普及
大分県	対象年齢層の減少。避妊知識の向上
大分県	昨年度の手術件数に比べ、月単位で 10 件減少している
大分県	7～8 年前は年間 60 件以上あった中絶術が、去年は 46 件、今年は 23 件と減少している
宮崎県	避妊方法の利用。宮崎県では減少していないが、当院では減少している
宮崎県	妊娠する方が減っている
宮崎県	少子化・人口減少。OC の普及
宮崎県	性教育の向上
宮崎県	若年者の中絶が減少した
鹿児島県	インターネットおよび学校などで公演等を見聞きしているため、いろいろな情報を得ているためと思われます。
鹿児島県	避妊法の理解が広まった
鹿児島県	10 代の妊娠は減少している印象がある
鹿児島県	日本人、特に若者達が生殖への意欲を失い、妊娠そのものがへっているのではないか
鹿児島県	OC の普及、EC の知識の普及
沖縄県	人口の減少
沖縄県	OC および EC が理解させてきた
沖縄県	避妊法（低用量ピル、緊急避妊法）の普及。手術患者、他院へ流出

人工妊娠中絶実施件数・実施率が減少したと思わない理由

北海道	当院では増えている
北海道	中期中絶が増えている。扱う施設の減少にて、当院では増加
福島県	中絶希望者は減っていない
福島県	2005年までは減少し続けてきたが、2006年以降、当院ではゆるやかに上昇しています
茨城県	当院では昨年の開業以来毎日増加してきています。(その後OCを処方していますので、2度来る人はいません)
栃木県	変化がない
栃木県	自院での手術件数が減少していない
栃木県	毎年平衡化している
群馬県	OC、ECやIUDを希望する患者の数は増えていないので
埼玉県	当院での実施数は不変
埼玉県	当院での人工妊娠術件数が変わらないため
埼玉県	近隣の施設を見て。
千葉県	もともと施設でのD&Cは少ないので、実感はありません。しかし開業の先生方からは随分少なくなったという感想を聞きます。もともと、最近大した合併症でなくても紹介、中期だと紹介というように、紹介を受ける中絶が増えています。
千葉県	変化なし
千葉県	人口が減少しているので数字と実態では違うのではないかと
千葉県	若年層での避妊率が低い。
東京都	あまり件数の変化がない 15~30件/月
東京都	当院では変化見られず
東京都	当院では減っていない
東京都	OCのPtは確実に増えていますが、中絶の数はそんなに変わりません。ただし中期は減りました。
東京都	居住環境の悪化、生活の悪化、女性の社会進出のため、中絶する女性が増えている
東京都	自院での中絶数が減っていない
東京都	当院では中絶をしておりませんので、自分自身としては変化なしと思う。全体数は減少傾向にあると思う。
東京都	当院での実施数は減少しているが、近隣クリニックが増えているために分散しているだけかもしれない

東京都	自院では減っていない
東京都	自院での経験
神奈川県	当院での中絶数が減少していない
新潟県	自院で減少していない
長野県	実感するにはいたらない。ただし増加しているとも思わない。手術件数はほぼ同数ですが、年々産科が忙しく中絶手術をうけられなくなっているため、増加している可能性ある。
長野県	中絶目的で受診する患者が減少していない
静岡県	中絶希望で受診される人数の減少を感じられない
愛知県	当院での中絶件数が変化していない
愛知県	自院では変化がない。みなさんは全てを報告していないのではないかと思います。
愛知県	避妊をまじめに考えている患者は少ない
愛知県	妊娠に関しての知識のなさ。妊娠後に相互関係が悪化して Aus というケースもかなり多い
三重県	統計はとっておりませんが、それほど減少した感はありません。Data 上は 12.5→10.1 になり、80%に減少していますので、おそらく減少しているのでしょうね。
大阪府	若年層は増加傾向
兵庫県	相談件数は減っていない
兵庫県	当院での実施数は減少していない
奈良県	避妊せずに性交をもつ若い世代が多い
和歌山県	件数ほぼ同じ
島根県	毎日の臨床現場の実感および当院のデータから
岡山県	中絶目的で来院する患者は減少していない
岡山県	中絶してくれる施設の減少。
岡山県	昔から少ない。月 1~2 件
広島県	当院では増加している
山口県	若い人の中絶は減っているが、高齢で多くなっている
山口県	変化がない
徳島県	避妊しない人が多い。避妊されたか分かっていない女性が多い
高知県	以前より指導を厳しくしているため、再来はまだなし。口コミにて来院はまだないため、開業 2~3 年より少なく推移している
福岡県	まだ避妊について無知な人が多くいる
福岡県	当院ではむしろ増加しているから

福岡県	自院での傾向では増加している
福岡県	集計して変わらず。ただしピルを求めて来る方は多くなった。
福岡県	10代は減っている気がするが、30代以降はあまり減っていない気がします
宮崎県	当院では減少していない
宮崎県	最近では停滞期に入っていると思われる
宮崎県	自施設で変化なし
鹿児島県	なるべく人口妊娠中絶は施行していませんが、減少している感じはありません。（当院での件数はわからない）
沖縄県	まだOCが普及していない
沖縄県	当院においての実施率は全く同数である

低用量経口避妊薬（OC）処方の際に留意していること

北海道	血栓症の予防について説明
北海道	若年者にコンドームとの併用を勧めている。喫煙の危険性
北海道	タバコ、血圧、血栓症
北海道	年齢、たばこ、血栓の有無
北海道	血圧と喫煙に注意している
北海道	飲み忘れへの対処
北海道	副作用のチェック
北海道	内服忘れ
北海道	喫煙、血栓について説明
北海道	不正出血時の対応。飲み忘れたときの対応。年齢、喫煙、頭痛の有無
北海道	乳がん、子宮頸がん、子宮筋腫、血栓静脈炎などの恐れがある女性。血栓性素因のある女性。心疾患、高血圧、肝障害、糖尿病などのある患者。タバコ、年齢
北海道	不正出血及び飲み忘れ
北海道	飲み忘れがないよう
北海道	体重の変化、肝機能の異常の有無、STDの有無
北海道	副作用の出現、妊娠成立の有無
青森県	メリットの説明。STD予防できない事の説明
青森県	服用の仕方、服用ミスがないよう
青森県	副作用についてのIC
青森県	血栓症。特にプロテインC、Sを測定していないが気にしている
岩手県	喫煙状況。既往歴
岩手県	問診、喫煙
岩手県	飲み忘れ
岩手県	内服のドロップに注意する。100%の避妊でないことの認知。STDの危険性の理解
岩手県	禁忌、副作用、合併症が主です
岩手県	性病の予防はしっかりと
岩手県	利点のみでなく欠点、心配な点を聞いています。
宮城県	ピル服用検査の受診を
宮城県	飲み忘れ、たばこ、乳がん
宮城県	服用忘れがないよう、決まった時間帯に服用することを強調。心配なこと、わからないことがあった時は病院に電話して相談するよう。

宮城県	飲み忘れ
宮城県	検診（子宮がん、STD)のすすめ。禁煙指導
宮城県	OCの仕組みについてしっかり説明。自分にとって何がよいか十分納得してもらおう。服用中の疑問、質問に答えること。
宮城県	OCの問い合わせメールアドレスを必ず伝えている。OCの疑問については必ず返答するようにしている
宮城県	血圧、たばこ服用等の問診
宮城県	タバコの有無。体重など、血栓症のリスク
宮城県	服薬指導と定期検診を受けるように指導すること
宮城県	ユーザーのニーズに応じOCを選択する
宮城県	患者の使用しやすいタイプ。副作用のあった時の変更
宮城県	乳がん、子宮がん検診の有無と継続受診の指導
宮城県	副作用発現時の注意。飲み忘れ
宮城県	がん検、長期使用の場合肝腫瘍、コレステロール等の check をしています。
宮城県	副作用のチェック
秋田県	服用方法。不正出血など副作用
秋田県	禁煙指導、正しい服薬指導
秋田県	飲みわすれの防止、順番に飲むこと
秋田県	確実に飲む・異変があったら連絡を
秋田県	喫煙と不正出血
秋田県	飲み忘れ
山形県	喫煙状況、血圧、既往歴
山形県	服用法、タバコ禁止、下肢痛時の連絡
山形県	副作用チェック。性感染の有無。喫煙の有無
山形県	Smoker、肥満合併、高血圧合併、DM 合併、compliance など
山形県	服用を忘れない事。性病の予防にならない事
福島県	発がん性、副作用（気分不快等）、飲み忘れ、たばこの関係（結構飲んでる女性多いです。本数と年齢につき詳しく知りたいと思いますが）。
福島県	血栓症に対する注意、性感染症予防のためのコンドーム使用、OC 処方をきっかけにして子宮がん検診などの健康管理へつなげる
福島県	コンドーム使用（未婚者）、飲み忘れ
福島県	正しい服用方法。タバコ。副作用情報
福島県	禁煙の約束。定期検査の徹底。副作用発症時の対応
福島県	乳がん検診、子宮がん検診
福島県	副作用の発現

福島県	飲み忘れ
福島県	風説には惑わされないように、事実をきちんと伝えること
福島県	他薬剤との併用。高血圧治療薬との併用などにはさらにペルサンチン等を加える。また、小児用パファリン等を併用する人もある（数は少ないが）
茨城県	飲み方、飲み忘れ
茨城県	パンフレットを目の前に、いいことを強調してわたしている
茨城県	たばこです。禁煙のすすめ及び禁煙不可能例はIUDをすすめています。
茨城県	血圧、体重、年齢、たばこ
茨城県	服用方法を間違いないように。副作用が出た場合は連絡。途中で止めた場合のみ。
茨城県	喫煙者には原則処方せず
茨城県	服用方法の指導。副作用のチェック
茨城県	タバコの有無（本数）
茨城県	服用忘れ。STDの注意
茨城県	月経が28日にきてもよいか（遅らせたい時がたびたびあるか）
茨城県	① パコをやめるように ② 飲み忘れないように
栃木県	飲み間違いないよう
栃木県	喫煙の有無チェック。副作用の説明
栃木県	6か月ごとの血液検査。1年毎の子宮がん乳がん検査。異常があれば連絡するよう。
栃木県	服用開始直後は吐き気、不正出血などが起きることがあっても続けて内服すること
栃木県	出血が起こることを話しておく。
栃木県	はじめの2～3周期不正出血のある事が多い、下肢血栓症の症状—受診、飲み合わせのないこと
栃木県	服用忘れ
栃木県	副作用、飲み忘れ
栃木県	スポッティングと飲み忘れ
群馬県	子宮筋腫の有無
群馬県	Obesity、Smoking、がん検
群馬県	副作用と妊娠の可能性について。場合により性器出血がある
群馬県	体重、血圧、HPV
群馬県	禁煙のすすめ
群馬県	副作用が発生した場合病院の責任とならないように自己管理、自己責任を強調しています（よくないことかもしれませんが、時間的余裕がありませんの

	で)
群馬県	体重増加の有無、喫煙の有無、性感染症への配慮、脂質代謝、肝機能障害
群馬県	禁煙。血圧測定。飲み忘れない様。
群馬県	タバコ
群馬県	肥満、喫煙、血圧
埼玉県	高血圧・高年齢・その他合併症のある方へは注意している。子宮頸部細胞診、血液採取。生活習慣の意識向上
埼玉県	喫煙の有無
埼玉県	最初の投与タイミング。コンプライアンス改善の指導
埼玉県	忘れずに飲むこと。
埼玉県	副作用、血液検査、子宮頸がん検診、乳がん検診、飲み忘れ
埼玉県	指示通り服用しているか。
埼玉県	副作用と副効用について説明
埼玉県	タバコ、肥満、合併症。コンドーム着用の指導
埼玉県	定期的な検診
埼玉県	タバコ、飲酒、コレステロール値、生活態度
埼玉県	服用の仕方の指導
埼玉県	飲み方をしっかり。6か月毎の検診勧める。禁煙指導。消退出血がない場合は受診するよう
埼玉県	飲み忘れ、他剤併用時の注意
埼玉県	服用の仕方を誤らないように
千葉県	開始時の informed consent、Smoking。ほとんど治療的な使用なので、原疾患のコントロールに留意します。
千葉県	リスクを必ず説明
千葉県	乳がん、子宮がん、肝機能
千葉県	血圧測定と、35歳以上の喫煙の有無。血栓症、乳がんなどの既往歴。併用薬の有無
千葉県	内診、エコー、血液検査は必ず。血圧も。
千葉県	STDの予防。年齢
千葉県	血栓症の症状に気をつける
千葉県	年齢・喫煙の有無
千葉県	血圧、糖尿
千葉県	血圧のチェック、喫煙の有無
千葉県	ガイドラインに基づくように心がけている
千葉県	不正出血などの副作用

千葉県	中絶を行った方や分娩後の人に避妊指導をしている
千葉県	子宮がん、子宮筋腫の有無、血圧、体重、乳がん検診、肝機能検査
千葉県	血栓症
千葉県	コンドームの使用
千葉県	副作用、飲み忘れ
千葉県	服用をきちんとしているか。定期的な血液検査
東京都	喫煙、血圧
東京都	血栓症予防
東京都	飲み忘れ
東京都	喫煙、肥満、生活習慣
東京都	喫煙の有無。服用の正確さ。不正出血の有無
東京都	治療法と避妊用を使い分けている
東京都	血栓症のリスク
東京都	問診、スメアなど検診。数か月に一度問診
東京都	患者にとっての簡便性とショートタームの副作用の有無
東京都	服用時間を厳守すること
東京都	飲み忘れ、内服時間の注意
東京都	初回の説明と指導を十分時間をとって行う
東京都	使用当初の不正出血
東京都	不正出血と飲み忘れ、対処法
東京都	喫煙
東京都	タバコ、肝機能障害
東京都	避妊率、副作用、定期検診の必要性を話すこと
東京都	患者の症状に対して最も適したものを選択。服用中の注意と副作用について
東京都	忘れないよう服用させている
東京都	副作用。途中出血について
東京都	低価格で若い人に処方してあげたい
東京都	飲んだ時の患者の気分
東京都	心配な副作用が出たらいつでも問い合わせるように。勝手にやめないように。
東京都	合併症の有無。内服時の注意点
東京都	毎日服用。飲み忘れないよう
東京都	喫煙の有無と悪性細胞のチェック
東京都	喫煙。肝機能
東京都	副作用。飲み忘れ
東京都	タバコ、体重、年齢、既往症による静脈血栓

東京都	確実に服用できる人かどうかの判断。血栓症のリスクが高くないか。
東京都	喫煙を中止させる。定期チェックを勧める
東京都	飲み忘れと副作用について
東京都	飲みわすれの対処について
東京都	とにかく飲み忘れがないこと。コンドームも併用すること
東京都	飲み方を正確に。飲み忘れ対処。急性の副作用の症状とその対処法
東京都	35歳以上には、喫煙、高脂血しょう、血圧。10代20代には服用方法間違えないように、飲み忘れないように。子宮がん検査、乳がん検査
東京都	服用が正しく行われているか否か。飲み忘れなどの電話相談
東京都	副作用について。副効用について伝える
東京都	乳がん、子宮がん、血圧、コレステロール、たばこ
東京都	PMS患者には1相性を、飲みわすれそうな患者には28日タイプを出している
東京都	年齢、体格、体質、合併症の有無
東京都	副作用の説明。妊娠していない事の確認。服薬中の問診をまめに、場合により休薬を勧める
東京都	血圧のチェック
東京都	飲みわすれしないよう。病気感染の予防にはならない
東京都	肝機能、喫煙、内服状況の把握、定期検査、年齢により中止勧告
東京都	副作用の確認。血圧のチェック
東京都	喫煙、高血圧、高脂血症。定期的な細胞診
東京都	OCのメリットデメリットを説明。
東京都	問診を重視し、血圧測定を必須とする。喫煙に対して厳しい。服用禁忌に該当しても、妊婦は回避できないので、何とかしてピルを使うことができないかと議論を重ねている。必要に応じて受診回数を増やすこともある。抗てんかん薬を使用している場合には中用量ピルに変更することもある。
東京都	服用忘れ
東京都	性病について
東京都	子宮癌検診、性感染症
東京都	血圧、体重、子宮がん、乳がん、性感染症、飲み忘れた時の対応、副作用についての説明
東京都	副効用の説明
東京都	副作用
東京都	乳がん及び子宮がん検査を1年に1回受けること
東京都	STIの検査（頸がん検査を含めて）
東京都	内診、血液検査、尿検査

東京都	血栓、血圧
東京都	タバコの本数。血圧、片頭痛の有無など
東京都	妊娠希望が現時点ない女性すべてに処方を勧める
東京都	リスクの説明。きちんと飲むように
東京都	妊娠率。コンドーム併用。子宮頸がんのスクリーニングの必要性。
東京都	OC への患者の不安感をなくす
東京都	STD 感染に注意する
東京都	正しい服用方法、諸検査
東京都	服用忘れ
東京都	喫煙、肥満、高血圧、年齢
東京都	血圧、STD
東京都	副作用の有無。喫煙の有無
東京都	高齢、肥満など血栓症ハイリスク患者の選別・指導
東京都	規則正しく飲むよう
東京都	飲み忘れ。異常あった場合すぐ連絡
東京都	長期間の使用
東京都	副作用のこと。タバコひかえること
東京都	副作用について説明。定期的に検査を受けるようすすめる
東京都	STD、定期的な癌検診、血栓症の把握
東京都	血栓症の既往。喫煙の有無。糖尿病、高血圧、肥満の合併症がないか
東京都	年齢、たばこ
東京都	STD について関心をもってもらう
東京都	乳がん、血液の異常、肝機能
東京都	禁煙するように
東京都	体重、血圧、出血の持続期間、副作用の有無
神奈川県	定期的内服
神奈川県	内服の忘れによる出血など
神奈川県	体重、喫煙の有無。服用開始のタイミング。飲み忘れの対応
神奈川県	副作用のチェック
神奈川県	症状により処方を変える。飲み方の注意をよく説明して理解してもらう。押し付けない。
神奈川県	使用に関するガイドラインの順守。ドロップアウトしないためのサポート。効用がたくさんある事を知らせる。
神奈川県	患者自身が OC をどの程度望んでいるのか
神奈川県	タバコ、体重、血圧、尿、糖、帯下

神奈川県	血圧、体重、脱水に注意することを伝える
神奈川県	血栓症のリスク増大。ホルモン依存性腫瘍。服用忘れ時の対処
神奈川県	喫煙者、35歳以下でも極力禁煙を勧める。服用時間の厳守
神奈川県	定期的検診
神奈川県	飲み間違い（スケジュールの誤解など）の防止。併用薬剤の確認。血管疾患などの有無
神奈川県	定期健診、嘔気などの注意
神奈川県	性感染症のチェック。説明をよく聞いて注意事項をしっかり守れる人に限る
神奈川県	禁煙、飲み忘れ指導
神奈川県	服用方法、喫煙の中止
神奈川県	強制にならないよう注意しています
神奈川県	血栓症
神奈川県	子宮筋腫、卵巣腫瘍、たばこ
神奈川県	乳がん検査、子宮がん検診
神奈川県	タバコの服用中止。血圧、体重、検尿は毎回。年に1、2回採血チェック
新潟県	年齢、たばこ、肥満度、子宮の大きさ
新潟県	血栓など重篤な副作用。月経困難症の改善や月経量の減少などの副効果もあるとの説明を十分に行っている
新潟県	合併症、禁忌症例の確認
新潟県	産婦人科医会で配布されたアンケート用紙に記入してもらい、喫煙、既往症などにとくに注意を払う。
新潟県	飲み忘れ。定期的なチェック
富山県	性感染症、癌検診、たばこ
富山県	副作用は少ないことを話す。
富山県	リスクベネフィットの説明。マイナートラブルのフォローアップを十分に。
石川県	飲み忘れ
石川県	服用忘れないよう
石川県	飲み忘れ、副作用
石川県	タバコ、アルコール
石川県	指示通りに服用しているかどうか
石川県	服用方法、喫煙
石川県	血圧、喫煙
石川県	服用方法
福井県	副作用についても話す。副作用を必要以上に強調しない。
福井県	飲み忘れ注意

福井県	服用時間の工夫
福井県	飲み忘れ
福井県	血液疾患・心疾患
福井県	服用法の指導
山梨県	服用方法、副作用
山梨県	OC服用時の一般的な注意を守ること
山梨県	副作用
山梨県	毎日必ず服用すること
山梨県	タバコを吸う人に対する厳重指導
長野県	副作用、副効用をきちんと説明するようにしている。服用希望者をみて検査等をこちらから勧めている。
長野県	禁忌のチェック。定期的な肝機能検査
長野県	高度肥満、高血圧、喫煙、血栓症のリスク、飲み忘れの対処法
長野県	服用忘れ。
長野県	服用し忘れないよう
長野県	乳がん、子宮がん、頸癌、STD
長野県	凝固系の異常が出る可能性ある為に6か月毎に肝機能とDTとAPTT測定をすることを理解してもらう。
長野県	高血圧など血液関連疾患、乳がん、子宮疾患、感染症の有無
長野県	喫煙、高血圧、肥満の人には処方しない
長野県	禁忌事項のチェック
岐阜県	喫煙との関係
岐阜県	副作用
岐阜県	ピルの副作用。ピルの飲み方
岐阜県	OCの効果と副作用の理解
岐阜県	血液検査を年2~3回おこなう
岐阜県	OCのみ忘れの場合の説明。副作用の説明。血圧。既往歴チェック
静岡県	既往T(肝胃)、タバコ、血圧(これは毎回測定)です。
静岡県	喫煙、飲み忘れない様
静岡県	タバコの影響。乳がんの発生頻度
静岡県	服用を忘れる女性が多いので、十分に注意を促しています。
静岡県	血圧のチェック
静岡県	飲み忘れに注意
静岡県	体重、血圧、喫煙の有無、マイナートラブルの説明
静岡県	正しい服薬

静岡県	飲み忘れ。タバコの服用。体調不良の際の対応
静岡県	肝臓障害、たばこ服用中の人
静岡県	ガイドライン
静岡県	服用開始初めての場合は服用説明を十分に行い、必ず問診票を作成。OC服用者の記録をし、定期的な検査を勧める（半年後毎→肝機能をチェック、1年毎→卵巣のチェック、子宮頸部がん検査）
静岡県	禁忌の確認。年齢。肥満。喫煙
静岡県	副作用を見落とさない事
静岡県	体重、定期的な肝機能検査・血液検査・乳がん検診・子宮がん検診
静岡県	生理を必ずチェックする。飲み忘れないうよう
静岡県	服用忘れに注意
静岡県	飲み忘れがないよう
静岡県	飲み忘れぬよう。STDには注意すること
愛知県	飲み忘れ、途中の出血
愛知県	肥満、高脂血しょう、高血圧、喫煙者
愛知県	メリットを強調。
愛知県	何か変わったことはないか、訴えなどをよく問診する。副作用のこと。
愛知県	喫煙、毎日確実な服用、半年ごとの検査
愛知県	副作用の詳しい説明。STDの予防について
愛知県	服用忘れしないよう
愛知県	禁煙、飲み忘れ、副作用について説明
愛知県	正確に服用すること。飲み忘れの対応。長期投与に対しては服用が不確実になるので2か月以上の投与はしない
愛知県	飲み忘れ、節煙
愛知県	肝機能障害、合併症ないこと、STDに注意すること
愛知県	タバコ、血圧
愛知県	不必要な検査はせず、低額で提供する
愛知県	本人が納得して服やくすること。心配や失敗があれば電話ください。
愛知県	継続服用しやすいこと。副作用。
愛知県	糖尿病をはじめ代謝病、過凝固家系、子宮内膜異常、
愛知県	説明をきちんとする。定期検査をする
愛知県	飲み忘れ。性感染症
愛知県	喫煙している人への対応。やめるべきであると念入りに説明
愛知県	喫煙、年一回の乳がん、子宮がん検診、年齢、
愛知県	服用方法

三重県	年齢、肥満、喫煙、家族歴、性病は防げないという説明
三重県	飲み忘れ
三重県	副作用が少ないことを説明します。
三重県	血圧、喫煙、片頭痛、年齢、副効用の説明
三重県	副作用
三重県	血圧、たばこ、飲み忘れ
滋賀県	タバコ
滋賀県	禁煙減煙
滋賀県	メリットデメリットの説明
京都府	タバコとの併用への注意。年齢、血圧など
京都府	気になることが発生したときに必ず連絡させる
京都府	血圧、乳癌リスク
京都府	毎日の服用。血圧測定。効果と副作用。子宮頸がん検診
京都府	OCよりミレーナに切り変えている
京都府	塞栓症
京都府	悪心などの副作用
京都府	血圧
京都府	STI を考慮
大阪府	初診時の説明に力を入れている。
大阪府	OC の電話相談を受けて、心配や不安の軽減に努めている
大阪府	服用の方法についてよく説明する。性病予防についてもよく説明する
大阪府	凝固系病進の有無。喫煙の有無
大阪府	副作用の軽減
大阪府	年齢、たばこ
大阪府	服用忘れのないように指導
大阪府	服用の忘れがないよう指示している
大阪府	目的別に使い分けること
大阪府	STI の予防の必要性
大阪府	飲み忘れをしないこと。服用時間を正しく守る。飲み間違いをしないよう。
大阪府	月経異常が時にある事を説明する。禁煙指導も
大阪府	定期的な血液検査
大阪府	出血のこと。同じ時間に服用すること。飲み忘れ。
大阪府	出血、飲み忘れ、電話での連絡。年1回の婦人科検診の約束
大阪府	副作用の説明。血圧測定
大阪府	副作用、性病、悪声疾患

大阪府	血圧、年齢、たばこ
大阪府	服用中の出血。服用間違い
大阪府	ガイドライン参照
大阪府	副作用
大阪府	喫煙、高血圧、きちんと服用できるか
大阪府	喫煙、年齢、血栓症の有無
大阪府	副作用についてチェックすること
大阪府	服用の仕方
大阪府	避妊、月経随伴症状の改善、月経調節、卵巣癌予防の話
大阪府	血栓症傾向の把握。肝機能。タバコの本数。血圧
大阪府	導入時の説明（20分ほどかけている）
大阪府	血栓ができてないか心配で、呼吸困難や足の痛みなどがあれば必ず受診させる
大阪府	頸癌、肝機能
大阪府	コストを低く抑える。血液検査も、健康診断などをできるだけ使用する
大阪府	STDの注意
大阪府	飲み忘れに対する対応。患者の性格と体型
大阪府	処方通り服用してもらえらること。禁煙
大阪府	飲み忘れをなくす
大阪府	出血、価格
大阪府	副作用
大阪府	STDの検査と予防教育。禁煙指導
大阪府	服用不適格者への処方を避けること
大阪府	副作用の発現が出そうな患者かどうか注意する
大阪府	副作用、たばこ
大阪府	血栓症などの副作用の説明
大阪府	服用を忘れない事。
大阪府	血圧。血栓症を疑う症状がないか
大阪府	副作用の有無
大阪府	途中出血があること。OCの作用とその効果
大阪府	飲み忘れないことの指導
大阪府	タバコ、高血圧、子宮腫瘍、性感染症
兵庫県	血圧、尿検査、採血
兵庫県	血圧測定以外の不必要な検査はいっさいしない
兵庫県	飲み忘れないよう指導。体調不良、無排卵の月経

兵庫県	STD について
兵庫県	血圧、尿糖、肝機能検査、トリグリセライド、HDL、LDL コレステロール、CRP
兵庫県	禁忌、慎重投与を留意
兵庫県	血栓症のリスク
兵庫県	血栓症。喫煙
兵庫県	定期服用、年齢、副作用、たばこ
兵庫県	血栓症の既往、家族歴など。不正出血の有無
兵庫県	飲み忘れがないよう注意している
兵庫県	服用方法、飲み忘れの対応、出血の対応、定期検診
兵庫県	副作用があれば早めに連絡を
兵庫県	STO、癌検診、凝固異常、喫煙の有無などをチェックする
兵庫県	副作用の出現
兵庫県	薬理作用を理解してもらう
兵庫県	飲み忘れ、初期の嘔気などの副作用を伝える、OC とコンドームの併用
兵庫県	年齢、既往歴、血圧
兵庫県	血栓や癌の発症
兵庫県	服用忘れをしないよう
兵庫県	月経初日から服用開始。途中出血あっても服用し続ける。出血が2週間以上続けば1ヶ月間用量ピルを併用している。
兵庫県	STD と混同しないよう。服用忘れ防止。がん検査の必要性指導
兵庫県	タバコ、血圧
兵庫県	効果、副作用の有無、管理について
兵庫県	妊娠の有無。子宮がん、子宮筋腫、卵巣腫等の有無。肝機能等のチェック
兵庫県	服用忘れとその時の対処
兵庫県	タバコ、子宮がん
奈良県	毎日ちゃんと服用すること
奈良県	避妊目的か副効用目的かによる使い分け
奈良県	副作用の少なさ
奈良県	安全性の説明。
奈良県	服用中の不正出血
和歌山県	不正出血
和歌山県	血栓症・定期検査・血圧・体重
和歌山県	タバコ、合併症
和歌山県	不正出血の有無
和歌山県	年1回の婦人科検診と乳がん検診

鳥取県	飲み忘れ、高脂血しょうの有無、たばこ
鳥取県	既往歴を確認。内服わすれないよう
鳥取県	喫煙、服用方法の徹底
島根県	喫煙の有無。自己免疫疾患。肥満。肝疾患
島根県	継続内服しやすいもの
島根県	症状に合わせて製品を選択している
島根県	下痢嘔吐飲み忘れ気をつけるよう。血圧、たばこ、体重、肝疾患の有無
岡山県	十分な説明と質問や相談に乗ってあげられる体制
岡山県	飲み忘れ防止に関する注意
岡山県	タバコ
岡山県	タバコ、血圧のチェック
岡山県	タバコ、肥満
岡山県	ホルモンの働き、排卵のメカニズムを正しく伝える。
岡山県	飲み忘れないよう。忘れた場合の対処
岡山県	血栓症を思わす症状の有無。月経が来ているか
岡山県	処方条件の十分なチェック（喫煙、基礎疾患など）
岡山県	本人の理解度を確認。何かあったら早く連絡するよう
岡山県	飲みわすれしないように
岡山県	タバコ、BMI、高血圧
岡山県	喫煙者に対し、禁煙指導
岡山県	服用する時間。胃痛・嘔吐することあり。
広島県	リスク、ベネフィットを理解させる
広島県	年齢、喫煙、糖尿病、血栓
広島県	1年一度の婦人科検診。半年一度の採血検査。血圧
広島県	飲み忘れ。出血
広島県	副作用
広島県	飲み忘れのないよう
広島県	喫煙、血栓症の既往
広島県	緊急避妊としては使えないこと。内膜症や筋腫の薬ではない事を伝える。HRTとして用いないように伝える。
広島県	嘔気・嘔吐についての説明。服用忘れ
広島県	飲み間違いがないように
広島県	尿検査、体重、血圧、性感染症、子宮がん検診
広島県	定期的な検診
広島県	定期検査の指導

広島県	マイナートラブルがあれば何時でも対応できることを伝える
広島県	服用開始と服用方法についてよく説明する
山口県	定期的に血液の検査をすること。きちんと飲まないとは避妊の効果はないこと。性病予防にはコンドームが必要なこと
山口県	子宮がん検診、乳がん検診、基本健診、喫煙、年齢、定期的な診察
山口県	副作用について説明
山口県	出血、正確な服用
山口県	服用方法について。作用の発現機序。副作用
山口県	服用方法の説明。不明時には連絡をするよう
山口県	禁忌の確認。飲み忘れについての説明
徳島県	喫煙。血圧。仕事
徳島県	低用量だからきちんと服用するように
徳島県	禁煙指導
香川県	STDを予防できないので、STDが心配な場合はコンドームの使用を説明している
香川県	禁忌のチェック、飲み忘れ、STDの注意
香川県	喫煙の有無。内服に対するコンプライアンスの遵守
愛媛県	1年に1回は子宮がん検査をする。乳がん血栓症に注意する
愛媛県	合併症（特に血栓症、肝炎）がないか。子宮頸がん、乳がんの検診と6か月毎の肝機能検査。飲み忘れと内服時間のズレに注意させる。
愛媛県	初回投与時に必ずチェックシートに記入。STDについて
愛媛県	タバコ、PHを聞くこと
愛媛県	喫煙の有無
愛媛県	副作用の問題
愛媛県	禁煙
高知県	コンプライアンス
高知県	ニキビがきになる人やアスリートには一相性を処方している
高知県	不正出血についての説明
高知県	年1-2回の子宮がん検査、肝機能検査など一般血液検査は必ず施行していただくこと。飲み忘れをしないこと。出血が中等量つづくときは中用量に切り替える
高知県	個人個人にレディーメードの説明（性格などにより異なる）
福岡県	喫煙、肝機能、血圧、乳がん
福岡県	確実な服用
福岡県	喫煙の有無など、リスクに関して