

福岡県	特になし
福岡県	飲み忘れに注意、不正出血がつづいても処方をつづけていくこと
福岡県	服用の仕方の注意
福岡県	喫煙
福岡県	禁煙、血圧
福岡県	副作用のこと
福岡県	先ず確実な避妊が行えること。月経発来日をご希望どおりに調整する。
福岡県	喫煙。頭痛有無
福岡県	血圧
福岡県	毎日同じ時間に服用するように。飲み忘れや服用時間がずれた場合電話するように
福岡県	その女性のライフスタイルにあったものを選ぶことや、月経随伴症状に適したものを選ぶこと
福岡県	開始時期の確認、服用方法の確認、喫煙・体重管理
福岡県	副作用の説明
福岡県	問診、血圧、体重
福岡県	性格がルーズでないこと。月経調整の頻度でOCの種類を選択
福岡県	子宮頸がん細胞診、STD
福岡県	副作用の説明
福岡県	喫煙、血栓の注意
福岡県	肥満とタバコの有無
福岡県	特になし
福岡県	血圧、体重、たばこ
福岡県	飲み違いのないように（飲み忘れを含んで）
福岡県	定期的な検診を行っている
福岡県	子宮がん検査、乳房がんの検査をルーチンに1回/年を指示
福岡県	飲み忘れぬよう
福岡県	喫煙、前兆ありの片頭痛の有無は確実にチェックしています。月経痛、月経過多、PMSの人は、避妊の必要がなくても勧めています。若年者で腺筋症の疑い、筋腫のある人は、積極的に勧めます。
福岡県	飲み忘れと子供の誤飲
福岡県	経膈超音波による検査。肝疾患。タバコの有無。出血傾向。STD
福岡県	服用忘れ、途中での出血
福岡県	プロゲステロン活性アンドロゲン活性を注意し、体重増加を主に、その他煙草の喫煙の有無、DMの有無

福岡県	患者の疑問には十分説明する
福岡県	時々出血があることをムンテラ
福岡県	最初3-4ヶ月月経のきれがわるい旨。不正出血しても飲みやめないよう指示しています
佐賀県	服用の仕方。副作用
佐賀県	とにかく3か月以上飲み続けること
佐賀県	飲み忘れないようにすること
長崎県	3か月トライアル、継続するかどうか相談
長崎県	副作用
長崎県	長期投与の際のルーチン検査
長崎県	正しく服用しているかどうか。副作用の有無
長崎県	服用開始日、規則的服用の遵守。中用量からのきりかえ。(中用量に慣れ親しんだPtも多く、服用中出血や服用後無月経のトラブルもある)
長崎県	1年に1回必ず問診チェックと血圧測定
長崎県	飲み忘れに注意
長崎県	飲み忘れ
熊本県	問診チェックリストの確認。定期的な検査。患者の薬についての理解
熊本県	35歳以上のヘビースモーカー、妊娠中あるいは妊娠の可能性のある人、血栓症、心臓、肝、腎に病気のある方
熊本県	副作用、定期的なチェック
熊本県	半年ごとに定期健診を受けるように呼びかけている
熊本県	飲み忘れないことを注意する。STDの予防はコンドームしかないことを強調する
熊本県	肝機能、血栓症、子宮がん、乳がん
熊本県	不正出血の有無
熊本県	1年に1回の子宮がん検診、乳がん検診を勧める。まとめて処方しない
熊本県	飲み忘れ防止。年1回のスメア検査、性感染症検査
熊本県	飲み忘れ
大分県	自分で決定していく意識を持つこと。副効用をアピールすることで、友人にも勧める、仕事をしていく上で良い、QOLが向上する。副作用については何かあればすぐに相談すること
大分県	喫煙、家族の血栓症の有無、体重増加など
大分県	服用忘れの有無。頭痛、胸部痛の有無。血液検査(血液学、生理学)。乳がん(超音波、マンモ)。子宮がん検診。
大分県	タバコによる血栓症

大分県	問診、血圧測定を必ず行う。タバコは禁煙、節煙。効用の説明を十分に行う。
大分県	性感染症への留意。血栓症・喫煙。
大分県	服用忘れ、副作用検査の必要性について詳細に説明している。内服方法にまよった場合は必ず電話して指示を仰ぐように指導している
大分県	詳細な問診と血圧、体重測定。婦人科全般に渡る健康管理
大分県	飲み忘れ、嘔気、嘔吐
宮崎県	タバコの使用、静脈瘤の有無、血圧
宮崎県	初診時、妊娠の可能性についての質問。心血管系疾患の有無。乳がん、子宮がんについての問診。
宮崎県	年に1回の癌検診、子宮筋腫
宮崎県	内服時間を守る。飲みわすれの注意など
宮崎県	副作用、飲みわすれの対処、禁忌
宮崎県	喫煙、血圧
宮崎県	婦人科検診をうけること
宮崎県	飲み方の注意
宮崎県	喫煙の有無。年齢。合併症の有無
宮崎県	既往歴、高血圧の有無、喫煙の有無
宮崎県	喫煙の有無。既往歴
鹿児島県	喫煙、年齢、DMや高脂血症。加えて処方を受ける目的。
鹿児島県	タバコ
鹿児島県	禁忌の合併症
鹿児島県	血圧、喫煙
鹿児島県	飲む時間厳守
鹿児島県	事前の問診と説明
沖縄県	服用忘れ予防に、日曜日からの服用。曜日がカレンダー通りになる。したがって、左側はいつも日曜日になる。新しいシート(次の)も日曜日からになる。
沖縄県	タバコの使用だめ
沖縄県	使用上の注意を必ず説明
沖縄県	内服忘れの際の注意。年一回のSmear、乳房検診を推奨。気楽に電話でも構わないので相談をと言いつ添えている。頭痛などがあれば、脳外科受診を勧めている。
沖縄県	正確な服用方法の徹底。副作用のチェック
沖縄県	血栓症。月経困難症、過多月経、副作用コントロールが必要な場合は1相性のOCを投与

緊急避妊ピル（EC）処方の際に留意していること

北海道	緊急避妊不成功の場合の再受診をしてもらうこと
北海道	胃薬を同時に服用させている
北海道	避妊効果が不確実であること。今後OCに移行するように。
北海道	嘔気、避妊率
北海道	服用後の避妊。吐気が出るかもしれない
北海道	避妊が未確実なことを伝える
北海道	服用方法
北海道	3週間以内に月経なしであれば、再診の事
北海道	内服方法の誤認
北海道	必ず12時間後に内服すること。嘔吐対策
北海道	繰り返しアフターピルを取りに来る人にはOCを勧める
北海道	次回月経をチェック。悪心嘔吐、下痢の有無を確認。排卵期の確認。100%の効果ではない。性感染症の予防について注意。
北海道	服用後の避妊
北海道	普段からOCを使うよう
北海道	確実に内服したか。月経後の再受診を約束させること
青森県	飲み忘れと嘔吐、月経発来時期
青森県	緊急避妊をきっかけにOC服用やSTD検査を受けることを勧める
青森県	服用時間のこと、確実な避妊として低用量ピルを今後服用するように勧めている
青森県	避妊、低用量ピル、STDについて
岩手県	今後の避妊指導
岩手県	確実な避妊
岩手県	100%ではないことの説明。より確実な避妊法を持つことの説明
岩手県	基本的に当院は処方をお断りしています。
岩手県	今回限りにしなさいと話している
岩手県	あくまで、緊急であることの理解
宮城県	服用時間
宮城県	避妊効果100%ではない。服用後3週間たっても月経ない場合必ず受診
宮城県	正確に内服のこと。100%有効ではないと話す
宮城県	妊娠率。副作用。避妊指導
宮城県	ECピルの仕組み、その失敗率、今後OC勧める
宮城県	説明文を渡している。低用量ピルを必ず勧めている

宮城県	内服方法、消退出血の確認、その後の避妊（OC等）
宮城県	内服方法、副作用の説明
宮城県	内服開始時間の指導および、出血後の受診を勧めること
宮城県	処方後の性交の注意。出血の有無
宮城県	嘔吐。その後の避妊（OC）
宮城県	失敗することがありうること。場合によってはその後排卵がおこることがあるので近ドームで必ず避妊をすることを話す
宮城県	妊娠する可能性もあること。嘔吐時
宮城県	嘔吐しないよう
秋田県	周期の何日目か、排卵との関係。服用方法。嘔気嘔吐
秋田県	吐き気
秋田県	正しい服薬指導
秋田県	① OCをすすめる ②避妊器具の使用方法を教示する
秋田県	服用後の嘔吐時の対応
秋田県	飲み忘れ
山形県	性交後の時間（すでに妊娠している場合もあるので）など、前後の状況。嘔吐に対する注意
山形県	100%の効果は期待できないことを十分に説明する
山形県	BBT測定し2,3週後の受診を提示している
山形県	100%こうかがあるわけではない事の説明。胃腸障害などが起こる可能性についての説明。生理がない場合に必ず受診すること及び服用後生理が来ない間は性交の禁止。
山形県	服用後の新しい妊娠に気をつけること
福島県	失敗することもある事（2週間以上無月経のときは必ず受診するよう説明）、副作用（気分不快等）
福島県	ECのあとはOCにつなげること
福島県	嘔吐、確実な避妊ではない
福島県	副作用。避妊指導
福島県	100%成功とは限らない。今後OCを勧める。ECとOCの両者の説明文（当クリニック作成）を渡している
福島県	かならず指導通りに服用すること
福島県	妊娠
福島県	これを機に、完全避妊指導（主にOC処方）している
福島県	症例によっては小児用パファリンを併用する
茨城県	1）妊娠阻害率91～98%であること 2）破綻出血までは他の避妊法を併用

	すること 3) 3週間後に月経ない時は必ず来院すること
茨城県	同意書をとること
茨城県	この飲み方で100%有効でないので、異常があれば必ず診察を受けるか、相談をするように指導
茨城県	服用方法の指導
茨城県	緊急避妊ピルを内服すれば、簡単に避妊ができるという考えを、もたないように説明しています。また、100%避妊はできない。→今はピルの内服をすすめています。
茨城県	効果が100%ではないこと
茨城県	その後低用量ピルを勧める。ただ、最近何回も取りに来る方や、ECがあるからその度飲めば大丈夫と考える風潮があるような気がする。
茨城県	① 嘔吐しないように ②内服開始時間(12時間後が変な時間にならないように)
栃木県	飲み間違いないよう
栃木県	服用時間、副作用の説明
栃木県	吐き気対策。今後の避妊にOC勧める
栃木県	100%の効果があるわけではない。副作用がおこることがあること。OCを勧める
栃木県	失敗例もある事を話す。
栃木県	95-97%妊娠しない、服用後10-12時間して吐いたと電話する女性あり食べ過ぎないこと、低用量ピル服用のすすめ
栃木県	避妊効果が100%でない旨説明する
栃木県	次からのきちんとした避妊をうながしている
栃木県	不確実性
群馬県	服用時間の調節
群馬県	膣洗をしている
群馬県	HPVの話に合わせて行う
群馬県	内服後2週間の避妊
群馬県	不確実性を伝える
群馬県	服用法。完全には避妊できるわけではない
群馬県	消退出血があることがあると話す
群馬県	OCを使った避妊を勧める
群馬県	子宮、卵巣を確認してから処方
群馬県	避妊率の説明。副作用。指示された服用方法を守る。出血後の報告に必ず来院。自費であるために上記費用が必要

群馬県	先行妊娠の否定。内服後の避妊指導
埼玉県	嘔吐した際の追加処方も出している。低用量ピルを勧めている
埼玉県	OCを勧める
埼玉県	飲み忘れ。内服後の避妊をしっかり
埼玉県	確実に避妊ができるのか心配している
埼玉県	副作用。妊娠の可能性
埼玉県	服用日は禁煙すること。次回からの避妊
埼玉県	嘔吐時の対応
埼玉県	JFPAの資料を示しながら説明を行っている
埼玉県	確率の説明。副作用
埼玉県	飲み方の指導
埼玉県	日本家族計画協会から送付された同意書およびリーフレットに沿って説明している。あくまで緊急的な対応であることを話す。
埼玉県	服用後の出血の有無の確認。服用時の嘔吐、下痢。
埼玉県	服用方法の徹底。副作用の説明
千葉県	確実な避妊に移行するよう話してはいますが、再来情報を把握できません
千葉県	不確実性を伴うこと。月経不順をひきおこすこと
千葉県	悪心、嘔吐についての説明。完全な避妊法でない。同一周期での失敗を繰り返さない事。妊娠時でも催奇性がないことの説明。今後はOCをすすめる
千葉県	100%避妊できるわけではない事を説明。次回の生理時に出血が長引く又は周期の乱れとなる事を説明
千葉県	副作用。100%ではないこと
千葉県	避妊率について説明
千葉県	100%の避妊は得られない事を説明
千葉県	続けてOCを服用させること。避妊指導
千葉県	副作用の説明
千葉県	100%避妊できないこと。服用後の出血
千葉県	あてにしないよう話す
千葉県	性交72時間以内かどうか。
千葉県	ECを月経周期のいつの時期に処方したか
千葉県	消退出血の確認。OCへの移行
千葉県	失敗率。妊娠可能性あり。
千葉県	服用の仕方
東京都	72時間以内に服用開始する
東京都	次回の性交についての指導。嘔吐した場合について

東京都	服用時間の問題
東京都	100%の効果ではないこと。出血、消化器症状
東京都	OCに移行するよう勧めている
東京都	出血の確認
東京都	異所妊娠も心にとめておくように。必ず2週間後に再来すること
東京都	服用時間の厳守。OCなどの避妊について説明
東京都	以前はプラノバルでしたが、マーペロンにしてその後なるべくOC服用してもらおうと思っている。
東京都	OC服用を考えてもらう
東京都	服用後の嘔吐、避妊の確率
東京都	100%効果はないと強調
東京都	喫煙
東京都	72時間以内であること。生理予定日に来ない場合は必ず来院。100%避妊できるわけではないことを話す。
東京都	避妊率、副作用の説明
東京都	現症と既往歴のチェック。失敗することもあること。OCの服用を勧める
東京都	避妊効果が100%ではないことの説明
東京都	出血があること。気持ちが悪くなることがあるということ
東京都	嘔気嘔吐の有無
東京都	副作用についての説明
東京都	副作用の嘔気について。避妊率について。
東京都	次回月経ない場合の注意
東京都	月経周期のチェック。次回月経発来の確認
東京都	前回月経の次期。効果が70～75%であること。その後の避妊指導のタイミング。
東京都	副作用。無効の場合
東京都	嘔気嘔吐による服用不全
東京都	月経周期と通常の避妊方法の説明
東京都	OCを勧める。飲み方、副作用をきちんと話す
東京都	副作用と、妊娠の可能性があることの説明
東京都	MAP服用直後に、次の妊娠のチャンスを作ってしまう人がいるので、注意を促している
東京都	失敗することもあること。安易な気持ちで続けないこと。
東京都	時間を正確に。嘔吐のケア。確実な避妊法ではないこと。
東京都	100%の効果はない。月経の発来を確認。OCの使用を勧める

東京都	リーフレットを渡す。服用の時間を徹底させる。OCの説明を付け加える
東京都	避妊を理解・実行すること。感染症
東京都	効果・副作用について理解してもらうように説明する。OCのメリットを説明する
東京都	すでに妊娠していないか。排卵の前後の確かめる
東京都	本人に希望があるかの確認。100%の効果でないことの説明。次回月経までの避妊注意
東京都	OCの使用を勧める
東京都	複数回来院する人には、定期的にピルを服用する事をすすめる
東京都	繰り返さないよう注意。避妊方法を指導
東京都	不完全な妊娠であり、OCへの移行が必要なことを説明
東京都	タバコ使用有無と失敗した時点の月経周期は何日目か。
東京都	100%ではないこと。今後の避妊にOCを勧める
東京都	ECからOCへ。ECはあくまでもきっかけであって目的ではない。ECを契機に女性が主体的に取り組むことのできる確実な避妊法への変更を迫っている。
東京都	12時間後の服用について
東京都	出血の確認
東京都	妊娠する可能性について
東京都	効果は100%ではない。子宮外妊娠の原因になることがある。OCを勧める
東京都	OCへの移行を勧める
東京都	不成功例の有無
東京都	100%でないこと。自分の周期より1週間遅ければ自分で検査する。反応が出れば受診する
東京都	次回からの避妊の指導
東京都	確実な避妊法（OC）を勧める
東京都	服用直後からも避妊するよう指導。
東京都	嘔吐対策。時間をきちんと守る。
東京都	内服後2時間以内の嘔吐を避けるため、空腹をさけて何か食べて飲むことなど。飲む時間を守ること
東京都	緊急避妊を要する＝低用量ピルの適応と考えるので、必ず継続服用をすすめます。
東京都	通常の避妊には使えない事を説明。今後の避妊指導
東京都	失敗率。月経発来までの日数。
東京都	服用しても3週間後に妊娠反応を行うように指導。OCを勧める

東京都	処方日の月経周日、性交後の時間、服用法、避妊率の説明
東京都	月経周期。性交後経過時間
東京都	100%ではないということを強調
東京都	必ず再診に来るように指導している
東京都	避妊法が失敗することがあることの説明
東京都	Echo 検査
東京都	繰り返し来る人にはOCを勧める
東京都	失敗があること
東京都	吐き気をいかにおさえるか
東京都	必ず本人であることを確認。副作用の説明。今後の避妊指導（OCの勧め）
東京都	感染症の検査、確実な避妊への移行、コンドームの正しい使用方法の練習
東京都	100%の避妊ができない事。嘔気、嘔吐
東京都	出来るだけ内診、エコー、
東京都	今後の避妊指導
東京都	次回月経の確認。OCを勧める
東京都	100%ではない
神奈川県	100%の避妊ではない事
神奈川県	出血についての説明と100%効果はないことの説明
神奈川県	現在の妊娠の有無。避妊実施の確認
神奈川県	100%避妊できるわけではない事を告知する
神奈川県	金額にあまりにもばらつきがおおい
神奈川県	避妊の重要性。OCを勧める
神奈川県	完全ではない事。悪心・嘔吐が高率にみられる。OC, IUCをすすめる
神奈川県	服用後の注意点を説明
神奈川県	正確な服用。副作用の説明。性病について説明。タバコの有害性の説明。
神奈川県	血栓症その他のリスク増大を説明。飲水を勧める。そのあとのSTD
神奈川県	2回目の服用時間を考慮し、少量の食べ物と共に服用し2時間以内に嘔吐なきよう初回服用時に注意する。服用後21日以後になっても出血を見ないとき、要受診を伝える。
神奈川県	OCの推薦
神奈川県	排卵日に相当しているかどうか。（排卵日の5日以上前に希望して来るケースが多い）
神奈川県	嘔気、100%成功とは限らない
神奈川県	100%の成功率でないこと。次の妊娠に対する備えをすること
神奈川県	100%の避妊法ではない。今後OCに移行するように。

神奈川県	低用量ピルを勧めるようにしております。(ドオルトンもプラノバールも入手できなくなり大変困っています。
神奈川県	避妊の失敗率を含め、十分な説明と同意書を記載してもらう
新潟県	服用後 21 日経過しても月経がない場合は必ず受診すること
新潟県	妊娠の有無
富山県	① 2 時間後の内服、その後の妊娠の有無チェック、OC への移行
富山県	嘔気対策。月経様出血の有無にかかわらず妊娠反応検査を 2W 後に。OC への移行を勧める
石川県	月経発来しない時は必ず妊娠反応をみるか、来院する。月経発来まではかならずコンドームを使うこと
石川県	日常の避妊指導。自己責任での使用ということを理解させること。生理来なければまた来院すること。
石川県	嘔気、嘔吐の副作用をできるだけ抑えるように工夫
石川県	避妊成功したか否か
石川県	指示どおりに服用されているかどうか
石川県	服用方法、成功、失敗率、性交後経過時間
石川県	妊娠の可能性、副作用、次の生理までの性行為、次回生理までの期間を徹底して伝える
石川県	今後の避妊について
福井県	避妊率 100%ではないことをはなす。
福井県	100%の避妊ではないと患者に念を押す
福井県	服用の出血について
福井県	100%の避妊法でないこと。より確実な避妊を説明
山梨県	避妊効果 100%でないことの確認
山梨県	100%の避妊でないこと。
山梨県	避妊率が 100%でないこと
山梨県	きちんと服用。嘔吐した場合の対応
山梨県	すでに妊娠が成立していないか。
長野県	低用量ピルへの手術をうながす。性感染症についても説明し、近ドームの使用も勧める。
長野県	100%ではないということ。OC への移行
長野県	嘔吐してしまった場合の対応、OC への移行を勧める
長野県	時間、同周期の回数
長野県	確実性について
長野県	今回の性交以外で妊娠していないか。きちんと整理を確認しているか。

長野県	次回月経までの性交による妊娠の可能性の説明。
長野県	内容を十分理解してもらう
長野県	100%の避妊ではないことを説明する
長野県	適応かどうか
岐阜県	性交後の時間
岐阜県	避妊指導
岐阜県	避妊 100%でない。出血することがある。悪心嘔吐があることがある。
岐阜県	効果に対する理解
岐阜県	完全に妊娠を防止できるわけではない事を説明する
岐阜県	100%ではないことを理解してもらう。月経遅れた場合は来院してもらう。今後はOCを勧める
静岡県	2回目の服用時間を考えて、外来時に1回目を服用することも勧める。嘔吐があるときは追加。3週間後に月経（様出血）ない時は来院を勧める。いただきました緊急避妊法の実際を見せて、説明します。
静岡県	失敗することもあることについてはなす
静岡県	再度来院させ、妊娠が否定出来たらBBT指導を行う
静岡県	次回の避妊
静岡県	次回からの避妊としてOCを勧める
静岡県	100%でないことをはなす
静岡県	月経の発来。確実な服用時間。嘔吐などの対応。
静岡県	避妊率。OCを勧めること。現在妊娠していないか
静岡県	必ず10分は服用を説明と行い、飲み忘れや飲みずれがないように配慮する。随時電話にてトラブル等の対応に努める。服薬処方薬袋も服用説明を記載
静岡県	月経周期からみて妊娠の可能性がないと思われても希望者には処方している。「あなたにも知ってほしい”緊急避妊ピル”のこと」のパンフレットに沿って説明している
静岡県	自己責任であることの承諾。OCを積極的に勧める
静岡県	次回からOCを勧める。効果は100%でない。嘔気あることがある。次回の生理は不定
静岡県	日母からのパンフレットを見せて、避妊の説明をしてから処方する
静岡県	精子の有無及びSTDのチェック。服用後嘔吐しないように
静岡県	失敗した場合に関しての子供への影響
静岡県	OCを勧めている
静岡県	月経が来るかどうか
愛知県	72時間以内を守ること

愛知県	避妊指導。性病指導。
愛知県	絶対的なものでないことを説明する
愛知県	反復利用者にはOCをすすめる
愛知県	服用方法、副作用（特に嘔吐）
愛知県	妊娠の可能性があること。嘔吐について
愛知県	避妊効果は100%でないことを説明
愛知県	緊急避妊ピル患者配布リーフレットを完全に理解してもらう
愛知県	タバコ、血圧
愛知県	診察料はなし。膣洗+投薬+説明で1700円
愛知県	服用後の出血の有無（確認）。避妊効果は100%でないというムンテラ
愛知県	あくまで緊急避妊。次の月経までsexしてはいけない。OCを勧める。OCのま ないならBBT
愛知県	嘔気嘔吐あります
愛知県	不確実な避妊方法であることを十分に説明
愛知県	確実性の問題、副作用
愛知県	100%ではないこと。嘔吐した場合の話
愛知県	確実ではない。発来する生理に異常があれば必ず来院。その後の避妊指導。 OCを勧める
愛知県	エコーで卵胞をチェックする。服用後に出血することとないことがある。ア フターフォローを必ず受ける
愛知県	時間通りに服用。OCへの移行を勧める
三重県	説明書を渡して、服用方法、出血の起こる次期などを言い落としのないよう 話をしている
三重県	妊娠の可能性があること
三重県	緊急避妊ピルは妊娠例が多いので、この方法に頼ってはいけないこと。
三重県	100%でないこと。STDのリスク。避妊指導
三重県	月経周期のどの時期であるか確認。
三重県	副作用（嘔気、嘔吐）
三重県	服用の仕方の工夫。今後の避妊指導。基礎体温指導。次回の月経確認
滋賀県	確実な方法ではない。OCを使用するように
滋賀県	あくまで緊急避妊であること。的確な避妊方法を勧める。周りの人にECの存 在を教えてもらう
滋賀県	嘔気と100%ではないこと
京都府	貴会よりの説明文をパンフレットにして説明
京都府	嘔気があっても服用する。次回月経を確認する

京都府	代用品であること。効果の詳細は不明であること
京都府	高血圧、血栓の問診
京都府	妊娠の可能性
京都府	悪心などの副作用。避妊失敗例もあること
京都府	STI
京都府	カップルで来てもらう
大阪府	妊娠する場合もあるという点
大阪府	嘔気、嘔吐に関しての説明
大阪府	確実に 12 時間後に服用させること。100%の確率でない事。STI のリスクがあること
大阪府	嘔気、嘔吐
大阪府	10 代が多いので妊娠するかもしれない点を詳しく説明。あくまで緊急的なものと説明
大阪府	次の避妊の指導
大阪府	3 週間後の妊娠の有無チェック。妊娠の可能性について説明する
大阪府	必ず正しく服用。不正出血があり得る。避妊効果は 100%ではない。予定月経がなければ受診すること。
大阪府	OC を服用するようにすすめている
大阪府	必ず OC の話をする。緊急避妊の失敗例の話も。
大阪府	悪心などの副作用の説明。OC への移行指導
大阪府	全員経膈超音波検査で危険度を評価。ほぼ 100%避妊できるがまれに妊娠する。次回月経までの避妊。
大阪府	妊娠していないか、次回月経がちゃんと起こるか、繰り返さないように
大阪府	100%でないこと。嘔吐時の対応
大阪府	100%でないこと
大阪府	100%でないことを強調。投与する必要があるかどうか（次期）の検討
大阪府	緊急避妊に対する説明。特に副作用について。
大阪府	成功率が 100%でないこと。嘔吐時の対応。喫煙。今後の避妊について
大阪府	経過時間、確実性の説明
大阪府	妊娠している可能性について話しておくこと
大阪府	出血が少ない、または無い場合には必ず診察に来るよう
大阪府	日常の避妊指導。性感染症
大阪府	嘔吐時の対応。アルコール類やハーブティなどと同時に服用しない事。
大阪府	説明に時間をかける
大阪府	嘔気嘔吐などで薬が出てしまうことがないように注意

大阪府	安易に考えないでほしい。その後の避妊指導
大阪府	不確実性
大阪府	副作用と消退出血の可能性。
大阪府	今後の確実な避妊
大阪府	来院時妊娠反応をする。超音波で卵胞状態をみる。翔退出血の有無を見る。 毎週妊娠反応
大阪府	100%の効果ではないこと
大阪府	完全な避妊ではないことを説明
大阪府	STD 検査を勧める
大阪府	説明書・同意書をとっている
大阪府	タバコ
大阪府	避妊効果が 100%でない。医会作成のパンフを渡して説明している
大阪府	100%避妊できるわけではないこと
大阪府	消退出血は月経でないことを説明
大阪府	妊娠率の話。OC を勧める
大阪府	服用後出血がない場合は必ず来院するよう
大阪府	妊娠成立した場合のこと
大阪府	副作用が強く出る場合がある。月経こなければ来院
大阪府	予定月経がない場合は必ず来院
大阪府	副作用の説明、今後の OC の服用を勧める
大阪府	必ずしも 100%の確率ではないこと。
大阪府	不確実性。不正出血
大阪府	避妊はOC を勧めている
大阪府	吐き気の副作用、有効率の説明
大阪府	出血があるまでのセックスにたいする避妊方法を助言
大阪府	インフォームドコンセント、次回生理の確認
大阪府	続いての避妊についての話
兵庫県	次回生理後OC 処方进行提示
兵庫県	副作用、内服後の出血
兵庫県	効果が 100%でない。気分不良に対する注意説明
兵庫県	嘔吐の場合の対応、月経発来のない場合の対応の説明
兵庫県	確実でないこと。なるべく OC を勧める
兵庫県	生理予定日になっても来ない場合は受診してもらう
兵庫県	次回月経有無を連絡すること
兵庫県	内服法を守る。消退出血の有無連絡

兵庫県	嘔気が強い場合にプリンペラ投与
兵庫県	OCに移行するよう勧める
兵庫県	100%の確率ではない。副作用が。次回の避妊方法指導
兵庫県	内服方法を徹底することおよび避妊成功率が100%でないことを周知させること
兵庫県	正確な内服
兵庫県	OCの必要性を理解してもらう
兵庫県	服用時間、妊娠の可能性
兵庫県	完璧な避妊法にならない事。OCの開始を勧める
兵庫県	嘔吐などの副作用、避妊効果が100%でないこと
兵庫県	OCを紹介する
兵庫県	100%でないこと。生理が1週間遅ければ必ず婦人科受診すること
兵庫県	100%でないことを伝える
兵庫県	次回生理の確認。生理なければ必ず受診
兵庫県	効果、副作用についてのインフォームドコンセント
兵庫県	診察時に排卵の有無を超音波検査で確認
兵庫県	処置後の経過
兵庫県	嘔吐した時の対応
奈良県	月経が確実に起こっているか
奈良県	完全な方法ではない。月経が遅れた場合は必ず来院するよう
奈良県	出血がいつあるかの説明
奈良県	子宮、卵巣に異常がないかエコー
奈良県	次回からOCを使用することを勧める
奈良県	確実な避妊法でない。今後の避妊について
和歌山県	服用方法を守る。妊娠を防止できない事があるということ。今後はOCに移行することを勧める
和歌山県	効果は約80%との説明。予定月経が遅れた場合は受診を。吐気することあり。
和歌山県	その後の月経発来の有無
和歌山県	最近の生理日の確認
和歌山県	20歳以下は、本人のみでは処方していない。
鳥取県	3W以内に出血があっても必ず3W後に受診する
鳥取県	効果は100%ではないこと。その後の避妊なしの性交で妊娠することがあること。嘔気嘔吐
鳥取県	効果に限界がある事を周知
島根県	引き続きOCに移行するよう説明する

島根県	効果 100%ではない。飲み忘れないよう
岡山県	効果は 100%ではない。困っている友達に教えてあげる
岡山県	妊娠するかもしれない可能性。OC への移行。DV との関係性
岡山県	服用後の嘔気、嘔吐防止
岡山県	妊娠することもあることの説明
岡山県	効果は 100%でないこと。嘔気等があるかもしれないこと。
岡山県	妊娠する可能性があること。次回以降の避妊指導
岡山県	100%の確率ではないこと。次回から OC に変更するよう
岡山県	説明通り服用すること。2 週間以上無月経の場合は来院すること
岡山県	100%の効果ではない。今後も避妊を続けること。
岡山県	性交後の過程時間
岡山県	必ず診察、分泌物検査をする
岡山県	嘔吐の注意。3 週間後に月経発来を確認する
岡山県	100%ではない。ホルモンの内用説明。副作用の説明。OC を勧める
岡山県	タバコ、血圧、BMI
岡山県	OC への移行を勧める
岡山県	服用する時間帯。飲み忘れ
広島県	繰り返させない
広島県	嘔気嘔吐。タバコ
広島県	嘔吐、嘔気
広島県	排卵前後であること。経膈超音波で診ること。卵管粘液検査。今後の避妊に OC を勧める
広島県	E C 服用後の月経確認
広島県	妊娠する可能性を強調。次の生理を確認
広島県	72 時間以内の他の性交の有無確認。排卵後 3 日以上経過していないか。3 週間月経来ない場合は来院
広島県	嘔気・嘔吐のこと。避妊の失敗についての説明
広島県	確実ではない。OC 服用の勧め
広島県	繰り返さないよう指導。OC とコンドームの併用を勧める
広島県	100%安心できるものではない。OC、IUD、IUS への導入を図ること
広島県	次回月経の確認。OC 使用に移行するように
広島県	妊娠の可能性があること。副作用に嘔気があること
山口県	100%の避妊効果はないこと。OC を勧める
山口県	子宮がん検診を勧める。STD や精子の有無のチェック。生理発来したら電話でも報告をもらう

山口県	避妊率が100%ではない
山口県	正確な指示通りの服用。副作用
山口県	BBT測定法の説明。服用後の出血。服用後の排卵日の遅れ。
山口県	避妊効果は100%ではないこと。月経の発来がない場合は受診すること。
山口県	100%でないことの説明
徳島県	何回も繰り返して来院していないか。犯罪性はないか
徳島県	生理が来なければ必ず来ること。それより前の性交渉での妊娠もありうることの説明。
香川県	12時間後の再度2Tの服用時間は必ず12時間後でいいかげんにしないよう。また、処方時は排卵日の推定日、及びデメリット（副作用）
香川県	100%ではない。月経が来ないときは必ずチェック。嘔吐防止
香川県	あくまでも緊急避難であるので100%内服に避妊が出来るのではないこと。内服する時期により、消退性出血の時期には誤差があること。
愛媛県	100%完全ではない。嘔気、嘔吐が出てくるので注意が必要
愛媛県	副作用について十分に説明する。プリンペランを同時に処方する。同意書をとる。
愛媛県	次回メンスの確認。STD。性交経験によってはスミアテストを
愛媛県	性交後出来るだけ早く。予定生理が遅れた場合は妊娠反応を行うことを説明
愛媛県	胃粘膜への影響。性感染症、避妊の指導
愛媛県	確実ではないことを説明、2週間後來院
高知県	絶対的な避妊法ではないこと。通常のピルを勧める
高知県	処方後にトラブルが発生したとき夜間でも十分対応できるようにしている。月経が起きたら連絡もらうようにしている
高知県	性感染症に注意すること。避妊具使用を勧める。OCを勧める
高知県	この内服にて必ず避妊できるわけではなく、あくまで緊急避妊ということを理解していただくこと。今後このようなことがない様、低用量ピル等すすめる。
高知県	北村邦夫先生のコピーの一部を活用させていただいています。大体10分くらいで説明。OC誘導（又はIUD）
福岡県	月経の状態、周期、性交の時間
福岡県	月経の次期
福岡県	最近思うところあり、緊急避妊ピルの処方を中止しました。処方が医師の裁量での処方のため、PL法上許されるのか？比較的トラブルが多い。処方する施設が増えてきて、当院は産科が主体の診療所のため、他院でも処方できるため。

福岡県	初回より確実に12時間以内に服用すること
福岡県	低用量ピルへの移行を啓蒙
福岡県	副作用、100%の避妊率ではない
福岡県	聞き取り
福岡県	100%ではないこと。同意書を書いてもらう
福岡県	副作用、失敗率があるのを知らせること
福岡県	100%確実な避妊法でないことの徹底
福岡県	生理週数。前後のセックス
福岡県	副作用。100%ではないこと。今後OCを勧める
福岡県	2回目は必ず12時間に内服するように
福岡県	検査をして、本当に必要があるかどうかを確認してから処方を考えています。その人の月経周期を確認の上、妊娠可能期間などについての説明も加えています。
福岡県	排卵予想日と妊娠率の可能性説明。確実な避妊法でない（妊娠率を低下させる作用）ことの説明。おう吐などの副作用とその処置
福岡県	100%でないこと。できれば低用量ピルを今後服用すること
福岡県	すでに妊娠していないか
福岡県	あくまで緊急であり、100%の効果ではない。嘔吐の対策。OCを勧める
福岡県	妊娠
福岡県	生理開始は2W程待つこと。その後の避妊
福岡県	副作用について
福岡県	吐き気の注意
福岡県	性交後の時間。血圧
福岡県	10～20%の失敗例があります。12時間後に再度必ず2錠服用をまもる
福岡県	OCへの移行
福岡県	内診、性感染症検査を必ず行う。100%避妊ではないことを話す。
福岡県	緊急避妊ピルについての説明書を渡している。避妊は100%でないことを話している
福岡県	副作用（胃症状）の説明。失敗率の説明。今後の確実な避妊（ピル）の紹介
福岡県	21日以内に生理のない時は必ず来院。生理があるまでは避妊すること
福岡県	避妊しているのに、今回のみ避妊に失敗したのかどうか確かめる。服用説明書を私、了解のサインを受け取る
福岡県	時間通りの服用
福岡県	服用後の嘔吐、月経の遅れに対する対応を十分に指示
福岡県	今後の避妊について。STDに関して注意

福岡県	100%確実ではないということをムンテラ
福岡県	避妊確率 100%でないこと。内服時期により 3 日くらいして消退出血がわりと多くあること。出血の有無にかかわらず、2 週間後に妊娠反応をためてみる
佐賀県	服用を必ず守ること。服用時の嘔気・嘔吐などの副作用。100%の避妊ではない
佐賀県	21 日以内に生理のない時は必ず来院。妊娠の可能性
佐賀県	失敗の可能性について説明
佐賀県	その後の経過を報告するよう指導
長崎県	正しい内服
長崎県	今後の避妊指導
長崎県	正しく服用しているか
長崎県	2.5%の妊娠例がある。悪心があることがある。次回月経を必ず確認する。可能な限り子宮頸部細胞診を行う。
長崎県	今回かぎりにして次からの避妊指導
長崎県	妊娠の可能性はあること。月経が遅れたら受診するよう
長崎県	失敗の可能性の説明
熊本県	禁忌の確認。嘔吐対応。100%でないことを説明
熊本県	緊急避妊処方するときの時間帯
熊本県	100%ではないこと。OC を勧める。STD について
熊本県	低用量ピルを勧めている
熊本県	月経が来たら連絡させる。次の OC 内服を勧める
熊本県	時間。嘔吐。下痢。アレルギー
熊本県	説明
熊本県	配布するパンフレットを読んで理解させてから処方している
熊本県	嘔気嘔吐の可能性を伝える。100%出ない事を伝える。同意書をとる
熊本県	その後のフォローアップ
大分県	処方後の避妊。OC を確実な避妊法として勧める。性犯罪被害ではないか・
大分県	効果は 100%でないこと。3 時間以内に嘔吐したら必ず予備を服用すること。
大分県	緊急避妊ピル（患者配布リーフレット）を説明。同意書。服用方法を説明。一ヶ月後の再来を指示する。
大分県	最終月経、ピルによる嘔吐
大分県	嘔気についての説明。予備薬 2T 追加。あくまで緊急時のみの避妊法であることの説明
大分県	性感染症の予防。効果が 100%でないこと