症例報告				波形レベル統計							対応統計				
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
30	[redacted]	4	D	0	0	2	12	0	0	0	0	1	11	2	0

【基本情報】

No. 0072　施設別登録件数 34 件　出産日 2004 年 5 月 22 日

施設名 [redacted]　担当者 医本

産婦名 [redacted]　経腟回数　出産回数

ふりがな [redacted]

【分娩・胎児状況】

母体現症・合併症 ☐PIH ☐GDM ☐CPD ☐前置胎盤 ☐胎盤早期剥離 ☐帝王切開 ☐OAM ☐前期破水 ☐羊水過多 ☐羊水過少 ☑その他

その他の母体現症・合併症 UCR, 切迫早産

分娩時刻 9 時 3 分　分娩方法 ○自然 ○吸引 ○鉗子 ◉帝切　妊娠 37 週 2 日

児の状況 SGA(-2.73SD)

体重[g] 1714　身長[cm] 40.0　アプガースコア：1分 9　5分 9

胎帯：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　巻絡 ○無 ◉有

胎帯動脈血液ガス値：

pH 7.361　PaO2 28.2　PaCO2 37.5　BE -4.1　lactate 5

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進剤の使用：オキシトシン ◉無 ○有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酵素投与 ○無 ◉有　体位変換 ◉無 ○有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮弛緩剤の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

時刻 7 時 50 分 ～ 9 時 30 分　子宮口開大度 3　破水 ◉無 ○有

陣痛周期 ○10分以上 ◉10～5分 ○5～3分 ○3分未満 ○測定せず又は測定不能

心拍数基線 ◉正常脈 ○頻脈 ○徐脈 ○徐脈(80)

基線細変動 ○無 ○5以下 ◉6～25 ○26以上

一過性徐脈 ○無 ◉有

早発一過性徐脈 ○無 ◉有　遅発一過性徐脈 ○無 ○軽度 ◉高度

変動一過性徐脈 ○無 ○軽度 ◉高度　遷延一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ○2 ○3 ◉4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ○A ○B ○C ◉D　対応と根拠

CTGファイル【登録済】 kotera.pdf　CTGファイル情報





症例	施設	波形レベル	対応
31	[redacted]	4	D

波形レベル統計							対応統計				
1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
0	0	0	14	0	0	0	0	0	6	8	0

【基本情報】

No. 0073　施設別登録件数 34 件　出産日 2006 年 12 月 15 日

施設名 [redacted]　担当者 医本

母氏名 [redacted]　ふりがな [redacted]　妊娠回数 1　出産回数 1

【分娩・胎児状況】

母体現症・合併症 ☐PIH ☐GDM ☐OPD ☐前置胎盤 ☐胎盤早期剥離 ☐母体発熱 ☐CAM ☐前期破水 ☐羊水過多 ☐羊水過少 ☑その他

その他の母体現症・合併症 UCR

分娩時刻 15 時 29 分

分娩方法 ○自然 ○吸引 ○鉗子 ◉帝切　妊娠 34 週 6 日

児の状況 NSDz/o

体重[g] 2239　身長[cm] 43.2　アプガースコア：1分 6　5分 8

臍帯：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　巻絡 ◉無 ○有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.383　PaO2 28.2　PaCO2 49.7　BE 1.4　lactate 0

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進薬の使用：オキシトシン ◉無 ○有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酸素投与 ◉無 ○有　体位変換 ◉無 ○有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮弛緩薬の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

時刻 15 時 20 分 ～ 15 時 40 分　子宮口開大度 1　羊水 ◉無 ○有

陣痛周期 ○10分以上 ◉10～5分 ○5～3分 ○3分未満 ○測定せず又は測定不能

心拍数基線 ◉正常域 ○頻脈 ○徐脈 ○徐脈(<80)

基線細変動 ◉無 ○5以下 ◉6～25 ○26以上

一過性頻脈 ○無 ◉有

単発一過性徐脈 ○無 ◉有　遅発一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度　遷延一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ◉高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ○2 ○3 ◉4 ○5 ○基線なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ○A ○B ○C ◉D　対応と処置

CTGファイル [登録済] seiyoshi.pdf　CTGファイル登録





症例報告				波形レベル統計							対応統計					
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
32	[redacted]	4	D	0	2	3	9	0	0	0	0	6	8	0	0

【基本情報】

No. 0074　過去分娩件数 34 件　出産日 2006 年 11 月 5 日

施設名 [redacted]　担当者 院本

母氏名 [redacted]　妊娠回数 [ ]　出産回数 [ ]

ふりがな [redacted]

【分娩・胎児状況】

母体疾患・合併症: ☐ PIH ☐ GDM ☐ OPD ☐ 前期胎盤 ☐ 胎盤早期剥離 ☐ 母体発熱 ☑ CAM ☑ 前期破水 ☐ 羊水過多 ☐ 羊水過少 ☑ その他

その他の母体疾患・合併症: CBS

分娩時刻 9 時 55 分

分娩方法 ○ 自然 ○ 吸引 ○ 鉗子 ◉ 帝切　妊娠 38 週 1 日

児の状況

体重[g] 3090　身長[cm] 48.5　アプガースコア：1分 8　5分 9

臍帯：付着部位 ◉ 正常 ○ 辺縁 ○ 卵膜　巻絡 ◉ 無 ○ 有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.316　PaO2 58.0　PaCO2 41.1　BE -5.3　lactate [ ]

神経学的異常：けいれん ◉ 無 ○ 有　脳浮腫 ◉ 無 ○ 有

その他

【処置情報】

分娩促進薬の使用： オキシトシン ◉ 無 ○ 有　PGF2α ◉ 無 ○ 有　PGE2 ◉ 無 ○ 有

酵素投与 ○ 無 ◉ 有　体位変換 ◉ 無 ○ 有

羊水注入 ◉ 無 ○ 有　子宮収縮抑制の使用 ◉ 無 ○ 有

その他

【CTG評価項目】

時刻 7 時 55 分 ～ 9 時 25 分　子宮口開大度 8　陣痛 ○ 無 ◉ 有

陣痛周期 ○ 10分以上 ○ 10～9分 ◉ 9～3分 ○ 3分未満 ○ 測定せず又は測定不能

心拍数基線 ◉ 正常脈 ○ 頻脈 ○ 徐脈 ○ 徐脈(<80)

基線細変動 ○ 無 ○ 5以下 ◉ 6～25 ○ 26以上

一過性徐脈 ○ 無 ◉ 有

早発一過性徐脈 ○ 無 ◉ 有　遅発一過性徐脈 ○ 無 ○ 軽度 ◉ 高度

変動一過性徐脈 ○ 無 ◉ 軽度 ○ 高度　遷延一過性徐脈 ◉ 無 ○ 軽度 ○ 高度

サイヌソイダル ◉ 無 ○ 有

波形レベル ○ 1 ○ 2 ○ 3 ◉ 4 ○ 5 ○ 該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ○ A ○ B ○ C ◉ D　対応と処置

CTGファイル【登録済】 ishiyama.pdf　CTGファイル情報



症例報告			波形レベル統計							対応統計				
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
33	[redacted]	3	C	0	1	4	9	0	0	0	0	4	6	4	0

【基本情報】

No. 0076　施設内登録件数 2 件　出産日 2008 年 7 月 21 日

施設名 [redacted]　担当者 三谷 暢

母氏名 [redacted]　妊娠回数 3　出産回数 1

ふりがな

【分娩・胎児状況】

母体合併症・合併症 □PIH □IDM □CPD □前置胎盤 □胎盤早期剥離 □母体発熱 □CAM □前期破水 □羊水過多 □羊水過少 □その他

その他の母体合併症・合併症 なし

分娩時刻 0 時 1 分

分娩方法 ○自然 ○吸引 ○鉗子 ◉帝切　妊娠 34 週 0 日

児の状況 両側口唇裂、多指症あり 呼吸障害にて人工呼吸管理→Tracheostomy

体重[g] 1878　身長[cm] 41.5　アプガースコア：1分 5　5分 6

臍帯：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　巻絡 ◉無 ○有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.245　PaO2 8.4　PaCO2 68.8　BE -6.7　lactate 6

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進術の使用：オキシトシン ◉無 ○有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酸素投与 ◉無 ○有　体位変換 ◉無 ○有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮硬縮抑制の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

観察 21 時 50 分～ 23 時 30 分　子宮口開大度 0　破水 ◉無 ○有

陣痛周期 ○10分以上 ○10～5分 ◉5～3分 ○3分未満 ◉測定せず又は測定不能

心拍数基線 ○正常域 ◉頻脈 ○除脈 ○除脈(CBD)

基線細変動 ○無 ○SWF ◉6～25 ○26以上

一過性頻脈 ○無 ○有

単発一過性除脈 ◉無 ○有　遅発一過性除脈 ○無 ◉軽度 ○高度

変動一過性除脈 ○無 ◉軽度 ○高度　遷延一過性除脈 ◉無 ○軽度 ○高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ○2 ◉3 ○4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル算出

対応 ○A ○B ◉C ○D　対応と処置

CTGファイル【登録済】F (NST.doc　CTGファイル情報





症例報告			波形レベル統計							対応統計				
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
34	[redacted]	4	D	0	0	1	13	0	0	0	0	0	6	8	0

【基本情報】

No. 0077　施設別登録件数 2 件　出産日 2008 年 7 月 18 日

施設名 [redacted]　担当者 芹沢 順子

産婦名 [redacted]　妊娠回数 1　出産回数 1

みりがな [redacted]

【分娩・胎児状況】

合併症・合併症 ☐ PIH ☐ GDM ☐ CPD ☐ 前置胎盤 ☐ 胎盤早期剥離 ☐ 子宮発熱 ☐ CAM ☐ 前期破水 ☐ 羊水過多 ☐ 羊水過少 ☐ その他

その他の合併症・合併症 なし

分娩時刻 12 時 9 分

分娩方法 ◯ 自然 ◯ 吸引 ◯ 鉗子 ◉ 帝切　妊娠 36 週 1 日

児の状況 Breech, IUGR

体重(g) 1902　身長(cm) 44.0　アプガースコア：1分 6　5分 9

臍帯：付着部位 ◯ 正常 ◯ 辺縁 ◉ 卵膜　巻絡 ◯ 無 ◉ 有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.297　PaO2 16.8　PaCO2 50.2　BE -2.1　lactate

神経学的異常：けいれん ◉ 無 ◯ 有　脳浮腫 ◉ 無 ◯ 有

その他

【処置情報】

分娩促進薬の使用：オキシトシン ◉ 無 ◯ 有　PGF2α ◉ 無 ◯ 有　PGE2 ◉ 無 ◯ 有

酸素投与 ◉ 無 ◯ 有　体位変換 ◉ 無 ◯ 有

羊水注入 ◉ 無 ◯ 有　子宮弛緩薬の使用 ◉ 無 ◯ 有

その他

【CTG評価項目】

観察 10 時 15 分 ～ 10 時 50 分　子宮口開大度 0 cm 羊水 ◉ 無 ◯ 有

陣痛周期 ◉ 10分以上 ◯ 10～9分 ◯ 8～3分 ◯ 3分未満 ◯ 測定せずまたは測定不能

心拍数基線 ◉ 正常域 ◯ 頻脈 ◯ 徐脈 ◯ 除脈(80)

基線細変動 ◯ 無 ◯ 5以下 ◉ 6～25 ◯ 26以上

一過性頻脈 ◉ 無 ◯ 有

単発一過性徐脈 ◉ 無 ◯ 有　遅発一過性徐脈 ◉ 無 ◯ 軽度 ◯ 高度

変動一過性徐脈 ◯ 無 ◯ 軽度 ◉ 高度　遷延一過性徐脈 ◉ 無 ◯ 軽度 ◯ 高度

サイヌソイダル ◉ 無 ◯ 有

波形レベル ◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◉ 4 ◯ 5 ◯ 該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ◯ A ◯ B ◯ C ◉ D　対応と処置

CTGファイル【登録済】 CTGHKOTO.pdf　CTGファイル情報



症例報告				波形レベル統計							対応統計				
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
35	[redacted]	1	A	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0

【基本情報】

No. 0076　施設別登録件数 41 件　出産日 2008 年 7 月 28 日

施設名 [redacted]　担当者 katsuyo

母氏名 [redacted]　妊娠回数 2　出産回数 2

ふりがな [redacted]

【分娩・胎児状況】

母体異常・合併症 ☐PIH ☐GDM ☐OPD ☐前置胎盤 ☐胎盤早期剥離 ☐母体発熱 ☐CAM ☐前期破水 ☐羊水過多 ☐羊水過少 ☑その他

その他の母体異常・合併症 脳梗塞脳室形成術後

分娩時刻 10 時 10 分

分娩方法 ○自然 ◉吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 39 週 [redacted] 日

児の状況 正常

体重[g] 2562　身長[cm] 50.0　アプガースコア：1分 9　5分 10

臍帯：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　臍帯 ◉無 ○有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.335　PaO2 12.3　PaCO2 43.8　BE -1.7　lactate 3

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進薬の使用：オキシトシン ○無 ◉有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酵素投与 ○無 ◉有　体位変換 ○無 ◉有

羊水注入 ○無 ◉有　子宮弛緩薬の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

時刻 17 時 8 分～17 時 15 分　子宮口開大度 6 羊水 ◉無 ○有

陣痛周期 ○10分以上 ○10～5分 ○5～3分 ◉3分未満 ○測定せず又は測定不能

心拍数基線 ◉正常域 ○頻脈 ○徐脈 ○徐脈(<80)

基線細変動 ○無 ○5以下 ◉6～25 ○26以上

一過性頻脈 ○無 ◉有

単発一過性徐脈 ○無 ○有　遅発一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度　遷延一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

サイヌソイダル ○無 ○有

波形レベル ◉1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ◉A ○B ○C ○D　対応と処置

CTGファイル【登録済】 monital.jpg　CTGファイル情報



症例報告				波形レベル統計							対応統計					
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
36	[redacted]	4	C	0	1	2	11	0	0	0	0	2	8	4	0

【基本情報】

No. 0090　施設別登録件数 34 件　出産日 2008 年 8 月 26 日

施設名 [redacted]　担当者 田中 恵理

産科名 [redacted]　妊娠回数 1　出産回数 1

ふりがな [redacted]

【分娩・胎児状況】

母体現症・合併症 ☐PIH ☐GDM ☐OPD ☐前期胎盤 ☐胎盤早期剥離 ☐帝王開始
☐OAM ☑羊膜破水 ☐羊水過多 ☐羊水過少 ☑その他

その他の母体現症・合併症 切迫早産

分娩時刻 6 時 25 分

分娩方法 ◉自然 ○吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 32 週 2 日

児の状況 FGS 2/0

体重[g] 2134　身長[cm] 46.0　アプガースコア：1分 7　5分 8

臍帯：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　巻絡 ○無 ◉有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.323　PaO2 26.5　PaCO2 42.5　BE -4.0　lactate 5

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳下腫 ◉無 ○有

その他 cystic PVL

【処置情報】

分娩促進薬の使用：オキシトシン ◉無 ○有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酸素投与 ◉無 ○有　体位変換 ◉無 ○有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮硬縮薬の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

観察 5 時 35 分 ～ 6 時 25 分　子宮口開大度 10　羊水 ○無 ◉有

陣痛周期 ○10分以上 ○10～5分 ◉5～3分 ○3分未満 ○測定できず又は測定不能

心拍数基線 ◉正常域 ○頻脈 ○徐脈 ○徐脈(-80)

基線細変動 ○無 ○5以下 ◉6～25 ○26以上

一過性頻脈 ○無 ◉有

早発一過性徐脈 ○無 ◉有

遅発一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ○無 ○軽度 ◉高度

遅延一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ○2 ○3 ◉4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ○A ○B ◉C ○D　対応と処置

CTGファイル【登録済】 [redacted].pdf　CTGファイル情報







症例報告				波形レベル統計							対応統計				
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
37	[redacted]	4	D	0	0	4	10	0	0	0	0	0	6	8	0

【基本情報】

No. 0091　施設別登録件数 34 件　出産日 2008 年 8 月 30 日

施設名 [redacted]　担当者 [redacted]

母氏名 [redacted]　妊娠回数 1　出産回数 1

ふりがな

【分娩・胎児状況】

母体現症・合併症　□PIH □GDM □OPD □前回帝王 □前回早期剥離 □母体発熱
□CAM ☑破水 □羊水過多 □羊水過少 □その他

その他の母体現症・合併症 なし

分娩時刻 9 時 15 分

分娩方法 ○自然 ◉吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 36 週 1 日

児の状況

体重[g] 2456　身長[cm] 46.8　アプガースコア：1分 8　5分 9

臍帯：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　巻絡 ◉無 ○有

臍帯動脈血液ガス値：
pH 7.269　PaO2 25.1　PaCO2 42.3　BE -6.3　lactate 5

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進剤の使用：オキシトシン ◉無 ○有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酢水投与 ○無 ◉有　体位変換 ◉無 ○有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮収縮剤の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

観察 7 時 30 分～ 8 時 0 分　子宮口開大度 10　破水 ○無 ◉有

陣痛周期 ○10分以上 ○10～5分 ○5～3分 ◉3分未満 ○測定せずまたは測定不能

心拍数基線 ◉正常脈 ○頻脈 ○徐脈 ○徐脈(<80)

基線細変動 ○無 ○5以下 ◉6～25 ○25以上

一過性頻脈 ○無 ◉有

遅発一過性徐脈 ○無 ○軽度 ◉高度

単発一過性徐脈 ○無 ◉有

遷延一過性徐脈 ○無 ◉軽度 ○高度

実動一過性徐脈 ○無 ◉軽度 ○高度

サイヌソイダル ○無 ○有

波形レベル ○1 ○2 ○3 ◉4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル確認

対応 ○A ○B ○C ◉D　対応と処置

CTGファイル【登録済】 [redacted].pdf　CTGファイル情報





症例報告				波形レベル統計							対応統計				
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
38	[redacted]	3	A	2	5	1	3	3	0	0	3	6	2	3	0

【基本情報】

No. 0097　施設別登録件数 41 件　出産日 2008 年 5 月 17 日

施設名 [redacted]　担当者 木村 紀子

母氏名　新規登録 2　出産回数 1

ふりがな

【分娩・胎児状況】

母体異常・合併症 □PIH □GDM □OPD □胎盤異常 □胎盤早期剥離 □帝王開始 □CAM □前期破水 □羊水過多 □羊水過少 □その他

その他の母体異常・合併症 なし

分娩時刻 21 時 21 分

分娩方法 ○自然 ◉吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 40 週 1 日

児の状況 経方理解応

体重[g] 3280　身長[cm] 50.0　アプガースコア：1分 9 5分 9

臍帯：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　巻絡 ◉無 ○有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.304　PaO2 23.8　PaCO2 61.3　BE -5.4　lactate 6

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他 なし

【処置情報】

分娩促進薬の使用：オキシトシン ○無 ◉有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酵素投与 ◉無 ○有　体位変換 ○無 ◉有

羊水注入 ◉無 ◉有　子宮収縮抑制の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

観察 7 時 0 分～ 7 時 10 分　子宮口開大度 3　破水 ◉無 ○有

陣痛周期 ○10分以上 ○10～5分 ◉5～3分 ○3分未満 ○測定せず又は測定不能

心拍数基線 ◉正常域 ○頻脈 ○徐脈 ○検討(SB)

基線細変動 ◉無 ○SSCF ◉6～25 ○25以上

一過性頻脈 ◉無 ○有

早発一過性徐脈 ◉無 ○有　遅発一過性徐脈 ○無 ◉軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度　遅延一過性徐脈 ○無 ◉軽度 ○高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ○2 ◉3 ○4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル解析

対応 ◉A ○B ○C ○D　対応と処置

CTGファイル【登録済】 hibiki-mizuno.pdf　CTGファイル情報



症例	症例報告 施設	波形レベル	対応	波形レベル統計 1	2	3	4	5	該当なし	空欄	対応統計 A	B	C	D	空欄
39	[redacted]	4	D	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	14	0

【基本情報】

No. 0099　施設別登録件数 34 件　出産日 2008 年 9 月 8 日

施設名 [redacted]　担当者 医本 牧志

産婦氏名 [redacted]　妊娠回数 3　出産回数 3

ふりがな [redacted]

【分娩・胎児状況】

母体既往・合併症　□PIH □GDM □CPD □前回帝王 □前回早期新生 □母体発熱
□CAM ☑前期破水 □羊水過多 □羊水過少 ☑その他

その他の母体既往・合併症 HUCL 高脂肪肝

分娩時刻 6 時 40 分

分娩方法 ○自然 ◉吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 39 週 2 日

児の状況 AGA(-2.3SD)

体重[g] 2124　身長[cm] 45.0　アプガースコア： 1分 9　5分 9

臍帯：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○前置　巻絡 ○無 ◉有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.172　PaO2 10.6　PaCO2 69.1　BE -6.6　lactate 5

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進薬の使用： オキシトシン ◉無 ○有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酵素投与 ◉無 ○有　体位変換 ◉無 ○有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮弛緩薬の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

観察 6 時 25 分～ 8 時 50 分　子宮口開大度 10　羊水 ○無 ◉有

陣痛周期 ○10分以上 ○10～5分 ○5～2分 ◉2分未満 ○測定せず又は測定不能

心拍数基線 ◉正常域 ○頻脈 ○徐脈 ○除脈(<80)

基線細変動 ○無 ○5以下 ◉6～25 ○26以上

一過性頻脈 ○無 ◉有

早発一過性徐脈 ◉無 ○有　遅発一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ○無 ◉軽度 ○高度　遅延一過性徐脈 ○無 ○軽度 ◉高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ○2 ○3 ◉4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ○A ○B ○C ◉D　対応と処置

CTGファイル【登録済】 kaden.pdf　CTGファイル情報



症例報告				波形レベル統計							対応統計				
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
40	[redacted]	3	D	0	0	9	4	1	0	0	0	5	7	2	0

【基本情報】

No. 0100　施設別登録件数 40 件　出産日 2008 年 5 月 20 日

施設名 [redacted]　担当者 小川 修

母氏名 [redacted]　妊娠回数 1　出産回数

みりがな [redacted]

【分娩・胎児状況】

妊娠現症・合併症: ☑PIH ☐GDM ☐OPD ☐前期胎盤 ☐胎盤早期剥離 ☐帝王切開 ☐OAM ☐前期破水 ☐羊水過多 ☐羊水過少 ☐その他

その他の母体現症・合併症: 本態性高血圧

分娩時刻 17 時 56 分　妊娠 34 週 0 日

分娩方法 ○自然 ○吸引 ○鉗子 ◉帝切

児の状況 子宮内胎児発育遅延

体重[g] 1384　身長[cm] 40.0　アプガースコア：1分 8 5分 10

胎等：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　臍帯 ◉無 ○有

胎等給臍血液ガス値：

pH 7.211　PaO2 18.0　PaCO2 53.5　BE -7.4　lactate 6

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進薬の使用：オキシトシン ◉無 ○有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酸素投与 ○無 ◉有　体位変換 ◉無 ○有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮収縮薬の使用 ◉無 ○有

その他 妊娠高血圧、デプレゾリン、アルマヘット内服中。

【CTG評価項目】

時刻 15 時 40 分 ～ 17 時 10 分　子宮口開大度 0　羊水 ◉無 ○有

陣痛周期 ○10分以上 ◉10～3分 ○3～2分未満 ○測定サポートは測定不能

心拍数基線 ◉正常域 ○頻脈 ○徐脈 ○徐脈(CBD)

基線細変動 ○無 ○5以下 ◉6～25 ○25以上

一過性頻脈 ○無 ◉有

早発一過性徐脈 ◉無 ○有　遅発一過性徐脈 ○無 ◉軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度　遷延一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ○2 ◉3 ○4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ○A ○B ○C ◉D　対応と処置

CTGファイル [登録済] R0040　CTGファイル登録



症例総告				波形レベル統計							対応統計					
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
41	[redacted]	2	A	0	4	3	6	1	0	0	0	5	4	5	0

【基本情報】

No. 0105　施設別登録件数 54 件　出産日 2008 年 7 月 14 日

施設名 [redacted]　担当者 [redacted]

母氏名 [redacted]　妊娠回数 0　出産回数 0

みりがな [redacted]

【分娩・胎児状況】

母体疾患・合併症 ☐PIH ☐GDM ☐OPD ☐前置胎盤 ☐胎盤早期剥離 ☐母体発熱 ☐OAM ☐前期破水 ☐羊水過多 ☐羊水過少 ☐その他

その他の母体疾患・合併症 なし

分娩時刻 21 時 23 分

分娩方法 ◉自然 ○吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 39 週 0 日

児の状況

体重[g] 2430　身長[cm] 46.3　アプガースコア：1分 8　5分 9

臍帯：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　巻絡 ◉無 ○有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.283　PaO2　PaCO2　BE -5.0　lactate

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進薬の使用：オキシトシン ◉無 ○有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酢酸投与 ◉無 ○有　体位変換 ◉無 ○有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮弛緩薬の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

時刻 20 時 50 分～ 21 時 20 分　子宮口開大度 10　破水 ○無 ◉有

陣痛周期 ○10分以上 ○10～5分 ○5～3分 ◉3分未満 ○測定せず又は測定不能

心拍数基線 ◉正常脈 ○頻脈 ○徐脈 ○徐脈(<80)

基線細変動 ◉無 ○5以下 ◉6～25 ○26以上

一過性徐脈 ◉無 ○有

早発一過性徐脈 ◉無 ◉有　遅発一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ◉無 ◉軽度 ○高度　遷延一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ◉2 ○3 ○4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ○A ◉B ○C ○D　対応と処置

CTGファイル【登録済】 080714 yoshiuchi.pdf　CTGファイル情報









症例報告				波形レベル統計							対応統計				
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
42	[redacted]	2	A	1	10	2	1	0	0	0	4	9	1	0	0

【基本情報】

No. 0108　施設別登録件数 43 件　出産日 2008 年 6 月 14 日

施設名 [redacted]　担当者 生田

症例名 [redacted]　呼吸回数 1　出産回数 1

ふりがな

【分娩・胎児状況】

母体既往・合併症 ☐PIH ☐GDM ☐OPD ☐前置胎盤 ☐胎盤早期剥離 ☐帝王切開
☐CAM ☑前期破水 ☐羊水過多 ☐羊水過少 ☐その他

その他の母体既往・合併症 なし

分娩時刻 7 時 14 分

分娩方法 ◉自然 ○吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 40 週 5 日

児の状況

体重[g] 2628　身長[cm] 54.0　アプガースコア：1分 8 5分 9

臍帯：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　奇形 ◉無 ○有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.274　PaO2 22.9　PaCO2 48.5　BE -5.1　lactate 5

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進剤の使用：オキシトシン ◉無 ○有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酸素投与 ○無 ◉有　体位変換 ○無 ◉有

羊水注入 ○無 ◉有　子宮収縮剤の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

時刻 1 時 40 分 ～ 1 時 50 分　子宮口開大度 3 cm ○無 ◉有

陣痛周期 ○10分以上 ○10～5分 ◉5～3分 ○3分未満 ○測定できず又は測定不能

心拍数基線 ◉正常脈 ○頻脈 ○徐脈 ○徐脈(CBD)

基線細変動 ○無 ○5以下 ◉6～25 ○26以上

一過性頻脈 ◉無 ○有

早発一過性徐脈 ◉無 ○有　遅発一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ○無 ◉軽度 ○高度　遷延一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ◉2 ○3 ○4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ◉A ○B ○C ○D　対応と処置

CTGファイル【登録済】 nozoki.jpg　CTGファイル情報



症例報告				波形レベル統計							対応統計				
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
43	[redacted]	2	A	0	3	4	7	0	0	0	0	4	7	3	0

【基本情報】

No. 0109　施設別登録件数 54 件　出産日 2008 年 7 月 17 日

施設名 [redacted]　担当者 [redacted]

産婦名 [redacted]　妊娠回数 0　出産回数 0

ふりがな [redacted]

【分娩・胎児状況】

母体異常・合併症: □PIH □GDM □DPD □前置胎盤 □胎盤早期剥離 □母体発熱 □CAM □前期破水 □羊水過多 □羊水過少 □その他

その他の母体異常・合併症: なし

分娩時刻 3 時 25 分

分娩方法 ◉自然 ○吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 38 週 5 日

児の状況

体重[g] 2908　身長[cm] 48.1　アプガースコア: 1分 9　5分 9

羊等: 付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　着絡 ◉無 ○有

臍帯動脈血液ガス値:

pH 7.302　PaO2 [redacted]　PaCO2 [redacted]　BE -7.0　lactate [redacted]

神経学的異常: けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他 [redacted]

【処置情報】

分娩促進薬の使用: オキシトシン ◉無 ○有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酸素投与 ◉無 ○有　体位変換 ◉無 ○有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮弛緩薬の使用 ◉無 ○有

その他 [redacted]

【CTG評価項目】

時刻 2 時 55 分 ～ 3 時 10 分　子宮口開大度 10　破水 ◉無 ○有

陣痛周期 ○10分以上 ○3～5分 ◉2～3分 ○3分未満 ○測定せず又は測定不能

心拍数基線 ◉正常頻 ○軽頻 ○徐脈 ○徐脈(<80)

基線細変動 ○無 ◉5以下 ○6～25 ○26以上

一過性頻脈 ○無 ◉有

早発一過性徐脈 ○無 ◉有　遅発一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ○無 ◉軽度 ○高度　遷延一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ◉2 ○3 ○4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ◉A ○B ○C ○D　対応と処置

CTGファイル [登録済] 0071 tsuboka.pdf　CTGファイル登録







	症例報告			波形レベル統計							対応統計				
症例	施　設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
44	[redacted]	2	A	0	2	2	10	0	0	0	0	2	7	5	0

【基本情報】

No. 0111　施設別登録件数 64 件　出産日 2008 年 7 月 21 日

施設名 [redacted]　担当者 [redacted]

母氏名 [redacted]

ふりがな [redacted]　妊娠回数 0　出産回数 0

【分娩・胎児状況】

母体合併症・合併症: □PIH □GDM □OPD □前置胎盤 □胎盤早期剥離 □母体発熱 □CAM □前期破水 □羊水過多 □羊水過少 □その他

その他の母体合併症・合併症: なし

分娩時刻 23 時 20 分

分娩方法 ⊙自然 ○吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 39 週 3 日

児の状況

体重[g] 3054　身長[cm] 48.2　アプガースコア: 1分 9　5分 9

臍帯: 付着部位 ⊙正常 ○辺縁 ○卵膜　巻絡 ⊙無 ○有

臍帯動脈血液ガス値:

pH 7.318　PaO2　PaCO2　BE -6.0　lactate

神経学的異常: けいれん ⊙無 ○有　脳浮腫 ⊙無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進剤の使用: オキシトシン ⊙無 ○有　PGF2α ⊙無 ○有　PGE2 ⊙無 ○有

酵素投与 ⊙無 ○有　体位変換 ⊙無 ○有

羊水注入 ⊙無 ○有　子宮弛緩剤の使用 ⊙無 ○有

その他

【CTG評価項目】

時刻 21 時 5 分～ 21 時 20 分　子宮口開大度 8　破水 ⊙無 ○有

陣痛周期 ○10分以上 ○10～5分 ⊙5～3分 ○3分未満 ○測定せず又は測定不能

心拍数基線 ⊙正常服 ○頻脈 ○除脈 ○除脈(<80)

基線細変動 ○無 ○5以下 ⊙6～25 ○26以上

一過性頻脈 ○無 ⊙有

早発一過性除脈 ⊙無 ○有　遅発一過性除脈 ⊙無 ○軽度 ○高度

変動一過性除脈 ○無 ⊙軽度 ○高度　遷延一過性除脈 ⊙無 ○軽度 ○高度

サイヌソイダル ⊙無 ○有

波形レベル ○1 ⊙2 ○3 ○4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ⊙A ○B ○C ○D　対応と処置

CTGファイル [登録済] 080721 sraka.pdf　CTGファイル情報





症例報告				波形レベル統計							対応統計				
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
45	[redacted]	2	A	0	8	5	1	0	0	0	1	11	2	0	0

【基本情報】

No. 0112　施設内登録件数 64 件　出産日 2007 年 1 月 27 日

施設名 [redacted]　担当者 井手 一夫

症例名 [redacted]　経腟回数 0　出産回数 0

ふりがな

【分娩・胎児状況】

母体合併症・合併症 □PIH □GDM □CPD □前置胎盤 □胎盤早期剥離 □母体発熱 □CAM □前期破水 □羊水過多 □羊水過少 □その他

その他の母体合併症・合併症 妊娠合併

分娩時刻 7 時 25 分

分娩方法 ◉自然 ○吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 40 週 2 日

児の状況

体重[g] 3212　身長[cm] 47.5　アプガースコア：1分 9　5分 9

酸塩：付着部位 ◉正常 ○頭頂 ○前頭　臍帯 ◉無 ○有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.368　PaO2　PaCO2　BE -10.0　lactate

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進薬の使用：オキシトシン ◉無 ○有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酵素投与 ◉無 ○有　体位変換 ◉無 ○有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮収縮薬の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

時刻 1 時 30 分～ 2 時 20 分　子宮口開大度 10　破水 ◉無 ○有

陣痛周期 ○10分以上 ○10～5分 ○5～3分 ◉3分未満 ○測定せず又は測定不能

心拍数基線 ◉正常脈 ○頻脈 ○徐脈 ○徐脈(CB)

基線細変動 ○無 ○SHCF ◉6～25 ○25以上

一過性頻脈 ○無 ◉有

早発一過性徐脈 ○無 ◉有　遅発一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ○無 ◉軽度 ○高度　遷延一過性徐脈 ◉無 ◉軽度 ○高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ◉2 ○3 ○4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ◉A ○B ○C ○D　対応と処置

CTGファイル [登録済] 00909 shimizu.pdf　CTGファイル情報













症例報告				波形レベル統計							対応統計				
症例	施　設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
46	[redacted]	2	B	0	0	0	14	0	0	0	0	0	6	8	0

【基本情報】

No. 0114　施設別登録件数 54 件　出産日 2008 年 9 月 7 日

施設名 [redacted]　担当者 井手 一夫

母氏名 [redacted]　妊娠回数 2　出産回数 0

ふりがな

【分娩・胎児状況】

母体現症・合併症 ☐PIH ☐GDM ☐OPD ☐前置胎盤 ☐胎盤早期剥離 ☐母体発熱 ☐CAM ☐前期破水 ☐羊水過多 ☐羊水過少 ☐その他

その他の母体現症・合併症 なし

分娩時刻 0 時 49 分

分娩方法 ◉自然 ○吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 40 週 2 日

児の状況

体重[g] 3218　身長[cm] 50.0　アプガースコア： 1分 8 5分 9

臍帯： 付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　巻絡 ○無 ◉有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.205　PaO2　PaCO2　BE -4.0　lactate

神経学的異常： けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進薬の使用： オキシトシン ○無 ◉有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酸素投与 ◉無 ○有　体位変換 ◉無 ○有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮弛緩薬の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

時刻 0 時 20 分～ 0 時 30 分　子宮口開大度 10　羊水 ◉無 ○有

陣痛周期 ○10分以上 ○10～5分 ○5～3分 ◉3分未満 ○測定せず又は測定不能

心拍数基線 ◉正常脈 ○頻脈 ○徐脈 ○除脈(<80)

基線細変動 ◉無 ○5以下 ◉6～25 ○26以上

一過性頻脈 ○無 ◉有

早発一過性徐脈 ◉無 ○有　遅発一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ○無 ◉軽度 ○高度　遅延一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ◉2 ○3 ○4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ○A ◉B ○C ○D　対応と処置

CTGファイル [登録済] [redacted].pdf　CTGファイル情報





症例報告				波形レベル統計							対応統計				
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
47	[redacted]	2	B	0	6	0	8	0	0	0	1	3	5	5	0

【基本情報】

No. 0115　施設内登録件数 54 件　出産日 2008 年 9 月 5 日

施設名 [redacted]　担当者 [redacted]

母氏名 [redacted]　妊娠回数 0　出産回数 0

みりがな [redacted]

【分娩・胎児状況】

母体合併症・合併症 ☐PIH ☐GDM ☐OPD ☐[redacted] ☐[redacted] ☐母体発熱 ☐CAM ☐[redacted] ☐羊水過多 ☐羊水過少 ☐その他

その他の母体合併症・合併症 なし

分娩時刻 16 時 23 分

分娩方法 ◉自然 ○吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 40 週 1 日

羊の状況

体重[g] 2586　身長[cm] 47.5　アプガースコア：1分 8　5分 9

臍帯：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○[redacted]　巻絡 ○無 ◉有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.304　PaO2 [redacted]　PaCO2 [redacted]　BE -4.0　lactate [redacted]

神経学的異常：けいれん ○無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進薬の使用：オキシトシン ○無 ◉有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酸素投与 ○無 ◉有　体位変換 ◉無 ○有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮弛緩薬の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

時刻 15 時 0 分～ 16 時 10 分　子宮口開大度 10 cm ◉無 ○有

陣痛周期 ○10分以上 ○10～5分 ○5～3分 ◉3分未満 ○測定せず又は測定不能

心拍筋基線 ◉正常脈 ○頻脈 ○徐脈 ○徐脈(<80)

基線細変動 ○無 ○5以下 ◉6～25 ○25以上

一過性徐脈 ○無 ◉有

早発一過性徐脈 ◉無 ○有　遅発一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ○無 ◉軽度 ○高度　遷延一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ◉2 ○3 ○4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ○A ◉B ○C ○D　対応と処置

CTGファイル [登録済] [redacted].pdf　CTGファイル情報





症例報告				波形レベル統計							対応統計				
症例	施設	波形レベル	対応	1	2	3	4	5	該当なし	空欄	A	B	C	D	空欄
48	[redacted]	2	B	0	1	5	8	0	0	0	0	5	9	0	0

【基本情報】

No. 0116　施設別登録件数 64 件　出産日 2008 年 8 月 26 日

施設名 [redacted]　担当者 [redacted]

産婦氏名 [redacted]　胎児数 1　出産回数 1

ふりがな

【分娩・胎児状況】

母体現症・合併症 ☐ PIH ☐ GDM ☐ OPD ☐ 前置胎盤 ☐ 胎盤早期剥離 ☐ 母体発熱 ☐ CAM ☐ 前期破水 ☐ 羊水過多 ☐ 羊水過少 ☐ その他

その他の母体現症・合併症 なし

分娩時刻 7 時 26 分

分娩方法 ◉自然 ○吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 36 週 0 日

児の状況

体重[g] 2608　身長[cm] 48.0　アプガースコア：1分 7　5分 9

臍帯：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　巻絡 ◉無 ○有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.364　PaO2 [ ]　PaCO2 [ ]　BE -6.0　lactate [ ]

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進薬の使用：オキシトシン ◉無 ○有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酵素投与 ○無 ◉有　体位変換 ◉無 ○有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮弛緩薬の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

時刻 6 時 30 分 ～ 8 時 40 分　子宮口開大度 9　羊水 ○無 ◉有

陣痛周期 ○10分以上 ○10～5分 ◉5～3分 ○3分未満 ○測定せず又は測定不能

心拍数基線 ◉正常脈 ○頻脈 ○徐脈 ○徐脈(CBD)

基線細変動 ○無 ○5以下 ◉6～25 ○26以上

一過性徐脈 ○無 ◉有

早発一過性徐脈 ◉無 ○有　遅発一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ◉無 ◉軽度 ○高度　遅延一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

サイヌソイダル ○無 ◉有

波形レベル ○1 ◉2 ○3 ○4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ○A ◉B ○C ○D　対応と処置

CTGファイル [登録済] 80826 Iwamoto.txt　CTGファイル情報

症例	症例報告 前　於	波形レベル	対応	波形レベル統計 1	2	3	4	5	該当なし	空欄	対応統計 A	B	C	D	空欄
49	[redacted]	3	B	0	6	6	2	0	0	0	1	7	6	0	0

【基本情報】

No. 0117　施設別登録件数 49 件　出産日 2008 年 6 月 14 日

施設名 [redacted]　担当者 玉田

産婦氏名 [redacted]

ふりがな [redacted]　妊娠回数 1　出産回数 1

【分娩・胎児状況】

母体現症・合併症 □PIH □GDM □OPD □前回胎盤 □胎盤早期剥離 □母体発熱 □CAM ☑前期破水 □羊水過多 □羊水過少 □その他

その他の母体現症・合併症 なし

分娩時刻 7 時 14 分

分娩方法 ○自然 ◉吸引 ○鉗子 ○帝切　妊娠 40 週 5 日

児の状況 NICU管理症

体重[g] 3628　身長[cm] 54.0　アプガースコア：1分 8　5分 9

臍帯：付着部位 ◉正常 ○辺縁 ○卵膜　巻絡 ◉無 ○有

臍帯動脈血液ガス値：

pH 7.274　PaO2 12.3　PaCO2 68.5　BE -5.1　lactate 5

神経学的異常：けいれん ◉無 ○有　脳浮腫 ◉無 ○有

その他

【処置情報】

分娩促進薬の使用：オキシトシン ◉無 ○有　PGF2α ◉無 ○有　PGE2 ◉無 ○有

酵素投与 ◉無 ○有　体位変換 ○無 ◉有

羊水注入 ◉無 ○有　子宮弛緩薬の使用 ◉無 ○有

その他

【CTG評価項目】

時刻 3 時 50 分～ 4 時 0 分　子宮口開大度 8　羊水 ○無 ◉有

陣痛期間 ○10分以上 ○10～5分 ◉5～3分 ○3分未満 ○測定せずまたは測定不能

心拍数基線 ◉正常値 ○頻脈 ○徐脈 ○徐脈(<80)

基線細変動 ○無 ○5以下 ◉6～25 ○26以上

一過性頻脈 ◉無 ○有

早発一過性徐脈 ◉無 ○有　遅発一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度

変動一過性徐脈 ◉無 ○軽度 ○高度　遷延一過性徐脈 ○無 ◉軽度 ○高度

サイヌソイダル ◉無 ○有

波形レベル ○1 ○2 ◉3 ○4 ○5 ○該当なし　心拍数パターン評価による波形レベル選択

対応 ○A ◉B ○C ○D　対応と処置

CTGファイル【登録済】 nozoki.jpg　CTGファイル情報