

表2 ROC 曲線

状況変数:病的ギャンブラー診断の有無(精神科医師の SCID による診断)

検定変数: SOGS 得点

ROC曲線




表3 曲線の座標

検定結果変数: SOGS合計点

	感度	1 - 特異
0.00	1.000	1.000
1.00	1.000	.500
2.00	1.000	.336
3.00	1.000	.245
4.00	1.000	.155
5.00	1.000	.055
6.00	1.000	.036
7.00	1.000	.036
8.00	.991	.036
9.50	.974	.027
13.50	.966	.027
17.50	.957	.009
18.50	.948	.009
19.50	.922	.009
20.50	.862	.000
21.50	.733	.000
22.50	.621	.000
23.50	.440	.000
24.50	.267	.000
25.50	.138	.000
26.50	.052	.000
28.00	.000	.000

II. 病的ギャンブリング関連要因についての検討

1) 対照群と病的ギャンブリング群間の比較

表4 年齢*ギャンブリング開始年齢* SOGS合計点

年齢	健康者 (N=110)		病的ギャンブラー (N=116)		P値
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
ギャンブリング開始年齢	20.30	8.17	20.01	6.93	0.78
SOGS合計点	1.68	3.21	22.66	3.38	<0.001

表5 性別 * SCID診断

	健康者	病的ギャンブラー
男性	86 78.2%	90 77.6%
女性	24 21.8%	26 22.4%

有意差なし
P=0.91

表6 <それぞれのギャンブリングの頻度との関連について>

SOGSパチンコ * SCID診断

	健康者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	86 32.7%	3 2.6%
週に1回未満	55 50.0%	14 12.1%
週に1回以上	19 17.3%	99 85.3%

有意差あり
P<0.001

SOGSスロットマシン、ポーカーマシン * SCID診断

	健康者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	86 32.7%	3 2.6%
週に1回未満	55 50.0%	14 12.1%
週に1回以上	19 17.3%	99 85.3%

有意差あり
P<0.001

SOGS競馬 * SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	55 50.0%	52 44.8%
週に1回未満	48 43.6%	48 41.4%
週に1回以上	7 6.4%	16 13.8%

有意差なし
P<=0.18

SOGS競輪 * SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	94 85.5%	95 81.9%
週に1回未満	15 13.6%	17 14.7%
週に1回以上	1 0.9%	4 3.4%

有意差なし
P=0.41

SOGS競艇、オートレース * SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	95 86.4%	91 78.4%
週に1回未満	15 13.6%	19 16.4%
週に1回以上	0 0.0%	6 5.2%

有意差あり
P=0.04

SOGS麻雀、賭博棋 * SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	77 70.0%	64 55.2%
週に1回未満	31 28.2%	39 33.6%
週に1回以上	2 1.8%	13 11.2%

有意差あり
P=0.007

SOGSインターネット賭博 * SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	110 100.0%	115 99.1%
週に1回未満	0 0.0%	0 0.0%
週に1回以上	0 0.0%	1 0.9%

有意差なし
P=1.00

SOGS花札、ハカラ、ポーカー * SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	94 85.5%	89 76.7%
週に1回未満	15 13.6%	23 19.8%
週に1回以上	1 0.9%	4 3.4%

有意差なし
P<=0.18

SOGsスポーツ賭博 * SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	102 92.7%	98 84.5%
週に1回未満	8 7.3%	18 15.5%
週に1回以上	0 0.0%	0 0.0%

有意差なし
P=0.06

SOGsサイコロ賭博 * SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	100 90.9%	102 87.9%
週に1回未満	10 9.1%	12 10.3%
週に1回以上	0 0.0%	2 1.7%

有意差なし
P=0.36

SOGs賭ゴルフ、賭ビリヤード * SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	91 82.7%	90 77.6%
週に1回未満	19 17.3%	25 21.6%
週に1回以上	0 0.0%	1 0.9%

有意差なし
P<=0.44

SOGsカジノ * SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	105 95.5%	102 89.9%
週に1回未満	5 4.5%	13 11.2%
週に1回以上	0 0.0%	1 0.9%

有意差なし
P<=0.11

SOGsナンパース、宝くじ、サッカーくじ * SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	44 40.0%	34 29.3%
週に1回未満	63 57.3%	72 62.1%
週に1回以上	3 2.7%	10 8.6%

有意差なし
P=0.06

SOGs証券信用取引、先物取引 * SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
全くしたことなし	104 94.5%	113 97.4%
週に1回未満	6 5.5%	2 1.7%
週に1回以上	0 0.0%	1 0.9%

有意差なし
P=0.20

表7 2) 自死問題との関連について

設問18 自殺年慮の経験(生涯)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
あり	16 14.5%	72 62.1%
なし	94 85.5%	44 37.9%

有意差あり
P<0.001

設問19(2) 自殺年慮の経験(最近1年以内)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
真剣に死にたいと 考えたことなし	94 85.5%	44 37.9%
あり	3 2.7%	31 26.7%
なし	13 11.8%	41 35.3%

有意差あり
P<0.001

設問22 自殺企図の経験(生涯)とギャンブラー問題の関連有無* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
行動したことなし	108 98.2%	68 58.6%
関連あり	0 0.0%	44 37.9%
関連なし	2 1.8%	4 3.4%

有意差あり
P<0.001

設問19(1) 自殺年慮の経験(生涯)とギャンブラー問題の関連有無* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
真剣に死にたいと 考えたことなし	94 85.5%	44 37.9%
関連あり	0 0.0%	64 55.2%
関連なし	16 14.5%	8 6.9%

有意差あり
P<0.001

設問21 自殺企図の経験(生涯)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
あり	2 1.8%	47 40.5%
なし	108 98.2%	69 59.5%

有意差あり
P<0.001

設問23 自殺の行動(最近1年以内)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
行動したことなし	108 98.2%	67 57.8%
あり	0 0.0%	14 12.1%
なし	2 1.8%	35 30.2%

有意差あり
P<0.001

表8 3) 他の精神障害との関連について

うつ病(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	107	112
	97.3%	96.6%
エピソードあり	3	4
	2.7%	3.4%

有意差なし
P=1.00

うつ病(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	63
	54.3%
エピソードあり	53
	45.7%

メランコリー型うつ病(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	107	115
	97.3%	99.1%
エピソードあり	3	1
	2.7%	0.9%

有意差なし
P<0.36

メランコリー型うつ病(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	95
	81.9%
エピソードあり	21
	18.1%

精神病症状を伴ううつ病(現在)* SCID診断

※両群とも精神病症状を伴ううつ病エピソード(現在)を満たす人はいない。

精神病症状を伴ううつ病(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

※精神病症状を伴ううつ病エピソード(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)を満たす人はいない。

気分変動症(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	110	110
	100.0%	94.8%
エピソードあり	0	6
	0.0%	5.2%

有意差あり
P=0.03

気分変動症(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	109
	94.0%
エピソードあり	7
	6.0%

躁病(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	110 100.0%	115 99.1%
エピソードあり	0 0.0%	1 0.9%

有意差なし
P=1.00

躁病(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	115 99.1%
エピソードあり	1 0.9%

※本来、躁病エピソードにより説明される過度なギャンプリング行為のみでは、病的ギャンプリングの診断はつかないが、そのような診断基準を満たした1名のデータを、今回の調査結果には含めた。

軽躁病(現在)* SCID診断

※両群とも軽躁病エピソード(現在)を満たす人はいない。

軽躁病(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

※軽躁病エピソード(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)を満たす人はいない。

広場恐怖を伴わないパニック障害(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	110 100.0%	114 98.3%
エピソードあり	0 0.0%	2 1.7%

有意差なし
P<=0.50

広場恐怖を伴わないパニック障害(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	114 98.3%
エピソードあり	2 1.7%

広場恐怖を伴うパニック障害(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	110 100.0%	115 99.1%
エピソードあり	0 0.0%	1 0.9%

有意差なし
P=1.00

広場恐怖を伴うパニック障害(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	114 98.3%
エピソードあり	2 1.7%

パニック障害の既往のない広場恐怖(現在)* SCID診断

※両群ともパニック障害の既往のない広場恐怖エピソード(現在)を満たす人はいない。

パニック障害の既往のない広場恐怖(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

※パニック障害の既往のない広場恐怖エピソード(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)を満たす人はいない。

社会不安障害(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	109 99.1%	108 93.1%
エピソードあり	1 0.9%	8 6.9%

有意差あり
P<=0.04

社会不安障害(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	107 92.2%
エピソードあり	9 7.8%

強迫性障害(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	110 100.0%	115 99.1%
エピソードあり	0 0.0%	1 0.9%

有意差なし
P=1.00

強迫性障害(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	115 99.1%
エピソードあり	1 0.9%

PTSD(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	108 98.2%	115 99.1%
エピソードあり	2 1.8%	1 0.9%

有意差なし
P=0.61

PTSD(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	115 99.1%
エピソードあり	1 0.9%

アルコール依存(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	107 97.3%	113 97.4%
エピソードあり	3 2.7%	3 2.6%

有意差なし
P=1.00

アルコール依存ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	106 91.4%
エピソードあり	10 8.6%

アルコール乱用(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	109 99.1%	116 100.0%
エピソードあり	1 0.9%	0 0.0%

有意差なし
P<=0.50

アルコール乱用(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	112 96.6%
エピソードあり	4 3.4%

薬物依存(現在)* SCID診断

※両群とも薬物依存エピソード(現在)を満たす人はいない。

薬物依存(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

※薬物依存エピソード(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)を満たす人はいない。

薬物乱用(現在)* SCID診断

※両群とも薬物乱用エピソード(現在)を満たす人はいない。

薬物乱用(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	115 99.1%
エピソードあり	1 0.9%

統合失調症(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	110 100.0%	115 94.1%
エピソードあり	0 0.0%	1 0.9%

有意差なし
P=1.00

統合失調症(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	115 99.1%
エピソードあり	1 0.9%

統合失調感情障害(現在)* SCID診断

※両群とも統合失調感情障害エピソード(現在)を満たす人はいない。

統合失調感情障害(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)割合

※統合失調感情障害エピソード(ギャンプリングを最もやりこんでいた時期)を満たす人はいない。

妄想性障害(現在)* SCID診断

妄想性障害(ギャンブラー)を最もやりこんでいた時期)割合

※両群とも妄想性障害エピソード(現在)を満たす人はいない。

※妄想性障害エピソード(ギャンブラー)を最もやりこんでいた時期)を満たす人はいない。

全般性不安障害(現在)* SCID診断

全般性不安障害(ギャンブラー)を最もやりこんでいた時期)割合

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	110 100.0%	114 98.3%
エピソードあり	0 0.0%	2 1.7%

有意差なし
P<0.50

	病的ギャンブラー
エピソードなし	114 98.3%
エピソードあり	2 1.7%

反社会性パーソナリティ障害(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	110 100.0%	113 97.4%
エピソードあり	0 0.0%	3 2.6%

有意差なし
P=0.90

4)性別とギャンブラーの資金を得るための違法行為(窃盗、横領、偽造、詐欺等)の有無との関連について

表9 性別* SCID病的ギャンブラーの違法行為の有無

	情報不確実	なし、または否定	閾値以下	閾値以上、または肯定
男性	1 50.0%	24 66.7%	8 61.5%	57 87.7%
女性	1 50.0%	12 33.3%	5 38.5%	8 12.3%

有意差なし
P<0.06

表10 ギャンブリングにはまるきっかけとなった出来事、生活上感じていたストレス等について
(自由記載まとめ)

あり:206(重複可)、なし:12

1. 仕事、職場関係	50
仕事上の負担	21
職場の人間関係に関する気疲れ	16
就職の失敗もしくは不本意な就職	4
職場の人達の誘い	3
転職時の過剰適応	2
職場上司への不満	1
会社合併にともなう精神的負担	1
業務への興味の喪失	1
退職	1

2. 配偶者、子ども、舅姑、介護問題関係	34
配偶者との関係が悪い、家の居心地の悪さ	9
配偶者への不満	7
子供との関係悪化	4
配偶者への過度な気遣い	3
配偶者の厳しい金銭管理	3
育児負担、子育ての悩み	2
介護負担、トラブル	2
姑への不満	2
離婚	1
配偶者の誘い	1

3. ギャンブリングの楽しさ、居心地のよさ	32
ビギナーズラックもしくは小額で大勝した経験	12
小遣い稼ぎもしくは一攫千金をねらう	12
充実感、全能感を求める	5
息抜き、居心地のよさを感じる	2
海外のカジノを経験	1

4. 親、兄弟関係	29
親との関係悪化	6
親、養親への過度な気遣い	6
親の厳しい金銭管理	3
親への不満	3
両親の不和	3
親のアルコール問題、暴力問題	2
家族の死去	2
親の監視からの開放感	1
親の誘い	1
兄弟からの誘い	1
兄弟との不和	1

5. 自己不全感、幼少期からの周囲との違和感	18
幼少期からの周囲との違和感	7
現実逃避	5
孤独感	3
劣等感、自己否定感	3

6. 友人、恋人等関係	17
友人からの誘い	4
恋人との不和、失恋	4
友人への過度な気遣い	3
友人がいないことの寂しさ	3
友人との関係悪化	2
信頼していた人の不祥事	1

7. 進路選択、受験、スポーツ等関係	10
打ち込んでいたスポーツ、趣味をやめたこと	4
大学受験失敗、受験のプレッシャー	3
成績の低下、進路の悩み	2
塾の息抜きとして	1

8. その他	16
借金の心理的負担から逃れるため	6
自由時間、暇な時間が増えたことをきっかけとして	5
健康上の不安	2
安易な気持ちから	1
アルコールを飲んだ勢いから	1
ダイエットとして	1

H20 年度版
病的ギャンブリング関連機関リスト

病的キャンピング関連病院

※ プログラムなどを用いて対応しているところや、相互援助(自助)グループへの結びつけのみを行っているところなど、それぞれの病院での取り組みは異なるため、受診に際しては事前の確認を要する。

	〒	住所	電話
北海道	047-0036	北海道小樽市長橋3-7-7	0134-25-6655
	057-0007	北海道浦河郡浦河町東町ちのみ1-2-1	01462-2-5111
	063-0005	北海道札幌市西区山の手五条5-1-1	011-644-5111
青森県			
秋田県			
岩手県			
山形県			
宮城県	981-0933	宮城県仙台市青葉区柏木1-8-7	022-234-0461
福島県			
茨城県			
栃木県			
群馬県	379-1111	群馬県渋川市赤城町北赤城山1051	0279-56-8148
埼玉県	346-0024	埼玉県久喜市北青柳1366-1	0480-23-6540
千葉県	274-0054	千葉県船橋市金堀町521	047-457-7151
東京都	175-0091	東京都板橋区三園1-19-1	03-3939-1191
神奈川県			
山梨県			

長野県	駒ヶ根病院	399-4101	長野県駒ヶ根市下平2901	0265-83-3181
	城西病院	390-0875	長野県松本市城西1-5-16	0263-33-6400
新潟県				
富山県	富山市民病院	939-8511	富山県富山市今泉北部町2-1	076-422-1112
石川県	公立能登総合病院	926-8610	石川県七尾市藤橋町了部6-4	0767-52-6611
	かないわ病院	920-0351	石川県金沢市普正寺町9-6	076-267-0601
福井県	公立小浜病院	917-0078	福井県小浜市大手町2-2	0770-52-0990
岐阜県	各務原病院	504-0802	岐阜県各務原市蘇原持田町3-38	0583-89-2228
静岡県	服部病院	438-0026	静岡県磐田市西貝塚3781-2	0538-32-7121
	聖明病院	417-0801	静岡県富士市大淵888	0545-36-0277
愛知県				
三重県	三重県立こころの医療センター	514-0818	三重県津市城山1-12-1	059-235-2125
滋賀県	公立高島総合病院	520-1121	滋賀県高島市勝野1667	0740-36-0220
京都府				
大阪府	光愛病院	569-1041	大阪府高槻市奈佐原4-3-1	072-696-2881
兵庫県				
奈良県				
和歌山県				
鳥取県	渡辺病院	680-0011	鳥取県鳥取市東町3-307	0857-24-1151
鳥根県	鳥根県立こころの医療センター	693-0032	鳥根県出雲市下古志町1574-4	0853-30-0556

岡山県	岡山県精神科医療センター	700-0915	岡山県岡山市鹿田本町3-16	086-225-3821
広島県				
山口県				
徳島県				
香川県				
愛媛県				
高知県				
福岡県	八幡厚生病院	807-0846	福岡県北九州市八幡西区里中3-12-12	093-691-3431
	千鳥橋病院	812-0044	福岡県福岡市博多区千代5-18-1	092-641-2761
	雁の巣病院	811-0206	福岡県福岡市東区雁の巣1-26-1	092-606-2861
佐賀県	肥前精神医療センター	842-0104	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津160	0952-52-3231
長崎県	西脇病院	850-0835	長崎県長崎市桜木町3-14	095-827-1187
熊本県	菊陽病院	869-1102	熊本県菊池郡菊陽町原水野5587	096-232-3171
	桜が丘病院	860-0082	熊本県熊本市池田3-44-1	096-352-6264
	くわみず病院	862-0954	熊本県熊本市神水1-14-41	096-381-2248
大分県				
宮崎県	大悟病院	889-1911	宮崎県北諸郡三股町大字長田1270	0986-52-5800
鹿児島県	指宿竹本病院	891-0304	鹿児島県指宿市東方7531	0993-23-2311
沖縄県	国立病院機構琉球病院	904-1201	沖縄県国頭郡金城町字金城7958-1	098-968-2133
	田崎病院	902-0062	沖縄県那覇市松川319	098-885-2375
	糸満晴明病院	901-0334	沖縄県糸満市字大度520	098-997-2011

病的ギャングリング関連クリニック、診療所

※ プログラムなどを用いて対応しているところや、相互援助(自助)グループへの結びつけのみを行っているところなど、それぞれのクリニック、診療所での取り組みは異なるため、受診に際しては事前の確認を要する。

	〒	住所	電話
北海道	007-0870	北海道札幌市東区伏古10条2-14-16 水島ビル2F	011-789-6100
青森県			
秋田県			
岩手県			
山形県	990-0044	山形県山形市木の実町9-52-205	023-615-0018
宮城県	981-0913	宮城県仙台市青葉区昭和町2-25 HCビル2F	022-274-2772
	981-3111	宮城県仙台市泉区松森字下町8-1	022-722-9801
福島県	963-8014	福島県郡山市虎丸町14-4 丸三ビル2F	024-934-3960
茨城県	310-0851	茨城県水戸市千波町2077-6	0292-44-1212
栃木県			
群馬県			
埼玉県	330-0803	埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-305	048-641-2133
	330-0071	埼玉県さいたま市浦和区上木崎4-2-25	048-831-0012
	330-0062	埼玉県さいたま市浦和区仲町1-2-12 関根ビル4F	048-824-7302
千葉県			

東京都	雷門メンタルクリニック	111-0034	東京都台東区雷門2-18-15 パインビル4F	03-5828-3841
	タカハシクリニック	144-0052	東京都大田区蒲田4-29-3	03-5828-3841
	周愛利田クリニック	114-0016	東京都北区上中里3-6-13	03-3911-3050
	たかつきクリニック	196-0014	東京都昭島市中町562-8 昭島昭和ビル3F	0425-43-6781
	外苑神経科	150-0002	東京都渋谷区渋谷1-10-12 宮城ビル4F	03-3498-6123
	榎本クリニック	171-0021	東京都豊島区西池袋1-2-5	03-3982-5321
	さいとうクリニック	106-0045	東京都港区麻布十番2-14-5	03-5476-6550
神奈川県	岩崎メンタルクリニック	251-0024	神奈川県藤沢市鶴沼橋1-16-14 ヤマキビル3F	0466-25-6363
	関内メンタルクリニック	231-0027	神奈川県横浜市中区扇町1-1-25	045-664-7000
	石井心療内科	222-0012	神奈川県横浜市港北区富士塚1-14-28	045-433-1420
	大石クリニック	231-0058	神奈川県横浜市中区弥生町4-41 大石第一ビル	045-262-0014
山梨県				
長野県	かとうメンタルクリニック	390-0872	長野県松本市北深志1-5-18	0263-34-6141
新潟県				
富山県				
石川県	かとうクリニック	920-0855	石川県金沢市武蔵町13-27	076-224-6500
	さぶりクリニック	920-0982	石川県金沢市大工町30-1	076-224-9229
	ひろメンタルクリニック	920-0024	石川県金沢市西念3-1-32 西清ビルA-1	076-234-1621
福井県				
岐阜県				

静岡県	城北公園クリニック	420-0886	静岡県静岡市葵区大岩4-25-43	054-245-6700
	ふじ心療クリニック	416-0923	静岡県富士市横割本町16-16 イナビル2F	0545-65-3790
愛知県	西山クリニック	465-0025	愛知県名古屋市長区上社1-70	052-771-1600
	あらたまこころのクリニック	467-0066	愛知県名古屋市長区瑞穂区洲山町1-49	052-852-8177
三重県				
滋賀県				
京都府	竹村診療所	607-8422	京都府京都市山科区御陵封じ山町7-71	075-593-1051
	おくい診療所	616-8313	京都府京都市右京区嵯峨野開町8-60	075-873-3515
	広兼神経内科クリニック	612-8048	京都府京都市伏見区大坂町602	075-622-3006
大阪府	新阿武山クリニック	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島4-5-22 第3新大阪ビル2階	06-6390-6772
兵庫県	ただしメンタルクリニック	663-8204	兵庫県西宮市高松町4-37	0798-69-2881
奈良県				
和歌山県				
鳥取県				
島根県	福田クリニック	690-0823	島根県松江市西川津町3592 パークサイドビル1F	0852-31-7100
岡山県				
広島県				
山口県				
徳島県				
香川県				
愛媛県				
高知県				