


図3-2. 咽頭淋菌感染症（男） ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県




図3-3. 咽頭淋菌感染症（男） ※人口10万人あたり





図3-4. 咽頭淋菌感染症（男） ※人口10万人あたり

徳島県





図3-5. 咽頭淋菌感染症（男） ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図3-6. 咽頭淋菌感染症（女） ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県





図3-7. 咽頭淋菌感染症（女） ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県





図3-8. 咽頭淋菌感染症（女） ※人口10万人あたり

茨城県



岩手県




図3-9. 咽頭淋菌感染症(女) ※人口10万人あたり

徳島県







図3-10. 咽頭淋菌感染症(女) ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図4-1. 非淋菌性尿道炎（男） ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県





図4-2. 非淋菌性尿道炎（男） ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県




図4-3. 非淋菌性尿道炎（男） ※人口10万人あたり





図4-4. 非淋菌性尿道炎（男） ※人口10万人あたり

徳島県





図4-5. 非淋菌性尿道炎（男） ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図4-6. 非淋菌性尿道炎（女） ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県




図4-7. 非淋菌性尿道炎（女） ※人口10万人あたり








図4-8. 非淋菌性尿道炎（女） ※人口10万人あたり

茨城県



岩手県




図4-9. 非淋菌性尿道炎（女） ※人口10万人あたり

徳島県





図4-10. 非淋菌性尿道炎（女） ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図5-1. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（男） ※人口 10 万人あたり

兵庫県



千葉県

