


図5-2. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（男） ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県





図5-3. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（男） ※人口10万人あたり

茨城県



岩手県




図5-4. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（男） ※人口10万人あたり

徳島県





図5-5. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（男） ※人口 10 万人あたり

4 県計



7 県計





図5-6. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（女） ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県





図5-7. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（女） ※人口 10 万人あたり

岐阜県



石川県





図5-8. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（女） ※人口10万人あたり

茨城県



岩手県




図5-9. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（女） ※人口 10 万人あたり

徳島県





図5-10. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（女） ※人口10万人あたり
あたり

4 県計



7 県計





図6-1. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発）（男） ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県





図6-2. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発）（男） ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県




図6-3. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発）（男） ※人口10万人あたり





図6-4. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発）（男） ※人口10万人あたり

徳島県





図6-5. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発）（男） ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図6-6. 性器ヘルペスウイルス感染症(再発)(女) ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県





図6-7. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発）（女） ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県





図6-8. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発）（女） ※人口10万人あたり

茨城県



岩手県




図6-9. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発）（女） ※人口10万人あたり

徳島県





図6-10. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発）（女） ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図7-1. 尖圭コンジローマ（男） ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県

