

図4-8. 非淋菌性尿道炎(女) ※人口10万人あたり





図4-9. 非淋菌性尿道炎（女） ※人口10万人あたり

徳島県





図4-10. 非淋菌性尿道炎（女） ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図5-1. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（男） ※人口 10 万人あたり

兵庫県



千葉県





図5-2. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（男） ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県





図5-3. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（男） ※人口10万人あたり

茨城県



岩手県




図5-4. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（男） ※人口 10 万人あたり

徳島県





図5-5. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（男） ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計







図5-6. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（女） ※人口 10 万人あたり

兵庫県



千葉県





図5-7. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（女） ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県





図5-8. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（女） ※人口 10 万人あたり

茨城県



岩手県




図5-9. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（女） ※人口10万人あたり

徳島県





図5-10. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染）（女） ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図6-1. 性器ヘルペスウイルス感染症(再発)(男) ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県





図6-2. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発）（男） ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県





図6-3. 性器ヘルペスウイルス感染症(再発)(男) ※人口10万人あたり

茨城県



岩手県






図6-4. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発）（男） ※人口10万人あたり

徳島県





図6-5. 性器ヘルペスウイルス感染症(再発)(男) ※人口10万人あたり

4 県計



7 県計





図6-6. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発）（女） ※人口10万人あたり

兵庫県



千葉県





図6-7. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発）（女） ※人口10万人あたり

岐阜県



石川県

