

- (1) 臨床症状の改善は通常、72時間以内に認められるので、急激な症状の増悪のないかぎり3日目までは抗菌薬変更を行うべきではない。
- (2) 3日間経過後も治療効果が得られない場合、臨床所見や細菌学的検査を参考に抗生物質の変更の必要性を検討する。
- (3) 緑膿菌やアシネトバクター属などの耐性傾向の強い菌による肺炎を除き、初期治療が有効なら治療期間は7～10日間でよい。
- (4) 漫然とした長期投与は、薬剤耐性菌の出現を助長する。

### 3) 初期抗菌薬の選択

抗菌薬の感受性の地域パターンと、予想される副作用、最近使用した抗生物質などを考慮し、以下のように、広域の抗菌薬を選択する。

- (1) 可能性のある病原体が、肺炎球菌、インフルエンザ菌、メチシリン感受性黄色ブドウ球菌 (methicillin sensitive *Staphylococcus aureus*; MSSA)
  - ①セフトリアキソン (CTRX。ロセフィン®)：1回1～2g、1日2回 (最大量：4g/日)
  - ②スルバクタム/アンピシリン (SBT/ABPC。ユナシンS®)：1回3g、1日2～4回 (最大量：6g/日)
  - ③シプロフロキサシン (CPFX。シプロキサシン®)：1回0.3g、1日2回 (最大量：0.6g/日)
- (2) 後期発症および多剤耐性菌リスクのある場合
 

以下の抗菌薬の併用が薦められる。

  - ①抗緑膿菌性セファロスポリンの例
 

セフェピム (CFPM。マキシピーム®)：1回1～2g、1日2～4回 (最大量：4g/日)
  - ②抗緑膿菌性カルバペネムの例
 

メロベネム (MEPM。メロベン®)：1回0.5～1g、1日2～4回 (最大量：2g/日)
  - ③タゾバクタム/ピペラシリン (TAZ/PIPC。ゾシン®)：1回4.5g、1日2～4回 (最大量：18g/日)
  - ④抗緑膿菌性フルオロキサシンの例
 

シプロフロキサシン (CPFX。シプロキサシン®)：1回0.3g、1日2回 (最大量：0.6g/日)
  - ⑤アミノグリコシド (アミカシン、ゲンタマイシンなど) の例
    - ・アミカシン (AMK。硫酸アミカシン®)：推奨用量として15 mg/kgを24時間ごとに点滴
    - ・ゲンタマイシン (GM。ゲンタシン®)：推奨用量として5 mg/kgを24時間ごとに点滴
  - ⑥バンコマイシン (VCM。塩酸バンコマイシン®)：1回500 mg～1g、1日2～4回 (最大量：2g/日)。TDMを実施し、最高血中濃度20～40 μg/mL、トランプ値5～10 μg/mL (重症例は10～15 μg/mL以上) となるように調節  
併用例は以下のとおりである。

- ・ 緑膿菌やクレブシエラの可能性が高いとき：〔①あるいは②あるいは③〕 + 〔④あるいは⑤〕
- ・ MRSAも加わっていると考えられるとき：〔①あるいは②あるいは③〕 + 〔④あるいは⑤〕 + ⑥
- ・ ESBL（基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ）産生菌の可能性があるとき：②の単剤が第1選択薬、④または⑤も使用可能。併用効果は不明
- ・ レジオネラ菌の可能性があるときは、マクロライド+④

## 7. 予防対策

予防対策の要点は以下のとおりである。

### 1) 人工呼吸器および周辺機器の管理

- (1) 人工呼吸器本体を滅菌・消毒する必要はない。ただし、VAPの原因であることが疑われるときは、直ちに呼吸器内部の回路を含めて、本体表面の細菌検査をし、滅菌・消毒を行う。
- (2) 人工呼吸器回路は再使用時には滅菌する。
- (3) 人工呼吸器回路を同一患者に使用する場合、定期的に変換する必要はなく、汚れがあれば交換する。
- (4) 人工呼吸器に関連したディスポーザブル製品は再利用しない。
- (5) 加温加湿器に比べて肺炎の合併症率は低いため、喀痰排泄が多い場合や気道抵抗が高い場合以外は、人工鼻を使用する。人工鼻は48時間以内であれば交換する必要はない。
- (6) ネプライザーは使用后、滅菌水で洗浄し、空気乾燥させる。
- (7) 回路内の結露は、患者側に流入しないよう頻回に排出する。
- (8) 加温加湿器には滅菌水（通常、注射用蒸留水を用いる）を使用する。
- (9) アンビューバッグは当該患者専用とし、定期的に変換する。
- (10) 人工呼吸器装着中の誤嚥によるVAP防止のため、患者の体位は基礎疾患などの状況が許すかぎり半座位（上体を30～45°挙上）にする。
- (11) 人工呼吸器からの早期の離脱を図る。

### 2) 手洗いと手袋

- (1) 吸引時には手袋を使用する。
- (2) 汚染された手袋をしたまま人工呼吸器を操作しない。
- (3) スタンダードプリコーションに準じ、交差感染を起こさないようにする。

### 3) 気道内分泌物の吸引

- (1) 開放式ではディスポーザブルの吸引チューブを使用し、1回ごとに使い捨てにしたほうがよい。
- (2) 閉鎖式吸引システムを使用してもよい。
- (3) 気管内吸引操作は清潔操作とし、必要最小限にとどめる。
- (4) 吸引チューブの洗浄には滅菌水を使用する。
- (5) 吸引回路や吸引びんは当該患者専用とする。


### 4) 気管チューブと挿管

- (1) VAP防止の観点からは原則的に経口挿管を選択する。

- (2) カフ圧を20cmHg以上にする。
  - (3) カフ上部の貯留物を吸引するための側孔付きの気管チューブを使用し、カフ上部の貯留物を、持続吸引または注射器により側孔から定期的に吸引、除去する。これでVAPが半減するとの報告がある。
  - (4) 気管チューブ抜管時または気管チューブを動かす前には、口腔内およびカフ上部の貯留物を吸引、除去する。
- 5) 口腔内清拭
- (1) 定期的に口腔内清拭を行う。
  - (2) 定期的に口腔内分泌物を吸引、除去する。特に唾液が貯留しやすい患者では重要である。
- 6) 栄養および経管栄養チューブ
- (1) 栄養剤注入時には、可能なかぎり頭位を30～40° 挙上する。
  - (2) 経鼻胃管チューブなどはできるかぎり早期に除去する。
  - (3) 定期的に経管栄養チューブの位置を確認し、消化管の蠕動運動の評価を行う。
- 7) ストレス潰瘍予防薬
- (1) ストレス潰瘍の危険性の少ない患者へのH<sub>2</sub>受容体拮抗薬の投与は行わない。
  - (2) 明らかな上部消化管出血が存在する患者や、ストレス潰瘍の危険のきわめて高い患者（過去に消化性潰瘍の既往がある患者など）では、H<sub>2</sub>受容体拮抗薬を投与する。
  - (3) ストレス潰瘍の危険が高い患者では、胃のpHを上げない薬剤を選択する。

病院・診療所・介護老人施設における  
院内感染防止手順例

## C 疾患別感染防止対策





## 1 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) 感染症 (5類) : 一般

黄色ブドウ球菌は鼻腔などの上気道の常在細菌の一つであり、市中健常者の1%以上、医療従事者の5%以上がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* ; MRSA) を保菌しているといわれている。入院患者から分離される黄色ブドウ球菌の約60%がMRSAであり、医療従事者の手指や医療器具を介して他の患者に接触感染する。したがって、院内感染防止には全般的な標準予防策と、クリティカルポイントを定め、また、ハイリスク患者について重点的に、接触感染予防策を遵守することが重要となる。ハイリスク患者とは、未熟児・新生児、高齢者、重度の熱傷および外傷者、気管切開患者、気管カニューレや中心静脈カテーテル、尿道カテーテルの留置患者、透析患者、広域抗菌薬の長期投与患者、ステロイド薬や免疫抑制薬、抗がん薬の投与患者、侵襲の大きな手術を受けた患者などである。

血液、髄液、胸水、腹水など、通常は無菌的な場所から菌が分離された場合、および、膿、喀痰、尿などから菌が分離された場合は、臨床症状や幼若白血球増加、好中球による貪食像、CRP上昇などの診断基準を満たすものをMRSA感染症 (=治療の対象) とする。

結核病棟でのリファンピシン耐性、開発途上国からの患者由来のトリメトプリム耐性、療養型病棟での多剤耐性に注意を要する。


### 収録した手順例

- ◆ MRSA 感染防止対策 (個別管理に対する) フローチャート B-[1]-1
- ◆ MRSA 発生時のチェックリスト B-[1]-2
- ◆ MRSA 検出患者発生時の対応 B-[1]-3
- ◆ MRSA 感染対策の実際 (療養型病棟、介護老人保健施設など) B-[1]-4
- ◆ 院内感染関連報告票 (発生時・続報・解除時) B-[1]-5
- ◆ MRSA に対する感染対策 B-[1]-6



B-[1]-1

## MRSA 感染防止対策（個別管理に対する）フローチャート





B-[1]-2

## MRSA 発生時のチェックリスト

病棟

患者名	年齢	病室	主治医	病棟看護師長
男 女	歳	号室		
菌の検出（検体）		平成 年 月 日		
開放	喀痰、気管支洗浄液、咽頭粘膜、鼻腔、耳漏、眼脂、糞便、開放ドレーン、胃液、腔頭管分泌物、尿道分泌物、褥瘡、皮膚、CV、その他（ ） ※該当項目に○を、（ ）は記入			
非開放	カテーテル尿、閉鎖式ドレーン（腹水、胸水）穿刺液、血液 その他（ ） ※該当項目に○を、（ ）は記入			
<b>感 染 対 策</b>				
病室	個室	大部屋可		
手袋	適宜	手洗い	手指消毒	処置時着用
ガウン	不要	処置時着用	常時着用	
マスク	不要	飛沫の拡散時着用	常時着用	
キャップ	不要	飛沫の拡散時着用	常時着用	
清掃	一般と同じ	薬液清掃で最後に		
入浴	不可	可		
<b>患者家族への説明</b>				
	「MRSA について」保菌状態の説明をする そのうえでハイリスク患者との接触を避けることや、手洗いの励行を促す			
	個室でガウンテクニックが必要な場合は、別紙マニュアルに沿った説明と同意			
治療中止後の培養検査結果			個別管理解除の月日	
1回目	月 日（+、-）		平成 年 月 日	
2回目	月 日（+、-）		報告者	
3回目	月 日（+、-）		病棟看護師長	

\*このチェックリストをもとにケアを行い、スタッフ間で統一する。



B-[1]-3

## MRSA 検出患者発生時の対応

### 1. スタッフへの伝達

担当医、病棟看護師長より、看護師、放射線技師、医師にMRSA 検出患者であることを伝える。

部屋の管理は、ハイリスク患者と同室にならないように配慮する。

院内感染防止委員会への報告（様式例＝B-[1]-5）

### 2. 患者・家族への説明

1. MRSA は接触感染であり、直接接触することにより感染する。
2. MRSA は弱毒菌であり、健康者に感染症を引き起こすことはまれである。
3. 面会前後に流水と石けんでよく手を洗うこと、特に退室時には擦式手指消毒薬（0.2%塩化ベンザルコニウム加アルコール）で手指を消毒する。
4. 患者の衣類はビニール袋に入れて持ち帰り、通常どおり洗濯し、日光消毒をすれば大丈夫。
5. その他、不安やわからないことがあれば看護師に気軽に聞いてください。

### 掲示する場合

☆☆☆ ご家族および面会を希望される方へ ☆☆☆

面会を希望されるときは、病室に入る前に看護師に声をかけてください。

☆☆☆ ご家族の方へ ☆☆☆

患者さんよりMRSAという細菌が検出されました。  
この菌は健康な人には影響ありませんが、感染症を発症すると治療が困難な細菌です。  
病気などで抵抗力が弱っている方の面会をご遠慮ください。

- ◇ 病室に入るとき・出るときは、病室入り口の消毒液で手指を消毒してください。
- ◇ 必要時、ディスポーザブルエプロンとマスクを着用してください。
- ◇ 洗濯物は、お持ち帰りになり、洗濯してください。

何か心配な点、ご不明な点などいつでも看護師に聞いてください。




## B-[1]-4 MRSA 感染対策の実際〈療養型病棟、介護老人保健施設など〉

### 1. 検査により MRSA 陽性であることが判明した場合

- ① MRSA 陽性と判明したら、患者情報を「院内感染関連報告票」(B-[1]-5 参照)を用いて施設の感染対策担当者に連絡する。
- ② 主治医より患者・家族に MRSA が検出されたことと、感染対策の必要性などについて十分に説明する。

### 2. 隔離の基準

- ① 下記の図に従って隔離を決定する。個室隔離ができない場合はカーテンなどで隔離を行う。
- ② カテーテルを使用している患者や、皮膚炎のある患者、徘徊のある患者とは同室させない。



### 3. MRSA 隔離病室の運用

- ① 病室の入り口（エリアの入り口）に、手袋、擦式手指消毒薬、プラスチックエプロン、マスク、専用のごみ袋を設置する（右の写真参照）。
- ② 体温計、血圧計、聴診器などは専用のものを用意する。
- ③ 使用機器は可能な限り専用とする。共有で使用する場合は、搬出時に消毒用アルコール（消毒用エタノール液 IP\*）か 0.1%次亜塩素酸ナトリウム（20 倍希釈ビューラックス\*）で清拭する。
- ④ 隔離病室のドアはなるべく閉めておき、換気のために、時々、窓をあける。
- ⑤ 皮膚炎や気管切開など、環境中に MRSA が飛散しやすい状況の場合は、1 日 1 回以上は清掃する。



#### 4. 介護上の注意点

- ① 患者に直接接触しない場合は、退室時に手洗いまたは擦式手指消毒薬で手指消毒する。
- ② 患者に接触する場合は、手袋を着用する。
- ③ 体位変換、患者清拭、ベッドメイキングをするときなどは、手袋、プラスチックエプロンを着用する。
- ④ 吸引処置などで飛散する分泌物を吸入する可能性のある場合は、手袋、プラスチックエプロン、マスクを着用する。
- ⑤ 退室時は、手袋、プラスチックエプロン、マスクをはずしてごみ袋に入れ、速やかに手洗いまたは擦式手指消毒薬で手指消毒を行う。
- ⑥ 処置に使用したカテーテルや使用後のおむつは感染性廃棄物としてごみ袋に入れ、速やかに処理する。

#### 5. MRSA 陽性患者の移動

- ① MRSA 陽性患者が検査や治療の目的で他の診療部門や他施設に移動することは問題ない。該当の部署・施設にはあらかじめ連絡しておき、診察の順番などに配慮する。
- ② 咳や痰が多い患者には移動の際にサージカルマスクを着用させる。
- ③ 患者の使用した車椅子は、洗浄剤や消毒用アルコールで清拭を行う。

#### 6. MRSA 陽性患者の使用した食器類、残飯の取り扱い

- ① 通常のごみ処理でよい。
- ② 配膳者が隔離室に入るときに、エプロン、マスク、手袋などは必要ない。

#### 7. MRSA 陽性患者の使用した病室の清掃

##### 〈日常の清掃〉

- ① 清掃は、ベッドメイキングの後で行う。
- ② 通常の洗剤と温湯を用い、プラスチックエプロンと手袋を着用して行う。
- ③ 床はぬらしたモップで拭く。
- ④ 家具類やドアノブなどの清掃は、アルコールウエットティッシュで行う。

##### 〈患者退室後の清掃〉

- ① 看護用具は部屋から出すときに、十分に消毒用アルコールで拭く。
- ② 清掃方法は日々の清掃と同じでよい。患者が触れるおそれのある壁は、腕の届く高さまで清掃する。カーテンの汚染があれば通常どおり洗濯する。

#### 8. MRSA 陽性患者に対する面会人への注意

- ① 通常は面会人が MRSA 感染を生じることはない。
- ② マスクやエプロンを着用する必要はない。
- ③ 入室および退室時に手洗いまたは擦式手指消毒薬で手指消毒を行う。
- ④ 複数の患者に面会する場合は、MRSA 陽性患者の順番を後にする。
- ⑤ できるだけ乳幼児、小児の面会は最小限にする。



B-[1]-5

## 院内感染関連報告票〈発生時・続報・解除時〉

<input type="checkbox"/> MRSA	<input type="checkbox"/> VRSA	<input type="checkbox"/> PRSP (PISP)	<input type="checkbox"/> VRE
<input type="checkbox"/> 多剤耐性緑膿菌			
<input type="checkbox"/> メタローβ-ラクタマーゼ産生グラム陰性杆菌			
<input type="checkbox"/> セラチア	<input type="checkbox"/> レジオネラ	<input type="checkbox"/> その他 ( )	
報告日 : 平成 年 月 日			
診療科・病棟 :			
主治医・担当医 :			(PHS )
師長・担当看護師 :			

- \* MRSA 等が発生した場合、●の項目を記入し、速やかに ICT に提出してください。  
 \* 発生時より状態が変化した場合、必要事項を記入し、速やかに ICT まで提出してください。  
 \* 感染解除時には、転帰を記入してください。

## &lt;発生時：看護師記入&gt;

- 入院日 : 平成 年 月 日 [新規・再入院・転院・転棟 ( ) 病棟より]  
 ●発生日 : 平成 年 月 日 ●入院時 MRSA 感染 : [有・無・不明]  
 ●救護区分 : [担送・護送・独歩] ●看護度 : [ ]  
 ●部屋 : [ 号室 / ベッド] ●管理状況 : [個別管理 1・個別管理 2・個別管理 3]  
 部屋を移動した場合、移動前の部屋 : [ 号室 / ベッド]

## &lt;発生時：医師記入&gt;

- 検出結果：検査日：平成 年 月 日 / 検査材料別の菌量 (++, +, +等) を記入してください。

鼻腔	咽頭	喀痰	尿	便	膿	血液	その他 ( )

- 感染症関連データ：検査前後 3 日間 (トータル 1 週間) の最高値を記入してください。  
 \* 体温 : ( ) °C \* CRP : ( ) \* 白血球数 : ( )  
 ●感染の判定 : [感染・疑い・保菌] (感染・疑いの場合、以下の「○」の項目をご記入ください)  
 ○感染症診断名 : [ ]  
 ○基礎疾患名 : [ ]  
 ○カテーテル・人工器官等の有無 (あるものに「✓」を付けてください)  
 膀胱留置カテーテル  IVH カテーテル  SG カテーテル  
 ドレーン (PTCD を含む)  気管挿管・人工呼吸器  人工器官 (弁・骨頭・血管)  
 経鼻・経管栄養  末梢血管内留置カテーテル  その他  
 ○基礎疾患に対する治療 (感染判定前 30 日以内のデータ) (あるものに「✓」を付けてください)  
 ○カテーテル・人工器官等の有無  
 免疫抑制薬  副腎皮質ステロイド薬  抗悪性腫瘍薬  
 手術  透析  放射線治療 (部位 : )  
 ○感染と判断した日を起点に 30 日以内に投与された抗菌薬 (薬剤名のみ記載)  
 注射薬 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 内服薬 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 ○当該感染症に対する抗菌薬 (薬剤名のみ記載)  
 注射薬 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 内服薬 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

## &lt;解除時：担当医師記入&gt;

- 転帰 : 平成 年 月 日 [陰性化 退院 転院 死亡]

< ICT からの連絡 >	整理番号

\* 病棟から ICT への連絡や、特記事項がありましたら、裏面に記入してください。



B-[1]-6

## MRSA に対する感染対策

	個別管理 1	個別管理 2	個別管理 3
病室	個室	可能ならば個室 大部屋でも可 ハイリスク患者から離れた位置	大部屋で可 ハイリスク患者から離れた位置
エプロン ガウン	患者に接触時に使用する（ディス ポーザブルのエプロン、ガウン）	患者に接触時に使用する	適宜
マスク	使用する（サージカルマスク）	適宜	不要
手袋	患者に接触時に着用する	患者に接触時に着用する	適宜 着用しない場合は接触前後に 手洗いと手指消毒を実施する
手洗い	処置の前後に衛生的な手洗いを実施する 手洗い設備がない場合は擦式手指消毒薬を使用する		
使用器材	病室に持ち込む器材は最小限 にする 血圧計、聴診器、体温計など は専用化する	病室に持ち込む器材は最小限 にする 血圧計、聴診器、体温計など は専用化する	血圧計、聴診器、体温計など は、必要時には専用化する。 またはアルコール消毒する
	耐熱性、非耐熱性にかかわらず滅菌し、再利用する物は洗剤と温湯で洗浄した後滅菌室 （中央材料室）に提出する 病棟管理の器材は、耐熱性の物は熱湯消毒（80℃、10分）し、非耐熱性の物は水洗いす る		
食器類	通常の熱処理（そのまま返却）		
リネン 衣類	汚染リネンは床に置いたりせず、速やかにビニール袋に密封して搬送する 衣類はビニール袋に密封して搬送する 衣類は自宅に持ち帰り、洗濯し、日光消毒する		
ベッド清拭	ベッドは通常の清拭でよい マットレスはビニールカバーをして使用し、通常の清拭でよい		
便器・尿器	通常の消毒		
感染性廃棄物	廃棄物はすべて感染性廃棄物として取り扱い、密封する		
環境整備	患者1人に1枚のディスポーザブルタオルで清拭する（オーバーテーブル、床頭台、ナース コール、ベッドなど） 手の触れる箇所（手すり、ドアノブなど）も同様に清拭する。アルコールウェットティッ シュが便利である		

C 疾患別感染防止対策

	個別管理 1	個別管理 2	個別管理 3
処置回診	<p>回診や処置の順番は最後にする【清潔→汚染の原則】</p> <p>必要時は専用の処置セットを用意する</p> <p>事前に石けんと流水で手洗いまたは擦式手指消毒薬を使用し、必要時は手袋を着用する</p> <p>感染集の処置時は、ティスボーザブルエプロンを使用する</p> <p>喀痰吸引のカテーテルは吸引のたびにカテーテルを廃棄する</p> <p>処置後は、石けんと流水で手洗いまたは擦式手指消毒薬を使用する【1処置1手洗いの原則】</p>		

国立病院機構香川小児病院



## 2 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) 感染症(5類):ハイリスク病棟

MRSA による院内感染事例を分析して、ハイリスク病棟を同定した。未熟児・新生児室、心臓血管外科病棟、脳神経外科病棟、耳鼻科・眼科混合病棟などがあげられる。

新生児は、出生時には無菌状態であるが、その後時間の経過とともに皮膚、上気道、消化管などに正常細菌叢が形成される。この間に MRSA に接すると、それが定着し細菌叢の一部になってしまい、長期間保菌する場合がある。特に新生児未熟児室、新生児特殊管理治療室 (neonatal intensive care unit ; NICU) の環境は一般病室より高温多湿のため、微生物の増殖は速く、少数の細菌でも付着すると急速に増え、細菌叢を形成しやすいので、クリティカルポイントの一つとして対処すべきである。

### 収録した手順例


☞ NICU 感染管理手順① B-[2]-1

☞ NICU 感染管理手順②

☞ ハイリスク病棟 (MRSA) — NICU B-[2]-3



## NICU 感染管理手順①



国立病院機構長野病院



B-[2]-2

## NICU 感染管理手順②

### 1. 入室・退室の方法

- 1) 医療従事者は入室前に、前室で、
  - 水道水でうがいをし、石けんと流水で肘関節まで洗浄後、ペーパータオルで拭く。
  - 必要に応じて、マスク、ガウンを着用する。
- 2) 面会者の入室は両親のみとし、感染症状がないか確認してから面会する。
- 3) 面会前後には前室にて、石けん、流水で手を洗う。

### 2. 環境整備

- 1) 室内の床はオートモップで毎日、水拭きする。  
MRSA などが検出された場合は非汚染区域と汚染区域を設定し、非汚染区域から汚染区域へ清掃する。
- 2) 水回りなどを含め、毎日清掃する。ペーパータオルなどのディスポーザブル製品を用い、水拭きする。  
冷蔵庫内外→処置台→コンピュータ周囲→天井から下がっているユニットの周り→机や流しなど、拭けるところは全部拭く。
- 3) 児に使用する物品は個人専用とする。体温計、聴診器、ストップウォッチ、絆創膏類、はさみ、アルコール綿、その他の個人専用のできるものはすべて個人専用にする。

### 3. 保育器の消毒方法

- 1) 使用中
  - ①保育器の内側の頭部側から足部側に向かって水拭き後、乾拭きする。同様に保育器の外側を拭く。ペーパータオルなどのディスポーザブル製品を用い、毎日行う。
  - ②加湿槽と湿度計の滅菌蒸留水を1日1回交換する。
  - ③ビニール袖は週2回交換し、洗浄した後、乾燥させ、滅菌する。
  - ④継続使用する場合は、週1回、保育器を交換する。
  - ⑤保育器のフィルターは、メーカーの推奨する期間で交換する。
  - ⑥インファントウォーマー、コットも、①に記載した方法で、保育器と同様に拭く。
- 2) 使用后
  - ①分解できるものはすべて分解する。
  - ②プラスチック、ゴム類、金属類は0.1%塩化ベンザルコニウムまたは0.1%両性界面活性剤に30分以上浸す。
  - ③取りはずせないものは0.1%次亜塩素酸ナトリウムで、金属部分は消毒用エタノールで清拭の後、乾拭きする。
  - ④再度、保育器を組み立て、器内温を37.0℃に上げ、6時間空回しさせ乾燥させる。
  - ⑤MRSA 患児の使用した保育器も、同様に消毒する。



#### 4. 哺乳

- 1) 母乳は専用の冷凍庫で保存する（使用期限は1か月）。
- 2) ミルクは栄養部で1日分を一括調乳して、保冷庫で保管する。
- 3) 水加熱式温乳器の場合は、1日3回、水を抜いて器内を洗浄し、乾燥後に水を入れる。乾熱式温乳器の場合は、1日1回、器内を水拭きし、乾燥後に使用する。
- 4) 哺乳びん、乳首は栄養部での熱消毒が望ましいが、NICUで行う場合には0.01%次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。

#### 5. 使用器材

- 1) 人工呼吸器回路交換、モジュール交換  
使用中は回路の定期交換は行わない。汚染時にはそのつど交換する。長期間使用する場合は1か月程度で交換する。  
使用後の回路はビニール袋で密閉し、高水準消毒を行う。可能ならばディスポーザブルとする。
- 2) 静脈ラインチューブ交換、フィルター交換
  - (1) 静脈ラインは閉鎖式のものを使用し、ルート交換（3方活栓を含む）は3日ごとに行う。
  - (2) PIカテーテルのフィルター、延長チューブ交換は3日ごとに行う。
- 3) 吸引チューブ（可能ならばディスポーザブルとする）
  - (1) 気管内吸引チューブは毎回交換する。
  - (2) 鼻腔、口腔内吸引チューブは各勤務帯で交換する。吸引チューブは使用后、毎回、外側をアルコール綿で拭き、滅菌蒸留水を通す。

#### 6. リネン類

- 1) 保育器内およびコットで使用するリネン類は通常のものでよい。
- 2) リネンは基本的に毎日交換する。

#### 7. 処置

- 1) すべての児に対して処置ごとにディスポーザブル手袋を使用する。その前後に、衛生的な手洗いを行う。
- 2) MRSAおよび他の感染が判明した場合には、速やかに隔離し、経路別感染予防対策を行う。

#### 8. 沐浴

- 1) 体重の少ない感染徴候のない児から行い、沐浴後は沐浴槽を家庭用洗剤で洗浄後、乾燥を確認し、次の児を沐浴する。
- 2) 感染徴候のある児、感染のある児は別の沐浴槽を使用する。
- 3) 沐浴終了後は家庭用洗剤で洗浄後、よく乾燥させる。



B-[2]-3

## ハイリスク病棟（MRSA）— NICU

監視培養	週1回、監視培養を行う 皮膚損傷部位があれば、含めて行う
病室	NICU内でコホーティングする
プラスチック エプロン	患児に接触時、使用する
サージカル マスク	使用する
手袋	患児に接触時、使用する
手洗い	処置の前後に手指消毒（流水と石けんでの手指消毒が基本）を肘の高さまで実施する 同一患児の処置変更の場合は擦式手指消毒薬を使用する
使用器材	血圧計、聴診器、体温計などは専用とする 滅菌再利用する物は密閉し、中央材料室へ依頼する 病棟管理の器材は、耐熱性の物は熱湯消毒（80℃、10分）し、非耐熱性の物は石けんで水洗い後、消毒をする
食器類	通常の熱処理を行う（そのまま返却）
哺乳びん、 乳首等	哺乳びん、乳首は栄養部での熱消毒が望ましい。NICUで行う場合には、0.01%次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。
リネン 衣類	汚染リネンは速やかにビニール袋に密封して搬送する 衣類はビニール袋に密封して搬送する 衣類は自宅に持ち帰って洗濯し、日光消毒もしくは乾燥機にて十分乾燥させる
コット清拭	コットは毎日、通常の清拭を行う マットレスも通常の清拭でよい
保育器清拭	保育器は毎日、通常の清拭を行う 保育器交換は1週間に1回行う。使用后パーツをすべて分解して洗浄し、乾燥させる
看護物品	耐熱性物品は熱湯消毒（80℃、10分）する。 非耐熱性物品は界面活性剤を使用して洗浄後、乾燥させる
感染性廃棄物	鋭利なものや注射器は、シャープセーフ*（鋭利器具専用廃棄箱）に入れる 固形のものにはオレンジ色のバイオハザードマークの感染性廃棄箱に入れる
環境整備	通常の清掃を毎日行い、周辺機器で清掃が難しいものは消毒剤（アルコール）を使用し清掃する
処置回診	回診や処置の順番は最後にする【清潔→汚染の原則】 処置前に手指消毒をし、手袋を着用する。手袋除去後にも手指消毒を実施する【1処置1手洗いの原則】 感染染の処置などは、プラスチックエプロンを着用する 喀痰吸引はディスポーザブルカテーテルを使用し、そのつど廃棄する



### 3 多剤耐性緑膿菌感染症（5類）

多剤耐性緑膿菌（MDRP）は、治療や院内感染対策のうえで通常の緑膿菌とはまったく異なる病原体として扱わなくてはならない。現在、MDRPが日本の医療施設で新興しはじめている。これまでのところ、多くの病院ではMDRPが分離される症例が年間数例程度であるが、その一方でMDRP院内感染多発事例が長期間持続的に報告されている病院もある。MDRPの蔓延を阻止するためには、以下のような感染対策プログラムを実施する必要がある。

- ① 病院長の強いリーダーシップのもとに感染対策チームはもとより職員全員が一丸となった感染対策プログラムを実施する。
- ② すべての医療従事者がMDRPに関する知識を十分にもつ。
- ③ MDRPを重点的に監視し、得られた情報をできるだけ早く医療現場に周知する。
- ④ 原則、個室管理を含む徹底した感染予防策を実施する。
- ⑤ MDRPの感染源となりうるような病棟内の水回り（汚物処理）を消毒・整備する。
- ⑥ 適正な抗緑膿菌薬、特にカルバペネム系の使用法が適正かどうかを再検討し、必要であれば是正する。

なお、カルバペネム、アミノグリコシド、フルオロキノロンの3系統すべてに耐性の緑膿菌をMDRPと定義する。判定基準は、厚生労働省院内感染対策サーベイランス、薬剤耐性菌判定基準、<http://www.nih-janis.jp/material/薬剤耐性菌判定基準改定20070712.pdf>に記載されている。

#### 収録した手順例

- 多剤耐性および2剤耐性緑膿菌感染対策
- 多剤耐性緑膿菌感染予防マニュアル
- 蓄尿時の感染対策〈蓄尿カップの管理、汚物室の環境整備〉




## 多剤耐性および2剤耐性緑膿菌感染対策

### 1. 院内感染対策の対象

気道由来検体（喀痰、咽頭ぬぐいなど）、あるいは尿より分離された緑膿菌で、カルバペネム（IPM/CS、MEPM）、アミノグリコシド（AMK）、フルオロキノロン（NFLX、OFLX、LVFX、CPFX、GFLX.）のうち2剤以上に耐性をもっているものである。

ICTが薬剤感受性結果のチェックを行い、上記に該当する場合には、当該病棟に連絡し、下記の対策を実施するよう指導する。

### 2. 対策の方法



### 3. 対策解除の基準

- ①抗菌薬の中止後、48時間以上経過した後に採取した培養検査で2回連続して陰性の場合は解除する。
- ②再燃のリスクがあるため、その後、週1回の頻度で培養検査を提出する。

### 4. 同一病棟で、同一の耐性パターンをもつ緑膿菌が検出された場合

状況によっては、PFGEによる解析が必要であり、ICTがその適応を決定する。

### 5. 3剤以上の耐性菌の持続保菌が疑われる症例

外来カルテ表紙に「MDRP」のスタンプを押す。再入院時には、その取り扱いについて、ICTと協議する。