

耐性菌検出が外来初診後数日で結果が得られる。また、血液を使った補助診断法を組み合わせることによって潜在感染の診断もより正確なものになる。誌面の関係上、各検査法の詳細な結果については、文献を参考されたい。

文 献

- 1) Higuchi T, Fushiwaki T, Tanaka N, et al: Direct detection of rifampicin resistant Mycobacterium tuberculosis in sputum by line probe assay (LiPA). *Kekkaku* 79: 525-530, 2004
- 2) Okuda Y, Maekura R, Hirotsani A, et al: Rapid serodiagnosis of active pulmonary Mycobacterium tuberculosis by analysis of results from

multiple antigen-specific tests. *J Clin Microbiol* 42: 1136-1141, 2004

- 3) Mazurek GH, Jereb J, Lobue P, et al: Guidelines for using the QuantiFERON-TB Gold test for detecting Mycobacterium tuberculosis infection, United States. *MMWR Recomm Rep* 54: 49-55, 2005
- 4) Kitada S, Kobayashi K, Ichiyama S, et al: Serodiagnosis of Mycobacterium avium-complex pulmonary disease using an enzyme immunoassay kit. *Am J Respir Crit Care Med* 177: 793-797, 2008

(** 国立病院機構刀根山病院・副院長
〒560-8552 大阪府豊中市刀根山5-1-1
** 同・検査科・主任)