

F11. アヘン使用による精神および行動の障害	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
	221	44	35	14	3	4	212	6	8	25	45	16
F1x.0 急性症状	217	46	36	13	3	3	195	6	7	32	44	10
.00 併発症状がないもの	218	47	37	11	3	2	216	6	9	37	41	7
.01 外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	218	47	37	11	3	2	216	6	10	36	42	6
.02 他の医学的合併症を伴うもの	218	47	37	10	3	3	216	6	10	35	43	6
.03 せん妄を伴うもの	218	46	36	11	4	3	215	6	8	35	44	7
.04 知覚変容を伴うもの	218	46	36	11	4	3	216	6	8	35	44	7
.05 昏睡を伴うもの	218	46	37	11	3	2	216	6	9	35	44	6
.06 けいれんを伴うもの	218	46	37	11	3	2	216	6	9	35	44	6
.07 病的中毒	218	47	36	11	4	2	216	6	8	35	44	7
F1x.1 有害な使用	218	45	36	11	4	3	216	6	7	33	45	8
F1x.2 依存症候群	217	43	36	13	4	4	215	5	7	32	47	10
.20 現在中断しているもの	216	45	35	14	4	2	216	6	7	35	44	7
.21 現在中断しているが、保護された環境にいるもの	218	44	37	13	4	2	215	7	7	37	42	7
.22 現在臨床指導によって中断を継続している者、あるいは置換療法下にあるもの (コントロールされた依存)	218	45	37	13	3	2	216	7	8	37	41	7

	回答者数			使用頻度 (%)			回答者数			必要性 (%)		
	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である		
.23 現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	218	46	37	12	2	216	9	8	38	39	6	
.24 現在物質を使用しているもの (依存中)	218	45	36	13	2	216	7	7	36	42	7	
.25 持続的使用	218	45	34	16	2	214	6	9	36	43	7	
.26 陣間的使用 (渴酒症)	218	46	36	14	2	214	7	9	36	42	6	
Flx.3 離脱状態	218	45	34	16	2	215	5	7	33	47	8	
.30 併発症状がないもの	218	45	35	14	2	215	6	8	37	42	7	
.31 けいれんをともなうもの	218	45	36	13	2	215	6	8	37	42	7	
Flx.4 せん妄をともなう離脱状態	218	45	35	14	2	215	6	7	33	47	7	
.40 けいれんを伴わないもの	218	45	36	13	2	215	7	8	37	41	7	
.41 けいれんを伴うもの	218	45	36	13	2	215	6	8	36	44	6	
Flx.5 精神病性障害	218	44	34	15	3	215	6	7	35	45	7	
.50 統合失調症様のもの	218	44	36	12	3	215	7	8	37	42	6	
.51 主として妄想性のもの	218	45	36	13	3	215	7	8	37	42	6	
.52 主として幻覚性のもの	217	45	36	13	2	215	7	8	37	41	7	
.53 主として多形性のもの	218	45	38	12	2	215	6	9	38	41	6	
.54 主としてうつ病性症状のもの	218	45	37	11	2	215	7	8	37	42	6	
.55 主として躁鬱性症状のもの	218	45	38	12	2	215	7	8	39	40	6	

	回答者数			使用頻度 (%)			回答者数			必要性 (%)		
	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である		
.56 混合性のもの	218	46	37	12	3	2	215	7	8	38	40	6
Flx.6 健忘症候群	218	45	36	13	4	2	215	6	7	35	44	7
Flx.7 残遺性および逆発性精神病性障害	218	45	35	13	5	2	215	6	8	33	45	7
.70 フラッシュバック	218	46	34	14	4	2	215	6	8	35	44	7
.71 パーソナリティあるいは行動の障害	217	45	35	14	4	2	215	7	8	35	42	7
.72 残遺性感情障害	218	45	35	13	5	2	215	7	8	35	42	8
.73 認知症	218	46	36	11	4	3	214	6	9	36	42	7
.74 他の持続性認知障害	218	45	37	12	3	2	214	6	9	37	41	7
.75 逆発性精神病性障害	218	45	37	13	3	2	214	6	9	38	41	7
Flx.8 他の精神および行動の障害	218	46	36	13	3	2	214	6	10	38	40	7
Flx.9 特定不能の精神および行動の障害	218	46	36	12	4	2	214	6	10	41	37	7
F12: 大麻使用による精神および行動の障害	220	35	37	20	5	3	213	3	7	25	50	15
第 4, 5 桁カテゴリーは、以下の臨床状態を特定するのに用いる:												
Flx.0 急性症状	217	39	39	16	4	2	214	5	7	29	50	8
.00 併発症状がないもの	217	39	41	13	4	2	214	6	9	33	45	7
.01 外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	217	41	41	12	3	2	214	6	10	33	43	7

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
.02 他の医学的合併症を伴うもの	217	41	41	13	4	2	214	6	10	33	44	7
.03 せん妄を伴うもの	217	40	40	15	3	2	214	6	9	31	47	7
.04 知覚変容を伴うもの	217	40	40	14	4	2	214	6	9	32	45	8
.05 昏睡を伴うもの	217	41	41	12	3	2	214	6	9	32	45	7
.06 けいれんを伴うもの	217	41	41	12	4	2	214	6	9	32	46	7
.07 病的中毒	216	41	40	13	4	2	214	6	8	32	46	7
Flx.1 有害な使用	217	38	41	14	4	3	214	5	9	30	47	9
Flx.2 依存症候群	218	36	37	19	5	3	216	5	6	29	52	8
.20 現在中断しているもの	218	38	40	15	5	2	216	6	8	33	46	7
.21 現在中断しているが、保護された環境にいるもの	218	39	41	15	4	2	216	6	9	34	44	6
.22 現在臨床指導によって中断を継続している者、あるいは置換療法下にあるもの (コントロールされた依存)	218	39	41	14	4	2	216	6	9	34	44	6
.23 現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	218	42	39	12	5	2	216	9	8	34	43	6
.24 現在物質を使用しているもの (依存中)	218	38	39	15	4	3	216	6	8	31	47	7
.25 持続的使用	217	39	39	15	5	2	216	6	9	31	47	7
.26 陣発的使用 (渴酒症)	217	39	40	15	4	2	215	6	9	32	47	7

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
Flx.3 離脱状態	218	39	41	14	4	2	216	6	7	31	49	8
.30 併発症状がないもの	218	40	41	13	4	2	216	7	8	33	45	6
.31 けいれんをともなうもの	218	40	41	12	4	2	216	6	8	33	46	6
Flx.4 せん妄をともなう離脱状態	218	41	40	13	4	2	216	6	7	32	48	6
.40 けいれんを伴わないもの	218	41	40	12	4	2	216	7	8	32	46	6
.41 けいれんを伴うもの	218	40	41	12	4	2	216	6	8	33	45	6
Flx.5 精神病性障害	218	39	38	15	6	2	216	5	7	31	49	8
.50 統合失調症様のもの	218	39	39	14	5	2	216	6	8	33	46	7
.51 主として妄想性のもの	218	40	38	15	5	2	215	6	8	33	46	7
.52 主として幻覚性のもの	218	40	37	16	5	2	215	6	8	33	47	7
.53 主として多形性のもの	218	41	39	13	4	2	215	6	8	33	47	6
.54 主としてうつ病性症状のもの	218	41	39	14	4	2	215	7	7	33	46	7
.55 主として躁鬱性症状のもの	218	42	38	14	5	2	215	7	7	33	46	7
.56 混合性のもの	218	41	39	14	4	2	215	7	7	34	46	6
Flx.6 健忘症候群	218	41	39	14	4	3	215	6	7	32	47	7
Flx.7 残遺性および遅発性精神病性障害	218	41	38	15	5	2	216	6	7	32	48	7
.70 フラッシュバック	218	40	39	15	3	3	216	6	8	31	47	7
.71 パーソナリティあるいは行動の障害	218	41	38	15	4	2	216	6	9	31	47	7

	使用頻度 (%)			必要性 (%)								
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらとも いえない	必要である	非常に必要である	
.72 残遺性感覚障害	218	41	38	14	4	3	216	6	8	32	49	6
.73 認知症	218	42	38	13	5	2	216	6	8	33	46	6
.74 他の持続性認知障害	218	41	39	14	4	2	215	7	8	34	45	7
.75 遅発性精神病性障害	218	41	39	13	4	2	216	6	8	32	47	6
Flx.8 他の精神および行動の障害	218	41	39	14	3	2	216	6	9	35	44	6
Flx.9 特定不能の精神および行動の障害	218	42	39	14	3	2	216	6	8	36	44	6
F13. 鎮静薬あるいは睡眠薬使用による 精神および行動の障害	221	12	18	46	13	12	220	2	4	16	60	19
第 4, 5 桁カテゴリは、以下の臨床状態を特定するのに用いる:												
Flx.0 急性症状	219	18	22	37	16	6	216	4	4	21	57	13
.00 併発症状がないもの	219	22	34	30	10	3	216	6	6	27	52	9
.01 外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	218	22	37	31	7	3	216	6	7	29	49	8
.02 他の医学的合併症を伴うもの	217	23	32	33	8	4	214	6	7	28	50	9
.03 せん妄を伴うもの	219	17	26	36	15	6	216	5	6	24	56	11
.04 知覚変容を伴うもの	218	21	32	33	10	5	216	6	6	25	53	10
.05 昏睡を伴うもの	218	21	28	32	15	5	216	6	5	25	54	11
.06 けいれんを伴うもの	218	20	34	31	11	5	216	6	6	25	53	10

	回答者数			使用頻度 (%)				必要性 (%)				
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
.07 病的中毒	219	19	32	32	14	4	216	4	6	25	54	10
Flx.1 有害な使用	217	18	27	33	17	5	214	4	5	26	54	11
Flx.2 依存症候群	218	15	23	37	19	6	215	3	5	21	58	13
.20 現在中断しているもの	218	22	34	31	9	4	214	5	7	26	53	9
.21 現在中断しているが、保護された環境にいるもの	219	22	38	29	7	4	215	7	8	29	50	7
.22 現在臨床指導によって中断を継続している者、あるいは置換療法下にあるもの (コントロールされた依存)	219	23	36	30	7	4	215	7	7	29	50	7
.23 現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	219	30	35	26	6	3	215	10	7	30	47	7
.24 現在物質を使用しているもの (依存中)	219	19	28	37	11	5	216	5	5	26	53	11
.25 持続的使用	219	22	27	35	11	4	216	4	6	27	52	11
.26 挿間的使用 (渴酒症)	219	25	34	28	9	4	216	5	6	29	50	9
Flx.3 離脱状態	217	17	29	35	13	5	215	2	7	24	56	12
.30 併発症状がないもの	219	23	35	29	10	3	216	6	7	27	51	9
.31 けいれんをともなうもの	219	21	34	31	10	5	215	5	6	27	53	10
Flx.4 せん妄をともなう離脱状態	219	19	29	36	12	5	217	3	5	26	55	11
.40 けいれんを伴わないもの	218	22	34	32	9	4	216	5	6	27	52	10

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
.41 けいれんを伴うもの	218	22	34	29	10	4	216	5	6	27	53	9
Flx.5 精神病性障害	219	25	39	24	8	4	217	5	6	28	52	9
.50 統合失調症様のもの	219	25	42	22	7	4	217	5	8	29	50	8
.51 主として妄想性のもの	219	26	40	23	8	4	217	6	8	29	49	8
.52 主として幻覚性のもの	219	26	38	25	8	4	217	6	8	29	48	9
.53 主として多形性のもの	219	27	40	23	6	3	217	6	9	31	47	7
.54 主としてうつ病性症状のもの	219	25	40	24	8	4	217	5	8	30	49	7
.55 主として躁鬱性症状のもの	219	27	40	22	7	3	217	6	8	31	47	7
.56 混合性のもの	218	27	40	23	6	4	216	6	8	31	48	7
Flx.6 健忘症候群	219	24	31	29	12	5	216	5	6	29	50	10
Flx.7 残遺性および選発性精神病性障害	219	26	41	21	8	4	216	5	7	31	49	8
.70 フラッシュバック	219	27	41	21	8	3	216	5	7	32	48	8
.71 パーソナリティあるいは行動の障害	219	27	42	21	7	3	216	6	8	32	47	7
.72 残遺性感情障害	218	28	44	19	6	3	216	5	8	34	46	6
.73 認知症	218	28	43	19	7	3	215	5	7	33	47	7
.74 他の持続性認知障害	219	29	44	17	7	3	216	6	9	35	43	7
.75 選発性精神病性障害	218	28	45	17	6	3	216	6	9	34	45	6
Flx.8 他の精神および行動の障害	219	29	42	20	6	3	216	5	9	36	44	6

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
F1x.9 特定不能の精神および行動の障害	219	29	41	21	6	3	216	5	9	37	43	6
F14. コカイン使用による精神および行動の障害	218	41	36	16	4	3	209	5	6	24	51	14
第 4, 5 桁カテゴリは、以下の臨床状態を特定するのに用いる:												
F1x.0 急性症状	218	42	38	14	4	2	210	5	5	30	51	9
.00 併発症状がないもの	218	44	39	12	4	2	210	6	6	35	46	7
.01 外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	218	44	40	11	4	2	210	7	6	36	44	7
.02 他の医学的合併症を伴うもの	218	44	40	11	3	2	210	7	7	35	45	7
.03 せん妄を伴うもの	218	43	39	12	4	2	210	6	6	34	46	8
.04 知覚変容を伴うもの	218	43	40	11	4	2	210	6	6	34	46	7
.05 昏睡を伴うもの	218	43	40	12	3	2	209	7	6	34	46	7
.06 けいれんを伴うもの	218	43	40	11	4	2	210	6	7	34	47	7
.07 病的中毒	217	44	37	14	4	1	215	6	7	33	47	7
F1x.1 有害な使用	218	43	37	15	4	2	216	6	6	31	49	9
F1x.2 依存症候群	218	42	37	15	4	2	216	5	6	31	49	10
.20 現在中断しているもの	218	42	39	13	3	2	215	6	6	33	48	7
.21 現在中断しているが、保護された環境にいるもの	218	42	39	13	4	1	216	6	6	35	46	7

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
.22 現在臨床指導によって中断を継続している者、あるいは置換療法下にあるもの (コントロールされた依存)	218	43	39	13	3	2	216	7	7	34	44	7
.23 現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	218	44	38	13	4	1	216	8	7	35	44	6
.24 現在物質を使用しているもの (依存中)	218	42	39	14	4	2	216	6	6	31	48	7
.25 持続的使用	218	42	39	14	4	2	216	6	7	31	48	8
.26 挿間的使用 (渴酒症)	218	43	38	14	3	2	216	6	7	32	47	7
Flx-3 離脱状態	218	42	39	14	4	2	215	5	7	31	49	8
.30 併発症状がないもの	218	43	39	13	4	2	215	7	7	33	46	7
.31 けいれんをともなうもの	218	42	39	13	3	2	215	7	7	34	46	7
Flx-4 せん妄をともなう離脱状態	218	42	40	12	4	2	216	6	7	31	48	8
.40 けいれんを伴わないもの	218	43	39	12	3	2	216	7	7	33	45	7
.41 けいれんを伴うもの	217	43	39	12	3	2	216	7	7	33	45	7
Flx-5 精神病性障害	217	41	38	15	4	3	215	5	6	32	48	9
.50 統合失調症様のもの	217	41	38	14	3	3	215	6	7	33	46	8
.51 主として妄想性のもの	217	41	39	14	3	3	215	6	7	34	45	8
.52 主として幻覚性のもの	217	41	39	14	3	3	215	6	7	34	45	8
.53 主として多形性のもの	217	43	39	13	3	3	215	6	7	35	45	7

	使用頻度 (%)			必要性 (%)								
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
.54 主としてうつ病性症状のもの	217	42	39	13	3	3	215	7	7	34	45	8
.55 主として躁鬱性症状のもの	216	43	38	13	2	3	215	7	7	35	44	8
.56 混合性のも F1x.6 健忘症候群	217	43	38	13	3	3	215	7	7	35	44	8
F1x.7 残遺性および運発性精神病性障害	216	42	40	13	3	3	214	6	6	34	45	9
.70 フラッシュバック	217	41	38	15	3	3	215	6	6	32	47	9
.71 パーソナリティあるいは行動の障害	216	42	38	15	3	2	215	5	7	33	47	8
.72 残遺性感情障害	217	42	39	13	3	3	215	6	7	33	46	8
.73 認知症	217	42	38	15	3	3	215	6	7	33	45	8
.74 他の持続性認知障害	217	42	40	12	3	3	215	6	7	36	42	9
.75 運発性精神病性障害	217	43	39	12	3	3	215	7	7	36	42	9
F1x.8 他の精神および行動の障害	217	42	39	13	3	3	215	7	7	34	43	8
F1x.9 特定不能の精神および行動の障害	217	43	39	12	3	3	215	6	8	36	43	7
F15: カフェインを含む他の精神刺激薬 使用による精神および行動の障害	217	42	39	13	3	3	215	6	8	37	42	8
第 4、5 桁カテゴリーは、以下の臨床状態を特定するのに用いる:	217	29	35	27	5	4	204	3	5	33	48	11
F1x.0 急性症状	217	33	41	18	5	2	216	4	7	33	47	8

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
.00 併発症がないもの	217	35	43	16	4	3	216	6	8	37	43	7
.01 外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	217	35	44	15	4	2	216	6	9	37	42	6
.02 他の医学的合併症を伴うもの	217	35	44	15	4	2	216	6	9	36	43	6
.03 せん妄を伴うもの	217	34	42	18	4	2	216	5	8	37	44	7
.04 知覚変容を伴うもの	217	34	43	17	4	2	216	6	8	37	44	6
.05 昏睡を伴うもの	216	35	44	16	3	3	216	6	8	37	42	7
.06 けいれんを伴うもの	216	36	43	16	3	2	216	5	8	37	43	6
.07 病的中毒	217	35	43	16	4	2	215	5	8	36	44	7
F1x.1 有害な使用	217	33	39	21	4	3	216	5	7	36	43	9
F1x.2 依存症候群	217	32	36	24	5	3	216	5	7	33	46	8
.20 現在中断しているもの	217	33	42	18	5	2	216	6	8	36	43	8
.21 現在中断しているが、保護された環境にいるもの	217	34	43	17	4	2	216	6	8	36	43	6
.22 現在臨床指導によって中断を継続している者、あるいは置換療法下にあるもの（コントロールされた依存）	217	35	42	17	4	2	216	6	9	36	43	6
.23 現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	218	38	42	15	4	1	214	8	7	39	40	5
.24 現在物質を使用しているもの（依存中）	218	33	40	21	4	2	214	7	6	37	44	6

	回答者数			使用頻度 (%)			回答者数			必要性 (%)		
	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である		
.25 持続的使用	218	33	40	21	2	214	7	7	36	44	6	
.26 挿問的使用 (濁酒症)	218	34	42	18	2	214	7	7	37	43	6	
Flx.3 離脱状態	218	33	42	19	2	214	5	7	36	45	7	
.30 併発症状がないもの	218	34	44	16	2	214	7	7	37	42	6	
.31 けいれんをともなうもの	218	35	44	17	3	214	7	8	38	41	6	
Flx.4 せん妄をともなう離脱状態	218	35	43	17	2	214	6	7	36	44	7	
.40 けいれんを伴わないもの	218	36	43	16	2	214	7	7	37	42	7	
.41 けいれんを伴うもの	218	35	44	16	2	214	7	8	37	43	6	
Flx.5 精神病性障害	218	34	38	21	2	215	7	7	34	45	7	
.50 統合失調症様のもの	218	35	40	18	5	215	7	8	37	41	7	
.51 主として妄想性のもの	218	35	40	18	5	215	7	8	36	42	6	
.52 主として幻覚性のもの	218	35	40	18	5	215	7	8	37	41	7	
.53 主として多形性のもの	217	35	42	17	5	215	7	8	37	42	6	
.54 主としてうつ病性症状のもの	218	35	42	17	5	215	8	8	35	42	7	
.55 主として躁鬱性症状のもの	218	35	41	17	4	215	8	7	36	42	7	
.56 混合性のもの	218	35	42	17	4	215	8	7	36	41	7	
Flx.6 健忘症候群	216	36	43	15	2	215	7	7	35	42	7	
Flx.7 残遺性および運発性精神病性障害	218	36	40	17	5	216	7	7	38	42	6	

	使用頻度 (%)					必要性 (%)						
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	
.70 フラッシュバック	218	36	39	20	3	2	216	7	8	37	42	6
.71 パーソナリティあるいは行動の障害	218	36	41	18	4	2	216	7	9	36	42	6
.72 残遺性感情障害	218	36	40	18	4	2	216	8	8	36	42	6
.73 認知症	218	37	43	16	3	2	216	7	9	38	40	6
.74 他の持続性認知障害	218	36	43	15	4	2	215	8	8	38	40	7
.75 遅発性精神病性障害	218	36	41	17	4	2	216	8	8	38	41	6
Flx.8 他の精神および行動の障害	218	38	42	16	3	2	216	8	8	39	39	6
Flx.9 特定不能の精神および行動の障害	218	38	42	15	3	2	216	8	8	39	39	6
F16. 幻覚剤使用による精神および行動の障害	220	27	34	29	6	5	214	3	4	22	57	14
第 4, 5 桁カテゴリーは、以下の臨床状態を特定するのに用いる:												
F1x.0 急性症状	217	31	35	26	5	3	214	4	4	25	56	12
.00 併発症状がないもの	217	34	38	21	4	3	214	6	5	32	49	8
.01 外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	217	35	38	20	4	3	214	7	5	31	50	7
.02 他の医学的合併症を伴うもの	217	34	39	20	5	3	214	6	5	31	49	8
.03 せん妄を伴うもの	217	32	38	22	4	4	214	5	5	30	51	10
.04 知覚変容を伴うもの	217	32	39	21	5	4	214	5	5	30	51	9

	使用頻度 (%)			必要性 (%)		
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う
.05 昏睡を伴うもの	217	35	40	18	4	2
.06 けいれんを伴うもの	217	35	39	19	4	2
.07 病的中毒	216	35	38	20	4	3
Flx.1 有害な使用	217	33	34	25	4	4
Flx.2 依存症候群	217	31	35	26	5	4
.20 現在中断しているもの	216	32	39	21	4	3
.21 現在中断しているが、保護された環境にいるもの	217	33	40	20	4	3
.22 現在臨床指導によって中断を継続している者、あるいは置換療法下にあるもの (コントロールされた依存)	217	34	41	19	4	2
.23 現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	217	37	40	17	4	2
.24 現在物質を使用しているもの (依存中)	217	33	39	21	4	3
.25 持続的使用	217	34	39	19	5	3
.26 抑問的使用 (過酒症)	217	34	39	20	4	3
Flx.3 離脱状態	217	33	39	22	4	3
.30 併発症状がないもの	217	35	39	19	4	3
.31 けいれんをともなうもの	217	35	41	18	4	3

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
F1x.4 せん妄をともなう離脱状態	217	34	39	20	5	3	213	5	3	31	53	8
.40 けいれんを伴わないもの	217	35	41	17	5	3	215	6	5	32	50	7
.41 けいれんを伴うもの	217	35	40	18	5	2	215	6	5	33	50	7
F1x.5 精神病性障害	217	31	37	23	6	4	215	5	3	27	53	11
.50 統合失調症様のもの	217	33	37	21	6	4	215	5	5	29	52	9
.51 主として妄想性のもの	217	33	37	21	5	4	215	6	5	29	51	10
.52 主として幻覚性のもの	217	33	37	21	6	4	215	6	5	29	51	10
.53 主として多形性のもの	217	35	40	18	5	3	215	6	4	32	50	8
.54 主としてうつ病性症状のもの	217	34	41	17	5	3	215	6	4	31	50	9
.55 主として躁鬱性症状のもの	217	35	40	17	6	3	215	7	4	31	50	9
.56 混合型のもの	217	35	39	18	5	3	214	7	4	32	49	9
F1x.6 健忘症候群	217	34	41	17	6	3	215	6	3	31	51	9
F1x.7 残遺性および遷延性精神病性障害	217	33	39	19	6	3	215	5	4	29	53	9
.70 フラッシュバック	217	33	39	19	6	3	215	5	5	28	53	9
.71 パーソナリティあるいは行動の障害	217	34	38	19	5	4	215	5	6	28	53	9
.72 残遺性感情障害	217	35	41	17	6	3	215	5	5	30	52	8
.73 認知症	217	35	41	17	5	3	215	5	5	32	50	8
.74 他の持続性認知障害	217	35	41	17	5	3	215	6	5	33	48	8

	回答者数			使用頻度 (%)			回答者数			必要性 (%)		
	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である		
.75 運発性精神病性障害	217	35	40	17	6	3	215	6	5	32	50	8
F1x.8 他の精神および行動の障害	217	35	40	17	5	3	215	5	5	33	50	7
F1x.9 特定不能の精神および行動の障害	217	36	40	16	5	3	215	6	5	34	48	7
F17. タバコ使用による精神および行動の障害	220	35	41	18	3	2	216	8	13	32	41	6
第 4, 5 桁カテゴリ—は、以下の臨床状態を特定するのに用いる:												
F1x.0 急性症状	217	46	38	12	2	2	215	10	14	35	37	4
.00 併発症状がないもの	217	46	39	11	3	1	215	11	15	35	34	4
.01 外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	217	47	38	11	2	1	215	11	16	36	33	4
.02 他の医学的合併症を伴うもの	217	45	39	12	3	1	215	11	15	37	33	4
.03 せん妄を伴うもの	217	47	39	11	2	2	215	11	15	36	34	4
.04 知覚変容を伴うもの	217	47	38	12	2	1	215	11	15	36	33	4
.05 昏睡を伴うもの	217	47	39	11	2	1	215	12	15	36	33	4
.06 けいれんを伴うもの	217	47	39	11	2	2	215	12	15	36	34	4
.07 病的中毒	217	45	38	13	2	2	215	11	14	34	36	4
F1x.1 有害な使用	217	41	40	14	2	3	214	11	14	34	36	6
F1x.2 依存症候群	218	39	36	19	4	3	215	10	13	31	40	7

参考資料 3

	回答者数	使用頻度 (%)			ときどき使う	日常的に使う	回答者数	必要性 (%)			非常に必要である	
		全く使わない	ほとんど使わない	よく使う				全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない		必要である
.20 現在中断しているもの	217	43	37	14	3	3	215	11	14	33	38	5
.21 現在中断しているが、保護された環境にいるもの	218	43	39	13	3	3	215	11	14	33	36	5
.22 現在臨床指導によって中断を継続している者、あるいは置換療法下にあるもの(コントロールされた依存)	216	42	39	13	4	2	215	11	13	34	37	5
.23 現在中断しているが、嫌悪剤あるいは阻止剤による治療下にあるもの	218	45	37	13	3	2	216	13	13	35	34	5
.24 現在物質を使用しているもの(依存中)	218	41	37	17	3	3	216	11	13	33	38	5
.25 持続的使用	218	41	38	17	3	2	215	11	14	32	38	5
.26 挿入的使用(渴酒症)	217	43	37	15	3	2	216	11	15	32	37	5
Flx.3 離脱状態	218	43	37	16	2	2	215	11	13	33	37	5
.30 併発症状がないもの	218	44	39	13	2	3	215	12	15	35	33	5
.31 けいれんをともなうもの	218	48	37	11	2	2	216	13	16	35	32	4
Flx.4 せん妄をともなう離脱状態	218	48	38	10	2	2	216	13	16	34	33	3
.40 けいれんを伴わないもの	218	48	38	11	2	2	216	14	15	35	31	4
.41 けいれんを伴うもの	218	48	38	10	2	2	216	14	15	35	32	3
Flx.5 精神病性障害	218	49	38	10	2	1	216	13	17	35	33	3
.50 統合失調症様のもの	218	49	37	10	2	2	216	14	16	36	31	3

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
.51 主として妄想性のもの	218	49	37	10	2	1	216	14	16	36	31	3
.52 主として幻覚性のもの	218	49	37	10	2	2	216	14	16	36	30	3
.53 主として多形性のもの	218	50	37	10	2	2	216	14	16	37	30	3
.54 主としてうつ病性症状のもの	218	50	37	10	2	2	216	14	16	36	31	3
.55 主として躁鬱性症状のもの	218	50	37	10	2	1	216	14	16	36	31	3
.56 混合性のもの	218	50	37	10	2	2	216	14	16	36	31	3
F1x.6 健忘症候群	218	50	37	10	2	1	215	15	15	36	31	3
F1x.7 残遺性および遅発性精神病性障害	218	50	36	10	2	2	215	15	15	36	31	3
.70 フラッシュバック	218	50	36	10	2	1	215	16	14	36	29	4
.71 パーソナリティあるいは行動の障害	218	50	36	11	2	1	214	16	14	36	30	3
.72 残遺性感情障害	218	50	36	11	2	1	215	16	14	36	30	4
.73 認知症	218	50	37	10	2	2	215	16	14	36	31	3
.74 他の持続性認知障害	218	50	37	10	2	1	215	16	15	36	30	3
.75 遅発性精神病性障害	218	50	36	10	2	2	215	16	14	36	30	3
F1x.8 他の精神および行動の障害	218	50	37	9	3	1	214	15	14	37	29	4
F1x.9 特定不能の精神および行動の障害	218	50	37	9	2	2	214	15	14	37	30	3

	使用頻度 (%)				必要性 (%)							
	回答者数	全く使わない	ほとんど使わない	よく使う	ときどき使う	日常的に使う	回答者数	全く必要でない	あまり必要でない	どちらともいえない	必要である	非常に必要である
F18. 揮発性溶剤使用による精神および行動の障害	221	19	31	35	10	5	213	3	3	22	56	15
第 4、5 桁カテゴリーは、以下の臨床状態を特定するのに用いる：												
F1x.0 急性症状	218	26	33	30	6	5	212	4	4	25	56	11
.00 併発症状がないもの	218	30	36	25	6	3	212	6	5	30	50	8
.01 外傷あるいは他の身体損傷を伴うもの	218	32	37	23	6	3	212	6	6	31	50	8
.02 他の医学的合併症を伴うもの	218	30	38	23	6	3	212	6	6	32	49	8
.03 せん妄を伴うもの	218	28	34	28	6	4	212	5	5	28	53	9
.04 知覚変容を伴うもの	216	27	35	28	6	3	215	5	6	28	53	8
.05 昏睡を伴うもの	217	30	37	24	6	2	215	6	7	29	51	7
.06 けいれんを伴うもの	216	30	38	24	6	3	215	5	6	29	53	7
.07 病的中毒	217	28	37	26	6	3	215	5	5	30	51	8
F1x.1 有害な使用	217	24	34	32	7	3	215	5	4	27	53	10
F1x.2 依存症候群	217	24	29	34	8	4	215	4	4	26	57	10
.20 現在中断しているもの	217	27	37	27	6	3	214	5	4	29	54	8
.21 現在中断しているが、保護された環境にいるもの	217	27	40	25	6	3	215	7	5	30	52	7
.22 現在臨床指導によって中断を継続している者、あるいは置換療法下にあるもの（コントロールされた依存）	217	28	40	25	6	2	215	7	6	31	50	7