

表 4. 医師・看護師に提供すべきと考えられる薬剤情報＜薬剤管理指導業務上で得た情報＞

| | いる | いない | どちらでもよい | 備考 |
|---------------|--------------|-----------|-------------|--------|
| 効果の評価 | 95 86.4% | 3 2.7% | 11 10.0% | 無回答:1件 |
| 副作用の評価 | 106 96.4% | 0 0.0% | 3 2.7% | 無回答:1件 |
| 患者の薬物治療に対する意識 | 98 89.1% | 1 0.9% | 9 8.2% | 無回答:2件 |
| 患者のコンプライアンス | 98 89.1% | 1 0.9% | 8 7.3% | 無回答:3件 |
| 患者のアドヒアランス | 99 90.0% | 0 0.0% | 7 6.4% | 無回答:4件 |

(上段:件数、下段:比率)

表 5. 薬剤師が患者に伝えるべき薬剤情報＜薬剤の基本情報＞

| 項目 | 件数 | 割合 |
|-----------|-----|-------|
| 薬の名前 | 103 | 93.6% |
| 薬剤の特徴 | 92 | 83.6% |
| 薬理作用、作用機序 | 39 | 35.5% |
| 効能・効果 | 105 | 95.5% |
| 用法・用量 | 102 | 92.7% |
| 薬物体内動態 | 15 | 13.6% |
| 薬価 | 16 | 14.5% |
| 薬剤の管理方法 | 91 | 82.7% |

表 6. < 臨床上重要となる基本情報 >

| 項目 | 件数 | 割合 |
|---------------|----|-------|
| 薬物相互作用・禁忌 | 90 | 81.8% |
| 緊急安全性情報 | 60 | 54.5% |
| 注意すべき副作用 | 95 | 86.4% |
| 副作用の発現頻度 | 38 | 34.5% |
| 副作用が発現した時の対処法 | 87 | 79.1% |
| 効果発現までの時間 | 69 | 62.7% |
| 腎・肝機能障害時の投与量 | 51 | 46.4% |
| 催奇形成のカテゴリー | 54 | 49.1% |
| 高齢者への投与量 | 66 | 60.0% |
| 治療成績 | 30 | 27.3% |
| 再発のリスク | 65 | 59.1% |
| 服薬中断時の注意事項 | 88 | 80.0% |
| 薬の作用持続時間 | 63 | 57.3% |

表 7.年齢と経験(医師)

| 年齢 | 人数 | 割合 |
|--------|----|-------|
| 30歳未満 | 4 | 2.9% |
| 30～39歳 | 37 | 26.6% |
| 40～49歳 | 44 | 31.7% |
| 50歳以上 | 54 | 38.8% |

| 精神科での経験年数 | 人数 | 割合 |
|-----------|----|-------|
| 5年未満 | 21 | 15.1% |
| 5～10年 | 27 | 19.4% |
| 11～15年 | 29 | 20.9% |
| 16年以上 | 62 | 44.6% |

表 8. 薬剤師に提供して欲しい薬剤情報＜薬剤の基本情報＞

| | いる | いない | どちらでもよい | 備考 |
|-----------|-------|-------|---------|----|
| 薬剤の特徴 | 107 | 10 | 22 | |
| | 77.0% | 7.2% | 15.8% | |
| 薬理作用、作用機序 | 97 | 12 | 30 | |
| | 69.8% | 8.6% | 21.6% | |
| 効能・効果 | 108 | 11 | 20 | |
| | 77.7% | 7.9% | 14.4% | |
| 用法・用量 | 120 | 5 | 14 | |
| | 86.3% | 3.6% | 10.1% | |
| 薬物体内動態 | 91 | 14 | 34 | |
| | 65.5% | 10.1% | 24.5% | |
| 薬価 | 87 | 15 | 37 | |
| | 62.6% | 10.8% | 26.6% | |
| 薬剤の管理方法 | 85 | 13 | 41 | |
| | 61.2% | 9.4% | 29.5% | |

(上段:件数、下段:比率)

表 9 薬剤師に提供して欲しい薬剤情報＜臨床上重要となる基本情報＞

| | いる | いない | どちらでもよい | 備考 |
|---------------|-------|------|---------|----|
| 薬物相互作用・禁忌 | 133 | 2 | 4 | |
| | 95.7% | 1.4% | 2.9% | |
| 緊急安全性情報 | 131 | 3 | 5 | |
| | 94.2% | 2.2% | 3.6% | |
| 注意すべき副作用 | 128 | 2 | 9 | |
| | 92.1% | 1.4% | 6.5% | |
| 副作用の発現頻度 | 104 | 7 | 28 | |
| | 74.8% | 5.0% | 20.1% | |
| 副作用が発現した時の対処法 | 116 | 7 | 16 | |
| | 83.5% | 5.0% | 11.5% | |
| 効果発現までの時間 | 95 | 9 | 35 | |
| | 68.3% | 6.5% | 25.2% | |
| 腎・肝機能障害時の投与量 | 113 | 8 | 18 | |
| | 81.3% | 5.8% | 12.9% | |
| 催奇形成のカテゴリ | 119 | 5 | 15 | |

| | | | |
|----------|-------|------|--------|
| | 85.6% | 3.6% | 10.8% |
| 高齢者への投与量 | 111 | 11 | 17 |
| | 79.9% | 7.9% | 12.2% |
| 治療成績 | 89 | 12 | 38 |
| | 64.0% | 8.6% | 27.3% |
| 等価換算量 | 82 | 13 | 44 |
| | 59.0% | 9.4% | 31.7% |
| 薬の作用持続時間 | 97 | 9 | 31 |
| | 69.8% | 6.5% | 22.3% |
| | | | 無回答:2件 |

(上段:件数、下段:比率)

表 10. 薬剤師に提供して欲しい薬剤情報<薬剤管理指導業務上で得た情報>

| | いる | いない | どちらでもよい | 備考 |
|---------------|-------|------|---------|----|
| 効果の評価 | 111 | 6 | 22 | |
| | 79.9% | 4.3% | 15.8% | |
| 副作用の評価 | 119 | 5 | 15 | |
| | 85.6% | 3.6% | 10.8% | |
| 患者の薬物治療に対する意識 | 117 | 5 | 17 | |
| | 84.2% | 3.6% | 12.2% | |
| 患者のコンプライアンス | 110 | 4 | 25 | |
| | 79.1% | 2.9% | 18.0% | |
| 患者のアドヒアランス | 110 | 4 | 25 | |
| | 79.1% | 2.9% | 18.0% | |

(上段:件数、下段:比率)

表 11. 年齢と経験(看護師)

| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---------|----|-------|
| 30 歳未満 | 30 | 10.3% |
| 30～39 歳 | 74 | 25.5% |
| 40～49 歳 | 87 | 30.0% |
| 50 歳以上 | 99 | 34.1% |

| 精神科での経験年数 | 人数 | 割合 |
|-----------|-----|-------|
| 5 年未満 | 56 | 19.3% |
| 5～10 年 | 60 | 20.7% |
| 11～15 年 | 57 | 19.7% |
| 16 年以上 | 117 | 40.3% |

表 12. 薬剤師に提供して欲しい薬剤情報<薬剤の基本情報>

| | いる | いない | どちらでもよい | 備考 |
|-----------|-------|------|---------|---------|
| 薬剤の特徴 | 277 | 1 | 11 | 無回答:1 件 |
| | 95.5% | 0.3% | 3.8% | |
| 薬理作用、作用機序 | 251 | 4 | 35 | |

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--------|
| | 86.6% | 1.4% | 12.1% | |
| 効能・効果 | 278 | 1 | 10 | 無回答:1件 |
| | 95.9% | 0.3% | 3.4% | |
| 用法・用量 | 246 | 4 | 40 | |
| | 84.8% | 1.4% | 13.8% | |
| 薬物体内動態 | 176 | 19 | 94 | 無回答:1件 |
| | 60.7% | 6.6% | 32.4% | |
| 薬価 | 126 | 38 | 121 | 無回答:5件 |
| | 43.4% | 13.1% | 41.7% | |
| 薬剤の管理方法 | 231 | 8 | 49 | 無回答:2件 |
| | 79.7% | 2.8% | 16.9% | |

(上段:件数、下段:比率)

表 13. 薬剤師に提供して欲しい薬剤情報<臨床上重要となる基本情報>

| | いる | いない | どちらでもよい | 備考 |
|-----------|-------|------|---------|--------|
| 薬物相互作用・禁忌 | 283 | 0 | 7 | |
| | 97.6% | 0.0% | 2.4% | |
| 緊急安全性情報 | 242 | 3 | 41 | 無回答:4件 |

| | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|--------|
| | 83.4% | 1.0% | 14.1% | |
| 注意すべき副作用 | 280 | 0 | 10 | |
| | 96.6% | 0.0% | 3.4% | |
| 副作用の発現頻度 | 213 | 9 | 66 | 無回答:2件 |
| | 73.4% | 3.1% | 22.8% | |
| 副作用が発現した時の対処法 | 265 | 1 | 23 | 無回答:1件 |
| | 91.4% | 0.3% | 7.9% | |
| 効果発現までの時間 | 246 | 5 | 38 | 無回答:1件 |
| | 84.8% | 1.7% | 13.1% | |
| 腎・肝機能障害時の投与量 | 203 | 9 | 76 | 無回答:2件 |
| | 70.0% | 3.1% | 26.2% | |
| 催奇形成のカテゴリ | 136 | 34 | 116 | 無回答:4件 |
| | 46.9% | 11.7% | 40.0% | |
| 高齢者への投与量 | 243 | 10 | 35 | 無回答:2件 |
| | 83.8% | 3.4% | 12.1% | |
| 治療成績 | 158 | 23 | 105 | 無回答:4件 |
| | 54.5% | 7.9% | 36.2% | |

| | | | | |
|----------|-------|-------|-------|---------|
| 等価換算量 | 112 | 35 | 139 | 無回答:4件 |
| | 38.6% | 12.1% | 47.9% | |
| 薬の作用持続時間 | 239 | 3 | 38 | 無回答:10件 |
| | 82.4% | 1.0% | 13.1% | |

(上段:件数、下段:比率)

表 14. 薬剤師に提供して欲しい薬剤情報<薬剤管理指導業務上で得た情報>

| | いる | いない | どちらでもよい | 備考 |
|---------------|-------|------|---------|--------|
| 効果の評価 | 208 | 10 | 67 | 無回答:5件 |
| | 71.7% | 3.4% | 23.1% | |
| 副作用の評価 | 218 | 11 | 58 | 無回答:3件 |
| | 75.2% | 3.8% | 20.0% | |
| 患者の薬物治療に対する意識 | 226 | 7 | 51 | 無回答:6件 |
| | 77.9% | 2.4% | 17.6% | |
| 患者のコンプライアンス | 211 | 11 | 63 | 無回答:5件 |
| | 72.8% | 3.8% | 21.7% | |
| 患者のアドヒアランス | 201 | 8 | 74 | 無回答:7件 |
| | 69.3% | 2.8% | 25.5% | |

(上段:件数、下段:比率)

表 15.年齢と経験(精神保健福祉士)

| 年齢 | 人数 | 割合 |
|--------|----|-------|
| 30歳未満 | 43 | 47.3% |
| 30～39歳 | 37 | 40.7% |
| 40～49歳 | 6 | 6.6% |
| 50歳以上 | 5 | 5.5% |

| 精神科での経験年数 | 人数 | 割合 |
|-----------|----|-------|
| 5年未満 | 43 | 47.3% |
| 5～10年 | 26 | 28.6% |
| 11～15年 | 10 | 11.0% |
| 16年以上 | 10 | 11.0% |

無回答：2件

表 16. 薬剤師に提供して欲しい薬剤情報＜薬剤の基本情報＞

| | いる | いない | どちらでもよい | 備考 |
|-----------|-------|-------|---------|----|
| 薬剤の特徴 | 83 | 0 | 8 | |
| | 91.2% | 0.0% | 8.8% | |
| 薬理作用、作用機序 | 69 | 4 | 18 | |
| | 75.8% | 4.4% | 19.8% | |
| 効能・効果 | 87 | 0 | 4 | |
| | 95.6% | 0.0% | 4.4% | |
| 用法・用量 | 71 | 3 | 17 | |
| | 78.0% | 3.3% | 18.7% | |
| 薬物体内動態 | 31 | 13 | 47 | |
| | 34.1% | 14.3% | 51.6% | |
| 薬価 | 31 | 19 | 41 | |
| | 34.1% | 20.9% | 45.1% | |
| 薬剤の管理方法 | 58 | 6 | 27 | |
| | 63.7% | 6.6% | 29.7% | |

(上段:件数、下段:比率)

表 17. 薬剤師に提供して欲しい薬剤情報<臨床上重要となる基本情報>

| | いる | いない | どちらでもよい | 備考 |
|---------------|-------|-------|---------|--------|
| 薬物相互作用・禁忌 | 80 | 0 | 11 | |
| | 87.9% | 0.0% | 12.1% | |
| 緊急安全性情報 | 58 | 2 | 31 | |
| | 63.7% | 2.2% | 34.1% | |
| 注意すべき副作用 | 84 | 0 | 7 | |
| | 92.3% | 0.0% | 7.7% | |
| 副作用の発現頻度 | 70 | 4 | 17 | |
| | 76.9% | 4.4% | 18.7% | |
| 副作用が発現した時の対処法 | 81 | 0 | 10 | |
| | 89.0% | 0.0% | 11.0% | |
| 効果発現までの時間 | 70 | 2 | 18 | 無回答:1件 |
| | 76.9% | 2.2% | 19.8% | |
| 腎・肝機能障害時の投与量 | 36 | 13 | 42 | |
| | 39.6% | 14.3% | 46.2% | |
| 催奇形成のカテゴリ | 52 | 5 | 33 | 無回答:1件 |

| | | | |
|----------|-------|-------|--------------|
| | 57.1% | 5.5% | 36.3% |
| 高齢者への投与量 | 52 | 9 | 30 |
| | 57.1% | 9.9% | 33.0% |
| 治療成績 | 31 | 3 | 56 無回答:1件 |
| | 34.1% | 3.3% | 61.5% |
| 等価換算量 | 12 | 20 | 59 |
| | 13.2% | 22.0% | 64.8% |
| 薬の作用持続時間 | 70 | 4 | 16 無回答:1件 |
| | 76.9% | 4.4% | 17.6% |

(上段:件数、下段:比率)

表 18. 薬剤師に提供して欲しい薬剤情報<薬剤管理指導業務上で得た情報>
<薬剤管理指導業務上で得た情報>

| | いる | いない | どちらでもよい | 備考 |
|---------------|-------|------|---------|--------|
| 効果の評価 | 63 | 4 | 22 | 無回答:2件 |
| | 69.2% | 4.4% | 24.2% | |
| 副作用の評価 | 64 | 4 | 22 | 無回答:1件 |
| | 70.3% | 4.4% | 24.2% | |
| 患者の薬物治療に対する意識 | 76 | 0 | 14 | 無回答:1件 |
| | 83.5% | 0.0% | 15.4% | |
| 患者のコンプライアンス | 69 | 0 | 21 | 無回答:1件 |
| | 75.8% | 0.0% | 23.1% | |
| 患者のアドヒアランス | 68 | 0 | 22 | 無回答:1件 |
| | 74.7% | 0.0% | 24.2% | |

(上段:件数、下段:比率)

表 19.年齢と経験(作業療法士)

| 年齢 | 人数 | 割合 |
|--------|----|-------|
| 30歳未満 | 34 | 44.7% |
| 30～39歳 | 29 | 38.2% |
| 40～49歳 | 11 | 14.5% |
| 50歳以上 | 2 | 2.6% |

| 精神科での経験年数 | 人数 | 割合 |
|-----------|----|-------|
| 5年未満 | 30 | 39.5% |
| 5～10年 | 28 | 36.8% |
| 11～15年 | 10 | 13.2% |
| 16年以上 | 8 | 10.5% |

表 20. 薬剤師に提供して欲しい薬剤情報＜薬剤情報＜薬剤の基本情報＞

| | いる | いない | どちらでもよい | 備考 |
|-----------|-------|-------|---------|----|
| 薬剤の特徴 | 72 | 1 | 3 | |
| | 94.7% | 1.3% | 3.9% | |
| 薬理作用、作用機序 | 55 | 3 | 18 | |
| | 72.4% | 3.9% | 23.7% | |
| 効能・効果 | 73 | 0 | 3 | |
| | 96.1% | 0.0% | 3.9% | |
| 用法・用量 | 60 | 0 | 16 | |
| | 78.9% | 0.0% | 21.1% | |
| 薬物体内動態 | 36 | 3 | 34 | |
| | 47.4% | 3.9% | 44.7% | |
| 薬価 | 24 | 10 | 42 | |
| | 31.6% | 13.2% | 55.3% | |
| 薬剤の管理方法 | 38 | 10 | 28 | |
| | 50.0% | 13.2% | 36.8% | |

(上段:件数、下段:比率)

表 21. 薬剤師に提供して欲しい薬剤情報＜臨床上重要となる基本情報＞

| | いる | いない | どちらでもよい | 備考 |
|---------------|-------|------|---------|----|
| 薬物相互作用・禁忌 | 66 | 0 | 10 | |
| | 86.8% | 0.0% | 13.2% | |
| 緊急安全性情報 | 52 | 0 | 24 | |
| | 68.4% | 0.0% | 31.6% | |
| 注意すべき副作用 | 75 | 0 | 1 | |
| | 98.7% | 0.0% | 1.3% | |
| 副作用の発現頻度 | 60 | 3 | 13 | |
| | 78.9% | 3.9% | 17.1% | |
| 副作用が発現した時の対処法 | 73 | 1 | 2 | |
| | 96.1% | 1.3% | 2.6% | |
| 効果発現までの時間 | 63 | 2 | 11 | |
| | 82.9% | 2.6% | 14.5% | |
| 腎・肝機能障害時の投与量 | 29 | 4 | 43 | |
| | 38.2% | 5.3% | 56.6% | |
| 催奇形成のカテゴリ | 37 | 12 | 27 | |

| | | | |
|----------|-------|-------|--------|
| | 48.7% | 15.8% | 35.5% |
| 高齢者への投与量 | 53 | 4 | 19 |
| | 69.7% | 5.3% | 25.0% |
| 治療成績 | 47 | 6 | 23 |
| | 61.8% | 7.9% | 30.3% |
| 等価換算量 | 22 | 6 | 48 |
| | 28.9% | 7.9% | 63.2% |
| 薬の作用持続時間 | 67 | 2 | 6 |
| | 88.2% | 2.6% | 7.9% |
| | | | 無回答:1件 |

(上段:件数、下段:比率)