

禁忌病名一覧

高度僧帽弁狭窄	19
高度大動脈弁狭窄	19
重症糖尿病	19
出血性素因	19
診断のつかない異常性器出血	19
性器瘻	19
成人発症2型シトリン血症	19
先天性グリセリン代謝異常症	19
先天性果糖代謝異常症	19
透析	19
虹彩炎	19
梅毒性皮膚炎	19
梅毒性皮膚炎	19
イブシリンアミノカプロン酸投与中	18
ケトージンズを伴った糖尿病	18
トラスネキサム酸投与中	18
ヘモコアグラール投与中	18
メーブルシロップ尿症	18
ヨウ素過敏症	18
牛卵を原料とする製剤に対し過敏症	18
血管障害による出血傾向	18
血小板減少性紫斑病	18
高胆血症	18
手術時	18
性早熟症	18
先天性分岐鎖アミノ酸代謝異常	18
頭蓋内腫瘍	18
動脈脈管畸形	18
QT延長症候群	17
インターフェロン製剤投与中	17
アルタフェンとの併用	17
下部尿路に高度の通過障害	17
急性心筋梗塞	17
牛乳アレルギー	17
重篤な血液障害	17
第2度以上の房室ブロック	17
頭蓋内圧上昇	17
頭蓋内出血後止血が完成していない	17
慢性肝炎における肝機能障害で血小板数が10万/mm ³ 以下	17
免疫抑制剤を来す治療中	17
2カ月以内に腎臓手術	16
HBs抗原陽性	16
アムニオタム所産製剤に対し過敏症	16
間質性肺炎	16
急性閉塞性隅角緑内障	16
高度腎障害	16
骨髄機能抑制	16
重篤な血液凝固障害	16
水様便	16
多薬毒性閉塞性腎不全を原因としない卵巣腫大	16
免疫機能に異常のある疾患	16
エリスロマイシン投与中	15
クラリスロマイシン投与中	15
シクロスポリン投与中	15
ジヒドロエルゴタミンシバル酸塩投与中	15
フルコナゾール投与中	15
ホスフルコナゾール投与中	15
ワルファリンカリウム投与中	15
急性頭蓋内血腫	15
体力の充実している患者で煩燥症状	15

禁忌病名一覧

体力の充実している患者で不眠	15
中毒性巨大結腸症	15
低血圧<収縮期血圧90mmHg未満>	15
特発性肥厚性大動脈弁下狭窄	15
姿勢アルカローシス投与中	15
発症直後で病態が安定していない重篤な急性心筋梗塞	15
エピネフリン投与中	14
シトキシリン投与中	14
ネルフィナビリン投与中	14
リファンピリン投与中	14
狭隅角緑内障	14
高血圧症	14
高度肝機能障害	14
残尿を伴う前立腺肥大	14
重度肝障害	14
重篤な虚血性心疾患	14
睡眠時無呼吸症候群	14
腸管麻痺	14
頭蓋内出血急性期	14
肺線維症	14
MAO阻害剤投与中止後2週間以内	13
アカラシア	13
ガラクトース血症	13
冠動脈硬化症	13
骨髄中の芽球が十分減少していない骨髄性白血病	13
重症高血圧症	13
重症高血圧症<収縮期血圧180mmHg以上>	13
重篤な出血	13
消化管運動機能不全	13
消化管狭窄	13
食道圧迫	13
食道弛緩不能症	13
食道通過を遅延させる障害	13
脱水症	13
脱水状態	13
脱分極性筋弛緩剤投与中	13
潰瘍	13
喘息	13
痙攣性疾患	13
1型糖尿病	6
2カ月以内に骨髄障害	12
2カ月以内に頭蓋内障害	12
GT延長を起すことが知られている薬剤投与中	12
アミフィリンに対し過敏症	12
エチレンジアミンに対し過敏症	12
グルコース	12
コントロール不十分な高血圧症	12
サキナビル投与中	12
シヨサマイシン投与中	12
ミテカマイシン投与中	12
リン酸脱水素酵素<G6PD>欠乏	12
ロキシメチン投与中	12
胃腸管閉塞症	12
痔瘻	12
牛血液を原料とする製剤に対し過敏症	12
申状腺機能亢進	12
高度腎機能障害	12
高度肝機能障害	12
重篤な脳機能障害	12

禁忌病名一覧

劇頭痛脈炎	12
胃腸閉塞食状悪	12
尿管器質的閉塞	12
肺萎縮	12
副腎機能不全	12
腹水	12
閉塞性血管障害	12
経緯発作	12
急断薬投与中	11
アミノアシス	11
アレナリン作動薬投与中	11
ハロゲン含有吸入麻酔薬投与中	11
モノアミン酸化酵素阻害剤投与中止後2週間以内	11
亜急性細菌性心内膜炎	11
下垂体腫瘍	11
過敏	11
肝硬変の活動期	11
肝疾患	11
胸水	11
胸所カンジダ症	11
局所に結核性感染症	11
局所に真菌症	11
局所白癩	11
抗精神薬投与中	11
高度余脈<50拍/分未満>	11
腎臓機能低下	11
驚厥な心筋症	11
消化管憩室炎	11
新鮮な心筋梗塞	11
大腸炎	11
中枢神経抑制薬の強い影響下	11
頭部傷害	11
内臓腫瘍	11
房路に閉塞性疾患	11
慢性肝炎の活動期	11
迷走神経緊張症	11
エルゴタミン様薬体含有剤投与中	10
コントロールされていない高血圧症	10
フトフ呼吸取不良	10
マジル酸サキナビル投与中	10
モリアミノキシダセ<MAO>阻害剤投与中	10
安島香酸リチドトリブタン投与中	10
塩酸ハルピナフィル水和物投与中	10
過敏症状	10
外傷後日の浅い	10
冠動脈狭窄	10
血液凝固障害	10
高血圧	10
骨粗鬆症治療用ビタミンK2製剤投与中	10
相対下部腫瘍	10
重篤な末梢血管病変のある血液透析	10
診断の確定していない不正出血	10
先天性QT延長症候群	10
全身状態が著しく悪化	10
中枢神経系の手術後日の浅い	10
潰瘍性大腸炎	10
糖尿病性腎臓病のある血液透析	10
透析中	10
肺梗塞	10

禁忌病名一覧

肺結核	10
肺高血圧症による右心不全	10
慢性肝疾患	10
インジナビル投与中	9
ワシ田来物質に対し過敏症	9
カリウム保持性利尿剤投与中	9
栄養不良状態	9
塩酸シプロフロキサシン投与中	9
過度のアアルコール摂取	9
過度の不安	9
解離性大動脈瘤	9
拡張不全による心不全	9
完全房室ブロック	9
創傷状態	9
急性肺炎	9
興奮性	9
筋弛緩剤の使用が禁忌	9
紫斑	9
血栓性疾患	9
血栓性肺炎	9
呼吸抑制	9
甲状腺中毒症	9
高心拍出性心不全	9
高度頻脈	9
骨髄抑制剤を起す可能性のある薬剤投与中	9
取除性心膜炎による心不全	9
重篤な下痢	9
心タンポナーデによる心不全	9
心血管系に高度の障害	9
診断未確定の器出血	9
診断未確定の尿器出血	9
僧帽弁狭窄による心不全	9
中等度以上の腎機能障害	9
低酸素血症を伴いやすい	9
頭部外傷による昏睡状態	9
頭部外傷後遺症	9
乳癌アシトシス	9
脳炎	9
脳下垂体機能不全	9
脳腫瘍	9
脳腫瘍による昏睡状態	9
脳障害	9
肺機能に高度の障害	9
肥大型心筋症による心不全	9
不安定狭心症	9
不整頻拍	9
アソール系抗真菌剤投与中	8
ケトプロフェン<外用剤>に対し過敏症	8
アラジカンテル投与中	8
メソリ酸シヒロエロコタミン投与中	8
モノアミン酸化酵素<MAO>阻害剤投与中	8
リチウムの体内貯留を起しやすしい状態	8
一酸化窒素<NO>拮抗剤投与中	8
痙攣	8
脚ブロック	8
牛乳に対しアレルギー	8
凝固障害	8
局所にウイルス性疾患	8
局所に化膿性感染症	8

禁忌病名一覧

高度アジドシス	8
刺激伝導障害	8
自殺傾向	8
酒石酸エリトリン投与中	8
重症気管支喘息	8
重症な肺障害	8
硝酸剤投与中	8
食塩制限	8
心血管系障害	8
性行為が不適当	8
大出血による循環不全	8
胆道閉塞症	8
潰瘍性痔核	8
電気ショック療法	8
動脈硬化症	8
脳萎縮	8
脳液異常	8
発汗	8
閉塞性尿路疾患により尿量が減少	8
慢性肝炎の急性増悪	8
痙攣	8
肛門裂傷	8
30分以上上体を起こしていることのできない	7
30分以上立っていることのできない	7
DIC	7
アフリキシジニョック	7
エルゴタミン酒石酸塩投与中	7
オキシトシン投与中	7
カンジダ症	7
クラスIA抗不整脈薬投与中	7
クラス3抗不整脈薬投与中	7
ブラダウーウィー症候群で高度肥満	7
ブラダウーウィー症候群で重篤な呼吸器障害	7
ベントスタチン投与中	7
マレイン酸エルゴメトリン投与中	7
一過性脳虚血性発作	7
過敏性	7
急性ホルテリン症	7
筋無力症候群	7
血清アンモニウム値上昇傾向にある末期肝硬変症	7
骨髄抑制	7
骨髄内感染による発熱	7
昏睡	7
子宮腫瘍	7
重症低血圧	7
重症な意識障害を伴う大痔瘻	7
真菌症	7
生物学的製剤に対して過敏症	7
造血機能低下	7
動脈硬化	7
動脈出血	7
乳房腫瘍	7
白濁	7
末梢血液中に著しい凝り認められる骨髄性白血病	7
21日以内に消化管出血	6
21日以内に尿路出血	6
3カ月以内に骨髄手術	6
3カ月以内に骨髄障害	6
3カ月以内に頭蓋内手術	6

禁忌病名一覧

3カ月以内に頭蓋内障害	6
3カ月以内に脳障害	6
PGE2投与中	6
Lourette症候群	6
インジナビル硫酸塩エタノーレ付加物投与中	6
インドメタシン投与中	6
ウシ血液を原料とする製剤に対し過敏症	6
ウシ肺を原料とする製剤に対し過敏症	6
ウマ血液を原料とする製剤に対し過敏症	6
クモ膜下出血	6
シクロフェナク投与中	6
シプロロスタン投与中	6
スルフィンピラジン投与中	6
フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤との併用療法	6
フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤投与中	6
フルシトニン投与中	6
メチルエルゴメトリン/マレイン酸塩投与中	6
モキシフロキサシン投与中	6
モリタミオキシジンゼ<MAO>阻害剤投与中止後14日以内	6
リアアチン投与中	6
運動性チック	6
塩酸バルネナフィル投与中	6
拡張期血圧が110mmHg以上	6
肝代謝能が低下	6
牛乳蛋白アレルギー	6
胸部レントゲン写真上ひまんの線維化病変	6
胸部レントゲン写真上著明な病変	6
胸部及びその周辺部への放射線照射	6
凝固制御因子の欠損	6
凝固制御因子の減少	6
凝固促進剤<臓器抽出製剤>による治療中	6
局所に毒性感染症	6
血液透析中	6
血清クレアチニン値が2.5mg/dL以上	6
幻覚	6
鼓膜穿孔	6
国際標準値<PTNR>が1.7を超える	6
収縮期血圧が185mmHg以上	6
重症鬱病	6
重症な肺機能障害	6
重篤な不整脈	6
出血する恐れの高い	6
出血性眼炎症	6
心障害	6
多発性卵巣症候群を原因としない卵巣の腫大	6
大手術後14日以内	6
胆結石	6
胆管炎患	6
虫垂炎	6
投与前CIで正中線偏位などの圧排所見	6
投与前CIで早期虚血性変化が広範	6
投与前CIで脳溝の消失が広範	6
投与前CIで脳実質の吸収値がわずかに低下が広範	6
投与前MRIで正中線偏位などの圧排所見	6
投与前のプロトロンビン時間	6
投与前の活性化部分トロンボプラスチン時間<aPTT>が延長	6
投与前の血小板数が100000/mm ³ 以下	6
投与前の血糖値が400mg/dLを超える	6
投与前の血糖値が50mg/dL未満	6
縫合欠損症	6

禁忌病名一覧

中枢興奮薬依存	5
注射部位又はその周辺の炎症	5
腸管の機能が残存していない	5
腸出血	5
潰瘍<ペーペー病を除く>	5
潰瘍性結腸炎	5
特発性肥大型大動脈弁下狭窄症	5
肺水腫<動脈管依存性先天性心疾患は除く>	5
不整脈	5
不眠症	5
腎臓等を伴う腎臓病	5
慢性閉塞性肺疾患	5
痙攣性素因	5
腸閉塞	5
肺炎	5
2カ月以内に腎臓損傷	4
2カ月以内に眼薬内損傷	4
D<Rho>陰性の新生児を分娩した	4
FSH濃度が高く尿毒性性機能不全	4
エトレチナート製剤投与中	4
エルゴタミン・酒石酸塩・無水カフェイン投与中	4
エルゴタミン酒石酸塩含有製剤投与中	4
クレアチニンクリアランス値が約30mL/分未満	4
スチロイド薬投与の患者で糖代謝異常	4
タミロロテン製剤投与中	4
トウモロコシデンプン由来物質に対し過敏症	4
トレンチン製剤投与中	4
ナロキシド製剤投与中	4
バルプロ酸ナトリウムの急性アルコール中毒	4
バロキサリン製剤投与中	4
ビタミンA過剰症	4
ヒタミンA製剤投与中	4
ヒペラリン系製剤投与中	4
ボルフィン症で急性発作	4
マウス蛋白質由来製剤に対する重篤な過敏症	4
モノアミンオキシターゼ<MAO>阻害剤投与中止2週間以内	4
モノアミン酸化酵素<MAO>阻害剤投与中止2週間以内	4
ヨード系薬剤に対する重篤な過敏症	4
胃腸出血	4
胃潰瘍	4
右心不全の急性増悪時	4
器質的脳障害	4
強心配糖体投与中	4
強心薬を精脈内投与する必要のある心不全	4
胸部単純X線写真で明らかかつ臨床症状のある肺線維症	4
胸部単純X線写真で明らかかつ臨床症状のある肺線維症	4
激しい嘔吐	4
血液疾患	4
血管拡張薬を静脈内投与する必要のある心不全	4
原因不明の発熱	4
呼吸不全	4
光線過敏症	4
抗D<Rho>抗体を持っている	4
紅斑性瘧疾	4
高アンモニウム血症	4
高度肝障害	4
高度肝障害による酢酸代謝障害	4
高度呼吸機能障害	4
高度骨髄抑制	4
高度骨髄抑制	4
止血処置が困難	4

禁忌病名一覧

頭部傷害のある場合で意識混濁	6
脳に高度循環障害	6
脳に病変のある場合で意識混濁	6
脳梗塞の既往歴が最近6カ月以内	6
脳出血の既往歴が最近6カ月以内	6
脳出血を起さす恐れの高い	6
肺機能障害	6
発症時に経薬作用	6
腹水を伴う肝硬変	6
末梢血液中に骨髄芽球の認められる骨髄性白血病	6
硫酸キニジン投与中	5
QT延長	5
アミオダロン<注射剤>投与中	5
アミオダロン投与中	5
イレウス	5
コカイン依存	5
セロトニン/アルドレリン再取り込み阻害剤投与中	5
フルプロキサジン投与中	5
パーキンソンズム	5
フルプロキサジン投与中	5
ホスファンプリナールカルシウム水和物投与中	5
ランハート・イートン症候群	5
ロメフロキサジン投与中	5
悪性高熱	5
腎臓閉塞	5
外来患者	5
寛解し剤依存	5
運動性痙攣	5
肝障害以外のアミノ酸代謝異常	5
気管支喘息の急性発作時	5
急性腹部疾患	5
牛血液成分を原料とする製剤に対し過敏症	5
牛乳に対してアレルギー	5
葉毒性胃潰瘍	5
葉毒性胃潰瘍投与中	5
葉毒性胃潰瘍投与中	5
肺萎縮性創傷硬化症	5
抗ブラスミン製剤投与中	5
骨質刺激剤投与中	5
三環系抗精神剤投与中止後14日間	5
自殺念慮	5
重度肝障害	5
重篤な心不全<動脈管依存性先天性心疾患は除く>	5
重篤な心不全<動脈管依存性先天性心疾患は除く>	5
術後イレウス	5
心疾患	5
人工心臓使用時	5
腎機能の進行性悪化状態	5
腎機能低下	5
腎不全<軽度及び透析中を除く>	5
接触性皮炎	5
先天性アミノ酸代謝異常	5
選択的セロトニン再取り込み阻害剤投与中	5
前シヨック状態	5
全身性の神経筋接合部障害	5
多臓器障害	5
多臓器障害	5
多臓器性脳神経症候群に起因しない脳腫瘍大	5
多臓器性脳神経症候群に起因しない脳腫瘍大	5
多発性硬化症	5
多発性硬化症	5
脳髄液	5

禁忌病名一覧

治療により十分な管理がされていないかんかん	4
十分にコントロールされていない甲状腺機能不全	4
十分にコントロールされていない副腎機能不全	4
重症肝疾患	4
重症低血圧症	4
重症糖尿病による酢酸代謝障害	4
重症動脈硬化症	4
重症な意識障害	4
重症な左心機能障害	4
出血が持続	4
小腸機能障害	4
薬剤性疾患	4
急性乾皮症	4
心に高度なストレス	4
認知症	4
腎疾患	4
生殖器の性ホルモン依存性腫瘍	4
生殖器付属器の性ホルモン依存性腫瘍	4
腎臓器質的疾患	4
先天性アミノ酸代謝異常症	4
多形性日光皮膚炎	4
菌性菌による皮膚感染症	4
胆汁の分泌が極めて悪い	4
腸穿孔	4
長期間ベンゾジアゼピン系薬剤を投与されているかんかん	4
痛風	4
低糖性食事を摂取	4
投与直前の排尿が1時間当たり20mL以下	4
投与部位並びにその周辺に炎症	4
投与部位並びにその周辺に潰瘍	4
糖尿病	4
糖代謝異常	4
糖尿病性細小血管症	4
透析を必要とするような重症な腎機能障害	4
頭蓋内器官活動性腫瘍	4
尿路結石	4
脳器質的疾患	4
灌漑性血管内血液凝固症候群	4
白血球数3000/mm ³ 以下	4
発熱を有し感染症	4
皮膚癌	4
非感染性菌による皮膚感染症	4
非代償性の高度の出血	4
非代償性心不全	4
房室ブロック<第23度>	4
未治療の真血	4
薬物乱用	4
用量設定期<投与開始時>に肺水腫が確認	4
立位を30分以上保てない	4
BCG全身性過敏症反応	3
HIVキャリア	3
HIV逆転写酵素阻害剤投与中	3
β	3
アジソン病に対して適切な治療を行っていない	3
アルギナーゼ欠損症	3
アルブミン投与中	3
アンピシリン投与中	3
イブプロフェン投与中	3

禁忌病名一覧

エスタゾラム投与中	3
エキサンソン水和物投与中	3
エレトアタン臭化水素酸塩投与中	3
十分コントロールされていない甲状腺機能不全	3
十分なコントロールされていない副腎機能不全	3
重症肝疾患	3
重症低血圧症	3
重症糖尿病による酢酸代謝障害	3
重症動脈硬化症	3
重症な意識障害	3
重症な左心機能障害	3
出血が持続	3
小腸機能障害	3
薬剤性疾患	3
急性乾皮症	3
心に高度なストレス	3
認知症	3
腎疾患	3
生殖器の性ホルモン依存性腫瘍	3
生殖器付属器の性ホルモン依存性腫瘍	3
腎臓器質的疾患	3
先天性アミノ酸代謝異常症	3
多形性日光皮膚炎	3
菌性菌による皮膚感染症	3
胆汁の分泌が極めて悪い	3
腸穿孔	3
長期間ベンゾジアゼピン系薬剤を投与されているかんかん	3
痛風	3
低糖性食事を摂取	3
投与直前の排尿が1時間当たり20mL以下	3
投与部位並びにその周辺に炎症	3
投与部位並びにその周辺に潰瘍	3
糖尿病	3
糖代謝異常	3
糖尿病性細小血管症	3
透析を必要とするような重症な腎機能障害	3
頭蓋内器官活動性腫瘍	3
尿路結石	3
脳器質的疾患	3
灌漑性血管内血液凝固症候群	3
白血球数3000/mm ³ 以下	3
発熱を有し感染症	3
皮膚癌	3
非感染性菌による皮膚感染症	3
非代償性の高度の出血	3
非代償性心不全	3
房室ブロック<第23度>	3
未治療の真血	3
薬物乱用	3
用量設定期<投与開始時>に肺水腫が確認	3
立位を30分以上保てない	3
BCG全身性過敏症反応	3
HIVキャリア	3
HIV逆転写酵素阻害剤投与中	3
β	3
アジソン病に対して適切な治療を行っていない	3
アルギナーゼ欠損症	3
アルブミン投与中	3
アンピシリン投与中	3
イブプロフェン投与中	3

禁忌病名一覧

後天性免疫不全	3
白血球数750/mm ³ 未満<除HIV感染に起因しHIV薬治療無し>	3
抗凝固剤服用中	3
抗血小板剤服用中	3
攻撃性	3
高コレステロール血症性アジドシス	3
高窒素血症がみられる高度腎機能障害	3
高度腎不全	3
子宮内胎産	3
弱毒性ワクチン投与中	3
臭化水素酸エレクトリトプタン投与中	3
十二指腸潰瘍	3
重度肝機能障害<ChildPugh分類クラスCの肝硬変に相当>	3
重度心疾患	3
重度腎機能障害	3
重度な冠血管疾患	3
重度な呼吸器疾患	3
重度な洞不全症候群	3
重要器官における出血	3
焦燥	3
衝動行為	3
心筋梗塞の既往歴が最近3カ月以内	3
心筋梗塞の既往歴が最近6カ月以内	3
心筋梗塞後の非持続型心房細拍	3
心筋梗塞後の無症候性心室性期外収縮	3
進行した肝疾患	3
酢酸フルカイニド投与中	3
性交中に激心症	3
精神運動興奮	3
先天性QT延長	3
先天性免疫不全	3
蛋白尿を伴う糖尿病	3
昏明な糸脈	3
長時間作用型バルビツール誘導体投与中	3
低マグネシウム血症	3
低血圧[安静時収縮期血圧<90mmHg]治療による管理がなされていない高血圧安否	3
低血圧[血圧<90/50mmHg]コントロール不良の高血圧[安静時血圧>170/101]	3
動脈性血行障害	3
内因性糖尿病	3
肉眼的血尿	3
脳血管障害回復初期	3
脳血栓	3
敗血症のリスクを有する	3
非肥満	3
非選択的モノアミン酸化酵素阻害薬投与中	3
非代償性肝疾患	3
非麻痺性中枢神経抑制剤による呼吸抑制	3
微量アルブミン尿を伴う糖尿病	3
病的要因による呼吸抑制	3
痙攣性不整脈	3
舞踏病	3
歩行の困難	3
慢性閉塞性肺病	3
未治療のアジドシス	3
免疫抑制剤投与中	3
免疫抑制状態	3
免疫抑制量のステロイド剤投与中	3
妄息	3
妄息状態	3
網膜色素変性症	3

禁忌病名一覧

予防接種によるケロイド	3
3度の屋蓋ブロック	2
B型肝炎	2
CPMSで定められた血液検査の中止基準により本剤の投与を中止	2
CPMSの規定を遵守できない	2
CPMS患者登録前<4週間以内>血液検査で好中球数が2000/mm ³ 未満	2
CPMS患者登録前<4週間以内>血液検査で白血球数が4000/mm ³ 未満	2
C型肝炎	2
HBs抗原陽性<肝移植施行患者を除く>	2
MAO阻害剤投与中止後14日間以内	2
Neartherton症候群	2
PUVA療法実施中	2
SLE	2
アナフィラキシー反応	2
アミノダロン塩酸塩<注射>投与中	2
アルコールによる急性中毒	2
アルコールを含む医薬品投与中	2
イオパノ酸を用いて胆管造影	2
イオパノ酸を用いて胆管造影	2
イリチゲン塩酸塩水和物投与中	2
ウシ由来蛋白質に対し過敏症	2
エタノールに対し過敏症	2
エノキサシン投与中	2
エフェドリン投与中	2
エフェドリン製剤投与中	2
エルゴタミン製剤投与中	2
エルゴメトリンマレイン酸塩投与中	2
エルゴメトリン投与中	2
キノジン硫酸塩水和物投与中	2
キレート剤投与中	2
クレアチニンクリアランス<24時間蓄尿により測定>が30mL/分未満	2
クレアチニンクリアランス<50拍/分未満>	2
クレアチニンクリアランスが50mL/分以下の腎機能障害	2
コントロールの困難な心疾患	2
サラセミア	2
ザルシタピン投与中	2
ジノスタチンチマラマーに対する重篤な過敏症	2
ゼラチンに対し過敏症	2
たばこ禁煙	2
チカフル・ウラシル配合剤の成分に対し重篤な過敏症	2
チユピニゾン症候群	2
ハツカク誘導体投与中	2
ビタミンB12欠乏症	2
フェニルケトン尿症	2
フェニルケトン尿症以外	2
ブドウ糖由来蛋白質に対し過敏症	2
フレカイニド投与中	2
フロドノボン製剤投与中	2
フロバフェノン投与中	2
フロプラノロール塩酸塩投与中	2
ヘモクロトーシス	2
ホスカルネットナトリウム投与中	2
ホルモン剤投与中	2
マウス由来蛋白質由来製剤に対するアナフィラキシー反応	2
マンデル酸ヘキサミン投与中	2
メチルシロップ尿症以外	2
メチルエフェドリン製剤投与中	2
メチルエフェドリン投与中	2
メチルエルゴメトリン投与中	2

禁忌病名一覧

モノアミン酸化酵素阻害剤使用中	2
モノアミン酸化酵素阻害剤使用中	2
リウマチ性偽膜性腹膜炎	2
リサトリアタン安眠薬併投与中	2
リジン尿性蛋白不耐症の患者でアルギニンの吸収阻害の程度が大きい	2
リツキマブ＜遺伝子組換え＞に対する重篤な過敏症	2
レーベル病	2
ローター症候群	2
安眠時拡張期血圧＜経口剤＞投与中	2
異常ヘモグロビン症	2
胃潰瘍出血	2
胃内出血	2
胃腸出血	2
遺伝性偽膜性腹膜炎	2
炎症症状	2
塩酸アミオダロン＜注射剤＞投与中	2
塩酸ベチジン投与中	2
塩酸モキシプロキチン投与中	2
化学療法	2
化膿性の創傷で高熱	2
外用抗真菌剤に対して過敏症	2
鎌状赤血球性貧血	2
冠動脈バイパス再建術の周術期	2
完全な胆道閉塞により胆汁が腸管に排泄されない	2
患部の湿潤のひどい	2
患部の腫痛のひどい	2
換気障害が重症＜PaO2:60mmHg以下＞	2
肝機能低下	2
肝毒性物質による中毒の結果起きた腎不全	2
眼に感染	2
眼が調節できない閉塞隅角緑内障	2
眼感染症	2
眼周囲に感染	2
機能障害を伴う重度の感覚異常	2
機能障害を伴う重度の知覚不全	2
急性リン酸腎症	2
急性肝炎の急性期	2
急性腎炎の急性期	2
魚鱗癬様紅皮症	2
胸部への放射線療法を施行	2
筋無力症状	2
激しい喘息発作時	2
血圧低下	2
血液凝固因子インヒビターを有していない	2
血小板数2500/mm3未満	2
血栓症を起す恐れの高い	2
月経直前	2
呼吸性アルカローシス	2
後天性QT延長症候群	2
好中球数500/mm3未満	2
甲状腺機能不全	2
高血圧＜収縮期圧160mmHg以上・拡張期圧100mmHg以上＞	2
高度高カリウム血症	2
高熱	2
骨髄機能低下	2
骨髄抑制を起こす可能性のある治療中	2
骨髄内に急性炎症性疾患	2
紫外線療法実施中	2

禁忌病名一覧

持続性抗精神病剤投与中	2
自殺企図	2
連続制注中	2
手術後1週間以内	2
十二指腸潰瘍出血	2
重症外傷	2
重症冠動脈疾患	2
重症高血圧症＜収縮期血圧が180mmHg以上＞	2
重症心代償不全	2
重症腎障害	2
重症肝血性心不全	2
重症外傷	2
重症肝機能検査値異常	2
重症肝機能障害＜ChildPugh分類C＞	2
重症好中球減少症	2
重症腎障害＜クレアチニンクリアランス20mL/min未満＞	2
重症精神病	2
重症慢性疾患	2
重症な血液凝固異常	2
重症な骨髄機能抑制	2
重症な胆道閉塞	2
徐脈	2
消化管運動低下	2
消化管緊張低下	2
消化性潰瘍＜活動期＞	2
上体を30分以上起こしていることできない	2
疥癬症	2
心ブロック	2
心筋炎	2
心筋梗塞の急性期	2
心筋抑制のある麻酔薬投与中	2
心疾患により著しい心臓機能低下	2
心臓弁膜症	2
心内膜炎	2
心房細動	2
診断未確定の乳房病変	2
腎機能が高度に低下	2
腎毒性物質による中毒の結果起きた腎不全	2
水銀製剤使用中	2
精神障害	2
脊椎内出血	2
前立腺緑内障	2
前立腺肥大による排尿困難	2
前立腺肥大症	2
全身性の真菌症	2
体液量の少ない	2
代謝性アルカローシス	2
胆道の完全閉塞	2
中枢神経抑制状態	2
著しい骨髄抑制	2
著しい循環血流量の減少	2
著明なQT延長	2
著明な迷走神経亢進状態	2
低血圧	2
低血圧[血圧＜90/50mmHg]治療による管理がなされていない高血圧安静時収縮	2
投与直前の排尿が1時間あたり20mL以下	2
投与部位に悪性腫瘍	2
頸蓋内圧亢進	2
頭部傷害のある場合などで意識混濁	2

禁忌病名一覧

内視鏡検査が危険	2
尿量減少	2
尿路感染症	2
妊娠中に悪化した耳硬化症	2
熱性疾患	2
胸に病変のある場合などで意識混濁	2
脳圧亢進症	2
脳脊髄液性鞘	2
脳塞栓 [ヘパリン起因性血小板減少症 < HIT > 2型を除く]	2
肺炎	2
傾倒症状	2
非ステロイド性消炎薬・鎮痛剤等による喘息発作	2
非ステロイド性消炎薬・鎮痛剤などによる喘息発作	2
非ステロイド性消炎薬・鎮痛剤等により誘発される喘息発作	2
浮腫のある心疾患	2
腹水を伴う疾患	2
分娩直後	2
閉塞性肺疾患により著しい心肺機能低下	2
放射線療法後後遺症	2
本剤使用後肝機能が悪化	2
慢性腎不全	2
慢性尿閉に伴う逆流性尿失禁	2
無尿症	2
薬物過敏症	2
腸門部閉塞	2
有鉤寄生虫	2
冷血性貧血	2
凝糖アザナチル投与中	2
敬糖痔核	2
	131
2度以上の催眠鎮痛剤・抗不安剤及び精神神経用剤を一度に誤飲	1
2度以上プロック<人工エアースプレー>が装着されている患者を除く	1
3カ月以内に感染性流産	1
3カ月以内に細菌性髄膜炎・カンジダ・再発性HV・HB・CMVを除く性感染症	1
3度房室ブロック<人工エアースプレー>が装着されている患者を除く	1
CYP2D6で代謝される薬剤投与中	1
Grade5	1
HIT	1
Hunt	1
療法	1
MAO<モノアミン酸化酵素>阻害剤投与中	1
PGF2α投与中	1
アミド系局所麻酔剤に対する過敏症	1
アミオダロン塩酸塩投与中	1
アミオダロン注射剤投与中	1
アルカリを誤飲	1
アルコール<飲酒>を摂取中	1
アルコールを含む医薬品使用中	1
アルコールを含む化粧品使用中	1
アルコールを含む食品摂取中	1
アルコール乱用	1
アレルギー性疾患	1
アンフェタミンを誤飲	1
アンブレナビル投与中	1
イセチオン酸ベンタミジン投与中	1

禁忌病名一覧

イボスミアミド投与中	1
イレウス糞便性状	1
ワサキ血行阻害剤投与歴	1
エストラムチニンリン酸エステルナトリウム水和物投与中	1
エストロゲン依存性腫瘍<治療の目的で投与する場合を除く>	1
エフエドリン塩酸塩投与中	1
エリスロマイシン<注射剤>投与中	1
カリウムを誤飲	1
カルシウム拮抗剤を誤飲	1
キニーネ投与中	1
クラス1aの抗不整脈薬投与中	1
クラス3の抗不整脈薬投与中	1
クレアチニンクリアランスが25mL/分未満	1
クレアチニンクリアランスが30mL/分未満	1
クレアチニンクリアランス値が0.4mL/分/kg未満	1
クロニジン病急性期	1
クロニジンを誤飲	1
ケトコナゾール<経口剤>投与中	1
コカインを誤飲	1
ジギタリスを誤飲	1
シキタリス製剤使用中	1
シクロホスファミド投与中	1
ジドピラミド投与中	1
ジフロロスタット投与中	1
スピロラクトン投与中	1
タルナビル投与中	1
チクロロームP450CYP3A4で代謝される薬剤が狭い薬物域が狭い薬剤投与中	1
テトラサイクリン系抗生物質投与中	1
トレミフェン投与中	1
ネフローゼ	1
ハロゲン含有吸入麻酔剤投与中	1
ハロファントリン投与中	1
ヒガン汁料の植物を誤飲	1
ヒダラピン注射剤投与中	1
フェニル酢酸系非ステロイド性消炎薬鎮痛剤投与中	1
フルダピリン酸エステル製剤投与中	1
フルビプロフェン アキセチル投与中	1
プロピオン酸系非ステロイド性消炎薬鎮痛剤投与中	1
ヘキサミン投与中	1
ヘパリン起因性血小板減少症	1
ベンタミジンイセチオン酸塩投与中	1
ベンタミジン製剤投与中	1
ベントハルピタール投与中	1
マウス由来の蛋白質に対する過敏症	1
メチルエフェドリン塩酸塩投与中	1
ヨウ素に対して過敏症	1
ヨードに対して過敏症	1
リン酸エステルナトリウム投与中	1
腫瘍領域より末梢側に腫瘍	1
悪心を合併している心不全	1
悪性虚脱	1
安全管理手順を遵守できない	1
意識障害	1
異常興奮状態	1
酸化窒素<NO>供与薬投与中	1
一般状態の程度に悪い	1
右心側から左心側への血管シャントのあるアノーゼ	1
炎症性腸疾患悪急性期	1

禁忌病名一覧

塩酸アミノピダロム＜経口剤＞投与中	
構紋筋融解症	
黄体ホルモン依存性腫瘍	
下腹部尿閉に閉塞性疾患	
下痢を合併している心不全	
過敏症	
角膜炎	
鎌状赤血球貧血	
乾燥剤＜シリカゲル・塩化カルシウム・生石灰＞を誤飲	
冠動脈閉塞	
感染症のある関節	
換気能力低下	
肝・胆道系に閉塞性病変	
肝炎	
肝性昏睡を伴う腎不全	
肝性脳症	
眼底の観察が困難	
眼内に重症炎症	
気管狭窄	
気管支攣縮性肺炎患	
急性冠動脈疾患	
急性腎炎	
急速な細胞外水分の増加が危険となるような病態	
強酸を誤飲	
速度の徐脈	
胸腺異常	
胸腺腫瘍	
経口避妊薬投与中	
継続的な吐血	
継続的な嘔吐	
緊急熱傷	
頸管炎	
頸管孤環時に迷走神経反射	
頸部外傷直後	
激しく嘔吐	
血液凝固阻止剤使用中	
血小板数50000/mm3以下	
血清病	
血中アンモニウム増加	
血中窒素貯留のある慢性腎炎	
原因が特定されていない急性疾患	
原因不明の腹痛	
呼吸抑制が顕著	
後天性の子宮の形態異常	
後頭蓋窩腫瘍	
経口以外の緊急処置を必要とする疾患	
経口以外の緊急処置を必要とする病態	
口腔にウイルス性感染症	
口腔に化膿性感染症	
口腔に結核性感染症	
広範囲火傷	
甲状腺機能異常	
高度冠動脈狭窄	
高度低血圧	
骨軟化症	
昏迷	
混濁の強い白内障	
再発性PID	
細菌性尿路感染症	

禁忌病名一覧

酸素系漂白剤＜過炭酸ナトリウム・過ホウ酸ナトリウム＞を誤飲	
刺激性のある物質を誤飲	
子宮の著しい位置異常	
子宮外妊娠	
子宮頸部異形成で開口瘻子を用いても扁平円柱上皮境界の上限を確認できない	
子宮頸部初期癌で開口瘻子を用いても扁平円柱上皮境界の上限を確認できない	
子宮癌の発生を来しているよう子宮筋腫	
子宮内避妊用具＜IUD＞装着時に迷走神経反射	
脂質代謝障害	
視神経障害	
治療による管理が十分でないかかん	
自律神経機能障害	
湿疹	
遮断剤を誤飲	
手術直後	
腫瘍が気管支軟骨層より外側に浸潤	
腫瘍が気管支壁外に浸潤	
重症＜HuntGrade4・5＞	
重症肝障害	
重症心障害	
重症腎不全	
重症肺障害	
重症の下痢症	
重症火傷	
重症肝機能障害＜ChildPugh Class C＞	
重症腎障害＜クレアチニンクリアランス30ml/min未満＞	
重症伝導障害＜高度な房室ブロック＞がありペースメーカーを使用していない	
重症伝導障害＜三葉ブロック＞がありペースメーカーを使用していない	
重症伝導障害＜二葉ブロック＞がありペースメーカーを使用していない	
重症な肝腫瘍	
重症な呼吸不全	
重症な胆道障害	
重症な低血圧＜血行動態不安定な心室細動又は心室頻拍発作発現中を除く＞	
重症な脳血流障害	
重症な膀胱障害	
重症な膝障害	
重油を誤飲	
出血した動脈瘤に対する十分な止血処置を術中に施すことができなかった	
術後回復期	
循環虚脱＜血行動態不安定な心室細動又は心室頻拍発作発現中を除く＞	
初期の除脳硬直	
徐脈性不整脈	
除脳硬直を示し、病死	
消化管潰瘍による出血	
症候性の著しい洞性徐脈＜人工ペースメーカーが装着されている患者を除く＞	
硝酸薬投与中	
食道癌において全周囲性の腫瘍	
心筋梗塞症	
心室細動	
心室頻拍	
心臓に重篤な合併症	
心筋機能低下	
深昏睡	
真性皮膚疾患	
人工呼吸器の呼吸回路にフィルタを装着し超音波式ブライザー使用中	
腎に重篤な合併症	
腎不全末期	
腎臓結石症	
腎不全末期	
制吐剤服用中	

禁忌病名一覧

性器感染症<カンジダ症を除く>	
性器瘻<治療の目的で投与する場合を除く>	
精神病	
静脈血栓塞栓症	
石油を誤飲	
石油留出物を誤飲	
先天性の子宮の形態異常	
洗浄液を誤飲	
創面から出血	
早期肺腫における亜区域支より末梢側に腫瘍	
胎原仮死	
代償不全状態にある心不全	
大腸癌で手術前の栄養管理を行っている	
脱髄性シアルコノ・マリー・トウース病	
単純性疱疹	
短腸症候群	
男子乳癌	
中等度から重篤な片麻痺	
中等度肝障害	
著明な頭蓋内圧亢進	
腸管の安静を必要とする	
長期安静期	
慢性不動状態	
潰瘍性大腸炎急性期	
低ナトリウム食を与えられている	
鉄過剰症	
鉄過剰症の治療中	
鉄剤服用中	
塗料シンナーを誤飲	
凍傷	
灯油を誤飲	
頭部外傷直後	
頭部腫瘍がある場合などで意識混濁	
慢性徐脈がありペースメーカーを使用していない	
洞不全症候群<人工ペースメーカーが装着されている患者を除く>	
洞不全症候群がありペースメーカーを使用していない	
洞房ブロックがありペースメーカーを使用していない	
突起のある異物を飲んでい	
乳癌<治療の目的で投与する場合を除く>	
乳頭浮腫	
妊娠中に重症そう痒症	
熱傷	
胸に病変がある場合などで意識混濁	
悪寒類を誤飲	
播種性血管内血液凝固症	
馬血清製剤の投与歴	
胸に重篤な合併症	
肺腫において気管狭窄	
肺腫において腫瘍が気管支軟骨層より外側に浸潤	
肺腫において腫瘍が気管支壁外に浸潤	
肺腫において太い気管の広範な病巣	
肺血流に高度の抵抗	
肺高血圧症	
肺出血	
肺不全	
白血球数2000/mm3以下	
白血球輸注中	
発症後14日未満の急性心筋梗塞	
発疹	

禁忌病名一覧

皮膚疹	
皮内テストで陽性	
皮膚潰瘍	
薬疹を目的とするホルモン療法	
表在型食道癌における食道・胃接合部に腫瘍	
表在型食道癌における食道入口部に腫瘍	
表在型早期胃癌における食道・胃接合部に腫瘍	
表在型早期胃癌における幽門輪に腫瘍	
不安状態	
腐食性のある物質を誤飲	
副腎疾患が強く疑われる者以外	
副腎皮質不全	
髄膜炎	
片頭痛	
房室ブロック<2度以上>	
本剤の投与歴	
本剤投与時に迷走神経反射	
本剤投与歴	
麻薬を誤飲	
麻薬依存	
麻薬中毒	
慢性冠動脈疾患	
慢性症消化器過剰感	
慢性腎不全<特に糸球体濾過値30mL/分以下>	
慢性肺炎で急性増悪	
無寛解	
明瞭な代償不全性心不全	
免疫機能に異常がある疾患	
毛じらみ	
網膜剥離	
網膜静脈血栓症	
薬物に対し過敏症	
薬物治療によっても安定化しない不安定救心症	
薬酸欠乏に基づき巨赤芽球性貧血	
利尿状態	
嘔吐を合併している心不全	
腫下腫毒	
陰原病	

資料 4

禁忌薬剤投与一覽

禁忌薬剤投与患者
CYP2D6で代謝される薬剤
HIVプロテアーゼ阻害剤
HIVプロテアーゼ阻害薬
HIV逆転写酵素阻害剤
HTLV-1/D受容体作動薬
MAO<モノアミン酸化酵素>阻害剤
MAO阻害剤
MAO阻害剤 止後14日間以内
MAO阻害剤 止後2週間以内
PGE2
PGF2α
QT延長を起すことが知られている薬剤
α遮断薬
アステミゾール
アゼルニジピン
アゾール系抗真菌剤
アゾール系抗真菌薬
アタザナビル
アタザナビル硫酸塩
アドレナリン
アドレナリン作動薬
アプロチニン製剤
アミオダロン
アミオダロン<注射剤>
アミオダロン塩酸塩
アミオダロン塩酸塩<注射>
アミオダロン塩酸塩<注射剤>
アミオダロン塩酸塩<注射剤>
アリスキレン
アルコールを含む医薬品
アルブアララム
アンピロキシカム
アンブレナビル
イセチオン酸ペンタミジン
イトラコナゾール
イブシロンアミカプロン酸
イブプロフェン
イボスファミド
イリナテカン塩酸塩水和物
インジナビル
インジナビル硫酸塩エタノール付加物
インターフェロン製剤
インドメタシン
ウサキ血清製剤投与歴
エストラム
エストラムチネリン酸エステルナトリウム水和物
エトレチナート製剤
エノキサシン
エノキサシン水和物
エピネフリン
エファベレンツ
エフェドリン
エフェドリン塩酸塩
エフェドリン製剤
エプレレノ
エリスロマイシン
エリスロマイシン<注射剤>

エルゴタミン
エルゴタミン含有製剤
エルゴタミン酒石酸塩
エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン
エルゴタミン酒石酸塩含有製剤
エルゴタミン製剤
エルゴタミン誘導体含有製剤
エルゴメトリン
エルゴメトリンマレイン酸塩
エルトリプタン臭化水素酸塩
オキシトシン
カテコールアミン
カテコールアミン製剤
カリウム製剤
カリウム保持性利尿剤
カリウム保持性利尿薬
カルバマゼピン
カルモフェール
キニーネ
キニジン
キニジン硫酸塩水和物
キヌプリスチン・ダルホホプリスチン
キノロン系抗菌製剤
キレート剤
クラス1aの抗不整脈薬
クラス1A抗不整脈薬
クラス3の抗不整脈薬
クラス3抗不整脈薬
クラリスロマイシン
グリペンクラミド
クロラゼパム二カリウム
ケトコナゾール<経口剤>
ケトプロフェン
サキナビル
サキナビルメシル酸塩
サルシタピン
ジアゼパム
シアナミド
シクロスポリン
ジクロフェナク
シクロホスファミド
シサプライド
ジスルファミド
ジピラミド
ジドブジン
ジノプロスト
ジノプロスト
ジドエロエルゴタミン
ジドエロエルゴタミンメシル酸塩
ジフルニサル
ジプロフロキサシン
ジヨサマイシン
シルチナフィール<レバチオ>
シルチナフィールクエン酸塩
シノバスタチン
スバルフロキサシン
スピロラクトン

スルフィンピラジン
セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
タクロリムス
タクロリムス<外用剤を除く>
タミバロテン製剤
ダルナビル
チオリダジン
チザニジン
チザニジン塩酸塩
チクロロ-AM-P450CYP3A4で代謝される薬剤で治療域が狭い薬剤
チガフル-ギマラシル-オテラシカルリウム配合剤
チガフル-ギマラシル-オテラシカルリウム配合剤 中止後7日以内
チトラサイクリン系抗菌剤
チトラサイクリン系抗生物質
チラベルジン
テルフェナジン
トラネキサム酸
トリアゾラム
トリアムテレン
トレチノイン製剤
トレミフェン
トレミフェンクエン酸塩
トロンボン
ニルジピン
ネルフィナビル
ネルフィナビルギザシル酸塩
フルフロキサシン
バツカク誘導体
ハルチゾフィル
ハルチゾフィル塩酸塩水和物
ハルプロ酸ナトリウム
ハロキサチン
ハロゲン含有吸入麻酔剤
ハロゲン含有吸入麻酔薬
ハロファントリン
ピタバスタチン
ピタミンA製剤
ピダラペン注射剤
ピペラジン系駆虫薬
ピモジド
ピロキシカム
フェニル酢酸系非ステロイド性消炎鎮痛剤
フェンブフェン
フルビドリミジン系抗悪性腫瘍剤
フラジカンテル
フルコナゾール
フルシトニン
フルダラペンリン酸エステル製剤
フルボキサミン
フルラセバム
フルフロキサシン
フルルビプロフェン
フルルビプロフェン アキセチル
フルルビプロフェンアキセチル
フレカイド
フロカルバジン塩酸塩
フロスタクワンジン製剤

フロトンポンブ阻害剤
フロナンゼリン
フロバフェン
フロピオネ酸系非ステロイド性消炎鎮痛剤
フロプラノロール塩酸塩
ハキサミン
ハチジン塩酸塩
ベプリジル
ベプリジル塩酸塩水和物
ハモコアラゼ
ペンタミンイセチオネ酸塩
ペントスタチン
ペントスタチン製剤
ペントバルビタール
ホスアンプレナビル
ホスアンプレナビルカルジウム水和物
ホスカルネットナトリウム
ホスフルコゾール
ホスホシエストラ-7E5阻害作用を有する薬剤
ボセンタン
ボリゴナゾール
ホルモン剤
マレイン酸メチルエルゴメトリン
マレイン酸メチルエルゴメトリン
マンデル酸ヘキサミン
ミコナゾール
ミダゾラム
ミダカマイジン
ミトタン
ギザシル酸サキナビル
メシル酸ジピロエルゴタミン
メチルエフェドリン
メチルエフェドリン塩酸塩
メチルエフェドリン製剤
メチルエルゴメトリン
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
モキシフロキサシン
モキシフロキサシン塩酸塩
モノアミンオキシターゼ<MAO>阻害剤
モノアミンオキシターゼ<MAO>阻害剤 中止後2週間以内
モノアミンオキシターゼ<MAO>阻害剤 中止後14日以内
モノアミンオキシターゼ<MAO>阻害剤 中止後14日以内
モノアミン酸化酵素<MAO>阻害剤
モノアミン酸化酵素<MAO>阻害剤 中止後2週間以内
モノアミン酸化酵素阻害剤
モノアミン酸化酵素阻害剤 中止後2週間以内
モノアミン酸化酵素阻害剤投与後2週間以内
モノアミン酸化酵素阻害薬
リザトリブタン安息香酸塩
リトナビル
リリアンチン
リリアンチン
リン酸エストラムスタンナトリウム
ロキソスロマイシン
ロスバスタチン
ロメフロキサシン
フルアラニンカリウム
安静時拡張期血圧<経口剤>

安息香酸リザトリン
一酸化窒素<NO>供与剤
一酸化窒素<NO>供与薬
塩酸アミオダロン
塩酸アミオダロン<緩口剤>
塩酸アミオダロン<注射剤>
塩酸シプロフロキサシン
塩酸バルチナナフィル
塩酸バルチナナフィル水和物
塩酸フルラセハム
塩酸プロバフェン
塩酸ペチジン
塩酸ペフリジル
塩酸モキシフロキサシン
強心配糖体
腎血促進剤
金剤
経口鉄剤
経口避妊薬
抗ブラズミン剤
抗生物質の投与に伴う偽膜性大腸炎
抗精神病薬
骨髄抑制を起す可能性のある薬剤
骨粗鬆症治療用ビタミンK2製剤
三環系抗鬱剤
三環系抗鬱剤止後14日間
脂溶性駆虫剤
持効性抗精神病剤
弱毒生ワクチン
酒石酸エルゴタミン
臭化水素酸エトリンブタン
小柴胡湯
硝酸剤
硝酸薬
心筋抑制のある麻酔薬
酢酸フレカイニド
選択的セロトニン再取り込み阻害剤
脱分極性筋弛緩剤
長時間作用型バルビツール酸誘導体
馬血清製剤の投与歴
素角アルカロイド
非選択的モノアミン酸化酵素阻害剤
非選択的モノアミン酸化酵素阻害薬
本剤投与歴
免疫抑制剤
免疫抑制薬のステロイド剤
硫酸アタザナビル
硫酸モキシジン

資料 5

標準用法マスター案

内服薬用法マスタ <連続投与の場合>

(1) 食事ベース型	
1日1回起床時	
1日1回朝食前	
1日1回朝食後	
1日1回朝食2時間後	
1日1回昼食前	
1日1回昼食後	
1日1回昼食2時間後	
1日1回夕食前	
1日1回夕食後	
1日1回夕食2時間後	
1日1回就寝前	
1日2回朝食前と就寝前	
1日2回朝食後と就寝前	
1日2回朝食前	
1日2回朝食後	
1日2回朝夕食前	
1日2回朝夕食後	
1日2回朝食前と就寝前	
1日2回朝食後と就寝前	
1日2回夕食前と就寝前	
1日2回夕食後と就寝前	
1日3回朝食夕食前	
1日3回朝食夕食後	
1日3回朝食夕食後2時間	
1日3回朝食前と就寝前	
1日3回朝食後と就寝前	
1日3回朝夕食前と就寝前	
1日3回朝夕食後と就寝前	
1日3回昼夕食前と就寝前	
1日3回昼夕食後と就寝前	
1日3回昼夕食前と就寝前	
1日3回昼夕食後と就寝前	
1日4回朝食前と就寝前	
1日4回朝食後と就寝前	
1日5回朝食夕食後、15時、就寝前	

(2) 時間間隔型→将来は時刻指定型へ	
1日2回 12時間毎	
1日3回 8時間毎	
1日4回 6時間毎	
1日6回 4時間毎	
1日8回 3時間毎	

(3) 時刻指定型 I	
1日1回 N1時	
1日2回 N1時, N2時	
1日3回 N1時, N2時, N3時	
1日4回 N1時, N2時, N3時, N4時	
1日5回 N1時, N2時, N3時, N4時, N5時	
1日6回 N1時, N2時, N3時, N4時, N5時, N6時	
1日8回 N1時, N2時, N3時, N4時, N5時, N6時, N7時, N8時	

(4) 時刻指定型 II	
1日〇回 授乳時	

内服薬用法マスタ <不連続投与(いわゆる頓用)の場合>

区分	標準用法記述	備考(付加コメント)
痛み	疼痛時	
	頭痛時	
	歯痛時	
	胸痛時	
	腹痛時	
	腰痛時	
	関節痛時	
	喘鳴時	
	喘息発作時	
	喉がゴロゴロする時	
呼吸	しゃっくり時	
	咳込時	
	血圧上昇時	〇〇mHg以上
	血糖値	〇〇以上
循環器	便秘時	
	お腹がゴロゴロする時	
	下痢時	
	嘔吐時	
	吐き気時	
	空腹時	
	出血時	
	乏尿時	〇〇mL/時間未満
	多尿時	
	むくみ時	
腎	不眠時	
	不安時	
	不穏時	
	いらいら時	
	けいれん時	
	めまい時	
精神神経	疲労時	

区分	標準用法記述	備考(付加コメント)
熱	発熱時	〇〇度以上
	悪寒時	
皮膚	かゆい時	
	発疹時	
その他症状	発作時	
	症状ある時	
医療	検査前	
	検査時	
	検査後	
	手術前	
	手術後	
	処置前	
	処置時	
	処置後	
	起床時	
	入浴前	
生活	食事前	
	食事後	
	就寝前	
その他	外出時	
	必要時 適宜	

制限記述
1日1回まで
1日2回まで
1日3回まで
1日4回まで
1日5回まで
1日6回まで
1時間以上あけて
2時間以上あけて
3時間以上あけて
6時間以上あけて
8時間以上あけて
12時間以上あけて

内服薬用法マスタ <汎用コメント>

薬剤師へ	粉碎
	脱カプセル
	一包化
	賦形なし

看護師へ	胃瘻から
	オベ室持参
	○滴/時間
	○○使用後に施用

患者へ	○月○日より
	薬効表示

薬剤毎	変更不可
	剤形変更不可
	規格変更不可
	検査日服用
	検査日服用禁止
	服用中止
	服用再開
	粉碎
	脱カプセル

処方(Rp単位)	○月○日より開始
	1日おきに服用
	食事の直前に
	食事の直後に
	○番と交互に服用
	○番終了後△番服用
	粉碎
	脱カプセル
	術前

処方せん単位	○月○日より開始
	粉碎
	脱カプセル
	検査当日のみ
	海外渡航のため
	年末年始のため
	ゴールデンウィークのため
	連休のため
	追加処方
	至急
	大至急

資料 6

データシートの例

1. 薬品名称関連

販売名 **アザリール錠1mg**

一般名 **グリメピリド**

構成要素

前修飾1	前修飾2	前修飾3	ブランド名/一般名	後修飾1	後修飾2	後修飾3
			アザリール			
			剤型	規格数字	規格単位	屋号
			錠	1	mg	

ブランド名ヨミ **アザリール**

処方せん印字用医薬品名 **糖尿病用薬アザリール錠1mg**

レセプト請求用薬品名 **アザリール錠1mg**

製販業者名 **サノア・アベレナス株式会社**

本体識別コード **NMK**

包装識別コード **NMK**

単味・配合剤区分 単味 配合剤 配合剤の有効成分数

配合剤有効成分及びその量

配合剤有効成分名	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

2. 法的規制

薬事法関連区分 毒薬 劇薬 処方せん医薬品 特定生物由来 生物由来
 麻薬向精神薬関連 麻薬 第1種向精神薬 第2種向精神薬 第3種向精神薬

3. 保険関連情報

後発 後発医薬品 後未発売 後発未発売
 長期投与制限日数 新医薬品の投与制限期限
 換算係数 1 経過措置期限
 名称変更経過措置期限

4. 医療安全関係

ヘリクス薬 複数規格存在の有無 あり 複数剤型存在の有無 あり
 名称類似医薬品名有無 あり ヘリクス薬との名称類似該当性 あり
 緊急安全性情報 あり 2回 名称類似医薬品名 **アザリール、アズルトール**
 機能評価医療安全情報有無 あり 0回
 PMDA医療安全情報有無 あり 0回
 厚労省通知有無 あり 1回
 発番 **医政発第1204001号** 発出日 **2008/12/4**