

8.1.3 副次評価項目の解析
 8.1.3.2.3 副次評価項目の要約
 FAS
 握力 右[kg]

時期	要約	NDDPX08					
		投与前ALS重症度分類					
		1度		2度		3度	
		スコア	変化量	スコア	変化量	スコア	変化量
22week(Visit8)	例数	7	7	10	10	5	5
	平均値	25.44	-3.83	16.83	-3.95	2.70	-2.24
	標準偏差	13.42	3.45	15.02	4.95	3.82	2.18
	最小値	0.0	-9.2	0.0	-13.7	0.0	-5.5
	中央値	25.10	-4.10	13.25	-2.90	0.00	-2.60
	最大値	45.1	0.5	48.2	1.5	8.1	0.0
30week(Visit9)	例数	7	7	10	10	7	7
	平均値	24.01	-5.26	13.82	-4.72	2.83	-2.59
	標準偏差	13.60	4.19	10.83	4.94	3.62	2.45
	最小値	0.0	-11.6	0.0	-17.1	0.0	-5.5
	中央値	24.30	-6.20	12.20	-3.80	0.00	-3.00
	最大値	46.4	1.8	28.4	0.0	7.7	0.0
38week(Visit10)	例数	6	6	8	8	4	4
	平均値	18.97	-7.75	18.28	-2.51	1.30	-4.88
	標準偏差	9.56	4.54	16.95	2.33	2.60	4.39
	最小値	0.0	-12.2	0.0	-5.8	0.0	-10.7
	中央値	21.85	-8.95	16.35	-1.85	0.00	-4.15
	最大値	26.6	-1.4	47.2	0.0	5.2	-0.5
46week(Visit11)	例数	5	5	8	8	3	3
	平均値	19.70	-9.10	15.43	-5.95	0.00	-5.57
	標準偏差	14.53	5.37	17.98	7.48	0.00	5.10
	最小値	0.0	-15.3	0.0	-22.2	0.0	-10.7
	中央値	19.00	-6.60	10.85	-5.35	0.00	-5.50
	最大値	41.0	-3.6	46.2	1.6	0.0	-0.5
54week(Visit12)	例数	5	5	6	6	3	3
	平均値	13.22	-12.26	15.12	-7.00	0.00	-5.57
	標準偏差	8.52	6.60	18.78	4.93	0.00	5.10
	最小値	0.0	-21.8	0.0	-15.0	0.0	-10.7
	中央値	12.70	-11.80	10.35	-6.85	0.00	-5.50
	最大値	22.2	-5.8	46.3	0.0	0.0	-0.5
62week(Visit13)	例数	4	4	6	6	2	2
	平均値	14.53	-15.68	13.57	-8.55	0.00	-3.00
	標準偏差	5.26	8.45	16.86	5.41	0.00	3.54
	最小値	8.4	-26.1	0.0	-14.7	0.0	-5.5
	中央値	14.35	-14.80	9.40	-9.20	0.00	-3.00
	最大値	21.0	-7.0	41.6	0.0	0.0	-0.5
70week(Visit14)	例数	2	2	5	5	2	2
	平均値	13.20	-15.95	12.92	-7.24	0.00	-8.10
	標準偏差	4.67	2.62	19.44	5.38	0.00	3.68
	最小値	9.9	-17.8	0.0	-14.8	0.0	-10.7
	中央値	13.20	-15.95	0.00	-8.10	0.00	-8.10
	最大値	16.5	-14.1	43.7	0.0	0.0	-5.5

8.1.3 副次評価項目の解析


8.1.3.2.3 副次評価項目の要約

FAS


握力 右[kg]

時期	要約	NDDPX08					
		投与前ALS重症度分類					
		1度		2度		3度	
		スコア	変化量	スコア	変化量	スコア	変化量
78week(Visit15)	例数	3	3	3	3	2	2
	平均値	12.83	-15.93	5.70	-7.90	0.00	-8.10
	標準偏差	4.73	4.52	9.87	9.61	0.00	3.68
	最小値	7.6	-20.2	0.0	-18.6	0.0	-10.7
	中央値	14.10	-16.40	0.00	-5.10	0.00	-8.10
	最大値	16.8	-11.2	17.1	0.0	0.0	-5.5
86week(Visit16)	例数	1	1	2	2	2	2
	平均値	10.40	-13.60	8.65	-11.75	0.00	-8.10
	標準偏差	—	—	12.23	9.40	0.00	3.68
	最小値	10.4	-13.6	0.0	-18.4	0.0	-10.7
	中央値	10.40	-13.60	8.65	-11.75	0.00	-8.10
	最大値	10.4	-13.6	17.3	-5.1	0.0	-5.5
終了又は中止時	例数	7	7	9	9	7	7
	平均値	17.14	-9.47	15.49	-7.32	1.84	-3.57
	標準偏差	12.45	7.04	15.09	8.13	3.23	3.95
	最小値	0.0	-20.2	0.0	-22.2	0.0	-10.7
	中央値	16.80	-11.20	15.10	-5.10	0.00	-2.80
	最大値	41.0	1.1	43.7	1.6	7.7	0.0
終了又は中止時(LOCF)	例数	8	8	11	11	10	10
	平均値	16.05	-11.55	14.38	-7.18	2.64	-2.72
	標準偏差	11.94	8.77	14.35	7.85	3.55	3.52
	最小値	0.0	-26.1	0.0	-22.2	0.0	-10.7
	中央値	15.45	-11.70	15.10	-5.10	0.00	-1.10
	最大値	41.0	1.1	43.7	1.6	8.4	0.0

8.1.3 副次評価項目の解析
 8.1.3.2.3 副次評価項目の要約
 FAS
 握力_右[kg]



8.1.3 副次評価項目の解析
 8.1.3.2.3 副次評価項目の要約
 FAS
 握力_右[kg]



8.1.3 副次評価項目の解析
 8.1.3.2.3 副次評価項目の要約
 FAS
 頸部前屈

時期	要約	NDDPX08					
		投与前ALS重症度分類					
		1度		2度		3度	
		スコア	変化量	スコア	変化量	スコア	変化量
観察期(Visit1)	例数	7	7	10	10	9	9
	平均値	5.0	0.4	4.7	0.0	4.6	0.4
	標準偏差	0.0	1.1	0.9	0.0	0.7	0.9
	最小値	5	0	2	0	3	-1
	中央値	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0
	最大値	5	3	5	0	5	2
観察期(Visit2)	例数	8	8	9	9	9	9
	平均値	4.6	0.3	4.7	0.0	4.4	0.3
	標準偏差	0.7	0.7	1.0	0.0	0.7	0.7
	最小値	3	0	2	0	3	-1
	中央値	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0
	最大値	5	2	5	0	5	1
投与前(Visit3)	例数	8	—	11	—	10	—
	平均値	4.4	—	4.7	—	4.2	—
	標準偏差	1.2	—	0.9	—	1.0	—
	最小値	2	—	2	—	2	—
	中央値	5.0	—	5.0	—	4.5	—
	最大値	5	—	5	—	5	—
8week(Visit6)	例数	8	8	10	10	9	9
	平均値	4.9	0.5	4.7	0.0	4.3	0.1
	標準偏差	0.4	1.1	0.9	0.0	1.0	0.9
	最小値	4	0	2	0	2	-1
	中央値	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0
	最大値	5	3	5	0	5	2
14week(Visit7)	例数	8	8	10	10	7	7
	平均値	4.8	0.4	4.6	-0.1	4.6	0.1
	標準偏差	0.5	1.2	1.0	0.3	0.5	0.7
	最小値	4	-1	2	-1	4	-1
	中央値	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0
	最大値	5	3	5	0	5	1
22week(Visit8)	例数	7	7	10	10	5	5
	平均値	4.4	0.1	4.6	-0.1	4.4	0.0
	標準偏差	1.1	0.9	1.0	0.3	0.5	0.7
	最小値	2	-1	2	-1	4	-1
	中央値	5.0	0.0	5.0	0.0	4.0	0.0
	最大値	5	2	5	0	5	1
30week(Visit9)	例数	7	7	10	10	7	7
	平均値	4.1	-0.1	4.4	-0.3	4.4	0.3
	標準偏差	1.1	1.1	1.3	0.5	0.8	1.1
	最小値	2	-1	1	-1	3	-1
	中央値	4.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0
	最大値	5	2	5	0	5	2


8.1.3 副次評価項目の解析
 8.1.3.2.3 副次評価項目の要約
 FAS
 頸部前屈

時期	要約	NDDPX08					
		投与前ALS重症度分類					
		1度		2度		3度	
		スコア	変化量	スコア	変化量	スコア	変化量
38week(Visit10)	例数	6	6	8	8	4	4
	平均値	4.2	0.0	4.0	-0.6	4.0	-0.3
	標準偏差	1.2	1.5	1.6	1.1	0.8	0.5
	最小値	2	-1	1	-3	3	-1
	中央値	4.5	-0.5	5.0	0.0	4.0	0.0
	最大値	5	3	5	0	5	0
46week(Visit11)	例数	5	5	8	8	3	3
	平均値	4.4	-0.2	3.9	-0.8	4.0	0.0
	標準偏差	1.3	0.4	1.6	1.0	0.0	1.0
	最小値	2	-1	1	-3	4	-1
	中央値	5.0	0.0	4.5	-0.5	4.0	0.0
	最大値	5	0	5	0	4	1
54week(Visit12)	例数	5	5	6	6	3	3
	平均値	4.0	0.0	3.7	-0.8	4.0	0.0
	標準偏差	1.2	1.2	1.8	1.2	0.0	1.0
	最小値	2	-1	1	-3	4	-1
	中央値	4.0	0.0	4.5	-0.5	4.0	0.0
	最大値	5	2	5	0	4	1
62week(Visit13)	例数	4	4	6	6	2	2
	平均値	3.8	0.0	3.7	-0.8	3.5	-0.5
	標準偏差	1.3	1.4	1.8	1.2	0.7	2.1
	最小値	2	-1	1	-3	3	-2
	中央値	4.0	-0.5	4.5	-0.5	3.5	-0.5
	最大値	5	2	5	0	4	1
70week(Visit14)	例数	2	2	5	5	2	2
	平均値	2.5	-1.5	3.4	-1.0	4.0	0.5
	標準偏差	0.7	0.7	1.8	1.2	0.0	0.7
	最小値	2	-2	1	-3	4	0
	中央値	2.5	-1.5	4.0	-1.0	4.0	0.5
	最大値	3	-1	5	0	4	1
78week(Visit15)	例数	3	3	3	3	2	2
	平均値	3.3	0.0	2.7	-1.3	4.0	0.5
	標準偏差	1.2	1.7	1.2	1.5	0.0	0.7
	最小値	2	-1	2	-3	4	0
	中央値	4.0	-1.0	2.0	-1.0	4.0	0.5
	最大値	4	2	4	0	4	1
86week(Visit16)	例数	1	1	2	2	2	2
	平均値	4.0	-1.0	2.5	-1.0	3.0	-0.5
	標準偏差	—	—	2.1	0.0	0.0	0.7
	最小値	4	-1	1	-1	3	-1
	中央値	4.0	-1.0	2.5	-1.0	3.0	-0.5
	最大値	4	-1	4	-1	3	0

8.1.3 副次評価項目の解析
 8.1.3.2.3 副次評価項目の要約
 FAS
 頸部前屈

時期	要約	NDDPX08					
		投与前ALS重症度分類					
		1度		2度		3度	
		スコア	変化量	スコア	変化量	スコア	変化量
終了又は中止時	例数	7	7	10	10	7	7
	平均値	4.1	-0.1	4.1	-0.6	3.7	-0.7
	標準偏差	1.1	1.1	1.4	1.0	0.8	0.8
	最小値	2	-1	1	-3	3	-2
	中央値	4.0	0.0	5.0	0.0	4.0	-1.0
	最大値	5	2	5	0	5	0
終了又は中止時(LOCF)	例数	8	8	11	11	10	10
	平均値	4.3	-0.1	3.9	-0.8	3.8	-0.4
	標準偏差	1.0	1.0	1.5	1.2	0.8	1.0
	最小値	2	-1	1	-3	3	-2
	中央値	4.5	0.0	5.0	0.0	4.0	-0.5
	最大値	5	2	5	0	5	1

8.1.3 副次評価項目の解析
 8.1.3.2.3 副次評価項目の要約
 FAS
 頸部前屈



8.1.3 副次評価項目の解析


8.1.3.2.3 副次評価項目の要約

FAS

頸部前屈

平均±標準偏差

- ALS重症度：1度
- -◇- - ALS重症度：2度
- ▲— ALS重症度：3度



別紙 (参考)

8.1.2.1 ALSFRS-Rトータルスコアの要約 球機能

時期	要約	NDDPX08		プラセボ	
		スコア	変化量	スコア	変化量
観察期(Visit1)	例数	26	26	7	7
	平均値	11.31	0.38	11.29	-0.29
	標準偏差	1.54	0.85	1.50	0.49
	最小値	7.0	0.0	8.0	-1.0
	中央値	12.00	0.00	12.00	0.00
	最大値	12.0	4.0	12.0	0.0
観察期(Visit2)	例数	27	27	6	6
	平均値	11.19	0.22	11.50	0.00
	標準偏差	1.90	0.51	0.84	0.63
	最小値	5.0	0.0	10.0	-1.0
	中央値	12.00	0.00	12.00	0.00
	最大値	12.0	2.0	12.0	1.0
投与前(Visit3)	例数	29	—	7	—
	平均値	10.93	—	11.57	—
	標準偏差	2.19	—	1.13	—
	最小値	3.0	—	9.0	—
	中央値	12.00	—	12.00	—
	最大値	12.0	—	12.0	—
4week(Visit5)	例数	27	27	6	6
	平均値	10.85	0.00	11.50	0.00
	標準偏差	2.33	0.28	1.22	0.00
	最小値	3.0	-1.0	9.0	0.0
	中央値	12.00	0.00	12.00	0.00
	最大値	12.0	1.0	12.0	0.0
8week(Visit6)	例数	27	27	7	7
	平均値	10.74	-0.11	11.43	-0.14
	標準偏差	2.36	0.32	1.13	0.38
	最小値	3.0	-1.0	9.0	-1.0
	中央値	12.00	0.00	12.00	0.00
	最大値	12.0	0.0	12.0	0.0
14week(Visit7)	例数	25	25	7	7
	平均値	10.72	-0.16	11.00	-0.57
	標準偏差	2.56	0.47	1.15	0.79
	最小値	3.0	-2.0	9.0	-2.0
	中央値	12.00	0.00	11.00	0.00
	最大値	12.0	0.0	12.0	0.0
22week(Visit8)	例数	22	22	6	6
	平均値	10.27	-0.41	11.00	-0.50
	標準偏差	2.90	0.80	0.89	1.05
	最小値	3.0	-3.0	10.0	-2.0
	中央値	12.00	0.00	11.00	-0.50
	最大値	12.0	0.0	12.0	1.0


8.1.2.1 ALSFRS-Rトータルスコアの要約 球機能

時期	要約	NDDPX08		プラセボ	
		スコア	変化量	スコア	変化量
30week(Visit9)	例数	24	24	6	6
	平均値	10.17	-0.63	11.00	-0.50
	標準偏差	2.78	1.24	1.26	0.84
	最小値	3.0	-4.0	9.0	-2.0
	中央値	11.50	0.00	11.50	0.00
	最大値	12.0	2.0	12.0	0.0
38week(Visit10)	例数	18	18	5	5
	平均値	10.06	-0.56	10.80	-0.60
	標準偏差	3.49	1.38	1.30	0.89
	最小値	2.0	-4.0	9.0	-2.0
	中央値	12.00	0.00	11.00	0.00
	最大値	12.0	1.0	12.0	0.0
46week(Visit11)	例数	16	16	5	5
	平均値	10.06	-1.00	10.80	-0.60
	標準偏差	3.59	1.83	1.30	1.52
	最小値	2.0	-5.0	9.0	-3.0
	中央値	12.00	0.00	11.00	0.00
	最大値	12.0	0.0	12.0	1.0
54week(Visit12)	例数	14	14	5	5
	平均値	8.86	-1.36	10.60	-1.40
	標準偏差	4.00	2.06	1.67	1.67
	最小値	1.0	-5.0	8.0	-4.0
	中央値	11.00	0.00	11.00	-1.00
	最大値	12.0	1.0	12.0	0.0
62week(Visit13)	例数	12	12	4	4
	平均値	8.08	-1.83	10.50	-1.50
	標準偏差	4.01	2.12	1.91	1.91
	最小値	1.0	-5.0	8.0	-4.0
	中央値	10.00	-1.00	11.00	-1.00
	最大値	12.0	1.0	12.0	0.0
70week(Visit14)	例数	9	9	4	4
	平均値	8.22	-1.78	10.00	-2.00
	標準偏差	3.67	2.11	2.45	2.45
	最小値	3.0	-5.0	7.0	-5.0
	中央値	10.00	-1.00	10.50	-1.50
	最大値	12.0	1.0	12.0	0.0
78week(Visit15)	例数	8	8	4	4
	平均値	6.50	-3.13	8.75	-3.25
	標準偏差	3.12	2.64	3.77	3.77
	最小値	3.0	-8.0	5.0	-7.0
	中央値	6.50	-3.50	9.00	-3.00
	最大値	11.0	1.0	12.0	0.0


8.1.2.1 ALSFRS-Rトータルスコアの要約 球機能

時期	要約	NDDPX08		プラセボ	
		スコア	変化量	スコア	変化量
86week(Visit16)	例数	5	5	1	1
	平均値	5.20	-3.80	4.00	-8.00
	標準偏差	3.35	3.96	—	—
	最小値	3.0	-9.0	4.0	-8.0
	中央値	4.00	-4.00	4.00	-8.00
	最大値	11.0	1.0	4.0	-8.0
終了又は中止時	例数	24	24	6	6
	平均値	9.54	-1.50	9.17	-2.33
	標準偏差	3.44	2.72	3.37	3.72
	最小値	3.0	-9.0	4.0	-8.0
	中央値	12.00	0.00	10.50	-0.50
	最大値	12.0	1.0	12.0	1.0
終了又は中止時(LOCF)	例数	29	29	7	7
	平均値	9.34	-1.59	8.57	-3.00
	標準偏差	3.53	2.58	3.46	3.83
	最小値	1.0	-9.0	4.0	-8.0
	中央値	11.00	0.00	10.00	-1.00
	最大値	12.0	1.0	12.0	1.0

8.1.2.1 ALSFRS-Rトータルスコアの要約 球機能



8.1.2.1 ALSFRS-Rトータルスコアの要約 球機能



8.1.2.1 ALSFRS-Rトータルスコアの要約 四肢の運動機能

時期	要約	NDDPX08		プラセボ	
		スコア	変化量	スコア	変化量
観察期(Visit1)	例数	26	26	7	7
	平均値	18.62	1.65	18.57	2.14
	標準偏差	4.92	1.20	5.38	1.07
	最小値	3.0	0.0	10.0	1.0
	中央値	19.50	1.00	21.00	2.00
	最大値	24.0	4.0	24.0	4.0
観察期(Visit2)	例数	27	27	6	6
	平均値	18.59	1.33	19.00	1.17
	標準偏差	4.53	1.21	4.47	1.47
	最小値	6.0	0.0	12.0	0.0
	中央値	20.00	1.00	19.50	1.00
	最大値	24.0	4.0	24.0	4.0
投与前(Visit3)	例数	29	—	7	—
	平均値	17.17	—	16.43	—
	標準偏差	4.86	—	5.09	—
	最小値	3.0	—	8.0	—
	中央値	18.00	—	19.00	—
	最大値	24.0	—	23.0	—
4week(Visit5)	例数	27	27	6	6
	平均値	17.00	-0.11	15.33	-0.67
	標準偏差	5.00	1.55	5.43	1.75
	最小値	5.0	-4.0	8.0	-3.0
	中央値	19.00	0.00	15.00	-0.50
	最大値	24.0	5.0	21.0	2.0
8week(Visit6)	例数	27	27	7	7
	平均値	16.37	-0.74	15.57	-0.86
	標準偏差	5.62	1.65	4.76	1.77
	最小値	2.0	-5.0	8.0	-3.0
	中央値	18.00	0.00	16.00	0.00
	最大値	24.0	2.0	20.0	1.0
14week(Visit7)	例数	25	25	7	7
	平均値	16.56	-1.20	14.29	-2.14
	標準偏差	5.03	1.76	5.06	3.80
	最小値	5.0	-5.0	8.0	-9.0
	中央値	18.00	-1.00	14.00	-2.00
	最大値	24.0	2.0	22.0	3.0
22week(Visit8)	例数	22	22	6	6
	平均値	15.95	-2.14	14.00	-3.83
	標準偏差	5.13	2.32	4.52	4.83
	最小値	5.0	-9.0	9.0	-12.0
	中央値	16.00	-1.50	13.00	-3.00
	最大値	24.0	0.0	21.0	2.0


8.1.2.1 ALSFRS-Rトータルスコアの要約 四肢の運動機能

時期	要約	NDDPX08		プラセボ	
		スコア	変化量	スコア	変化量
30week(Visit9)	例数	24	24	6	6
	平均値	13.83	-3.71	11.67	-6.17
	標準偏差	6.05	3.06	5.05	6.05
	最小値	1.0	-10.0	7.0	-15.0
	中央値	14.50	-4.00	10.50	-7.00
	最大値	24.0	1.0	21.0	2.0
38week(Visit10)	例数	18	18	5	5
	平均値	13.72	-4.06	11.80	-6.60
	標準偏差	5.55	3.15	5.59	7.23
	最小値	2.0	-11.0	6.0	-17.0
	中央値	14.00	-3.50	10.00	-7.00
	最大値	24.0	0.0	21.0	2.0
46week(Visit11)	例数	16	16	5	5
	平均値	12.88	-5.06	11.80	-6.60
	標準偏差	6.68	4.80	5.22	6.69
	最小値	2.0	-16.0	6.0	-17.0
	中央値	14.50	-5.00	12.00	-7.00
	最大値	24.0	2.0	20.0	1.0
54week(Visit12)	例数	14	14	5	5
	平均値	11.71	-6.29	8.60	-10.40
	標準偏差	6.62	3.60	6.91	7.60
	最小値	1.0	-13.0	3.0	-20.0
	中央値	12.00	-7.00	6.00	-11.00
	最大値	24.0	0.0	20.0	1.0
62week(Visit13)	例数	12	12	4	4
	平均値	11.17	-7.08	8.50	-10.50
	標準偏差	6.21	3.45	8.27	9.04
	最小値	3.0	-13.0	2.0	-21.0
	中央値	12.00	-7.00	6.00	-11.00
	最大値	21.0	-1.0	20.0	1.0
70week(Visit14)	例数	9	9	4	4
	平均値	8.56	-9.00	8.50	-10.50
	標準偏差	6.62	3.77	8.74	9.47
	最小値	1.0	-13.0	2.0	-21.0
	中央値	6.00	-10.00	5.50	-11.50
	最大値	19.0	-1.0	21.0	2.0
78week(Visit15)	例数	8	8	4	4
	平均値	7.88	-10.00	7.50	-11.50
	標準偏差	5.82	2.20	8.02	8.66
	最小値	1.0	-14.0	2.0	-21.0
	中央値	9.50	-10.00	4.50	-12.50
	最大値	14.0	-7.0	19.0	0.0

8.1.2.1 ALSFRS-Rトータルスコアの要約 四肢の運動機能

時期	要約	NDDPX08		プラセボ	
		スコア	変化量	スコア	変化量
86week(Visit16)	例数	5	5	1	1
	平均値	4.60	-11.60	2.00	-21.00
	標準偏差	4.83	1.95	—	—
	最小値	1.0	-14.0	2.0	-21.0
	中央値	2.00	-11.00	2.00	-21.00
	最大値	12.0	-9.0	2.0	-21.0
	終了又は中止時	例数	24	24	6
	平均値	11.21	-6.71	8.17	-9.67
	標準偏差	6.34	5.04	6.31	7.53
	最小値	1.0	-16.0	2.0	-21.0
	中央値	12.50	-7.00	8.00	-10.50
	最大値	22.0	2.0	19.0	0.0
終了又は中止時(LOCF)	例数	29	29	7	7
	平均値	10.93	-6.24	7.29	-9.14
	標準偏差	6.51	5.03	6.21	7.01
	最小値	1.0	-16.0	2.0	-21.0
	中央値	12.00	-6.00	7.00	-9.00
	最大値	22.0	2.0	19.0	0.0

8.1.2.1 ALSFRS-Rトータルスコアの要約 四肢の運動機能



8.1.2.1 ALSFRS-Rトータルスコアの要約 四肢の運動機能

