

| 40代男性 | 一人あたり 年間医療費 | 高血圧症 有病率 | 高脂血症 有病率 | 高尿酸血症 有病率 | 肝機能障害 有病率 | 糖尿病 有病率 | 糖尿病性 神経障害 有病率 | 糖尿病性 網膜症 有病率 | 糖尿病性 腎症 有病率 | 動脈閉塞 有病率 | 高血圧性 腎臓障害 有病率 | 脳出血有 病率 | 脳梗塞 有病率 | 虚血性 心疾患 有病率 |
|-------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|------------|-------------------|
| A | 270483 | 15.2% | 15.2% | 3.8% | 2.5% | 13.9% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.1% |
| B | 77798 | 17.6% | 11.8% | 0.0% | 11.8% | 23.5% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 5.9% |
| C | 202946 | 18.8% | 12.5% | 6.3% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| D | 343458 | 40.0% | 6.7% | 0.0% | 6.7% | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
| E | 247777 | 34.3% | 20.0% | 8.6% | 8.6% | 25.7% | 5.7% | 11.4% | 0.0% | 8.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.7% |
| F | 181131 | 7.4% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 14.8% | 0.0% | 7.4% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 3.7% | 0.0% |
| G | 376343 | 45.0% | 25.0% | 0.0% | 15.0% | 20.0% | 5.0% | 15.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 0.0% |
| H | 262203 | 29.2% | 20.8% | 8.3% | 0.0% | 25.0% | 12.5% | 25.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 0.0% |
| I | 119778 | 31.6% | 21.1% | 0.0% | 5.3% | 31.6% | 5.3% | 5.3% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 21.1% |
| J | 246429 | 33.3% | 38.6% | 8.8% | 12.3% | 36.8% | 0.0% | 12.3% | 0.0% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 8.8% |
| K | 251201 | 51.9% | 18.5% | 7.4% | 3.7% | 37.0% | 0.0% | 7.4% | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 3.7% | 3.7% | 7.4% |
| L | 192154 | 30.3% | 19.7% | 3.0% | 7.6% | 33.3% | 1.5% | 7.6% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% |
| 総計 | 234475 | 28.1% | 20.1% | 4.5% | 6.7% | 25.6% | 2.0% | 8.2% | 0.2% | 4.5% | 0.0% | 0.7% | 2.0% | 5.0% |
| 全国平均 | | | | | | 1.2% | | | | | | | 0.2% | 0.2% |

| 40代女性 | 合計点数 | 高血压症 | 高脂血症 | 高尿酸血症 | 肝機能障害 | 糖尿病 | 糖尿病性神経障害 | 糖尿病性網膜症 | 糖尿病性腎症 | 糖尿病性動脈閉塞 | 高血圧性腎臓障害 | 脳出血 | 脳梗塞 | 虚血性心疾患 | 特定健診対象者数 |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| A | 3030433 | 29 | 17 | 4 | 5 | 16 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 99 |
| B | 664790 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| C | 514053 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| D | 359551 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| E | 7491108 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| F | 531615 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| G | 290987 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| H | 800978 | 5 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| I | 292221 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| J | 1612217 | 15 | 12 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 52 |
| K | 818445 | 9 | 10 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| L | 701503 | 11 | 10 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 55 |
| 総計 | 17107901 | 99 | 83 | 14 | 18 | 92 | 2 | 13 | 8 | 8 | 0 | 1 | 12 | 25 | 405 |

| 女性合計 | 一人あた り年間医 療費 | 高血圧症 | 高脂血症 | 高尿酸血症 | 肝機能障害 | 糖尿病 | 糖尿病 | 糖尿病 | 糖尿病 | 動脈閉 塞有病 率 | 高血圧 性腎臓 障害有 病率 | 脳出血 有病率 | 脳梗塞 有病率 | 虚血性 心疾患 有病率 |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 性神経 障害有 病率 | 性網膜 症有病 率 | 性腎症 有病率 | 率 | 率 | 率 | 率 | 率 |
| A | 306104 | 29.3% | 17.2% | 4.0% | 5.1% | 16.2% | 1.0% | 5.1% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 3.0% | 8.1% |
| B | 443193 | 20.0% | 46.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.3% |
| C | 233660 | 22.7% | 13.6% | 0.0% | 9.1% | 31.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% |
| D | 199751 | 22.2% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| E | 3121295 | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| F | 183316 | 20.7% | 10.3% | 3.4% | 6.9% | 24.1% | 0.0% | 3.4% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 10.3% |
| G | 193991 | 26.7% | 20.0% | 6.7% | 6.7% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
| H | 348251 | 21.7% | 30.4% | 0.0% | 4.3% | 43.5% | 0.0% | 4.3% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.7% | 13.0% |
| I | 146111 | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J | 310042 | 28.8% | 23.1% | 7.7% | 3.8% | 17.3% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.6% | 1.9% |
| K | 248014 | 27.3% | 30.3% | 3.0% | 9.1% | 42.4% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| L | 127546 | 20.0% | 18.2% | 5.5% | 3.6% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 7.3% |
| 総計 | 422417 | 24.4% | 20.5% | 3.5% | 4.4% | 22.7% | 0.5% | 3.2% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.2% | 3.0% | 6.2% |
| 40代全国 平均 | | | | | | 0.5% | | | | | | 0.1% | 0.1% | |

【50代】

| 50代男性 | 合計点数 | 高血圧症 | 高脂血症 | 尿酸値 血症 | 肝機能 障害 | 糖尿病 糖尿病 | 糖尿病性 神経障害 | 糖尿病性 網膜症 | 糖尿病性 腎症 | 動脈閉塞 | 高血圧性 腎臓障害 | 脳出血 | 脳梗塞 | 虚血性 心疾患 | 特定健診 対象者数 |
|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| A | 5626171 | 71 | 49 | 17 | 13 | 48 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 144 |
| B | 913022 | 11 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| C | 3224996 | 26 | 25 | 6 | 4 | 32 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 43 |
| D | 902021 | 15 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 43 |
| E | 2350041 | 39 | 33 | 11 | 4 | 29 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 74 |
| F | 2262612 | 28 | 14 | 7 | 6 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 58 |
| G | 1118531 | 17 | 15 | 3 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 |
| H | 2045029 | 26 | 17 | 9 | 4 | 25 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 45 |
| I | 582374 | 11 | 9 | 2 | 5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 32 |
| J | 3648764 | 56 | 52 | 24 | 13 | 53 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 117 |
| K | 2589109 | 24 | 18 | 2 | 3 | 24 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 50 |
| L | 4368007 | 51 | 35 | 14 | 8 | 39 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | 104 |
| 総計 | 29630677 | 375 | 286 | 98 | 69 | 320 | 14 | 79 | 37 | 0 | 1 | 12 | 51 | 107 | 770 |

| 50代男性 | 一人あたり 年間医療費 | 高血圧症 有病率 | 高脂血症 有病率 | 高尿酸血症 有病率 | 肝機能障害 有病率 | 糖尿病 有病率 | 糖尿病性 神経障害 有病率 | 糖尿病性 網膜症 有病率 | 糖尿病性 腎症 有病率 | 動脈閉塞 有病率 | 高血圧性 腎臓障害 有病率 | 脳出血 有病率 | 脳梗塞 有病率 | 虚血性 心疾患 有病率 |
|-------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|------------|-------------------|
| A | 390706 | 49.3% | 34.0% | 11.8% | 9.0% | 33.3% | 2.8% | 9.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 4.9% | 11.1% |
| B | 415010 | 50.0% | 31.8% | 9.1% | 4.5% | 31.8% | 0.0% | 9.1% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 9.1% |
| C | 749999 | 60.5% | 58.1% | 14.0% | 9.3% | 74.4% | 0.0% | 9.3% | 16.3% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 11.6% | 32.6% |
| D | 209772 | 34.9% | 27.9% | 2.3% | 14.0% | 27.9% | 2.3% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.3% | 11.6% |
| E | 317573 | 52.7% | 44.6% | 14.9% | 5.4% | 39.2% | 2.7% | 12.2% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 5.4% | 14.9% |
| F | 390106 | 48.3% | 24.1% | 12.1% | 10.3% | 44.8% | 3.4% | 3.4% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 8.6% |
| G | 294350 | 44.7% | 39.5% | 7.9% | 5.3% | 36.8% | 0.0% | 7.9% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 5.3% |
| H | 454451 | 57.8% | 37.8% | 20.0% | 8.9% | 55.6% | 2.2% | 8.9% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 11.1% | 13.3% |
| I | 181992 | 34.4% | 28.1% | 6.3% | 15.6% | 34.4% | 0.0% | 9.4% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 3.1% | 15.6% |
| J | 311860 | 47.9% | 44.4% | 20.5% | 11.1% | 45.3% | 0.0% | 14.5% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 18.8% |
| K | 517822 | 48.0% | 36.0% | 4.0% | 6.0% | 48.0% | 4.0% | 18.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 12.0% |
| L | 420001 | 49.0% | 33.7% | 13.5% | 7.7% | 37.5% | 1.9% | 10.6% | 3.8% | 0.0% | 1.0% | 2.9% | 11.5% | 12.5% |
| 総計 | 384814 | 48.7% | 37.1% | 12.7% | 9.0% | 41.6% | 1.8% | 10.3% | 4.8% | 0.0% | 0.1% | 1.6% | 6.6% | 13.9% |
| 全国平均 | | | | | | 2.9% | | | | | | | 0.6% | 0.6% |

| 50代女性 | 合計点数 | 高血压症 | 高血脂症 | 高尿酸血症 | 肝機能障害 | 糖尿病 | 糖尿病性神経障害 | 糖尿病性網膜症 | 糖尿病性腎症 | 糖尿病性高血圧性腎臓障害 | 脳出血 | 脳梗塞 | 虚血性心疾患 | 特定健診対象者数 |
|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A | 5460922 | 52 | 53 | 11 | 12 | 54 | 3 | 11 | 5 | 0 | 2 | 13 | 14 | 135 |
| B | 1483288 | 19 | 14 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37 |
| C | 2415114 | 19 | 16 | 2 | 4 | 18 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 49 |
| D | 2440426 | 11 | 12 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 |
| E | 2448679 | 27 | 26 | 8 | 1 | 25 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 66 |
| F | 1761433 | 26 | 19 | 2 | 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 51 |
| G | 1514018 | 19 | 12 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46 |
| H | 1686653 | 27 | 28 | 2 | 5 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 55 |
| I | 1202487 | 17 | 12 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 38 |
| J | 4261133 | 52 | 53 | 12 | 5 | 48 | 3 | 11 | 4 | 0 | 5 | 6 | 18 | 114 |
| K | 2972536 | 28 | 23 | 5 | 8 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 58 |
| L | 4610346 | 49 | 48 | 2 | 5 | 51 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 12 | 122 |
| 総計 | 32257035 | 346 | 316 | 55 | 56 | 308 | 19 | 56 | 33 | 0 | 18 | 50 | 92 | 802 |

| 50代女性 | 一人あたり 年間医療費 | 高血圧症 | 高脂血症 | 高尿酸血症 | 肝機能障害 | 糖尿病 | 糖尿病性 神経障害 | 糖尿病性 網膜症 | 糖尿病性 腎症 | 動脈閉塞 | 高血圧性 腎臓障害 | 脳出血 | 脳梗塞 | 虚血性 心疾患 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 |
| A | 404513 | 38.5% | 39.3% | 8.1% | 8.9% | 40.0% | 2.2% | 8.1% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 9.6% | 10.4% |
| B | 400889 | 51.4% | 37.8% | 5.4% | 10.8% | 29.7% | 0.0% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 8.1% |
| C | 492880 | 38.8% | 32.7% | 4.1% | 8.2% | 36.7% | 4.1% | 10.2% | 10.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 14.3% |
| D | 787234 | 35.5% | 38.7% | 6.5% | 6.5% | 35.5% | 0.0% | 6.5% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.9% | 3.2% |
| E | 371012 | 40.9% | 39.4% | 12.1% | 1.5% | 37.9% | 3.0% | 9.1% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 7.6% | 15.2% |
| F | 345379 | 51.0% | 37.3% | 3.9% | 7.8% | 35.3% | 2.0% | 3.9% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 7.8% |
| G | 329134 | 41.3% | 26.1% | 4.3% | 4.3% | 32.6% | 8.7% | 4.3% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 6.5% |
| H | 306664 | 49.1% | 50.9% | 3.6% | 9.1% | 38.2% | 1.8% | 1.8% | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 14.5% |
| I | 316444 | 44.7% | 31.6% | 13.2% | 10.5% | 31.6% | 2.6% | 5.3% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 10.5% | 15.8% |
| J | 373784 | 45.6% | 46.5% | 10.5% | 4.4% | 42.1% | 2.6% | 9.6% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 5.3% | 15.8% |
| K | 512506 | 48.3% | 39.7% | 8.6% | 13.8% | 41.4% | 0.0% | 5.2% | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 6.9% | 10.3% |
| L | 377897 | 40.2% | 39.3% | 1.6% | 4.1% | 41.8% | 1.6% | 7.4% | 4.1% | 0.0% | 0.8% | 3.3% | 4.9% | 9.8% |
| 総計 | 402207 | 43.1% | 39.4% | 6.9% | 7.0% | 38.4% | 2.4% | 7.0% | 4.1% | 0.0% | 0.2% | 2.2% | 6.2% | 11.5% |
| 全国平均 | | | | | | 1.9% | | | | | | | 0.4% | 0.2% |

【60代】

| 60代男性 | 合計点数 | 高血压症 | 高血脂症 | 高尿酸血症 | 肝機能障害 | 糖尿病 | 糖尿病性神経障害 | 糖尿病性網膜症 | 糖尿病性腎症 | 糖尿病性腎症 | 動脈閉塞 | 高血压性腎臓障害 | 脳出血 | 脳梗塞 | 虚血性心疾患 | 特定健診対象者数 |
|-----------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|-------------|
| A | 13460289 | 173 | 128 | 37 | 24 | 138 | 7 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 53 | 288 |
| B | 5448357 | 69 | 51 | 15 | 8 | 47 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 | 109 |
| C | 2800873 | 59 | 44 | 10 | 9 | 42 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 90 |
| D | 3146861 | 48 | 26 | 11 | 5 | 39 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 76 |
| E | 4433261 | 72 | 68 | 12 | 6 | 51 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | 118 |
| F | 5811413 | 79 | 49 | 16 | 12 | 55 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 124 |
| G | 4698815 | 63 | 47 | 13 | 12 | 57 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | 101 |
| H | 4227098 | 63 | 58 | 13 | 13 | 57 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 26 | 108 |
| I | 2616239 | 50 | 42 | 6 | 8 | 45 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 13 | 74 |
| J | 11134628 | 161 | 114 | 45 | 37 | 122 | 6 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 47 | 256 |
| K | 4796194 | 79 | 60 | 12 | 17 | 58 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 23 | 121 |
| L | 11707808 | 158 | 107 | 29 | 25 | 111 | 9 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 48 | 251 |
| 総計 | 74281836 | 1074 | 794 | 219 | 176 | 822 | 48 | 183 | 114 | 2 | 0 | 0 | 67 | 176 | 320 | 1716 |

| 60代男性 | 一人あたり 年間医療費 | 高血圧症 有病率 | 高脂血症 有病率 | 高尿酸血症 有病率 | 肝機能障害 有病率 | 糖尿病 有病率 | 糖尿病性 神経障害 有病率 | 糖尿病性 網膜症 有病率 | 糖尿病性 腎症 有病率 | 動脈閉塞 有病率 | 高血圧性 腎臓障害 有病率 | 脳出血 有病率 | 脳梗塞 有病率 | 虚血性 心疾患 有病率 |
|-------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|------------|-------------------|
| A | 467371 | 60.1% | 44.4% | 12.8% | 8.3% | 47.9% | 2.4% | 12.5% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 8.0% | 18.4% |
| B | 499849 | 63.3% | 46.8% | 13.8% | 7.3% | 43.1% | 4.6% | 9.2% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 11.0% | 17.4% |
| C | 311208 | 65.6% | 48.9% | 11.1% | 10.0% | 46.7% | 3.3% | 12.2% | 8.9% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 10.0% | 18.9% |
| D | 414061 | 63.2% | 34.2% | 14.5% | 6.6% | 51.3% | 3.9% | 9.2% | 7.9% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 13.2% | 19.7% |
| E | 375700 | 61.0% | 57.6% | 10.2% | 5.1% | 43.2% | 2.5% | 12.7% | 11.9% | 0.8% | 0.0% | 3.4% | 10.2% | 22.9% |
| F | 466662 | 63.7% | 39.5% | 12.9% | 9.7% | 44.4% | 0.8% | 6.5% | 6.5% | 0.8% | 0.0% | 4.0% | 4.0% | 10.5% |
| G | 465229 | 62.4% | 46.5% | 12.9% | 11.9% | 56.4% | 4.0% | 7.9% | 7.9% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 10.9% | 18.8% |
| H | 391398 | 58.3% | 53.7% | 12.0% | 12.0% | 52.8% | 1.9% | 13.0% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 13.9% | 24.1% |
| I | 353546 | 67.6% | 56.8% | 8.1% | 10.8% | 60.8% | 1.4% | 9.5% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 21.6% | 17.6% |
| J | 434946 | 62.9% | 44.5% | 17.6% | 14.5% | 47.7% | 2.3% | 11.3% | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 9.4% | 18.4% |
| K | 396380 | 65.3% | 49.6% | 9.9% | 14.0% | 47.9% | 3.3% | 9.1% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 11.6% | 19.0% |
| L | 466447 | 62.9% | 42.6% | 11.6% | 10.0% | 44.2% | 3.6% | 10.8% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 10.0% | 19.1% |
| 総計 | 432878 | 62.6% | 46.3% | 12.8% | 10.3% | 47.9% | 2.8% | 10.7% | 6.6% | 0.1% | 0.0% | 3.9% | 10.3% | 18.6% |
| 全国平均 | | | | | | 5.3% | | | | | | | 1.9% | 1.5% |

| 60代女性 | 合計点数 | 高血压症 | 高血脂症 | 高尿酸血症 | 肝機能障害 | 糖尿病 | 糖尿病性神経障害 | 糖尿病性網膜症 | 糖尿病性腎症 | 糖尿病性動脈閉塞 | 高血压性腎臓障害 | 脳出血 | 脳梗塞 | 虚血性心疾患 | 特定健診対象者数 |
|-----------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|----------|-----------|------------|------------|-------------|
| A | 15003044 | 194 | 173 | 21 | 35 | 144 | 13 | 21 | 21 | 0 | 1 | 11 | 25 | 57 | 329 |
| B | 3245447 | 65 | 48 | 10 | 6 | 54 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 119 |
| C | 4002920 | 71 | 52 | 9 | 13 | 57 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 108 |
| D | 3354171 | 48 | 42 | 6 | 2 | 43 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 80 |
| E | 6149578 | 82 | 72 | 12 | 10 | 79 | 1 | 15 | 13 | 3 | 0 | 6 | 10 | 28 | 136 |
| F | 6166486 | 89 | 85 | 7 | 16 | 82 | 4 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 26 | 167 |
| G | 4536097 | 66 | 56 | 11 | 3 | 49 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | 102 |
| H | 4838449 | 79 | 81 | 11 | 8 | 65 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | 131 |
| I | 2205723 | 38 | 33 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 63 |
| J | 11430494 | 152 | 120 | 19 | 26 | 100 | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 8 | 24 | 41 | 235 |
| K | 7229482 | 88 | 71 | 13 | 15 | 57 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 23 | 145 |
| L | 11543058 | 165 | 142 | 27 | 22 | 140 | 3 | 24 | 19 | 0 | 0 | 5 | 28 | 45 | 276 |
| 総計 | 79704949 | 1137 | 975 | 151 | 161 | 899 | 38 | 158 | 117 | 4 | 1 | 54 | 166 | 319 | 1891 |

| 60代女性 | 一人あたり 年間医療費 | 高血圧症 | 高脂血症 | 高尿酸血症 | 肝機能障害 | 糖尿病 | 糖尿病性 神経障害 | 糖尿病性 網膜症 | 糖尿病性 腎症 | 動脈閉塞 | 高血圧性 腎臓障害 | 脳出血 | 脳梗塞 | 虚血性 心疾患 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 | 有病率 |
| A | 456020 | 59.0% | 52.6% | 6.4% | 10.6% | 43.8% | 4.0% | 6.4% | 6.4% | 0.0% | 0.3% | 3.3% | 7.6% | 17.3% |
| B | 272727 | 54.6% | 40.3% | 8.4% | 5.0% | 45.4% | 0.8% | 13.4% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 7.6% | 13.4% |
| C | 370641 | 65.7% | 48.1% | 8.3% | 12.0% | 52.8% | 2.8% | 5.6% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 8.3% | 19.4% |
| D | 419271 | 60.0% | 52.5% | 7.5% | 2.5% | 53.8% | 1.3% | 16.3% | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 8.8% | 16.3% |
| E | 452175 | 60.3% | 52.9% | 8.8% | 7.4% | 58.1% | 0.7% | 11.0% | 9.6% | 2.2% | 0.0% | 4.4% | 7.4% | 20.6% |
| F | 369251 | 53.3% | 50.9% | 4.2% | 9.6% | 49.1% | 2.4% | 12.6% | 7.8% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 6.0% | 15.6% |
| G | 444715 | 64.7% | 54.9% | 10.8% | 2.9% | 48.0% | 3.9% | 5.9% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 9.8% | 15.7% |
| H | 369347 | 60.3% | 61.8% | 8.4% | 6.1% | 49.6% | 1.5% | 9.2% | 6.1% | 0.8% | 0.0% | 3.1% | 11.5% | 16.0% |
| I | 350115 | 60.3% | 52.4% | 7.9% | 7.9% | 46.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 19.0% |
| J | 486404 | 64.7% | 51.1% | 8.1% | 11.1% | 42.6% | 2.1% | 6.4% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 10.2% | 17.4% |
| K | 498585 | 60.7% | 49.0% | 9.0% | 10.3% | 39.3% | 0.7% | 6.2% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 11.0% | 15.9% |
| L | 418227 | 59.8% | 51.4% | 9.8% | 8.0% | 50.7% | 1.1% | 8.7% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 10.1% | 16.3% |
| 総計 | 421496 | 60.1% | 51.6% | 8.0% | 8.5% | 47.5% | 2.0% | 8.4% | 6.2% | 0.2% | 0.1% | 2.9% | 8.8% | 16.9% |
| 全国平均 | | | | | | 3.5% | | | | | | | 1.2% | 0.7% |

【70-74 歳】

| 70-74 歳男 性 | 合計点数 | 高血压症 | 高脂血症 | 高尿酸血症 | 肝機能 障害 | 糖尿病 | 糖尿病性 神経障害 | 糖尿病性 網膜症 | 糖尿病性 腎症 | 糖尿病性 動脈閉塞 | 高血压性 腎臓障害 | 脳出血 | 脳梗塞 | 虚血性 心疾患 | 特定健診 対象者数 |
|---------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
| A | 6857060 | 110 | 75 | 17 | 13 | 86 | 1 | 18 | 13 | 0 | 4 | 5 | 26 | 39 | 154 |
| B | 2136702 | 36 | 17 | 3 | 3 | 24 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 48 |
| C | 2311714 | 39 | 30 | 5 | 3 | 37 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 51 |
| D | 2567931 | 28 | 17 | 6 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 40 |
| E | 3790684 | 62 | 53 | 14 | 12 | 47 | 5 | 19 | 16 | 0 | 2 | 5 | 15 | 22 | 77 |
| F | 3228813 | 47 | 27 | 7 | 5 | 37 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 67 |
| G | 2671249 | 35 | 26 | 5 | 4 | 28 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 49 |
| H | 1775980 | 44 | 26 | 7 | 4 | 32 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 53 |
| I | 1134815 | 22 | 11 | 2 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 37 |
| J | 6792829 | 83 | 61 | 16 | 11 | 67 | 4 | 16 | 9 | 0 | 1 | 3 | 27 | 34 | 113 |
| K | 4146548 | 45 | 30 | 9 | 5 | 32 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 59 |
| L | 7441290 | 97 | 57 | 17 | 13 | 70 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 34 | 130 |
| 総計 | 44855015 | 648 | 430 | 108 | 79 | 499 | 19 | 104 | 72 | 0 | 8 | 25 | 154 | 217 | 878 |

| 70-74 歳男 性 | 一人あたり 年間医療費 | 高血圧症 有病率 | 高脂血症 有病率 | 高尿酸血症 有病率 | 肝機能障害 | | 糖尿病 有病率 | 糖尿病性 | | 糖尿病性 網膜症 有病率 | 糖尿病性 腎症 有病率 | 動脈閉塞 有病率 | 高血圧性 腎臓障害 有病率 | 脳出血 有病率 | 脳梗塞 有病率 | 虚血性 心疾患 有病率 |
|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | | 肝機能障害 有病率 | 糖尿病性 神経障害 有病率 | | 糖尿病性 網膜症 有病率 | 糖尿病性 腎症 有病率 | | | | | | | |
| A | 445264 | 71.4% | 48.7% | 11.0% | 8.4% | 8.4% | 55.8% | 0.6% | 11.7% | 8.4% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 3.2% | 16.9% | 25.3% |
| B | 445146 | 75.0% | 35.4% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 50.0% | 0.0% | 12.5% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.4% | 20.8% |
| C | 453277 | 76.5% | 58.8% | 9.8% | 5.9% | 5.9% | 72.5% | 2.0% | 9.8% | 9.8% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 23.5% | 21.6% |
| D | 641983 | 70.0% | 42.5% | 15.0% | 5.0% | 5.0% | 50.0% | 0.0% | 2.5% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 30.0% | 17.5% |
| E | 492297 | 80.5% | 68.8% | 18.2% | 15.6% | 15.6% | 61.0% | 6.5% | 24.7% | 20.8% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 6.5% | 19.5% | 28.6% |
| F | 481912 | 70.1% | 40.3% | 10.4% | 7.5% | 7.5% | 55.2% | 0.0% | 7.5% | 13.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.4% | 28.4% |
| G | 545153 | 71.4% | 53.1% | 10.2% | 8.2% | 8.2% | 57.1% | 6.1% | 10.2% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 20.4% | 26.5% |
| H | 335091 | 83.0% | 49.1% | 13.2% | 7.5% | 7.5% | 60.4% | 0.0% | 13.2% | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.4% | 9.4% | 24.5% |
| I | 306707 | 59.5% | 29.7% | 5.4% | 10.8% | 10.8% | 51.4% | 2.7% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 8.1% | 18.9% |
| J | 601135 | 73.5% | 54.0% | 14.2% | 9.7% | 9.7% | 59.3% | 3.5% | 14.2% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 2.7% | 23.9% | 30.1% |
| K | 702805 | 76.3% | 50.8% | 15.3% | 8.5% | 8.5% | 54.2% | 0.0% | 11.9% | 6.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.0% | 13.6% |
| L | 572407 | 74.6% | 43.8% | 13.1% | 10.0% | 10.0% | 53.8% | 3.1% | 10.0% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 13.1% | 26.2% |
| 総計 | 510884 | 73.8% | 49.0% | 12.3% | 9.0% | 9.0% | 56.8% | 2.2% | 11.8% | 8.2% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 2.8% | 17.5% | 24.7% |
| 全国平均 | | | | | | | 6.9% | | | | | | | | 3.6% | 2.7% |

| 70-74 歲女 性 | 合計點數 | 高血壓症 | 高脂血症 | 高尿酸血症 | 肝機能 障害 | 糖尿病 | 糖尿病性 神經障害 | 糖尿病性 網膜症 | 糖尿病性 腎症 | 糖尿病性 腎臟障害 | 動脈閉塞 | 高血壓性 腎臟障害 | 腦出血 | 腦梗塞 | 虛血性 心疾患 | 特定健診 対象者數 |
|---------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| A | 1110007 | 149 | 119 | 19 | 28 | 118 | 2 | 20 | 14 | 0 | 1 | 10 | 28 | 54 | 208 | |
| B | 2762789 | 37 | 30 | 8 | 4 | 28 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 49 | |
| C | 3562544 | 36 | 32 | 5 | 8 | 33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 48 | |
| D | 1831652 | 31 | 23 | 3 | 7 | 30 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 39 | |
| E | 4279485 | 61 | 54 | 8 | 9 | 43 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 3 | 16 | 20 | 86 | |
| F | 2233954 | 34 | 26 | 3 | 8 | 26 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 54 | |
| G | 3867199 | 38 | 32 | 1 | 7 | 31 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 55 | |
| H | 5026561 | 40 | 34 | 10 | 8 | 33 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 64 | |
| I | 2271023 | 35 | 29 | 3 | 3 | 23 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 51 | |
| J | 9443703 | 97 | 82 | 9 | 16 | 76 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 26 | 40 | 148 | |
| K | 3118391 | 36 | 28 | 5 | 5 | 29 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 57 | |
| L | 7980127 | 90 | 80 | 22 | 16 | 77 | 3 | 16 | 8 | 0 | 1 | 3 | 21 | 34 | 140 | |
| 總計 | 57477435 | 684 | 569 | 96 | 119 | 547 | 21 | 108 | 61 | 0 | 4 | 31 | 160 | 240 | 999 | |

| 70-74 歳女 性 | 一人あたり 年間医療費 | 高血圧症 有病率 | 高脂血症 有病率 | 高尿酸血症 有病率 | 肝機能障害 有病率 | 糖尿病 有病率 | 糖尿病性 神経障害 有病率 | 糖尿病性 網膜症 有病率 | 糖尿病性 腎症 有病率 | 動脈閉塞 有病率 | 高血圧性 腎臓障害 有病率 | 脳出血 有病率 | 脳梗塞 有病率 | 虚血性 心疾患 有病率 |
|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
| A | 533654 | 71.6% | 57.2% | 9.1% | 13.5% | 56.7% | 1.0% | 9.6% | 6.7% | 0.0% | 0.5% | 4.8% | 13.5% | 26.0% |
| B | 563834 | 75.5% | 61.2% | 16.3% | 8.2% | 57.1% | 0.0% | 16.3% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.3% | 26.5% |
| C | 742197 | 75.0% | 66.7% | 10.4% | 16.7% | 68.8% | 0.0% | 14.6% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.6% | 31.3% |
| D | 469654 | 79.5% | 59.0% | 7.7% | 17.9% | 76.9% | 5.1% | 17.9% | 12.8% | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 23.1% | 30.8% |
| E | 497615 | 70.9% | 62.8% | 9.3% | 10.5% | 50.0% | 4.7% | 12.8% | 10.5% | 0.0% | 1.2% | 3.5% | 18.6% | 23.3% |
| F | 413695 | 63.0% | 48.1% | 5.6% | 14.8% | 48.1% | 0.0% | 7.4% | 5.6% | 0.0% | 1.9% | 1.9% | 9.3% | 22.2% |
| G | 703127 | 69.1% | 58.2% | 1.8% | 12.7% | 56.4% | 3.6% | 10.9% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 21.8% | 25.5% |
| H | 785400 | 62.5% | 53.1% | 15.6% | 12.5% | 51.6% | 6.3% | 7.8% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 23.4% | 14.1% |
| I | 445299 | 68.6% | 56.9% | 5.9% | 5.9% | 45.1% | 2.0% | 13.7% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.7% | 11.8% |
| J | 638088 | 65.5% | 55.4% | 6.1% | 10.8% | 51.4% | 1.4% | 8.8% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 17.6% | 27.0% |
| K | 547086 | 63.2% | 49.1% | 8.8% | 8.8% | 50.9% | 1.8% | 7.0% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 8.8% | 19.3% |
| L | 570009 | 64.3% | 57.1% | 15.7% | 11.4% | 55.0% | 2.1% | 11.4% | 5.7% | 0.0% | 0.7% | 2.1% | 15.0% | 24.3% |
| 総計 | 575350 | 68.5% | 57.0% | 9.6% | 11.9% | 54.8% | 2.1% | 10.8% | 6.1% | 0.0% | 0.4% | 3.1% | 16.0% | 24.0% |
| 全国平均 | | | | | | 5.0% | | | | | | | 2.8% | 1.5% |

※性年齢別・地域別に患者数・有病率をまとめ、全国平均値と比較した。有病率に関しては正確な比較ではなく、あくまで目安程度である。なぜならば、集計データは生活習慣病のレセプトを持つ患者数を国保被保険者数で割ったもの、全国平均値は患者調査から引用したものであり、計算の手法が異なる。レセプトには検査のための病名が含まれ（患者数の過大推定の要因）、診療を受けていない患者数は含まれない（患者数の過小推定の要因）。よって、厳密な比較の対象とはならない。

上記の分析例を見ると、この地域では集計上の問題を無視できるほどに生活習慣病患者の発生数が多いことが分かる。特に、本来、生活習慣病の発病がまれである40代から多くの患者がみられ、その蓄積が高年齢層の有病率の高さに反映されている。有病率が高いことが予想される国保データであることを割り引いても、非常に有病率が高い。

④統計的分析

【医療費】

| 保険点数 | 学校区 | 度数 | 平均値 | 標準偏差 | 標準誤差 | 95%信頼区間下限 | 95%信頼区間上限 | 最小値 | 最大値 |
|------|-----|------|-------|--------|-------|-----------|-----------|-----|---------|
| 1 | K | 550 | 47907 | 99827 | 4257 | 39546 | 56268 | 392 | 1278472 |
| 2 | F | 577 | 38969 | 75249 | 3133 | 32817 | 45122 | 40 | 711842 |
| 3 | L | 1144 | 43374 | 81126 | 2399 | 38668 | 48080 | 71 | 819985 |
| 4 | A | 1436 | 43645 | 76662 | 2023 | 39677 | 47614 | 105 | 979410 |
| 5 | I | 334 | 31534 | 47059 | 2575 | 26469 | 36600 | 115 | 407434 |
| 6 | B | 416 | 40353 | 89099 | 4368 | 31766 | 48940 | 150 | 980761 |
| 7 | D | 342 | 44204 | 85837 | 4642 | 35074 | 53334 | 251 | 1077681 |
| 8 | C | 427 | 44864 | 79014 | 3824 | 37348 | 52380 | 180 | 808462 |
| 9 | G | 426 | 45656 | 84457 | 4092 | 37613 | 53699 | 133 | 691451 |
| 10 | H | 503 | 41809 | 99564 | 4439 | 33087 | 50531 | 87 | 1817534 |
| 11 | E | 616 | 51640 | 284727 | 11472 | 29111 | 74169 | 150 | 6877901 |
| 12 | J | 1092 | 45539 | 83292 | 2521 | 40593 | 50484 | 155 | 864645 |
| 合計 | | 7863 | 43843 | 112470 | 1268 | 41357 | 46330 | 40 | 6877901 |

※レセプトデータはサンプル数が非常に多くなりがちであるため、統計的に有意な差が出やすい。その事実を考慮に入れた上で、本当に意味のある差なのかを考える必要がある。

上の分析例では、医療費に地域別の差があるかどうかを一元配置分散分析によって明らかにした。その結果、保険点数に地域ごとの統計的に有意な差はないことが明らかになった。ただし、統計的手法によっては、I地区の医療費の低さが統計的に有意な差であると示された。

【糖尿病】

| | 糖尿病 | | 合計 |
|-----|------|------|------|
| | 非該当 | 該当 | |
| 学校区 | | | 0 |
| K | 302 | 248 | 550 |
| F | 322 | 255 | 577 |
| L | 624 | 520 | 1144 |
| A | 821 | 615 | 1436 |
| I | 186 | 148 | 334 |
| B | 236 | 180 | 416 |
| D | 179 | 163 | 342 |
| C | 199 | 228 | 427 |
| G | 225 | 201 | 426 |
| H | 254 | 249 | 503 |
| E | 329 | 287 | 616 |
| J | 596 | 496 | 1092 |
| 合計 | 4273 | 3590 | 7863 |

カイ2乗検定

| | 値 | 自由度 | 漸近有意確率 (両側) |
|---------------|-----------|-----|----------------|
| Pearson のカイ2乗 | 22.750(a) | 11 | .019 |
| 尤度比 | 23.726 | 11 | .014 |
| 線型と線型による連関 | 8.071 | 1 | .004 |
| 有効なケースの数 | 7863 | | |

【脳梗塞】

| | 脳梗塞 | | 合計 |
|-----|------|-----|------|
| | 非該当 | 該当 | |
| 学校区 | | | |
| K | 495 | 55 | 550 |
| F | 543 | 34 | 577 |
| L | 1034 | 110 | 1144 |
| A | 1311 | 125 | 1436 |
| I | 298 | 36 | 334 |
| B | 377 | 39 | 416 |
| D | 296 | 46 | 342 |
| C | 384 | 43 | 427 |
| G | 380 | 46 | 426 |
| H | 442 | 61 | 503 |
| E | 554 | 62 | 616 |
| J | 972 | 120 | 1092 |
| 合計 | 7086 | 777 | 7863 |

カイ2乗検定

| | 値 | 自由度 | 漸近有意確率 (両側) |
|---------------|-----------|-----|----------------|
| Pearson のカイ2乗 | 22.750(a) | 11 | .019 |
| 尤度比 | 23.726 | 11 | .014 |
| 線型と線型による連関 | 8.071 | 1 | .004 |
| 有効なケースの数 | 7863 | | |

【虚血性心疾患】

| | 虚血性心疾患該当 | | 合計 |
|-----|----------|------|------|
| | 非該当 | 該当 | |
| 学校区 | | | 0 |
| K | 471 | 79 | 550 |
| F | 495 | 82 | 577 |
| L | 953 | 191 | 1144 |
| A | 1191 | 245 | 1436 |
| I | 281 | 53 | 334 |
| B | 350 | 66 | 416 |
| D | 286 | 56 | 342 |
| C | 341 | 86 | 427 |
| G | 358 | 68 | 426 |
| H | 417 | 86 | 503 |
| E | 496 | 120 | 616 |
| J | 884 | 208 | 1092 |
| 合計 | 6523 | 1340 | 7863 |

カイ乗検定

| | 値 | 自由度 | 漸近有意確率 (両側) |
|-------------------------|-----------|-----|----------------|
| Pearson のカイ乗 | 15.949(a) | 11 | .143 |
| 尤度比 | 15.945 | 11 | .143 |
| 線型と線型 による連関 有効なケースの数 | 9.137 | 1 | .003 |
| | 7863 | | |

※上の分析例を見ると、虚血性心疾患に関しては、統計的な有意差はなく、地域ごとの患者数に差はなかったが、糖尿病と脳梗塞に関しては地域ごとの有意差がみられた。糖尿病・脳梗塞ともに患者発生数が期待度数よりも低いA地区は、この市の中心となる駅を擁し、新興住宅を抱えており、住民の平均年齢が低いことが影響していると予測される。