

自己免疫性膵炎のアンケート調査 厚生労働省特定疾患診療事業 難治性膵疾患に関する調査研究班

ステロイド治療経過	初診時あるいは初回検査時	ステロイド治療開始時	ステロイド継続療法移行時あるいは中止時	臨床的可疑時あるいはステロイド剤増量時	最終受診日 or 検査日
日付	初診時年月日				
ステロイド投与量(PSL換算)					
自覚所見	炎症 上腹部痛 発熱	炎症 上腹部痛 発熱	炎症 上腹部痛 発熱	炎症 上腹部痛 発熱	炎症 上腹部痛 発熱
	腹部圧痛 その他	腹部圧痛 その他	腹部圧痛 その他	腹部圧痛 その他	腹部圧痛 その他
	WBC	/μL %	/μL %	/μL %	/μL %
	Es	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL
	CRP	g/dL	g/dL	g/dL	g/dL
	総ビリルビン	IU/L	IU/L	IU/L	IU/L
	AST	IU/L	IU/L	IU/L	IU/L
	ALT	IU/L	IU/L	IU/L	IU/L
	LDH	IU/L	IU/L	IU/L	IU/L
	ALP	IU/L	IU/L	IU/L	IU/L
	γ-GTP	IU/L	IU/L	IU/L	IU/L
	アマラーゼ	IU/L	IU/L	IU/L	IU/L
	リパーゼ	U/L	U/L	U/L	U/L
	γ-glob	g/dL	g/dL	g/dL	g/dL
IgG	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	
IgG4	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	
抗核抗体					
可溶性L2受容体	IUm/L	IUm/L	IUm/L	IUm/L	
補体C3	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	
補体C4	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	
補体CH50	CH50/mL	CH50/mL	CH50/mL	CH50/mL	
免疫複合体	μg/mL	μg/mL	μg/mL	μg/mL	
FUS	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	
HbA1c	%	%	%	%	
膵臓画像所見	膵腫大 膵管拡張 膵石 膵管狭窄	膵腫大 膵管拡張 膵石 膵管狭窄	膵腫大 膵管拡張 膵石 膵管狭窄	膵腫大 膵管拡張 膵石 膵管狭窄	膵腫大 膵管拡張 膵石 膵管狭窄
胆管所見	下部胆管狭窄 肝門部胆管狭窄	下部胆管狭窄 肝門部胆管狭窄	下部胆管狭窄 肝門部胆管狭窄	下部胆管狭窄 肝門部胆管狭窄	下部胆管狭窄 肝門部胆管狭窄
全身画像所見	Ca 膵集積 Ca 膵外集積	Ca 膵集積 Ca 膵外集積	Ca 膵集積 Ca 膵外集積	Ca 膵集積 Ca 膵外集積	Ca 膵集積 Ca 膵外集積
副作用などその他	集積臓器:	集積臓器:	集積臓器:	集積臓器:	集積臓器:

○ 本アンケートにおける新規・継続の定義

新規とは2007年の1年間に新たに新たに発症し、診断されたAIP症例をさし、継続とは2007年以前に診断され、継続診療または経過観察されている症例をさす。

○ 本アンケートにおける再燃の定義

再燃とは、1. 膵病変の再燃、または、2. 膵外病変の合併を来すこととする。

1. 膵病変の再燃:

寛解導入治療が有効であった被験者で、観察期間中、観察時に比して膵の再腫大および膵管の再狭窄を示す。ただし、膵管像はERCPIに加え、MRCPIによる診断を可とする。

2. 膵外病変の合併:

硬化性胆管炎を含む膵外病変の合併により、ステロイドの増量あるいは再投与が必要。

厚生労働科学研究費補助金
難治性疾患克服研究事業

難治性膵疾患に関する調査研究

平成20年度～22年度 総合研究報告書

平成23年 2月15日 印刷・発行

発行者 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業
難治性膵疾患に関する調査研究

研究代表者 下瀬川 徹

仙台市青葉区星陵町 1-1

東北大学大学院医学系研究科消化器病態学分野

TEL : 022-717-7171

製作・印刷 東北大学生生活協同組合

仙台市青葉区片平 2-1-1

TEL : 022-262-8022

