

を持つことのない検査システムを導入する。

→医療機関でも自由診療なら匿名検査が可能であるが、現時点では医療機関の足並みが揃っていない（匿名でしている医療機関は3割程度）ので、2007年度中に関連医会とその点の合意を取り付け、2008年度より広報の中に加えていく。

q. STD の検査が尿検査でできることを啓発する。

→検査の進歩で、尿検査の信頼度が上がっているが、まだ現時点では医療機関の足並みが揃っていないと思われるのと、2007年度中に関連医会とその点の合意を取り付け、2008年度より広報の

中に加えていく。

<長期戦略>

- r. 公的な検査機会の数を増やし、場所、日時のバラエティーを増やす。
- s. 即日検査のニーズにもっと応えられるようにする。

→調査結果を行政に還元し、現実的可能性について検討してもらう。

- t. 一般検診や健康診断時の HIV/STD 検査導入の可能性を検討する。

→実際すでに一部で行われているので、その現状の把握を行い、その是非を含めて検討する。

表1.形成調査の回収数

	性別	数	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60歳以上	無回答
形成調査1 自動車教習所受講者	男性	240	45.8	35.0	10.4	5.8	1.7	1.3	0.0
	女性	286	35.0	46.5	10.5	4.2	2.4	1.4	0.0
	無回答	17	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	94.1	0.0
形成調査2 パソコンモニター	男性	399	1.3	17.0	30.1	35.6	16.0	0.0	0.0
	女性	407	0.5	19.4	29.5	37.8	12.8	0.0	0.0
	無回答	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
形成調査3 世帯モニター	男性	247	0.0	0.0	0.0	46.6	53.4	0.0	0.0
	女性	288	0.0	0.0	0.0	52.8	47.2	0.0	0.0
	無回答	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
形成調査6 パソコンモニター	男性	56	0.0	8.9	39.3	39.3	12.5	0.0	0.0
	女性	53	0.0	20.8	49.1	22.6	7.5	0.0	0.0
	無回答	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
形成調査7 保健所受検者(大阪府)	男性	173	3.5	46.8	31.2	7.5	5.8	5.2	0.0
	女性	134	14.9	53.7	22.4	5.2	1.5	2.2	0.0
	その他	6	16.7	16.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
形成調査8 STDクリニック受診者	男性	134	1.5	25.4	30.6	29.1	11.2	1.5	0.7
	女性	174	4.6	34.5	39.1	16.1	2.9	1.7	1.1
	無回答	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

表2 形成調査1-3、8の知識及び重要性認識の割合に関する分析結果（男女合計）

	形成調査1 教習所 (n=543)			形成調査2:POセンター (n=806)			形成調査3:世帯 (n=35)			形成調査8:STIクリニック (n=312)		
	知つてゐる	重要	差	知つてゐる	重要	差	知つてゐる	重要	差	知つてゐる	重要	差
HIV-1. 最近、中国でも、エイズウイルス感染者が増えていること	31.7	18.4	-13.3	36.9	12.2	-24.6	45.2	11.0	-34.2	45.4	26.7	-18.7
HIV-2. 最近、台湾でも、大きなエイズ流行が起きたこと	17.9	18.2	0.3	21.5	11.2	-10.3	22.2	10.5	-11.8	29.3	26.4	-2.9
HIV-3. 最近、日本でも、エイズウイルス感染者が増えていること	81.0	63.7	-17.3	84.5	53.0	-31.5	85.8	34.4	-51.4	89.8	78.5	-11.4
HIV-4. 最近、大阪でも、エイズウイルス感染者が増えていること	31.5	68.5	37.0	27.9	58.2	30.2	29.9	38.3	8.4	38.7	80.5	41.8
HIV-5. 治療の進歩で、早期発見・早期治療をすれば、エイズウイルスに感染しても、普通に新しい生活ができるようになつたこと	54.3	51.2	-3.1	61.6	43.0	-18.6	65.0	26.9	-38.1	56.7	58.3	1.6
HIV-6. エイズウイルスに感染しても、5-10年は症状がなく、自分では感染しているかどうかわからぬこと	73.8	54.3	-19.5	82.3	42.8	-39.5	77.6	27.9	-49.7	81.0	64.9	-16.2
HIV-7. 男女間の性交渉では男性より女性の方が感染しやすいこと	31.5	55.6	24.1	25.8	40.6	14.8	32.7	26.0	-6.7	28.1	68.9	40.8
HIV-8. 保健所（保健センター）では、名前を言わずに無科でエイズ検査ができること	68.1	56.9	-11.2	82.3	45.2	-37.0	74.4	26.5	-47.9	80.4	64.3	-16.1
HIV-9. 大阪には、夜間や休日にエイズ検査を受けられる公的な検査所があること	18.0	54.0	36.0	24.5	45.6	21.1	18.5	25.6	7.1	34.1	59.6	25.5
HIV-10. 自分の住んでいる地域に関わらず、日本中どここの保健所でもエイズ検査を受けることができる	36.8	53.4	16.6	43.8	43.1	-0.7	40.6	25.0	-15.5	53.6	64.0	10.4
HIV-11. 病院や医院では、金額自費ですが、実名でなくともエイズ検査ができる	36.8	49.9	13.1	34.9	38.2	3.3	33.8	21.1	-12.7	48.4	59.3	10.9
HIV-12. 検査で感染がわかつても、名前や住所が国に報告されることはないこと	34.3	55.8	21.5	35.5	41.2	5.7	34.4	24.1	-10.3	47.7	59.6	11.9
STI-1. 今、日本で非常に増えていること	48.1	58.4	10.3	43.9	41.8	-2.1	38.7	27.7	-11.0			
STI-2. 今、大阪でも非常に増えていること	23.4	63.7	40.3	17.4	47.3	30.0	17.2	29.3	12.1			
STI-3. 女性に多い性病（男性の1.5倍）ということ	40.9	60.0	19.1	49.9	40.2	-9.8	49.2	25.8	-23.4			
STI-4. 若い人に多く、10人に以上が感染していること	25.4	55.6	30.2	33.0	34.6	1.5	25.4	29.0	3.6			
STI-5. オーラルセックス（口を使った性行為）でもうつるといふこと	32.4	49.0	16.6	29.8	37.6	7.8	19.8	19.6	-0.2			
STI-6. 感染していても男性の半分、女性の8割でいたみもかゆみも出ないこと	26.3	56.5	30.2	26.5	45.2	18.7	22.1	29.5	7.5			
STI-7. でも、放つておくと、女性では卵管が傷ついて不妊になりやすくなるということ	33.0	56.0	23.0	38.4	37.8	-0.6	34.6	18.5	-16.1			
STI-8. でも、放つておくと、男性では副うえ炎になることがあること	10.5	43.5	33.0	13.1	33.2	20.1	9.7	21.3	11.6			
STI-9. 放つておくと、エイズウイルスに何倍もかかりやすくなること	17.7	62.8	45.1	15.0	44.4	29.4	10.1	29.2	19.1			
STI-10. 出産のとき赤ちゃんの肺や目にうつるという困ったことが起こること	19.5	64.1	44.6	24.7	39.7	15.0	24.5	20.7	-3.7			
STI-11. 医療機関で頼めば尿で検査できること	21.4	58.6	37.2	21.8	43.2	21.5	19.1	27.9	8.8			
あなたはワクチンの経験がありますか（はい）	68.1			93.8			94.6			99.3		
これまでの性交渉の相手は2人以上になりますか（はい）（性経験者：世=506、教=370、PO=751、STI=291）	73.0			75.8			60.3			97.2		
これまでにコンドームを使わない性交渉の経験はありますか（はい）（性経験者：世=306、教=370、PO=751、STI=291）	71.1			90.6			95.7			93.1		

表3：形成調査1-3、8の知識及び重要性認識の割合に関する分析結果（男性）

	形成調査1:教習所 (n=240)			形成調査2:POモード (n=399)			形成調査3:世帯 (n=247)			形成調査8:STIクリニック (n=134)		
	知つてる 重要 差	知つてる 重要 差	知つてる 重要 差	知つてる 重要 差	知つてる 重要 差	知つてる 重要 差	知つてる 重要 差	知つてる 重要 差	知つてる 重要 差	知つてる 重要 差	知つてる 重要 差	知つてる 重要 差
HIV-1. 最近、中国でも、エイズウイルス感染者が増えていること	34.6	19.3	-15.3	44.3	14.3	-30.0	52.2	15.0	-37.2	54.9	21.7	-33.2
HIV-2. 最近、台湾でも、大きなエイズ流行が起きたこと	19.6	18.1	-1.5	26.5	13.0	-13.5	23.9	14.6	-9.3	25.6	21.7	-3.9
HIV-3. 最近、日本でも、エイズウイルス感染者が増えていること	80.0	61.3	-18.7	85.4	54.9	-30.5	87.0	38.5	-48.5	90.2	75.0	-15.2
HIV-4. 最近、大阪でも、エイズウイルス感染者が増えていること	34.6	66.0	31.4	31.2	61.2	30.0	33.2	44.9	11.7	37.1	75.0	37.9
HIV-5. 治療の進歩で、早期発見・早期治療をすれば、エイズウイルスに感染しても、普通に近い生活ができるようになつたこと	50.8	45.4	-5.4	59.7	42.6	-17.1	64.0	28.3	-35.7	60.9	50.0	-10.9
HIV-6. エイズウイルスに感染しても、5-10年は症状がなく、自分で感染しているかどうかわからぬこと	73.8	49.6	-24.2	82.1	41.1	-41.0	82.6	27.9	-54.7	83.5	61.2	-22.3
HIV-7. 男女間の性交渉では男性より女性の方が感染しやすいこと	27.5	38.7	11.2	24.7	27.1	2.4	34.4	19.4	-15.0	27.8	50.4	22.6
HIV-8. 保健所（保健センター）では、名前を言わずに無料でエイズ検査ができること	66.3	49.6	-16.7	81.7	45.4	-36.3	68.0	29.1	-38.9	75.2	57.4	-17.8
HIV-9. 大阪には、夜間や休日にエイズ検査を受けられる公的な検査所があること	20.4	50.0	29.6	26.2	45.4	19.2	18.6	28.3	9.7	40.2	56.3	16.1
HIV-10. 自分の住んでいる地域に関わらず、日本中どこの保健所でもエイズ検査を受けることができる	35.0	48.3	13.3	42.7	41.9	-0.8	40.9	26.7	-14.2	46.6	58.9	12.3
HIV-11. 病院や医院では、全額自費ですが、実名でなくてもエイズ検査ができる	40.8	42.9	2.1	37.9	34.8	-3.1	31.2	22.3	-8.9	45.9	51.9	6.0
HIV-12. 検査で感染がわかつても、名前や住所が国に報告されることはないこと	31.7	51.3	19.6	35.9	39.8	3.9	33.2	24.7	-8.5	42.9	50.4	7.5
STI-1. 今、日本で非常に増えていること	47.5	58.8	11.3	38.6	40.6	2.0	36.0	25.9	-10.1			
STI-2. 今、大阪でも非常に増えていること	26.3	63.0	36.7	17.7	47.1	29.4	15.4	27.5	12.1			
STI-3. 女性に多い性病（男性の1.5倍）ということ	34.2	57.6	23.4	41.2	27.8	-13.4	48.2	21.5	-26.7			
STI-4. 若い人に多く、10人に以上が感染していると言わわれていること	21.3	39.5	18.2	28.5	30.8	2.3	25.5	25.1	-0.4			
STI-5. オーラルセックス（口を使った性行為）でもうつるということ	35.0	50.0	15.0	33.8	40.4	6.6	29.1	19.4	-9.7			
STI-6. 感染していても男性の半分、女性の8割いたみもかゆみも出ないことが多い	25.8	50.4	24.6	24.2	39.6	15.4	24.3	28.3	4.0			
STI-7. でも、放っておくと、女性では卵管が傷ついて不妊になりやすくなるということ	24.2	38.2	14.0	29.0	31.8	2.8	30.4	16.2	-14.2			
STI-8. でも、放っておくと、男性では副にう丸炎になることがあること	12.5	63.4	50.9	15.9	43.9	28.0	15.4	30.0	14.6			
STI-9. 放っておくと、エイズウイルスに何倍もかかりやすくなること	20.0	61.3	41.3	16.4	43.6	27.2	9.7	30.0	20.3			
STI-10. 出産のとき赤ちゃんの肺や目にうつるという困ったことが起こること	16.7	55.9	39.2	20.2	35.1	14.9	19.0	21.9	2.9			
STI-11. 医療機関で頻めに尿で検査できること	23.3	57.6	34.3	21.5	38.8	17.3	24.3	25.9	1.6			

あなたはセックの経験がありますか（はい）

これまでの性交渉の相手は2人以上になりますか（はい）（性経験者：世=238、教=173、PG=371、STI=127）

72.1

76.3

71.1

71.1

93.5

83.0

89.5

95.0

96.4

79.0

89.5

100.0

98.4

92.1

表4. 形成調査1-3、8の知識及び重要性認識の割合に関する分析結果（女性）

	形成調査1-教習所 (n=286)			形成調査2-PGE-2- (n=407)			形成調査3-世帯 (n=288)			形成調査3-STI (n=174)		
	知っている	重要	差	知っている	重要	差	知っている	重要	差	知っている	重要	差
HIV-1. 最近、中国でも、エイズウイルス感染者が増えていること	29.7	18.7	-11.0	29.6	10.1	-19.5	39.2	7.6	-31.6	38.0	30.9	-7.1
HIV-2. 最近、台湾でも、大きなエイズ流行が起きたこと	17.1	19.4	2.3	16.7	9.3	-7.4	20.8	6.9	-13.9	32.2	30.3	-1.9
HIV-3. 最近、日本でも、エイズウイルス感染者が増えていること	85.3	68.6	-16.7	83.5	50.6	-32.9	84.7	30.9	-53.8	89.5	82.0	-7.5
HIV-4. 最近、大阪でも、エイズウイルス感染者が増えていること	29.7	73.5	43.8	24.7	54.5	29.8	27.1	32.6	5.5	40.0	85.5	45.5
HIV-5. 治療の進歩で、早期発見・早期治療をすれば、エイズウイルスに感染しても、普通に近い生活ができるようになつたこと	58.7	58.3	-0.4	63.5	43.0	-20.5	66.0	25.7	-40.3	53.5	64.5	11.0
HIV-6. エイズウイルスに感染しても、5-10年は症状がなく、自分では感染しているかどうかわからぬこと	77.3	60.8	-16.5	82.5	44.0	-38.5	73.3	27.8	-45.5	79.2	67.7	-11.5
HIV-7. 男女間の性交渉では男性より女性の方が感染しやすいこと	36.4	72.1	35.7	26.8	53.3	26.5	31.3	31.6	0.4	28.3	83.2	54.9
HIV-8. 保健所（保健センター）では、名前を言わずに無料でエイズ検査ができること	73.1	66.1	-7.0	82.8	44.7	-38.1	79.9	24.3	-55.6	84.4	69.6	-14.8
HIV-9. 大阪には、夜間や休日にエイズ検査を受けられる公的な検査所があること	16.4	60.1	43.7	22.9	45.2	22.3	18.4	23.3	4.9	29.5	61.9	32.4
HIV-10. 自分の住んでいる地域に問わらず、日本中どの保健所でもエイズ検査を受けることができるること	39.9	60.1	20.2	45.0	44.0	-1.0	40.3	23.6	-16.7	59.0	67.9	8.9
HIV-11. 病院や医院では、全額自費ですが、実名でなくともエイズ検査ができること	35.0	58.7	23.7	32.0	40.8	8.8	36.1	20.1	-16.0	50.3	64.9	14.6
HIV-12. 検査で感染がわかつても、名前や住所が国に報告されることはないこと	37.4	62.5	25.1	35.1	41.8	6.7	35.4	23.6	-11.8	51.4	66.7	15.3
STI-1. 今、日本で非常に増えていること	50.0	61.5	11.5	49.0	42.3	-6.7	41.0	29.2	-11.8			
STI-2. 今、大阪でも非常に増えていること	21.3	67.5	46.2	17.0	46.9	29.9	18.8	30.9	12.2			
STI-3. 女性に多い性病（男性の1.5倍）ということ	47.6	65.4	17.8	58.5	51.6	-6.9	50.0	35.4	-14.6			
STI-4. 若い人に多く、10人に1人以上が感染していると言われていること	29.4	72.1	42.7	37.5	37.1	-0.4	25.3	26.4	1.1			
STI-5. オーラルセッククス（口を使った性行為）でもうつるということ	30.8	50.9	20.1	25.9	33.9	8.0	11.8	19.8	8.0			
STI-6. 感染していく中でも男性の半分、女性の8割でいたみもかゆみも出ないこと	28.0	64.3	36.3	28.8	49.9	21.1	20.1	30.6	10.5			
STI-7. でも、放つておくと、女性では卵管が傷ついて不妊になりやすくなるということ	41.3	73.1	31.8	47.5	43.0	-4.5	38.2	20.5	-17.7			
STI-8. でも、放つておくと、男性では副こう丸炎になることがあること	9.1	28.3	19.2	10.4	22.1	11.7	4.9	13.9	9.0			
STI-9. 放つておくと、エイズウイルスに何倍もかかりやすくなること	15.4	67.1	51.7	13.6	44.2	30.6	10.4	28.5	18.1			
STI-10. 出産のとき赤ちゃんの肺や目にうつるという困ったことが起こること	22.0	73.9	51.9	29.1	43.2	14.1	29.2	19.8	-9.4			
STI-11. 医療機関で頼めば尿で検査できること	20.3	62.2	41.9	22.1	46.7	24.6	14.6	29.5	14.9			
あなたはセックスの経験がありますか（はい）	67.5			94.1			93.1			98.8		
これまでの性交渉の相手は2人以上になりますか（はい）（性経験者：世=268数=193、PC=380、STI=164）	71.0			68.6			43.7			96.3		
これまでにコンドームを使わない性交渉の経験はありませんか（はい）（性経験者：世=268数=193、PC=380、STI=164）	71.5			91.8			96.3			93.9		

表5. 知識・重要度クロス集計（世帯モニター[中高年]男性）

重要性の認識割合 (%)	知識の普及割合 (%)	
	<50%	≥50%
<50%	HIV（台湾流行、大阪流行、女性易感染、夜間検査、検査どこでも、医院匿名検査、国報告） STD（日本流行、大阪流行、女性多、若者多、口感染、無症状、女性不妊、副睾丸炎、HIV 易感染、児感染、尿検査）	HIV（中国流行、日本流行、早期治療、無症状、保健所匿名検査）
≥50%		

表6. 知識・重要度クロス集計（世帯モニター[中高年]女性）

重要性の認識割合 (%)	知識の普及割合 (%)	
	<50%	≥50%
<50%	HIV（中国流行、台湾流行、大阪流行、女性易感染、夜間検査、検査どこでも、医院匿名検査、国報告） STD（日本流行、大阪流行、若者多、口感染、無症状、女性不妊、副睾丸炎、HIV 易感染、児感染、尿検査）	HIV（日本流行、早期治療、無症状、保健所匿名検査） STD（女性多）
≥50%		

表7. 知識・重要度クロス集計（パソコンモニター[中年]男性）

重要性の認識 割合 (%)	知識の普及割合 (%)	
	<50%	≥50%
<50%	HIV（中国流行、台湾流行、女性易感染、夜間検査、検査どこでも、医院匿名検査、国報告）、STD（日本流行、大阪流行、女性多、若者多、口感染、無症状、女性不妊、副睾丸炎、HIV 易感染、児感染、尿検査）	HIV（早期治療、無症状、保健所匿名検査）
≥50%	HIV（大阪流行）	HIV（日本流行）

表8. 知識・重要度クロス集計（パソコンモニター[中年]女性）

重要性の認識 割合 (%)	知識の普及割合 (%)	
	<50%	≥50%
<50%	HIV（中国流行、台湾流行、夜間検査、検査どこでも、医院匿名検査、国報告） STD（日本流行、大阪流行、若者多、口感染、無症状、女性不妊、副睾丸炎、HIV 易感染、児感染、尿検査）	HIV（日本流行、早期治療、無症状、保健所匿名検査）
≥50%	HIV（大阪流行、女性易感染）	STD（女性多）

表9. 知識・重要度クロス集計（自動車教習所受講生[若者]男性）

重要性の認識 割合(%)	知識の普及割合 (%)	
	<50%	≥50%
<50%	HIV（中国流行、台湾流行、女性易感染、検査どこでも、医院匿名検査）、STD（若者多、女性不妊）	HIV（早期治療、無症状、保健所匿名検査）
≥50%	HIV（大阪流行、夜間検査、国報告） STD（日本流行、大阪流行、女性多、口感染、無症状、副睾丸炎、HIV易感染、児感染、尿検査）	HIV（日本流行）

表10. 知識・重要度クロス集計（自動車教習所受講生[若者]女性）

重要性の認識 割合(%)	知識の普及割合 (%)	
	<50%	≥50%
<50%	HIV（中国流行、台湾流行）、STD（副睾丸炎）	
≥50%	HIV（大阪流行、女性易感染、夜間検査、検査どこでも、医院匿名検査、国報告） STD（大阪流行、女性多、若者多、口感染、無症状、女性不妊、HIV易感染、児感染、尿検査）	HIV（日本流行、早期治療、無症状、保健所匿名検査） STD（日本流行）

表11. 知識・重要度クロス集計（STD医療機関受診者男性）－HIVの質問のみ

重要性の認識 割合(%)	知識の普及割合 (%)	
	<50%	≥50%
<50%	HIV（台湾流行）	HIV（中国流行）
≥50%	HIV（大阪流行、女性易感染、夜間検査、検査どこでも、医院匿名検査、国報告）	HIV（日本流行、早期治療、無症状、保健所匿名検査）

表12. 知識・重要度クロス集計（STD医療機関受診者女性）－HIVの質問のみ

重要性の認識 割合(%)	知識の普及割合 (%)	
	<50%	≥50%
<50%	HIV（中国流行、台湾流行）	
≥50%	HIV（大阪流行、女性易感染、夜間検査）	HIV（日本流行、早期治療、無症状、保健所匿名検査、検査どこでも、医院匿名検査、国報告）

表 13. 知識・重要度分析から抽出した重点項目群

集団の種類		最重点項目	重点項目	準重点項目
世帯モニター (中高年)	男	なし	なし	なし
	女	なし	なし	なし
パソコンモニター (中年)	男	なし	HIV (大阪流行)	STD (大阪流行、副睾丸炎)
	女	なし	HIV (大阪流行、女性易感染)	HIV (夜間検査) STD (大阪流行、無症状、HIV 易感染、尿検査)
自動車教習所受講生 (若者)	男	STD (副睾丸炎、HIV 易感染)	HIV (大阪流行、夜間検査、国報告)、STD (大阪流行、女性多、無症状、児感染、尿検査、日本流行、口感染)	なし
	女	HIV (大阪流行、夜間検査) STD (大阪流行、若者多、HIV 易感染、児感染、尿検査)	HIV (女性易感染、検査どこでも、医院匿名検査、国報告) STD (女性多、口感染、無症状、女性不妊)	なし
STD 医療機関受診者	男	なし	HIV (大阪流行、女性易感染、夜間検査、検査どこでも)	なし
	女	HIV (大阪大流行、女性易感染)	HIV (夜間検査)	なし

表 14 (J1-5, K1-3). 形成調査 1 (自動車教習所受講生) の分析結果

J1. 保健所HIV検査に抵抗感じると思うか (N=543)				J3. 医療機関HIV検査に抵抗感じると思うか (N=543)				
男性 (n=240)		女性 (n=286)		男性 (n=240)		女性 (n=286)		
N	%	N	%	N	%	N	%	
非常に感じると思う	35	14.6	70	24.5	1	5.9	46	19.2
かなり感じると思う	29	12.1	55	19.2	1	5.9	39	16.3
感じると思う	80	33.3	76	26.6	2	11.8	76	31.7
あまり感じないと思う	41	17.1	51	17.8	1	5.9	34	14.2
全く感じないとと思う	49	20.4	26	9.1	0	0.0	38	15.8
無回答	6	2.5	8	2.8	12	70.6	7	2.9
合計	240	100.0	286	100.0	17	100.0	240	100.0

J2. 何に抵抗を感じるか
<保健所のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる、
あまり感じないを選択した場合のみ> (N=442)

男性 (n=185)				女性 (n=252)				男性 (n=195)				女性 (n=258)				不明 (n=4)				
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
保健所自体に行きにくい	77	41.6	113	44.8	2	40.0	72	36.9	92	35.7	1	25.0	65	33.3	101	39.1	1	25.0		
無回答	2	1.1	0	0.0	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	129	50.0	1	25.0		
知り合いに会うかも	63	34.1	109	43.3	2	40.0	67	34.4	10	5.1	16	6.2	0	0.0	69	35.4	96	37.2	1	25.0
無回答	2	1.1	0	0.0	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	0	0.0
エイズ検査と受付で言う必要	73	39.5	133	52.8	3	60.0	69	35.4	96	37.2	1	25.0	65	33.3	101	39.1	1	25.0	65	33.3
無回答	2	1.1	0	0.0	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
プライバシーの不安	56	30.3	93	36.9	1	20.0	65	33.3	132	51.2	3	75.0	65	33.3	101	39.1	1	25.0	65	33.3
無回答	2	1.1	0	0.0	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
軽蔑的な扱いをされる不安	37	20.0	76	30.2	1	20.0	65	33.3	96	37.2	1	25.0	65	33.3	101	39.1	1	25.0	65	33.3
無回答	2	1.1	0	0.0	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
プライベートを聞かれる不安	38	20.5	85	33.7	1	20.0	65	33.3	132	51.2	3	75.0	65	33.3	101	39.1	1	25.0	65	33.3
無回答	2	1.1	0	0.0	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
いろいろ注意される不安	20	10.8	28	11.1	0	0.0	37	19.0	68	26.4	1	25.0	37	19.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0
無回答	2	1.1	0	0.0	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
どういう検査かわからぬ不安	79	42.7	138	54.8	2	40.0	43	22.1	78	30.2	1	25.0	43	22.1	10	5.1	16	6.2	0	0.0
無回答	2	1.1	0	0.0	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
いろいろ注意されぬ不安	7	3.8	11	4.4	0	0.0	22	11.3	26	10.1	0	0.0	22	11.3	10	5.1	16	6.2	0	0.0
どういう検査かわからぬ不安	2	1.0811	0	0.0	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
その他	7	3.8	11	4.4	0	0.0	4	2.1	6	2.3	1	25.0	4	2.1	6	2.3	1	25.0	4	2.1
無回答	2	1.0811	0	0.0	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1

J4. 何に抵抗を感じるか
<医療機関のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる、
あまり感じないを選択した場合のみ> (N=457)

男性 (n=240)				女性 (n=286)				男性 (n=258)				女性 (n=286)				不明 (n=17)				
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
医療機関自体に行きにくい	72	36.9	92	35.7	1	25.0	72	36.9	92	35.7	1	25.0	65	33.3	101	39.1	1	25.0	65	33.3
無回答	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
検査費用がわからぬ	67	34.4	129	50.0	1	25.0	67	34.4	129	50.0	1	25.0	65	33.3	101	39.1	1	25.0	65	33.3
無回答	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
保険証から家族に知られる恐れ	69	35.4	96	37.2	1	25.0	69	35.4	96	37.2	1	25.0	65	33.3	101	39.1	1	25.0	65	33.3
無回答	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
知り合いに会うかも	65	33.3	101	39.1	1	25.0	65	33.3	101	39.1	1	25.0	65	33.3	101	39.1	1	25.0	65	33.3
無回答	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
エイズ検査と受付で言う必要	65	33.3	132	51.2	3	75.0	65	33.3	132	51.2	3	75.0	65	33.3	101	39.1	1	25.0	65	33.3
無回答	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
プライバシーの不安	56	28.7	85	32.9	0	0.0	56	28.7	85	32.9	0	0.0	56	28.7	85	32.9	0	0.0	56	28.7
無回答	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
軽蔑的な扱いをされる不安	37	19.0	68	26.4	1	25.0	37	19.0	68	26.4	1	25.0	37	19.0	68	26.4	1	25.0	37	19.0
無回答	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
プライベートを聞かれる不安	38	20.5	85	33.7	1	20.0	38	20.5	85	33.7	1	20.0	38	20.5	85	33.7	1	20.0	38	20.5
無回答	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1
いろいろ注意されぬ不安	20	10.8	28	11.1	0	0.0	20	10.8	28	11.1	0	0.0	20	10.8	28	11.1	0	0.0	20	10.8
無回答	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1
どういう検査かわからぬ不安	79	42.7	138	54.8	2	40.0	79	42.7	138	54.8	2	40.0	79	42.7	138	54.8	2	40.0	79	42.7
無回答	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1
いろいろ注意されぬ不安	22	11.3	26	10.1	0	0.0	22	11.3	26	10.1	0	0.0	22	11.3	26	10.1	0	0.0	22	11.3
無回答	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
どういう検査かわからぬ不安	63	32.3	106	41.1	2	50.0	63	32.3	106	41.1	2	50.0	63	32.3	106	41.1	2	50.0	63	32.3
無回答	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1	16	6.2	0	0.0	10	5.1
その他	7	3.8	11	4.4	0	0.0	7	3.8	11	4.4	0	0.0	7	3.8	11	4.4	0	0.0	7	3.8
無回答	2	1.0811	0	0.0	0	0.0	2	1.0811	0	0.0	0	0.0	2	1.0811	0	0.0	0	0.0	2	1.0811

J5. どうしたら保健所や医療機関でのエイズ検査が受けやすいか (N=543)

	男性			女性			不明		
	(n=240)	N	%	(n=286)	N	%	(n=17)	N	%
すぐ結果がわかる	129	53.8	160	55.9	2	11.8			
繁華街一角で気軽に受検可	11	4.6	12	4.2	12	70.6			
無回答	31	12.9	35	12.2	1	5.9			
検査料金が安い	11	4.6	12	4.2	12	70.6			
無回答	52	21.7	87	30.4	1	5.9			
健康診断の一部として選べる	100	41.7	153	53.5	3	17.6			
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6			
祝祭日・日曜に受検可	57	23.8	64	22.4	2	11.8			
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6			
駅近くで受検可	24	10.0	28	9.8	1	5.9			
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6			
夜間に受検可	69	28.8	65	22.7	2	11.8			
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6			
郵送で受検可	75	31.3	103	36.0	1	5.9			
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6			
窓口で言わば申込用紙で受検可	107	44.6	164	57.3	2	11.8			
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6			
事前電話予約で当日は番号で受検可	59	24.6	103	36.0	1	5.9			
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6			
事前ネット予約で当日番号で受検可	67	27.9	101	35.3	2	11.8			
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6			
その他	5	2.1	8	2.8	1	5.9			
無回答	11	4.6	12	4.2	12	70.6			

K1. 医療機関STD検査に対する抵抗感じると思うか(N=543)

	男性 (n=240)		女性 (n=286)		不明 (n=17)	
	N	%	N	%	N	%
非常に感じると思う	40	16.7	65	22.7	1	5.9
かなり感じると思う	31	12.9	66	23.1	0	0.0
感じると思う	79	32.9	73	25.5	3	17.6
あまり感じないと思う	29	12.1	40	14.0	0	0.0
全く感じないとと思う	51	21.3	32	11.2	1	5.9
無回答	10	4.2	10	3.5	12	70.6
合計	240	100.0	286	100.0	17	100.0

K2. 何に抵抗を感じるか
<医療機関のHIV検査に抵抗を感じるか>(N=427)

	男性 (n=179)		女性 (n=244)		不明 (n=4)	
	N	%	N	%	N	%
検査費用がわからない	82	45.8	137	56.1	0	0.0
保険証から家族に知られる恐れ	62	34.6	103	42.2	1	25.0
知り合いに会うかも	1	0.6	3	1.2	0	0.0
STI検査を受付で言う必要	69	38.5	110	45.1	1	25.0
プライバシーの不安	61	34.1	94	38.5	0	0.0
軽蔑的な扱いをされる不安	34	19.0	70	28.7	0	0.0
プライベートを聞かれる不安	47	26.3	84	34.4	1	25.0
検査がはずかしい不安	69	38.5	140	57.4	1	25.0
検査が痛い不安	36	20.1	108	44.3	1	25.0
いろいろ注意される不安	20	11.2	32	13.1	0	0.0
その他	3	1.7	9	3.7	1	25.0
無回答	1	0.6	3	1.2	0	0.0

K3. どうしたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか(N=543)

	男性 (n=240)		女性 (n=286)		女性 (n=286)		女性 (n=17)	
	N	%	N	%	N	%	N	%
保健所で無料匿名で受検可	153	63.8	182	63.6	2	11.8		
無回答	5	2.1	11	3.8	13	76.5		
尿検査ができる	120	50.0	141	49.3	2	11.8		
無回答	5	2.1	11	3.8	13	76.5		
繁華街一角で気軽に受検可	26	10.8	34	11.9	1	5.9		
無回答	5	2.1	11	3.8	13	76.5		
検査料金が安い	52	21.7	88	30.8	1	5.9		
無回答	5	2.1	11	3.8	13	76.5		
健康診断の一部として選べる	98	40.8	129	45.1	3	17.6		
無回答	5	2.1	11	3.8	13	76.5		
祝祭日・日曜に受検可	48	20.0	55	19.2	2	11.8		
無回答	5	2.1	11	3.8	13	76.5		
駅近くで受検可	27	11.3	35	12.2	1	5.9		
夜間に受検可	70	29.2	65	22.7	1	5.9		
郵送で受検可	75	31.3	101	35.3	1	5.9		
窓口で言わず申込用紙で受検可	5	2.1	11	3.8	13	76.5		
無回答	83	34.6	137	47.9	1	5.9		
事前電話予約で当日は番号で受検可	61	25.4	101	35.3	1	5.9		
無回答	5	2.1	11	3.8	13	76.5		
事前ネット予約で当日は番号で受検可	63	26.3	98	34.3	1	5.9		
無回答	5	2.1	11	3.8	13	76.5		
その他	5	2.1	5	1.7	0	0.0		
無回答	5	2.1	11	3.8	13	76.5		

表 15 (J1-5, K1-3) . 形成調査 2 (ペソコンモニター) の分析結果

J1. 保健所HIV検査に抵抗を感じると思うか (N=806)					
		男性 (n=399)		女性 (n=407)	
		N	%	N	%
非常に感じると思う		40	10.0	95	23.3
かなり感じると思う		108	27.1	104	25.6
感じると思う		149	37.3	142	34.9
あまり感じないとと思う		74	18.5	53	13.0
全く感じないとと思う		26	6.5	11	2.7
無回答		2	0.5	2	0.5
合計		399	100.0	407	100.0

J2. 何に抵抗を感じるか <保健所のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じる、 あまり感じないと選択した場合のみ> (N=765)					
		男性 (n=371)		女性 (n=394)	
		N	%	N	%
保健所自体に行きにくい		173	46.6	170	43.1
無回答		5	1.3	0	0.0
知り合いに会うかも		128	34.5	181	45.9
無回答		5	1.3	0	0.0
エイズ検査と受付で言う必要		213	57.4	289	73.4
無回答		5	1.3	0	0.0
プライバシーの不安		184	49.6	215	54.6
無回答		5	1.3	0	0.0
軽蔑的な扱いをされる不安		96	25.9	152	38.6
無回答		5	1.3	0	0.0
プライベートを聞かれる不安		124	33.4	193	49.0
無回答		5	1.3	0	0.0
いろいろ注意される不安		40	10.8	64	16.2
無回答		5	1.3	0	0.0
どういう検査かわからない不安		123	33.2	182	46.2
無回答		5	1.3	0	0.0
その他		2	0.5	12	3.0
無回答		5	1.3	0	0.0

J3. 医療機関HIV検査に抵抗を感じると思うか (N=806)

J3. 医療機関HIV検査に抵抗を感じると思うか (N=806)		男性 (n=399)		女性 (n=407)	
		N	%	N	%
非常に感じると思う		57	14.3	106	26.0
かなり感じると思う		122	30.6	116	28.5
感じると思う		140	35.1	141	34.6
あまり感じないとと思う		53	13.3	34	8.4
全く感じないとと思う		23	5.8	9	2.2
無回答		4	1.0	1	0.2
合計		399	100.0	407	100.0

J4. 何に抵抗を感じるか <医療機関のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じる、 あまり感じないと選択した場合のみ> (N=769)					
		男性 (n=372)		女性 (n=397)	
		N	%	N	%
医療機関自体に行きにくい		152	40.9	153	38.5
無回答		2	0.5	2	0.5
検査費用がわからぬ		180	48.4	248	62.5
無回答		2	0.5	2	0.5
保険証から家族に知られる恐れ		117	31.5	145	36.5
無回答		2	0.5	2	0.5
知り合いに会うかも		145	39.0	197	49.6
無回答		2	0.5	2	0.5
エイズ検査と受付で言う必要		221	59.4	296	74.6
無回答		2	0.5	2	0.5
プライバシーの不安		184	49.5	213	53.7
無回答		2	0.5	2	0.5
軽蔑的な扱いをされる不安		96	25.8	153	38.5
無回答		2	0.5	2	0.5
プライベートを聞かれる不安		110	29.6	190	47.9
無回答		2	0.5	2	0.5
いろいろ注意される不安		38	10.2	74	18.6
無回答		2	0.5	2	0.5
どういう検査かわからぬ不安		96	25.8	152	38.3
無回答		2	0.5	2	0.5
その他		3	0.8	8	2.0
無回答		2	0.5	2	0.5

J5. どうしたら保健所や医療機関でのエイズ検査が受けやすいか (N=806)

	男性 (n=399)	N	%	女性 (n=407)	N	%
すぐ結果がわかる		220	55.1		224	55.0
繁華街一角で気軽に受検可	無回答	2	0.5	無回答	1	0.2
検査料金が安い	無回答	63	15.8	無回答	59	14.5
健康診断の一部として選べる	無回答	2	0.5	無回答	1	0.2
祝祭日・日曜に受検可	無回答	203	50.9	無回答	271	66.6
駅近くで受検可	無回答	139	34.8	無回答	114	28.0
夜間に受検可	無回答	2	0.5	無回答	1	0.2
郵送で受検可	無回答	118	29.6	無回答	87	21.4
窓口で言わば申込用紙で受検可	無回答	2	0.5	無回答	1	0.2
事前電話予約で当日は番号で受検可	無回答	191	47.9	無回答	248	60.9
事前ネット予約で当日番号で受検可	無回答	2	0.5	無回答	1	0.2
その他	無回答	97	24.3	無回答	150	36.9
		2	0.5		1	0.2
		151	37.8		218	53.6
		2	0.5		1	0.2
		4	1.0		9	2.2
		2	0.5		1	0.2

K1. 医療機関STD検査に抵抗を感じると思うか (N=806)				
	男性 (n=399)	女性 (n=407)		
	N	%	N	%
非常に感じると思う	45	11.3	97	23.8
かなり感じると思う	133	33.3	124	30.5
感じると思う	147	36.8	145	35.6
あまり感じないと思う	49	12.3	33	8.1
全く感じないと思う	23	5.8	7	1.7
無回答	2	0.5	1	0.2
合計	399	100.0	407	100.0

K2. 何に抵抗を感じるか <医療機関のSTD検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じる、 あまり感じないを選択した場合のみ> (N=773)				
	男性 (n=374)	女性 (n=399)		
	N	%	N	%
検査費用がわからぬ、 無回答	188	50.3	201	50.4
保険証から家族に知られる恐れ、 無回答	123	32.9	131	32.8
知り合いに会うかも、 無回答	134	35.8	179	44.9
STI検査を受付で言う必要 無回答	219	58.6	289	72.4
プライバシーの不安 無回答	174	46.5	187	46.9
軽蔑的な扱いをされる不安 無回答	95	25.4	138	34.6
プライベートを聞かれる不安 無回答	119	31.8	175	43.9
検査がばはづかしい不安 無回答	137	36.6	228	57.1
検査が痛い不安 無回答	83	22.2	156	39.1
いろいろ注意される不安 無回答	37	9.9	51	12.8
その他 無回答	3	0.8	2	0.5
	1	0.3	2	0.5

K3. どういたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか 男性 (n=399)		女性 (n=407)		女性 (n=407)	
		N	%	N	%
保健所で無料匿名で受検可 無回答		217	54.4	206	50.6
尿検査ができる 無回答		185	46.4	244	60.0
繁華街一角で気軽に受検可 無回答		44	11.0	37	9.1
検査料金が安い 無回答		51	12.8	67	16.5
健康診断の一部として選べる 無回答		178	44.6	219	53.8
祝祭日・日曜に受検可 無回答		113	28.3	87	21.4
駅近くで受検可 無回答		39	9.8	34	8.4
夜間に受検可 無回答		108	27.1	78	19.2
郵送で受検可 無回答		142	35.6	225	55.3
窓口で言わず申込用紙で受検可 無回答		4	1.0	4	1.0
事前電話予約で当日は番号で受検可 無回答		95	23.8	141	34.6
事前ネット予約で当日は番号で受検可 無回答		144	36.1	203	49.9
その他 無回答		4	1.0	4	1.0
	5	1.3	4	1.0	
	4	1.0	4	1.0	

表 16 (J1-5, K1-3) .形成調査 3 (世帯モニター) の分析結果

J1. 保健所HIV検査に抵抗感じると思うか (N=535)

	男性 (n=247)	N %	女性 (n=288)	N %
非常に感じると思う	39.0	15.8	85	29.5
かなり感じると思う	68.0	27.5	78	27.1
感じると思う	74.0	30.0	89	30.9
あまり感じないと思う	36	14.6	21	7.3
全く感じないとと思う	26	10.5	14	4.9
無回答	4	1.6	1	0.3
合計	247	100	288	100.0

J2. 何に抵抗を感じるか
<保健所のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じ
る、

	男性 (n=217)	N %	女性 (n=273)	N %
保健所自体に行きにくい	65	30.0	81	29.7
無回答	0	0.0	1	0.4
知り合いに会うかも	92	42.4	144	52.7
無回答	0	0.0	1	0.4
エイズ検査と受付で言う必要	126	58.1	201	73.6
無回答	0	0.0	1	0.4
プライバシーの不安	113	52.1	155	56.8
無回答	0	0.0	1	0.4
軽蔑的な扱いをされる不安	56	25.8	80	29.3
無回答	0	0.0	1	0.4
プライベートを聞かれる不安	82	37.8	113	41.4
無回答	0	0.0	1	0.4
いろいろ注意される不安	16	7.4	21	7.7
無回答	0	0.0	1	0.4
どういう検査かわからない不安	52	24.0	98	35.9
無回答	0	0.0	1	0.4
その他	9	4.1	12	4.4
無回答	0	0.0	1	0.4

J3. 医療機関HIV検査に抵抗感じると思うか (N=535)

	男性 (n=247)	N %	女性 (n=288)	N %
非常に感じると思う	56	22.7	85	29.5
かなり感じると思う	70	28.3	83	28.8
感じると思う	67	27.1	86	29.9
あまり感じないと思う	29	11.7	20	6.9
全く感じないとと思う	23	9.3	10	3.5
無回答	2	0.8	4	1.4
合計	247	100.0	288	100.0

	男性 (n=222)	N %	女性 (n=274)	N %
医療機関自体に行きにくい	66	29.7	76	27.7
無回答	2	0.9	4	1.5
検査費用がわからぬ	96	43.2	133	48.5
保険証から家族に知られる恐れ	2	0.9	4	1.5
無回答	51	23.0	53	19.3
知り合いに会うかも	75	33.8	127	46.4
無回答	2	0.9	4	1.5
エイズ検査と受付で言う必要	142	64.0	204	74.5
無回答	2	0.9	4	1.5
プライバシーの不安	115	51.8	145	52.9
無回答	2	0.9	4	1.5
軽蔑的な扱いをされる不安	54	24.3	72	26.3
無回答	2	0.9	4	1.5
プライベートを聞かれる不安	71	32.0	97	35.4
無回答	2	0.9	4	1.5
いろいろ注意される不安	14	6.3	20	7.3
無回答	2	0.9	4	1.5
どういう検査かわからぬ不安	50	22.5	73	26.6
無回答	2	0.9	4	1.5
その他	5	2.3	9	3.3
無回答	2	0.9	4	1.5

J5. どうしたら保健所や医療機関でのエイズ検査が受けやすいか (N=535)

	男性 (n=247)		女性 (n=288)	
	N	%	N	%
すぐ結果がわかる	114	46.2	135	46.9
繁華街一角で気軽に受検可	3	1.2	2	0.7
検査料金が安い	32	13.0	32	11.1
検査料金が安い	54	21.9	64	22.2
健康診断の一部として選べる	3	1.2	2	0.7
健康診断の一部として選べる	156	63.2	212	73.6
祝祭日・日曜に受検可	3	1.2	2	0.7
祝祭日・日曜に受検可	62	25.1	50	17.4
駅近くで受検可	3	1.2	2	0.7
駅近くで受検可	16	6.5	7	2.4
夜間に受検可	3	1.2	2	0.7
夜間に受検可	50	20.2	37	12.8
郵送で受検可	3	1.2	2	0.7
窓口で言わず申込用紙で受検可	76	30.8	157	54.5
事前電話予約で当日は番号で受検可	131	53.0	176	61.1
事前ネット予約で当日番号で受検可	3	1.2	2	0.7
事前ネット予約で当日番号で受検可	76	30.8	126	43.8
その他	3	1.2	2	0.7
その他	8	3.2	12	4.2
その他	3	1.2	2	0.7

K1. 医療機関STI検査に抵抗感じると思うか (N=535)		女性	
	(n=247)	N	%
非常に感じると思う	39	15.8	68
かなり感じると思う	72	29.1	87
感じると思う	86	34.8	97
あまり感じないとと思う	20	8.1	18
全く感じないとと思う	28	11.3	14
無回答	2	0.8	4
合計	247	100.0	288
		100.0	

K2. 何に抵抗を感じるか <医療機関のSTI検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じる、 あまり感じないを選択した場合のみ> (N=487)		女性	
	(n=217)	N	%
検査費用がわからぬ、無回答	87	40.1	108
保険証から家族に知られる恐れ、無回答	0	0.0	3
知り合いに会うかも、無回答	70	32.3	43
STI検査を受付で言う必要、無回答	0	0.0	3
プライバシーの不安、無回答	136	62.7	205
軽蔑的な扱いをされる不安、無回答	49	22.6	60
プライベートを聞かれる不安、無回答	77	35.5	98
検査がばかしい不安、無回答	0	0.0	3
いろいろ注意される不安、無回答	98	45.2	147
その他、無回答	38	17.5	70
		25.9	

K3. どうしたら性感染症の検査が(医療機関で)受けやすいか (N=535)		男性 (n=247)		女性 (n=288)	
		N	%	N	%
保健所で無料匿名で受検可	126	51.0	130	45.1	
尿検査ができる	2	0.8	3	1.0	
繁華街一角で気軽に受検可	137	55.5	189	65.6	
無回答	2	0.8	3	1.0	
検査料金が安い	26	10.5	23	8.0	
健康診断の一部として選べる	2	0.8	3	1.0	
祝祭日・日曜に受検可	40	16.2	59	20.5	
駅近くで受検可	2	0.8	3	1.0	
夜間に受検可	58	23.5	43	14.9	
郵送で受検可	153	61.9	176	61.1	
無回答	2	0.8	3	1.0	

表 17 (F1-5) 形成調査 8 (STD 受診者) の分析結果

F1. 保健所HIV検査に抵抗感じると思うか (N=312)				F3. 医療機関HIV検査に抵抗感じると思うか (N=312)			
男性 (n=134)		女性 (n=174)		男性 (n=134)		女性 (n=174)	
N	%	N	%	N	%	N	%
非常に感じると思う	12	9.0	24	13.8	0	0.0	0.0
かなり感じると思う	21	15.7	19	10.9	1	25.0	0.0
感じじると思う	46	34.3	41	23.6	2	50.0	0.0
あまり感じないとと思う	22	16.4	36	20.7	0	0.0	0.0
全く感じないとと思う	23	17.2	41	23.6	1	25.0	0.0
無回答	10	7.5	13	7.5	0	0.0	0.0
合計	134	100.0	174	100.0	4	100.0	3
				合計	134	100.0	174
						100.0	4
							100.0

F2. 何に抵抗を感じるか <保健所のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる、 あまり感じないと選択した場合のみ> (N=224)				F4. 何に抵抗を感じるか <医療機関のHIV検査に抵抗を非常に感じる・かなり感じる・感じる、 あまり感じないと選択した場合のみ> (N=210)			
男性 (n=101)		女性 (n=120)		男性 (n=98)		女性 (n=112)	
N	%	N	%	N	%	N	%
保健所自体に行きにくい	43	42.6	53	44.2	2	66.7	0
無回答	1	1.0	2	1.7	0	0.0	0.0
知り合いに会うかも	28	27.7	46	38.3	2	66.7	3
無回答	1	1.0	2	1.7	0	0.0	3.1
エイズ検査と受付で言う必要	46	45.5	62	51.7	1	33.3	31.6
無回答	1	1.0	2	1.7	0	0.0	55
プライバシーの不安	45	44.6	51	42.5	3	100.0	49.1
無回答	1	1.0	2	1.7	0	0.0	28
軽蔑的な扱いをされる不安	23	22.8	29	24.2	0	0.0	28.6
無回答	1	1.0	2	1.7	0	0.0	3
プライベートを聞かれる不安	19	18.8	37	30.8	0	0.0	3.1
無回答	1	1.0	2	1.7	0	0.0	5
いろいろ注意される不安	7	6.9	12	10.0	0	0.0	3.1
無回答	1	1.0	2	1.7	0	0.0	5
どういう検査かわからない不安	21	20.8	29	24.2	0	0.0	17.3
無回答	1	1.0	2	1.7	0	0.0	24
その他	6	5.9	7	5.8	0	0.0	5
無回答	1	1.0	2	1.7	0	0.0	4.5

F5. どうしたら保健所や医療機関でのエイズ検査が受けやすいか (N=312)

	男性 (n=134)		女性 (n=174)		不明 (n=4)	
	N	%	N	%	N	%
すぐ結果がわかる	77	57.5	108	62.1	1	25.0
繁華街一角で気軽に受検可	8	6.0	7	4.0	3	75.0
検査料金が安い、	27	20.1	33	19.0	0	0.0
検査料金が安い、	8	6.0	7	4.0	3	75.0
健康診断の一部として選べる	32	23.9	67	38.5	0	0.0
健康診断の一部として選べる	8	6.0	7	4.0	3	75.0
祝祭日・日曜に受検可	46	34.3	78	44.8	0	0.0
祝祭日・日曜に受検可	8	6.0	7	4.0	3	75.0
駅近くで受検可	56	41.8	55	31.6	0	0.0
駅近くで受検可	8	6.0	7	4.0	3	75.0
夜間に受検可	16	11.9	30	17.2	0	0.0
夜間に受検可	8	6.0	7	4.0	3	75.0
郵送で受検可	44	32.8	48	27.6	0	0.0
窓口で言わず申込用紙で受検可	90	67.2	126	72.4	3	75.0
事前電話予約で当日は番号で受検可	23	17.2	58	33.3	0	0.0
事前ネット予約で当日番号で受検可	8	6.0	7	4.0	3	75.0
その他	24	17.9	56	32.2	1	25.0
その他	8	6.0	7	4.0	3	75.0
その他	27	20.1	50	28.7	0	0.0
その他	8	6.0	7	4.0	3	75.0
その他	1	0.7	6	3.4	0	0.0
その他	8	6.0	7	4.0	3	75.0

表 18. 形成調査 1, 2, 3, 8 で受検に抵抗を感じる人の割合

対象集団	検査の種類	男	女	女／男
自動車教習所受講生(若者)	保健所でのエイズ検査	28.7	43.7	1.52
	医療機関でのエイズ検査	35.5	50.7	1.43
	医療機関STD検査	29.6	45.8	1.55
パソコンモニター(中年)	保健所でのエイズ検査	37.1	48.9	1.32
	医療機関でのエイズ検査	44.9	54.5	1.21
	医療機関STD検査	44.6	54.3	1.22
世帯モニター(中高年)	保健所でのエイズ検査	43.3	56.6	1.31
	医療機関でのエイズ検査	51.0	58.3	1.14
	医療機関STD検査	44.9	53.8	1.20
STD医療機関受診者	保健所でのエイズ検査	24.7	24.7	1.00
	医療機関でのエイズ検査	24.6	18.4	0.75

* 抵抗を感じる人＝「非常に感じる＋かなり感じる」

表 19. 受検・受診に抵抗を感じる理由の順位分析

検査の種類	対象集団	性別	行きにくさ	検査費用がわからない	保険証から家族に知られる恐れ	知り合いに会うかも	エイズ/STD検査と受付で言う必要	プライバシーの不安	軽蔑的な扱いをされる不安	プライベートを聞かれる不安	いろいろ注意される不安	どういう検査かわからない不安	検査がはずかし不安	検査が痛い不安
保健所でのエイズ検査	自動車教習所受講生(若者)	男	2			4	3	5	7	6	8	1		
		女	3			4	2	5	7	6	8	1		
	パソコンモニター(中年)	男	3			4	1	2	7	5	8	6		
		女	5			5	1	2	6	3	7	4		
	世帯モニター(中高年)	男	5			3	1	2	6	4	8	7		
		女	6			3	1	2	7	4	8	5		
	STD受診者	男	3			4	1	2	5	7	8	6		
		女	2			4	1	3	6	5	8	6		
	自動車教習所受講生(若者)	男	1	3	2	4	4	7	9	8	10	6		
		女	6	2	5	4	1	7	9	8	10	3		
	パソコンモニター(中年)	男	4	3	6	5	1	2	8	7	10	8		
		女	6	2	9	4	1	3	6	5	10	8		
医療機関でのエイズ検査	世帯モニター(中高年)	男	6	3	8	4	1	2	7	5	10	9		
		女	6	3	9	4	1	2	8	5	10	7		
	STD受診者	男	2	4	5	6	1	3	8	7	10	9		
		女	6	1	4	5	2	3	8	7	10	9		
	自動車教習所受講生(若者)	男		1	5	2	2	6	9	7	10		2	8
		女		2	6	4	3	7	9	8	10		1	5
医療機関 STD検査	パソコンモニター(中年)	男	2	6	5	1	3	8	7	10			4	9
		女	3	9	5	1	4	8	6	10			2	7
	世帯モニター(中高年)	男	4	7	6	1	2	8	5	10			3	9
		女	5	9	4	1	3	8	6	10			2	7

* 網掛けは割合が50%を超えるもの

* 框で囲った数字は、割合が70%を越えるもの