

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
ACACIA(アラビアゴム)	口腔：舌下、錠剤	9.10MG	経口投与	498mg
	口腔：ガム、咀嚼	7.07MG	筋肉内注射	25mg
	経口：カプセル、徐効	11.77MG	一般外用剤	8mg/g
	経口：粉末	80.00%	歯科外用及び口中用	46mg
	経口：粉末、経口用懸濁液	64.80%	舌下適用	9.6mg
	経口：錠剤	70.00MG	殺虫剤	
	経口：錠剤(即時型／複合型)	80.00MG	アラビアゴム末	
	経口：被覆錠剤	156.00MG	経口投与	1800mg
	経口：錠剤、徐放性、腸溶性 被	10.00MG	筋肉内注射	40mg
	経口：錠剤、フィルム 被覆	14.90MG	皮下注射	12.5mg
	経口 錠剤、復効 (経口：錠剤、反	11.54MG	一般外用剤	30mg/g
	経口 錠剤、徐効 (経口：錠剤、	34.40MG	舌下適用	460mg
	経口-20：錠剤	33.50MG	直腸腔尿道適用	4g
	経口-21：錠剤	5.00MG	歯科外用及び口中用	510mg
	経口-28：錠剤	5.00MG	注腸	800mg
ACETIC ACID(酢酸)	耳(耳性)：懸濁液	2.55%	経口投与	60mg
	筋肉－静脈－皮下：注射	0.35%	筋肉内注射	20mg
	筋肉－静脈：注射	0.25%		
	筋肉－皮下：注射	0.20%		
	筋肉：注射	0.25%		
	静脈：注射	0.69%	静脈内注射	20mg
	静脈：注射	12.75%		
	静脈：溶液、注射	0.05%		
	静脈－皮下：注射	0.20%		
	静脈－皮下：液体	0.20%		
	静脈(点滴)：注射	0.70%		
	静脈(点滴)：注射	0.44%		
	静脈(点滴)：注射溶液のためのパウ	0.27%		
	静脈(点滴)：溶液、注射	0.71%		
	眼：溶液	0.20%	眼科用剤	0.095 μ L/L
	眼：溶液、点眼	0.09%		
	経口：溶液	0.50%		
	経口：溶液、エリキシル剤	0.10%		
	経口：溶液、シロップ	1.32%		
	経口：錠剤	2.0e-03MG		
	皮下：液体	0.04%		
	皮下：注射溶液のためのパウダー、	0.04%	皮下注射	適量
	皮下：溶液、注射	0.26%		
	局所：懸濁液	0.04%	一般外用剤	212mg/g
	ACETIC ANHYDRIDE(経口：錠剤、	0.11MG		
ACETONE	経口：カプセル、腸溶性 被覆 丸薬	300.50MG		
	経口：錠剤、徐放	460.00MG		
	局所：ローション	10.00%	一般外用剤	392mg/g
	局所：シャンプー	13.00%		
	局所：溶液	12.69%		
ADIPIC ACID	筋肉：注射	1.00%	経口投与	42mg
	腔：挿入	57.00MG	直腸腔尿道適用 殺虫剤	140mg
ALANINE	静脈(点滴)：注射	77.00%	DLアラニン	
	静脈(点滴)：溶液、注射	21.00%	経口投与 一般外用剤 Lアラニン 静脈内注射 筋肉内注射	600mg 30mg/g 160mg 40mg
ALBUMINS	経口：錠剤、フィルム 被覆	4.50MG	経口投与 静脈内注射	2.6mg 10mg
ALCOHOL	歯科：溶液	12.80%	耳鼻科用剤	0.01mL/mL
	筋肉－静脈－皮下：注射	6.10%		
	筋肉－静脈：注射	11.00%	静脈内注射	800mg
	筋肉－静脈：溶液、注射	10.00%	筋肉内注射	0.15mg
	吸入：エアロゾル、定量	95.89%	皮下注射	2mg(エタノール)
	吸入：エアロゾル、噴霧	33.00%		
	吸入：溶液	25.00%		
	筋肉：注射	12.00%		
	筋肉：溶液、注射	10.00%		

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	静脈：注射	49.00%	眼科用剤	0.08mL/mL
	静脈：溶液，注射	40.00%		
	静脈-皮下：注射	0.94%		
	静脈(点滴)：注射	34.30%		
	静脈(点滴)：溶液，注射	30.00%		
	眼：溶液	0.50%		
	眼：溶液，点眼	1.40%		
	経口：カプセル	0.05MG		
	経口：カプセル，軟ゼラチン	15.36MG		
	経口：濃縮物	71.60%		
	経口：溶液	75.00%	経口投与 その他の内用 舌下適用	3.26mg 0.997mL 0.36mL/mL
	経口：溶液，エリキシル剤	94.70%		
	経口：溶液，液体，濃縮物，	15.06%		
	経口：懸濁液	21.00%		
	経口：シロップ	75.00%		
	経口：錠剤	196.00MG		
	経口：錠剤，徐放性，腸溶性，被	71.50MG		
	直腸：懸濁液	21.00%	直腸腔尿道適用	0.05mL/mL
	吸入：吸入のための溶液	0.08%		
	局所：乳液，エアロゾル，泡	58.21%		
	局所：ゲル	84.95%		
	局所：ローション	80.50%		
	局所：シャンプー	10.00%		
	局所：溶液	91.07%		
	局所：噴霧	49.25%		
	経皮：フィルム，制御放出	358.70MG	経皮	0.6mL/mL
	経皮：ゲル	74.10%		
ALCOHOL, DILUTED	筋肉-静脈：注射	10.00%	エタノール50	600mg/g 533mg/g
	経口：溶液，エリキシル剤	20.00%	一般外用剤	
	経口：シロップ	1.50%	55%エタノール	
	局所：エアロゾル	68.50%	一般外用剤	
	局所：溶液用パウダー	40.00%	(70%エタノール)	
ALGINIC ACID	眼：坐剤，挿入，制御放出	1.00MG	眼科用剤	1mg/g
	経口：カプセル	80.00MG	経口投与	984mg
	経口：錠剤	32.00MG		
	経口：錠剤(即時型／複合型)	400.00MG		
	経口：錠剤，被覆	60.00MG		
	経口：錠剤，フィルム，被覆	52.80MG		
	経口：錠剤，徐効	22.25MG		
ALLANTOIN	局所：乳液，クリーム	1.00%	一般外用剤	1mg/g
	局所：ゲル	0.20%		
	腔：乳液，クリーム	2.00%		
ALMOND OIL	局所：乳液，クリーム	2.00%	一般外用剤	525mg/g
ALPHA-TOCOPHEROL(トコフェロール)	静脈：注射，パウダー，リポソーム用	0.06%	経口投与	93mg
	経口：カプセル	0.50MG	一般外用剤	1mg/g
	経口：カプセル，軟ゼラチン	5.00MG	直腸腔尿道適用	4mg
	経口：錠剤	0.30MG	d- δ -トコフェロール：	
	局所：軟膏	2.00E-05	一般外用剤	0.5mg/g
	(静脈：溶液，濃縮物)	0.07%		
ALUMINUM HYDROXIDE	局所：乳液，クリーム	5.00%	一般外用剤	15mg/g
	経口：錠剤	15.00MG	皮下注射	1mg
			筋肉内注射	1mg
ALUMINUM HYDROXIDE GEL,	経口：錠剤	0.17MG	経口投与	480mg
			筋肉内注射	0.47mg
			皮下注射	0.47mg
			一般外用剤	3.75mg/g
ALUMINUM SILICATE(コロイド性含)	経口：錠剤	19.25MG	一般外用剤	36mg/g
	経口：錠剤，被覆	50.00MG		
	経口：錠剤，徐効	94.00MG		
	経口：錠剤，徐効，被覆	47.00MG		
ALUMINUM STEARATE	経口：カプセル，徐効	0.40MG	経口投与	0.4mg
	経口：錠剤	2.80MG	一般外用剤	30mg/g
	経口：錠剤，徐効	105.00MG		
	局所：乳液，クリーム	0.01%		
	局所：軟膏	0.01%		

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
ALUMINUM SULFATE	耳(耳性):溶液 局所:乳液, クリーム 局所:ローション	0.79% 0.13%	硫酸アルミニウム 一般外用剤 殺虫剤	2.3mg/g
AMMONIA SOLUTION	経口:懸濁液	0.01%	一般外用剤 静脈内注射	15mg/g 適量
AMMONIUM ACETATE	筋肉:注射 静脈:注射 静脈(点滴):注射	0.80% 0.80% 0.40%	筋肉内注射	2.3mg
AMMONIUM CHLORIDE	経口:シロップ 経口:錠剤 経口:錠剤, フィルム被覆	12.50% 4.20MG 8.00MG	一般外用剤	10mg/g
AMMONIUM GLYCYRRHIZATE	経口:顆粒 経口:溶液 経口:顆粒 経口:溶液	3.12MG 1.00% 3.12MG 1.00%	グリチルリチン酸二アンモニウ 経口投与 グリチルリチン酸モノアンモニウ 経口投与	1.25mg 20mg
ANHYDROUS CITRIC ACID	静脈:注射用パウダー 溶液, 凍結 経口:パウダー、懸濁液 経口:溶液 経口:懸濁 点滴剤	42.18% 0.62% 1.50% 0.25%	経口投与 静脈内注射 一般外用剤 眼科用剤 耳鼻科用剤 吸入剤 歯科外用及び口中用 筋肉内注射 その他の注射 殺虫剤	1.62g 0.2g 4.2mg/g 1.2mg/g 50 μ g/g 2.88mg/g 0.3mg/g 10mg 6mg
ANHYDROUS DIBASIC CALCIUM	経口:カプセル 経口:カプセル, 徐効 経口:錠剤 経口:錠剤(即時型／複合型) 経口:錠剤(即時型／複合型) 経口:錠剤, 被覆 経口:錠剤, 徐放性, 腸溶性 被 経口:錠剤, フィルム被覆 経口:錠剤, 徐効 経口-20:錠剤 経口-21:錠剤 経口-28:錠剤 局所:シャンプー	401.00MG 287.60MG 850.00MG 138.84MG 50.00MG 293.20MG 46.00MG 525.56MG 335.00MG 104.50MG 104.50MG 54.80%	経口投与 一般外用剤 歯科外用及び口中用 その他の外用	898mg 30mg/g 100mg/g 30mg/g
ANHYDROUS LACTOSE	口腔:錠剤 筋肉-静脈:注射 筋肉-静脈:注射用パウダー 溶液 腔内療法:注射用パウダー 溶液, 静脈:注射用パウダー 溶液, 凍結 静脈(点滴):注射用パウダー 溶液 経口:カプセル 経口:カプセル, 被覆, 軟ゼラチン 経口:カプセル, 腸溶性 被覆 丸 経口:カプセル, 硬ゼラチン 経口:カプセル, 徐効 経口:顆粒 経口:再構成用 顆粒 経口:吸入 用 パウダー 経口:錠剤 経口:錠剤(即時型／複合型) 経口:錠剤(即時型／複合型) 経口:錠剤, 被覆 経口:錠剤, 制御放出 経口:錠剤, 徐放性, 腸溶性 被 経口:錠剤, フィルム被覆 経口:錠剤, 徐効 経口:錠剤, 徐効, 被覆 経口:錠剤, 徐効, フィルム被覆 経口-21:錠剤 経口-21:錠剤, 被覆 経口-28:錠剤	23.75MG 2.50% 2.50% 4.75% 28.75% 2.50% 402.50MG 71.90MG 117.00MG 238.24MG 300.80MG 433.00MG 15.68MG 0.11% 735.20MG 98.70MG 108.00MG 144.19MG 29.99MG 90.00MG 453.60MG 180.90MG 130.70MG 157.95MG 75.68MG 58.00MG 79.33MG	経口投与	2.4g

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口-28: 錠剤, 被覆 舌下: 錠剤 腔: 錠剤 口腔: 錠剤 筋肉- 静脈: 注射 筋肉- 静脈: 注射用パウダー 溶液	58.00MG 128.00MG 605.00MG 23.75MG 2.50% 2.50%		
ANTI-FOAM (シリコン消泡剤)	経口: カプセル, 徐効 局所: ローション	0.16MG 0.03%	一般外用剤 経口投与 注腸	0.1mg/g 360mg 1560mg
ARGININE (L-アルギニン)	静脈: 注射 静脈: 注射 静脈: 注射用パウダー 溶液 静脈(点滴): 注射 静脈(点滴): 溶液, 注射	5.00% 62.40% 78.00% 88.00% 29.00%	経口投与 静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 一般外用剤	200mg 3240mg 3240mg 20mg 4.355mg/g
ASCORBIC ACID	筋肉- 静脈: 注射 吸入: エアロゾル, 定量 吸入: エアロゾル, 噴霧 吸入: 溶液 筋肉: 注射 静脈: 注射 静脈: 注射用パウダー 溶液 静脈: 注射用パウダー 溶液, 凍結 静脈: 溶液, 注射 静脈(点滴): 注射 静脈(点滴): 注射用パウダー 溶液, 神経ブロック: 注射 経口: カプセル 経口: カプセル, 徐放 経口: 濃縮物 経口: 懸濁液 経口: シロップ 経口: 錠剤 経口: 錠剤, フィルム 被覆 直腸: 坐薬 皮下: 注射 局所: ゲル 局所: 溶液	0.20% 95.95% 0.10% 1.02% 1.00% 62.50% 0.20% 0.08% 0.20% 50.40% 0.50% 0.20% 7.00MG 0.40MG 0.60% 2.50% 1.25% 28.44MG 20.00MG 3.00MG 1.00% 0.30% 0.04%	筋肉内注射 局所麻酔注射 耳鼻科用剤 歯科外用及び口中用 静脈内注射 経口投与 皮下注射 一般外用剤	1.68g 50mg 4mg/g 91.1mg 2.8g 500mg 10mg 1mg/g
ASCORBYL PALMITATE	経口: カプセル 経口: 錠剤 直腸: 坐薬 局所: 乳液, クリーム 局所: 溶液 経口: カプセル 経口: 錠剤 直腸: 坐薬 局所: 乳液, クリーム 局所: 溶液	12.00MG 0.51MG 5.60MG 0.02% 4.40E-05 12.00MG 0.51MG 5.60MG 0.02% 4.40E-05	経皮 一般外用剤	0.13mg/g 0.2mg/g
ASPARTAME	口腔: 貼布, 制御放出 経口: カプセル 経口: 顆粒 FOR 懸濁液 経口: 粉末 経口: 溶液用パウダー 経口: 懸濁液用パウダー 経口: 再構成用パウダー 経口: 溶液用パウダー 経口: 懸濁液用パウダー 経口: 懸濁液 経口: シロップ 経口: 錠剤 経口: 錠剤 (即時型／複合型), 経口: 錠剤 (即時型／複合型), 経口: 錠剤 (即時型／複合型), 経口: 錠剤, フィルム 被覆 経口: 錠剤, 口腔内崩壊 経口: 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	1.10MG 0.80MG 35.00MG 45.00% 233.00MG 4.80% 1.25% 4.70% 2.00% 1.00% 0.06% 20.00MG 5.10MG 65.00MG 30.00MG 20.00MG 36.00MG 9.00MG	経口投与 歯科外用及び口中用	120mg 0.21mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口：トローチ	6.10MG		
ASPARTIC ACID (L-アスパラギン酸)	静脈(点滴)：注射	0.68%	経口投与 静脈内注射 筋肉内注射 一般外用剤	300mg 16mg 8mg 30mg/g
BEESWAX	経口：カプセル 経口：カプセル、軟ゼラチン 経口：、液体入りカプセル、軟ゼラ 経口：カプセル、徐効 経口：錠剤 経口：錠剤、被覆 経口：錠剤、徐放性、腸溶性 被 局所：乳液、クリーム 局所：軟膏 経口：カプセル 経口：カプセル、軟ゼラチン 経口：、液体入りカプセル、軟ゼラ 経口：カプセル、徐効 経口：錠剤 経口：錠剤、被覆 経口：錠剤、徐放性、腸溶性 被 局所：乳液、クリーム 局所：軟膏	2.00MG 16.80MG 2.09MG 15.78MG 0.44MG 0.53MG 0.10MG 5.00% 20.00% 2.00MG 16.80MG 2.09MG 15.78MG 0.44MG 0.53MG 0.10MG 5.00% 20.00%	ミツロウ 経口投与 一般外用剤 直腸腔尿道適用 サラシミツロウ 経口投与 一般外用剤 舌下適用 経皮 直腸腔尿道適用 歯科外用及び口中用	160mg 446mg 180mg 270mg 550mg/g 100mg/g 28.8mg 100mg 47.4mg/g
BEHENETH-10(ポリオキシエチレンベ	局所：溶液	1.50%	一般外用剤	35mg/g
BENTONITE	経口：懸濁液 経口：錠剤 経口：錠剤、被覆 局所：ローション 局所：粉末 局所：シャンプー、懸濁液 経皮：フィルム、制御放出 経皮：貼布、制御放出 経：坐薬	6.50% 23.00MG 3.69MG 5.00% 66.64% 4.00% 9.86MG 2.47MG 288.10MG	経口投与 一般外用剤 経皮 殺虫剤	56.2mg 360mg/g 32mg/g
BENZALKONIUM CHLORIDE	耳(耳性)：溶液 耳(耳性)：溶液、点滴剤 耳(耳性)：懸濁液 吸入：溶液 関節内：注射 病巣内：注射 筋肉：注射 眼内：溶液 鼻：溶液 鼻：溶液、噴霧 鼻：噴霧 鼻：定量用スプレー 眼：ゲル 眼：軟膏 眼：溶液 眼：溶液、点滴剤 眼：懸濁液 眼：懸濁 点滴剤 局所：ローション 局所：シャンプー 局所：溶液 局所：溶液、点滴剤 局所：懸濁液 局所：懸濁 点滴剤	0.02% 0.02% 0.02% 20.00% 0.02% 0.02% 0.02% 5.20E-05 1.00% 0.02% 0.11% 0.11% 8.00E-05 0.02% 2.00% 0.51% 0.02% 0.02% 0.10% 0.20% 7.50E-05 0.01% 0.01% 0.01%	耳鼻科用剤 経皮 直腸腔尿道適用 吸入剤 皮下注射 その他の注射 筋肉内注射 眼科用剤 一般外用剤	0.8mg/g 0.1mg/g 0.3mg/g 0.1mg/g 1mg 0.4mg 1.8mg 0.1mg/mL 1mg/g
BENZETHONIUM CHLORIDE	耳(耳性)：溶液 耳(耳性)：溶液、点滴剤 筋肉-静脈：注射 静脈：注射用パウダー 溶液 静脈(点滴)：注射 鼻：定量用スプレー	0.10% 0.02% 0.01% 0.05% 0.01% 0.02%	眼科用剤 その他の注射 筋肉内注射 静脈内注射 歯科外用及び口中用	0.1mg/mL 5mg/mL 1mg 0.02mg 1mg/g
BENZOIC ACID	筋肉-静脈：注射 筋肉：溶液、注射	5.00% 0.20%	筋肉内注射	44mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	静脈: 溶液, 注射	3E-05	静脈内注射	44mg
	灌注: 溶液	2.40%		
	経口: 濃縮物	1.25%	経口投与	80mg
	経口: 溶液	0.50%		
	経口: 溶液, エリキシル剤	0.50%		
	経口: 噴霧	5.30E-05		
	経口: 懸濁液	0.10%		
	経口: シロップ	1.50%		
	直腸: ギル	0.14%	直腸腔尿道適用	1mg/g
	直腸: 懸濁液	0.10%		
	局所: 乳液, クリーム	0.25%	一般外用剤	4mg/g
	局所: ギル	0.10%		
	局所: ローション	0.20%		
	局所: 溶液	0.10%		
	腔: 乳液, クリーム	0.25%		
	腔: 海綿	3.00MG		
BENZYL ALCOHOL	耳 (耳性): 懸濁 液体	9.00%	耳鼻科用剤	9mg/mL
	歯科: パースト	25.00MG	歯科外用及び口中用	0.01mL/mL
	硬膜外: 注射	1.00%	眼科用剤	53mg/mL
	体外: 注射	1.00%	吸入剤	6.75mg
	筋肉 - 静脈-皮下: 注射	1.57%	筋肉内注射	0.5mL
	筋肉- 静脈: 注射	1.00%	その他の注射	200mg
	筋肉- 静脈: 注射	5.21%	局所麻酔注射	165.5mg
	筋肉- 静脈: 注射用パウダー 溶液	6.69%		
	筋肉- 静脈: 溶液, 注射	2.00%		
	筋肉- 皮下: 注射	2.00%		
	筋肉- 皮下: 注射, 徐効	1.20%		
	動脈内: 注射	0.90%		
	関節内: 注射	0.94%		
	関節内: 注射	1.50%		
	滑液嚢内: 注射	1.00%		
	腔内療法: 注射用パウダー 溶液,	0.84%		
	皮内: 注射	0.90%	皮内注射	9mg
	病巣内: 注射	0.94%		
	病巣内: 注射	1.00%		
	病巣内: 懸濁 注射	0.91%		
	筋肉: 注射	4.00%		
	筋肉: 注射	10.96%		
	筋肉: 注射, 徐効	1.00%		
	筋肉: 溶液, 注射	10.00%		
	筋肉: 懸濁 注射	0.91%		
	滑液嚢内: 注射	1.00%	脊椎腔内注射	16mg
	滑液嚢内: 懸濁 注射	0.91%		
	髄腔内: 注射	0.45%		
	腫瘍内: 注射	0.90%		
	静脈: 乳液, 注射	0.10%	静脈内注射	0.5mL
	静脈: 注射	2.02%		
	静脈: 注射	10.40%		
	静脈: 注射用パウダー 溶液	1.80%		
	静脈: 溶液	0.90%		
	静脈: 溶液, 注射	2.02%		
	静脈-皮下: 注射	1.50%		
	静脈(点滴): 注射	4.00%		
	静脈(点滴): 注射用パウダー 溶液	6.69%		
	静脈(点滴): 溶液, 注射	2.02%		
	不適用: 液体	0.90%		
	鼻: 溶液	0.50%		
	鼻: 定量用スプレー	0.03%		
	経口: カプセル	15.00MG		
	経口: カプセル, 徐効	1.23MG		
	経口: 溶液	5.00%		
	経口: 懸濁液	5.00%		
	経口: 錠剤	1.06MG		
	経口: 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被	2.31MG		
	経口: 錠剤, 徐効, 被覆	1.25MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	直腸：ゲル 軟組織：注射 軟組織：注射 軟組織：懸濁 注射 結膜下静脈：注射 皮下：注射 皮下：液体 皮下：溶液，注射 局所：クリーム，拡張 局所：クリーム，乳液，徐放 局所：乳液，クリーム 局所：ゲル 局所：ローション 局所：軟膏 局所：溶液 局所：懸濁液 腔：クリーム，拡張 腔：乳液，クリーム	1.55% 0.94% 1.00% 0.91% 0.94% 1.50% 0.90% 1.35% 1.00% 1.00% 2.70% 50.00% 1.30% 2.20% 2.00% 1.00% 1.00% 1.00%	皮下注射 一般外用剤 殺虫剤	0.5mL 40mg/g
BENZYL BENZOATE	筋肉：注射 筋肉：注射 筋肉：溶液，注射 経口：カプセル	20.00% 46.00% 15.00% 0.60ML	筋肉内注射 経口投与	371mg、 5.6mg、
BETA NAPHTHOLE(2 -ナフトール)	経口：カプセル	0.30MG	経口投与	0.36mg
BORIC ACID	耳（耳性）：溶液 静脈：溶液，注射 眼：乳液 眼：溶液用パウダー 眼：溶液 眼：溶液，点眼 眼：溶液，ゲル形成，徐放 眼：懸濁液 眼：懸濁 点眼 局所：乳液 局所：シャンプー 局所：溶液，点滴剤 局所：懸濁液	0.04% 0.31% 0.10% 0.06% 37.20% 1.90% 0.30% 1.00% 0.60% 1.30% 2.00% 0.12% 0.60%	耳鼻科用剤 眼科用剤 経皮	20mg/mL 20mg/mL 18mg/g
BUTYL ALCOHOL	局所：溶液 局所：溶液	0.07% 0.07%	殺虫剤	
BUTYLATED HYDROXYANISOLE	筋肉：注射 静脈（点滴）：注射 鼻：溶液 鼻：定量用スプレー 経口：カプセル 経口：カプセル，軟ゼラチン 経口：濃縮物 経口：溶液 経口：懸濁液 経口：錠剤 経口：錠剤，フィルム 被覆 経口：錠剤，口腔内崩壊 直腸：坐薬 舌下：錠剤 局所：乳液，クリーム 局所：ゲル 局所：軟膏 腔：乳液，クリーム 腔：軟膏 腔：坐薬 口腔：GUM，咀嚼 筋肉：注射 静脈：注射用パウダー 溶液，凍結 静脈（点滴）：注射 鼻：定量用スプレー 経口：カプセル 経口：カプセル，軟ゼラチン	0.03% 3.00E-06 2.00% 2.00E-06 0.08MG 1.00MG 7.50E-05 0.01% 0.25% 0.50MG 0.40MG 0.16MG 0.21MG 0.50MG 0.10% 0.05% 5.00E-05 0.12% 0.02% 1.00MG 0.21MG 0.03% 1.50E-05 1.00E-05 0.01% 0.20MG 0.25MG	動脈内注射 静脈内注射 経口投与	2 μ g 75 μ g 0.42mg

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本				
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量			
	経口：カプセル,硬ゼラチン	62.84MG					
	経口：カプセル,徐効	4.00MG					
	経口：錠剤	265.20MG					
	経口：錠剤(即時型／複合型)リ	132.00MG					
	経口：錠剤(即時型／複合型)リ	550.00MG					
	経口：錠剤,被覆	64.80MG					
	経口：錠剤,徐放性,腸溶性 被	8.40MG					
	経口：錠剤,フィルム 被覆	225.00MG					
	経口：錠剤,徐効	229.70MG					
	経口-21：錠剤,被覆	8.60MG					
	経口-28：錠剤	9.59MG					
	経口-28：錠剤,被覆	8.60MG					
	吸入：溶液,注射	4.02%					
	耳(耳性)：溶液	0.38%					
	口腔：GUM,咀嚼	145.50MG					
	経口：カプセル	349.90MG					
	経口：カプセル,硬ゼラチン	62.84MG					
	経口：カプセル,徐効	4.00MG					
	経口：錠剤	265.20MG					
	経口：錠剤(即時型／複合型)リ	132.00MG					
	経口：錠剤(即時型／複合型)リ	550.00MG					
	経口：錠剤,被覆	64.80MG					
	経口：錠剤,徐放性,腸溶性 被	8.40MG					
	経口：錠剤,フィルム 被覆	225.00MG					
	経口：錠剤,徐効	229.70MG					
	経口-21：錠剤,被覆	8.60MG					
	経口-28：錠剤	9.59MG					
	経口-28：錠剤,被覆	8.60MG					
	吸入：溶液,注射	4.02%					
	CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射			0.03%	殺虫剤	
		硬膜外：注射			0.03%		
		筋肉-静脈：注射			4.00%		
		筋肉：注射			4.00%		
眼球内：溶液		0.04%					
腹腔内：溶液		2.57%					
脈管内：注射		7.40E-05					
静脈：注射		0.07%					
静脈：溶液,リポソーム,注射		0.02%					
硝子体内：懸濁 注射		0.04%					
神経ブロック：注射		0.03%					
眼：溶液用パウダー		0.04%					
眼：溶液,点眼		6.00E-05					
経口：濃縮物		8.00E-05					
経口：懸濁液		0.05%					
皮下：注射		0.04%					
皮下：注射		0.05%					
局所：乳液,クリーム		0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	眼科用剤	0.16mg/g			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	静脈内注射	55mg/kg(体重)			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	3.2mg/g			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	経口投与	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					
	経口：濃縮物	8.00E-05					
	経口：懸濁液	0.05%					
	皮下：注射	0.04%					
	皮下：注射	0.05%					
	局所：乳液,クリーム	0.25%					
CALCIUM CHLORIDE(塩化カルシウ	AN浸潤：注射	0.03%	一般外用剤	150mg			
	硬膜外：注射	0.03%					
	筋肉-静脈：注射	4.00%					
	筋肉：注射	4.00%					
	眼球内：溶液	0.04%					
	腹腔内：溶液	2.57%					
	脈管内：注射	7.40E-05					
	静脈：注射	0.07%					
	静脈：溶液,リポソーム,注射	0.02%					
	硝子体内：懸濁 注射	0.04%					
	神経ブロック：注射	0.03%					
	眼：溶液用パウダー	0.04%					
	眼：溶液,点眼	6.00E-05					

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
CALCIUM STEARATE	口腔/舌下: 錠剤	1.42MG	舌下適用	8mg/g
	経口: カプセル	21.10MG	経口投与	1169.1mg
	経口: カプセル, 硬ゼラチン	1.00MG	歯科外用及び口中用	100mg
	経口: カプセル, 徐効	91.90MG		
	経口: 粉末	3.00%		
	経口: 錠剤	42.90MG		
	経口: 錠剤 (即時型/複合型)	47.50MG		
	経口: 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被	3.20MG		
	経口: 錠剤, フィルム 被覆	16.00MG		
	経口: 錠剤, 徐効	24.00MG		
	経口-21: 錠剤	0.70MG		
	経口-28: 錠剤	0.70MG		
	舌下: 錠剤	2.00MG	殺虫剤	
CALCIUM SULFATE	経口: カプセル	74.68MG	経口投与	1.2g
	経口: カプセル, 徐効	1.54MG	直腸腔尿道適用	103mg
	経口: 錠剤	436.90MG		
	経口: 錠剤, 被覆	170.00MG		
	経口: 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被	75.00MG		
	経口: 錠剤, フィルム 被覆	443.00MG		
	経口: 錠剤, 復効	235.00MG		
	経口: 錠剤, 徐効	340.00MG		
	経口-28: 錠剤	10.70MG		
CANOLA OIL(ナタネ油)	経口: カプセル, 軟ゼラチン	165.55MG	一般外用剤	80mg/g
CAPRYLIC/CAPRIC	経口: カプセル	140.56MG	経口投与	5mg
	経口: カプセル, 軟ゼラチン	250.00MG	経口投与	適量
	経口: 溶液	2.62%	舌下適用	100mg/g
	局所: クリーム, 乳液, 徐放	10.00%	直腸腔尿道適用	977mg
	局所: 乳液, クリーム	10.80%	静脈内注射	360mg/kg
	局所: 溶液	50.00%	一般外用剤	300mg/g
CAMEL	経口: BAR, 咀嚼剤	0.60MG	経口投与	1500mg
	経口: 顆粒	2.50MG		
	経口: 溶液	0.40%		
	経口: 懸濁液	11.11%		
	経口: シロップ	20.70%		
	局所: 乳液, クリーム	0.26%	一般外用剤	0.15mg/g
CARBOMER 1342(カルボキシビニルポリ)	眼: 乳液	0.05%	経口投与	150mg
	局所: クリーム,	0.20%	一般外用剤	48.99mg/g
	局所: クリーム, 乳液, 徐放	0.20%	舌下適用	15mg/g
	局所: 乳液, クリーム	0.20%	直腸腔尿道適用	130mg
	局所: 乳液, ローション	0.30%	眼科用剤	4mg/g
	局所: ローション	0.20%	歯科外用及び口中用	40mg/g
	経皮: フィルム, 制御放出	24.30MG	耳鼻科用剤	6mg/g
	経皮: ゲル	0.30%		
CARBOMER 934(カルボキシビニルポリ)	経口: 懸濁液	5.00%	経口投与	150mg
	経口: 錠剤, 徐効	90.00MG	一般外用剤	48.99mg/g
	直腸: かん腸	14.40%	舌下適用	15mg/g
	局所: 乳液, クリーム	1.00%	直腸腔尿道適用	130mg
	局所: ゲル	1.49%	眼科用剤	4mg/g
	局所: ローション	0.50%	歯科外用及び口中用	40mg/g
	局所: 軟膏	0.50%	耳鼻科用剤	6mg/g
CARBOMER 934P(カルボキシビニルポリ)	口腔: 錠剤	9.37MG	経口投与	150mg
	眼: 懸濁 点眼	0.45%	一般外用剤	48.99mg/g
	経口: カプセル	14.20MG	舌下適用	15mg/g
	経口: 懸濁液	1.40%	直腸腔尿道適用	130mg
	経口: 錠剤, 徐放	15.00MG	眼科用剤	4mg/g
	経口: 錠剤, 口腔内崩壊	0.30MG	歯科外用及び口中用	40mg/g
	経口: 錠剤, 徐効	1.50MG	耳鼻科用剤	6mg/g
	経口: 錠剤, 徐効, 被覆	3.00MG		
	直腸: 浣腸	0.07%		
	局所: クリーム, 増加	1.00%		
	局所: クリーム, 乳液, 徐放	1.00%		
	局所: 乳液	0.25%		
	局所: 乳液, クリーム	1.00%		
	局所: ゲル	2.00%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所：ローション 局所：溶液 腔：ゲル	0.56% 0.18% 2.00%		
CARBOMER 940(カルボキシビニルポリ)	眼：ゲル 局所：クリーム, 局所：乳液 局所：乳液, クリーム 局所：ゲル 局所：ローション 局所：軟膏, 経皮：ゲル	4.00% 1.00% 0.60% 0.60% 3.50% 58.00% 2.25% 1.20%	経口投与 一般外用剤 舌下適用 直腸腔尿道適用 眼科用剤 歯科外用及び口中用 耳鼻科用剤	150mg 48.99mg/g 15mg/g 130mg 4mg/g 40mg/g 6mg/g
CARBOMER 941(カルボキシビニルポリ)	局所：ゲル 局所：ローション	0.20% 0.15%	経口投与 一般外用剤 舌下適用 直腸腔尿道適用 眼科用剤 歯科外用及び口中用 耳鼻科用剤	150mg 48.99mg/g 15mg/g 130mg 4mg/g 40mg/g 6mg/g
CARBOMER 980(カルボキシビニルポリ)	局所：乳液, クリーム 局所：ゲル 経皮：ゲル	1.20% 0.85% 1.50%	経口投与 一般外用剤 舌下適用 直腸腔尿道適用 眼科用剤 歯科外用及び口中用 耳鼻科用剤	150mg 48.99mg/g 15mg/g 130mg 4mg/g 40mg/g 6mg/g
CARBOMER 981(カルボキシビニルポリ)	局所：ゲル	0.85%	経口投与 一般外用剤 舌下適用 直腸腔尿道適用 眼科用剤 歯科外用及び口中用 耳鼻科用剤	150mg 48.99mg/g 15mg/g 130mg 4mg/g 40mg/g 6mg/g
CARBON(薬用炭)	経口：錠剤 経口：錠剤, 被覆	6.0e-03MG 0.01MG	経口投与 一般外用剤 直腸腔尿道適用	150mg 7mg/g 9mg
CARBON DIOXIDE	吸入：GAS	95.00%	一般外用剤	25mg/g
CARBOXYMETHYL STARCH(カルボ)	経口：カプセル 経口：錠剤 経口：カプセル	15.00MG 25.00MG 15.00MG	経口投与 直腸腔尿道適用	320mg 150.0mg
CARBOXYMETHYLCELLULOSE(カ)	口腔：フィルム, 溶解(性) 関節内：注射 関節内：注射 病巣内：注射 筋肉：注射 経口：懸濁液 経口：錠剤 軟組織：I注射 局所：貼布	10.95MG 0.75% 0.20% 0.75% 0.90% 6.40% 3.00MG 0.75% 6.14MG	経口投与 直腸腔尿道適用 一般外用剤	950mg 53.4mg/g 24mg/g
CARBOXYMETHYLCELLULOSE	経口：カプセル 経口：カプセル, 硬ゼラチン 経口：錠剤 経口：錠剤, 徐放性, 腸溶性 被 経口：錠剤, フィルム 被覆	70.00MG 36.00MG 29.00MG 13.30MG 241.84MG	経口投与 舌下適用 歯科外用及び口中用 殺虫剤	2.5g 15mg 11.2mg
CARBOXYMETHYLCELLULOSE	歯科：ゲル 歯科：ペースト 関節内：注射 関節内：注射 筋肉：注射 筋肉：注射 筋肉：注射, 微小球 筋肉：注射用パウダー 溶液, 凍結 滑液嚢内：注射 硝子体内：懸濁 注射 鼻：定量用スプレー 眼：溶液, 点眼	0.40% 174.00MG 0.75% 0.50% 0.75% 3.00% 1.00% 3.00% 0.10% 0.50% 0.15% 0.50%	舌下適用 歯科外用及び口中用 耳鼻科用剤 筋肉内注射 皮内注射 その他の注射 経皮 吸入剤	10mg/g 99.7mg/g 5mg/mL 50mg 15mg 30mg 30mg 5mg/mL

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口：カプセル	160.00MG	経口投与	4.3g
	経口：カプセル, 徐放性, 被覆, 硬ゼ	4.00MG	その他の内用	475mg
	経口：カプセル, 腸溶性 被覆 丸	4.20MG	直腸腔尿道適用	20mg
	経口：カプセル, 徐効	0.46MG		
	経口：点滴剤}	1.28%		
	経口：顆粒	25.70MG		
	経口：溶液用パウダー	2.60MG		
	経口：溶液用パウダー	0.26%		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	2.00%		
	経口 溶液	3.50%		
	経口 懸濁液	16.50%		
	経口 懸濁 点滴剤	0.25%		
	経口 シロップ	5.00%		
	経口 錠剤	48.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	24.75MG		
	経口 錠剤, 被覆	2.20MG		
	経口 錠剤, 徐放	15.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	50.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	155.00MG		
	軟組織; 注射	0.50%		
	皮下; 筋肉	16.00MG		
	局所; ゼリー	3.50%	一般外用剤 60mg/g	
CARMINE	経口 懸濁液	1.00%	経口投与	1.8mg
	経口 錠剤	6.80MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	0.37MG		
CARNAUBA WAX	経口 カプセル, 徐効	0.75MG	経口投与	84mg
	経口 錠剤	57.80MG	一般外用剤	100mg/g
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	31.12MG	直腸腔尿道適用	88mg/g
	経口 錠剤, 被覆	0.92MG	歯科外用及び口中用	0.540mg
	経口 錠剤, 徐放性	0.06MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	230.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	290.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	5.00MG		
	経口 錠剤, 復効	0.04MG		
	経口 錠剤, 徐効	300.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	140.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	0.25MG		
	経口 錠剤, 徐効, 多層構造, フィル	75.00MG		
	経口 28; 錠剤	0.15MG		
CARRAGEENAN	経口 カプセル	0.15MG	経口投与	423mg
	経口 カプセル, 徐放	0.30MG	その他の内用	423mg
	経口 顆粒 FOR 再構成	6.00MG		
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	20.15MG		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	1.50%		
	局所; ローション	0.50%	一般外用剤	30mg/g
	経皮; フィルム, 制御放出	33.00MG		
CASTOR OIL	眼; 乳液	5.00%		
	経口 カプセル	0.03MG	経口投与	104mg
	経口 カプセル, 徐効	1.75MG	筋肉内注射	0.02mL
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	32.00MG	歯科外用及び口中用	777mg
	経口 錠剤	2.00MG	直腸腔尿道適用	100mg
	経口 錠剤, 被覆	0.90MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	3.06MG		
	経口 錠剤, 徐効	23.27MG		
	舌下 錠剤	1.60MG	舌下適用	0.3mL/mL
	局所; 乳液, クリーム	12.50%	一般外用剤	600mg/g
	局所; 軟膏	14.90%	その他外用	0.1mL/mL
CELLACEFATE	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	28.20MG	経口投与	427.2mg
	経口 カプセル, 徐効	9.42MG		
	経口 錠剤	37.00MG		
	経口 錠剤, 被覆			
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	70.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	15.60MG		
	経口 錠剤, 徐効	70.00MG		
CELLULOSE(粉末セルロース)	口腔/舌下 錠剤	4.50MG	経口投与	195mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル	405.00MG		
	経口 カプセル,硬ゼラチン	140.00MG		
	経口 錠剤	1120.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	40.20MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	16.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	391.70MG		
	経口 錠剤, 徐効	110.60MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	42.25MG		
	経口21; 錠剤	20.00MG		
	経口28; 錠剤	20.00MG		
CELLULOSE ACETATE	経口 カプセル	18.08MG	経口投与	31.5mg
	経口 錠剤	2.45MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	6.86MG		
	経口 錠剤, 制御放出	27.39MG		
	経口 錠剤, 徐放	23.56MG		
	経口 錠剤, 徐効	39.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	44.60MG		
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	関節内; 注射	0.05%	直腸腔尿道適用	500mg
	筋肉; 注射	0.05%	歯科外用及び口中用	250mg
	静脈; 注射	14.90%		
	硝子体内; 筋肉PLANT	1.66MG		
	鼻; 定量用スプレー	0.15%		
	経口 カプセル	551.25MG	経口投与	3.7g
	経口 カプセル(即時型／複合型リ	44.33MG	一般外用剤	70mg/g
	経口 カプセル, 被覆 丸薬	8.03MG	経皮	40mg
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	60.00MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	14.00MG	微結晶セルロース	
	経口 カプセル, 徐放	116.66MG	経口投与	適量
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	154.30MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	105.00MG	結晶セルロース(微粒子)	
	経口 カプセル, 徐効	186.00MG	経口投与	49.5mg
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	282.60MG		
	経口 分散 錠剤	253.20MG		
	経口 顆粒, 腸溶性 被覆	789.60MG		
	経口 顆粒 経口懸濁液用	27.39MG		
	経口 顆粒 再構成用	25.00MG		
	経口 顆粒 懸濁液用			
	経口 粘奨剤	63.00MG		
	経口 パウダー 懸濁液用	58.65%		
	経口 懸濁液	7.25%		
	経口 錠剤	1385.30MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	61.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	305.25MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	10.40MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	570.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	356.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出	152.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性	211.75MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	375.26MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	391.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	397.70MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	530.00MG		
	経口 錠剤, FOR 溶液用	0.75MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 被覆	34.00MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 徐放	17.30MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	415.92MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	30.00MG		
	経口 錠剤, 復効	25.00MG		
	経口 錠剤, SUGAR 被覆	4.64MG		
	経口 錠剤, 徐効	363.70MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	100.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	307.52MG		
	経口 錠剤, 徐放, フィルム 被覆	62.40MG		
	経口 錠剤, UN被覆, トローチ	60.00MG		
	経口21; 錠剤	28.48MG		

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口28; 錠剤 経口28; 錠剤, 被覆 舌下 錠剤 腔; 錠剤	28.48MG 10.00MG 43.20MG 390.00MG	舌下適用 120mg	
CERESINE	局所; 軟膏	7.31%	一般外用剤	150mg/g
CETEARETH-12(ポリオキシエチレン	局所; 乳液, クリーム	5.00%	一般外用剤	25mg/g
CETEARETH-15(ポリオキシエチレン	局所; 乳液, クリーム	1.50%	一般外用剤	25mg/g
CETEARETH-30(ポリオキシエチレン	局所; クリーム, 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション	1.00% 3.00% 2.30%	一般外用剤	25mg/g
CETEARYL OCTANOATE(2-エチル	局所; 乳液, クリーム	3.00%	一般外用剤	30mg/g
CETETH-10(ポリオキシエチレンセチル	局所; ローション	2.50%	一般外用剤 直腸腔尿道適用	70mg/g 30mg/g
CETETH-2(ポリオキシエチレンセチル	局所; 乳液, クリーム 局所; ローション	2.50% 0.80%	一般外用剤 直腸腔尿道適用	70mg/g 30mg/g
CETETH-20(ポリオキシエチレンセチル	局所; クリーム, 局所; 乳液, クリーム 局所; 乳液, ローション 局所; ローション 局所; 溶液 局所; 溶液, 液体	6.00% 4.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00%	一般外用剤 直腸腔尿道適用	70mg/g 30mg/g
CETETH-23(ポリオキシエチレンセチル	局所; 乳液, クリーム	2.00%	一般外用剤	70mg/g
CETOSTEARYL ALCOHOL	経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 局所; クリーム, 局所; 乳液, クリーム 局所; 乳液, ローション 局所; ローション 局所; 軟膏 局所; 懸濁液 腔; クリーム, 腔; 乳液, クリーム	70.00MG 62.00MG 8.00% 12.00% 5.00% 4.00% 1.20% 2.50% 10.00% 12.00%	一般外用剤	100mg/g
CETYL ALCOHOL	耳 (耳性); 懸濁液	1.00%		
	眼; 懸濁液 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 直腸; エアロゾル, 定量 局所; エアロゾル 局所; エアロゾル, 定量 局所; クリーム, 局所; クリーム, 乳液, 徐放 局所; 乳液, エアロゾル FOAM 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 軟膏 局所; 懸濁液 腔; 乳液, クリーム	0.50% 2.33MG 44.00MG 59.00MG 0.16% 1.16% 10.00% 4.00% 6.00% 3.22% 12.00% 68.40% 7.00% 2.01% 15.00%	経口投与 舌下適用 直腸腔尿道適用 一般外用剤 歯科外用及び口中用 その他の外用 殺虫剤	29.2mg/g 60mg/g 60mg/g 180mg/g 50mg/g 161.1mg/g
CETYL PALMITATE	局所; 乳液, クリーム 局所; 溶液 腔; 乳液, クリーム 局所; 乳液, クリーム 局所; 溶液 腔; 乳液, クリーム	9.45% 0.05% 3.30% 9.45% 0.05% 3.30%	一般外用剤	40mg/g
CETYL PYRIDINIUM CHLORIDE	イオントフォoresis; DDS 経口 カプセル 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 徐効 経皮; DDS	1.20MG 1.50MG 4.3e-03MG 0.02MG 1.20MG	歯科外用及び口中用	1mg/g
CHLOROBUTANOL	AN浸潤; 注射 筋肉 - 静脈皮下; 注射 筋肉 静脈; 注射 筋肉 皮下; 注射 吸入 ; 溶液 筋肉; 注射	0.40% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.52%	経皮 静脈内注射 筋肉内注射 吸入剤	2mg 600mg 60mg 7.5mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ	日本		
	投与経路／剤型	投与量	投与経路 投与量	
	筋肉; 注射	5.00%	耳鼻科用剤 3.5mg/g	
	静脈(点滴); 注射	0.60%		
	鼻; 溶液	0.05%		
	鼻; 噴霧	0.50%		
	鼻; 定量用スプレー	0.50%		
	神経ブロック; 注射	0.50%	眼科用剤 4mg/g	
	眼; 軟膏	0.65%		
	眼; パウダー 溶液用	0.55%		
	眼; 溶液	0.50%		
	眼; 溶液, 点滴剤	0.20%		
	皮下; 注射	0.25%	皮下注射 一般外用剤	
	局所; 溶液	0.30%		
CHLOROCRESOL	局所; クリーム,	0.10%	一般外用剤 1mg/g	
	局所; 乳液, クリーム	0.75%		
CHOLESTEROL	硬膜外; 注射, 懸濁 リポソーム	0.33%	経口投与 直腸腔尿道適用	260mg 40mg
	静脈; 注射, パウダー 凍結乾燥, リ	5.20%		
	静脈; 注射, 懸濁 リポソーム	0.31%	一般外用剤 50mg/g	
	静脈; 溶液, リポソーム 注射	0.68%		
	局所; 乳液, クリーム	1.00%		
	局所; ローション	1.50%		
	局所; 軟膏	5.00%		
	腔; 乳液, クリーム	0.50%		
CINNAMALDEHYDE	経口 懸濁液	0.01%	経口投与 一般外用剤 歯科外用及び口中用	微量 5mg/g 118mg、/mL
	経口 錠剤	2.10MG		
CINNAMON OIL	経口 PASTILLE	4.00MG	経口投与 一般外用剤 歯科外用及び口中用	12mg 5mg/g 16.2mg
	経口 溶液, エリキシル剤	55.00%		
	経口 懸濁液	0.02%		
	経口 シロップ	5.00E-05		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	1.0e-03MG		
CITRIC ACID(無水クエン酸)	AN浸潤; 注射	0.02%	耳鼻科用剤 歯科外用及び口中用	50 μg/g 0.3mg/g
	耳 (耳性); 溶液	1.00%		
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	0.04%		
	口腔; フィルム, 溶解 (性)	0.69MG		
	口腔; 錠剤	30.00MG		
	硬膜外; 注射	0.02%	筋肉内注射	10mg
	筋肉 - 静脈皮下; 注射	1.26%		
	筋肉 静脈; I注射	0.05%		
	筋肉 静脈; 注射	0.33%		
	筋肉 静脈; 溶液, 注射	0.08%		
	筋肉 皮下; 注射	0.21%	吸入剤	2.88mg/g
	吸入 ; エアロゾル, 定量	2.00E-06		
	吸入 ; 溶液	0.44%	その他の注射 6mg	
	心臓内; 注射	0.20%		
	筋肉; 注射	2.00%		
	筋肉; パウダー 注射 溶液用	0.03%		
	胸膜内; パウダー 注射 溶液用	0.03%		
	髄腔内; パウダー 注射 溶液用	0.03%		
	静脈; I注射	41.36%		
	静脈; 注射	20.00%		
	静脈; パウダー 注射 溶液用	50.00%		
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	7.69%		
	静脈; 溶液	0.50%		
	静脈; 溶液, 濃縮物	0.000025		
	静脈; 溶液, 注射	0.20%		
	イオントフォレシス; DDS	1.40MG		
	イオントフォレシス; 貼布., 制御放出	0.20MG		
	イオントフォレシス; 溶液	0.02%		
	静脈(点滴); 注射	9.30%		
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用	6.92%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	0.20%		
	鼻; 溶液	20.00%		
	鼻; 噴霧	0.26%		
	鼻; 定量用スプレー	3.50%		
	神経ブロック; 注射	0.02%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	眼; 溶液	0.20%	眼科用剤	1.2mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	0.05%		
	経口 BAR, 咀嚼剤	500.00MG	経口投与	1.62g
	経口 カプセル	30.75MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	4.90MG		
	経口 カプセル, 徐放	18.80MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	1.00MG		
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	18.80MG		
	経口 濃縮物	1.85%		
	経口 点滴剤	0.18%		
	経口 懸濁液用	0.10%		
	経口 顆粒	6.25MG		
	経口 顆粒 経口懸濁液用	4.90MG		
	経口 顆粒 再構成用	6.00MG		
	経口 顆粒 懸濁液用	9.10MG		
	経口 液体	1.35%		
	経口 粉末	9.50%		
	経口 パウダー 経口懸濁液用	8.10%		
	経口 パウダー 再構成用	0.25%		
	経口 パウダー 懸濁液用	60.00%		
	経口 溶液	3.00%		
	経口 溶液, エリキシル剤	10.00%		
	経口 溶液, 液体	0.70%		
	経口 懸濁液	2.00%		
	経口 懸濁 点滴剤	0.60%		
	経口 懸濁 FOR 吸入	0.05%		
	経口 懸濁 液体	0.90%		
	経口 懸濁 徐効	0.50%		
	経口 シロップ	72.20%		
	経口 錠剤	78.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型) リー	2.56MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型) リー	4.26MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	1.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	5.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	42.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	63.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	3.08MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	40.00MG		
	経口 錠剤, UN被覆, トローチ	12.00MG		
	舌下 錠剤	5.92MG		
	局所; エアロゾル	0.06%	一般外用剤 4.2mg/g	
	局所; クリーム,	0.05%		
	局所; 乳液	0.11%		
	局所; 乳液, エアロゾル FOAM	0.11%		
	局所; 乳液, クリーム	5.00%		
	局所; ゲル	0.05%		
	局所; ローション	0.85%		
	局所; 軟膏	0.01%		
	局所; 貼布, 制御放出	0.20MG		
	局所; シャンプー	2.30%		
	局所; シャンプー, 懸濁液	1.00%		
	局所; 溶液	40.00%		
	局所; 綿棒で分泌物を採集する	40.00MG		
	経皮; DDS	1.40MG		
	腔; 海綿	7.50MG	殺虫剤	
CITRIC ACID MONOHYDRATE(クエ)	AN浸潤; 注射	0.16%		
	筋肉 - 静脈皮下; 注射	1.26%	筋肉内注射	137.5mg
	筋肉 静脈; I注射ができる	0.05%	皮下注射	113.4mg
	筋肉 静脈; 注射	0.36%	動脈内注射	0.4mg
	筋肉 静脈; 溶液	0.05%	歯科注射	150 μ g
	筋肉 静脈; 溶液, 注射	0.08%	その他の注射	29.4mg
	心臓内; 注射	1.05%	経皮	0.6mg/g
	筋肉; I注射	0.35%	舌下適用	0.2mg/g
	眼内 溶液	0.05%	吸入剤	9.6mg
	静脈; I注射	0.05%	静脈内注射	882mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	静脈; 注射 静脈; パウダー 注射 溶液用 静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結 静脈; 溶液 静脈; 溶液, 注射 静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射 鼻; 溶液 鼻; 定量用スプレー 神経ブロック; 注射 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 経口 溶液 経口 噴霧 経口 懸濁液 経口 懸濁 徐効 経口 シロップ 経口 錠剤 経口 錠剤, フィルム 被覆 局所; 乳液, クリーム 局所; ゲル 局所; シャンプー 局所; 溶液 腔; 乳液, クリーム	52.50% 21.90% 41.36% 0.15% 0.52% 2.50% 0.14% 0.42% 0.17% 0.16% 0.05% 0.05% 0.50% 1.02% 1.50% 14.08% 0.96% 50.00MG 10.00MG 0.05% 0.10% 0.24% 0.18% 0.49%	直腸腔尿道適用 歯科外用及び口中用 注腸 耳鼻科用剤 眼科用剤 経口投与 一般外用剤 その他の外用 殺虫剤	10.2mg 80mg 1560mg 2mg/g 1.2mg/g 1290mg 10mg/g 10mg/g
CITRIC ACID, HYDROUS(クエン酸)	筋肉 - 静脈皮下; 注射 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射 経口 顆粒 懸濁液用 経口 懸濁液 経口 シロップ 経口 錠剤, フィルム 被覆 局所; 乳液, クリーム 局所; 乳液, ローション	1.26% 10.50% 3.20E-05 14.10MG 3.75% 1.30% 10.00MG 0.10% 0.05%	筋肉内注射 皮下注射 動脈内注射 歯科注射 その他の注射 経皮 舌下適用 吸入剤 静脈内注射 直腸腔尿道適用 歯科外用及び口中用 注腸 耳鼻科用剤 眼科用剤 経口投与 一般外用剤 その他の外用 殺虫剤	137.5mg 113.4mg 0.4mg 150 µg 29.4mg 0.6mg/g 0.2mg/g 9.6mg 882mg 10.2mg 80mg 1560mg 2mg/g 1.2mg/g 1290mg 10mg/g 10mg/g
CLOVE OIL	経口 懸濁液 経口 溶液, エリキシル剤	0.01% 40.00%	経口投与 その他の内用 一般外用剤 歯科外用及び口中用	10mg 0.002mL 0.5mg/mL 21mg/mL
COCAMIDE DIETHANOLAMINE(ヤ)	局所; エアロゾル, 定量 局所; 乳液, クリーム 局所; シャンプー 局所; 溶液 局所; 海綿 局所; 懸濁液 局所; エアロゾル, 定量 局所; 乳液, クリーム	3.00% 4.00% 3.50% 4.00% 20.20MG 4.00% 3.00% 4.00%	一般外用剤	40mg/g
COCOA BUTTER	直腸; 坐薬 局所; ローション	2070.60MG 0.10%	直腸腔尿道適用 一般外用剤 経口投与	3.5g 30mg/g 120mg
COCONUT OIL	局所; 乳液, クリーム 局所; 軟膏 局所; 溶液	6.00% 25.00% 15.50%	経口投与	460mg
COPOVIDONE(コポリビドン)	経口 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 口腔内崩壊	2.15% 356.82MG 7.58MG 853.80MG 4.38MG	経口投与	25.3mg

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤, 徐効, フィルム被覆	6.10MG		
CORN OIL	経口カプセル	918.00MG	経口投与	540mg
	経口カプセル, 軟ゼラチン	416.00MG	一般外用剤	75mg/g
	経口錠剤	20.00MG		
	経口錠剤, 被覆	0.30MG		
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆	0.03MG		
	舌下錠剤	1.70MG		
COTTONSEED OIL	筋肉; 注射	87.46%	経口投与	540mg
COTTONSEED OIL,	経口カプセル	15.00MG	経口投与	2.8g
	経口カプセル, 徐効	58.00MG	一般外用剤	80mg/g
	経口錠剤	34.00MG	経皮	28.8mg
	経口錠剤, 被覆	0.60MG	直腸腔尿道適用	5.38g
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆	4.00MG	歯科外用及び口中用	210mg
	経口錠剤, 徐効	402.00MG		
	舌下錠剤	2.00MG		
	経口カプセル	15.00MG		
	経口カプセル, 徐効	58.00MG		
	経口錠剤	34.00MG		
	経口錠剤, 被覆	0.60MG		
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆	4.00MG		
	経口錠剤, 徐効	402.00MG		
	舌下錠剤	2.00MG		
CREATININE	耳(耳性); 溶液	0.50%	耳鼻科用剤	12mg
	筋肉静脈; 注射	0.80%	静脈内注射	160mg
	関節内; 注射	0.80%	皮下注射	20mg
	病巣内; 注射	0.80%	その他の注射	20mg、
	筋肉; 注射	0.50%	筋肉内注射	128mg
	滑液嚢内; 注射	0.80%	皮内注射	2.0mg
	眼; 溶液	0.50%	眼科用剤	5mg/mL
	眼; 溶液, 点滴剤	0.20%	吸入剤	3.75mg
	軟組織; 注射	0.80%		
CROSCARMELLOSE SODIUM	筋肉; 注射	1.00%	経口投与	300mg
	経口カプセル	50.00MG		
	経口カプセル(即時型／複合型リ	30.00MG		
	経口カプセル, 腸溶性被覆丸薬	20.00MG		
	経口カプセル, 徐放	7.30MG		
	経口カプセル, 硬ゼラチン	30.00MG		
	経口顆粒 FOR 再構成	143.50MG		
	経口顆粒 FOR 懸濁液	35.30MG		
	経口溶液			
	経口錠剤	180.00MG		
	経口錠剤(即時型／複合型リリ	28.00MG		
	経口錠剤(即時型／複合型リリ	50.00MG		
	経口錠剤(即時型／複合型リリ	18.00MG		
	経口錠剤, 被覆	35.20MG		
	経口錠剤, 徐放性	14.00MG		
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆	32.44MG		
	経口錠剤, 徐放性			
	経口錠剤, 徐放	15.00MG		
	経口錠剤, フィルム被覆	165.00MG		
	経口錠剤, 口腔内崩壊	13.00MG		
	経口錠剤, 糖衣	2.50MG		
	経口錠剤, 徐効	28.00MG		
	経口錠剤, 被覆なし, トローチ	10.00MG		
	経口21; 錠剤	3.00MG		
	経口28; 錠剤	3.00MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	2.00MG		
	舌下錠剤	6.50MG		
CROSPVIDONE	移植; 丸薬	2.00MG	経口投与	470mg
	関節内; 注射	0.02%		
	筋肉; 注射	0.02%		
	経口カプセル	30.00MG		
	経口カプセル(即時型／複合型リ	15.91MG		
	経口カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	14.00MG		
	経口カプセル, 腸溶性被覆丸薬	75.00MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル,硬ゼラチン	70.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	10.71MG		
	経口 分散 錠剤	340.00MG		
	経口 顆粒 経口懸濁液用	75.00MG		
	経口 粘奨剤	9.00MG		
	経口 パウダー 懸濁液用	5.00%		
	経口 懸濁液	0.05%		
	経口 懸濁 徐効	18.68%		
	経口 錠剤	300.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	110.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	9.60MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	100.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	792.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出			
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	50.00MG		
	経口 錠剤, 分散性	6.00MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子	130.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	39.20MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	196.70MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 徐放	5.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	180.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	15.00MG		
	経口 錠剤, 復効	10.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	144.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	15.40MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	5.00MG		
	経口21; 錠剤	4.45MG		
	舌下 錠剤	6.50MG		
	局所; 乳液	1.00%		
	局所; ローション	0.18%		
	経皮; フィルム, 制御放出	60.00MG		
	腔; 坐薬	116.10MG		
	腔; 錠剤	35.00MG		
	移植; 丸薬	2.00MG		
	関節内; 注射	0.02%		
	筋肉; 注射	0.02%		
	経口 カプセル	30.00MG		
	経口 カプセル (即時型／複合型リ	15.91MG		
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	14.00MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	75.00MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	70.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	10.71MG		
	経口 分散性錠剤	340.00MG		
	経口 顆粒 FOR 経口懸濁液	75.00MG		
	経口 粘奨剤	9.00MG		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	5.00%		
	経口 懸濁液	0.05%		
	経口 懸濁 徐効	18.68%		
	経口 錠剤	300.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	110.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	9.60MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	100.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	792.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出			
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	50.00MG		
	経口 錠剤, 分散性	6.00MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	130.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	39.20MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	196.70MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 徐放	5.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	180.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	15.00MG		
	経口 錠剤, 復効	10.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	144.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	15.40MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤, 徐効, フィルム被覆	5.00MG		
	経口21; 錠剤	4.45MG		
	舌下錠剤	6.50MG		
	局所; 乳液	1.00%		
	局所; ローション	0.18%		
	経皮; フィルム, 制御放出	60.00MG		
	腔; 坐薬	116.10MG		
	腔; 錠剤	35.00MG		
CUPRIC SULFATE	耳 (耳性); 溶液	0.00%	その他の外用	1 μ g/g
DEHYDROACETIC ACID	局所; ローション	11.60%	経口投与	1mg
DEXTRAN 40	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	30%	経口投与	24mg
			静脈内注射	120mg
			筋肉内注射	5.01mg
			動脈内注射	15mg
DEXTRIN	経口錠剤	21.70MG	経口投与	12.015g
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆	9.25MG	一般外用剤	83.6mg/g
	局所; 乳液, クリーム	0.02%	歯科外用及び口中用	28mg
	局所; シャンプー	5.00%	注腸	53.065g
DEXTROSE (ブドウ糖)	筋肉 静脈; 注射	5.00%	皮内注射	0.18mg
	筋肉 静脈; パウダー 注射 溶液用	5.00%	歯科注射	0.5mg
	筋肉; 注射	4.40%	筋肉内注射	528mg
	髄腔内; 注射	5.00%		
	静脈; 注射	5.00%	静脈内注射	8g
	静脈; 注射	30.00%	皮下注射	300mg
	静脈; パウダー 注射 溶液用	5.00%	直腸腔尿道適用	224mg
	静脈; 溶液	5.00%	経皮	1.38g
	静脈; 溶液, 注射	5.00%	眼科用剤	2mg/g
	静脈(点滴); 注射	5.60%	歯科外用及び口中用	4.8mg
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用	5.00%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	5.17%		
	鼻; 噴霧	5.00%		
	鼻; 定量用スプレー	5.00%		
	経口 香錠	157.00MG	経口投与	27.5g
	経口 シロップ	0.40%		
	経口錠剤	183.66MG		
	経口錠剤 (即時型/複合型リリー	398.00MG		
	経口錠剤, 徐効, 被覆	103.95MG		
	経口錠剤, 被覆なし, トローチ	903.50MG		
	脊髄麻酔; 注射	7.50%	局所麻酔注射	2.25g
	舌下錠剤	115.77MG		
DEXTROSE SOLUTION (ブドウ糖液)	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用	5.00%	経口投与	15.33g
DEXTROSE MONOHYDRATE (ブドウ糖水合物)	経口錠剤	9.14MG	経口投与	340mg
	静脈; 溶液, 注射	5.00%		
	経口錠剤, 被覆	0.63MG		
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆	1.20MG		
DIACETYLATED	経口錠剤, フィルム被覆	1.14MG	経口投与	微量
DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE (リン酸水素カルシウム水和物)	経口カプセル	400.00MG	経口投与	4.02g
	経口錠剤	512.00MG	一般外用剤	25mg/g
	経口錠剤, 被覆	488.70MG	歯科外用及び口中用	250mg/g
	経口錠剤, 徐放	108.00MG		
	経口錠剤, フィルム被覆	635.50MG		
	経口錠剤, 徐効	189.00MG		
DIBUTYL PHTHALATE	経口カプセル, 腸溶性被覆丸薬	8.20MG	経口投与	15mg
	経口カプセル, 徐放	11.18MG		
	経口錠剤, 制御放出	7.97MG		
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆	1.70MG		
DIETHANOLAMINE	静脈(点滴); 注射	1.50%	静脈内注射	12mg
	局所; 乳液, クリーム	0.30%	一般外用剤	19mg/g
DIETHYL PHTHALATE	経口カプセル, 徐放性ACTION, 被覆丸薬	15.10MG	経口投与	8mg
	経口カプセル, 腸溶性被覆丸薬	12.00MG		
	経口カプセル, 徐放	8.48MG		
	経口カプセル, 徐効	3.60MG		
	経口錠剤	4.00MG		
	経口錠剤 (即時型/複合型リリー	0.50MG		
	経口錠剤, 被覆	1.25MG		