

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本			
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量		
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆	16.80MG				
	経口錠剤, フィルム被覆	2.30MG				
	経口錠剤, 徐効	12.00MG				
DIETHYL SEBACATE	局所; 溶液	24%	一般外用剤 舌下適用 歯科外用及び口中用	400mg/g 150 µ L/mL 20mg/g		
DIETHYLENE GLYCOL	局所; ゲル	25.00%	殺虫剤			
	経皮; ゲル	5.00%				
DIISOPROPANOLAMINE	局所; 乳液, クリーム	0.12%	一般外用剤	50mg/g		
	局所; ゲル	0.20%				
DIISOPROPYL ADIPATE	局所; ローション	20.00%	一般外用剤 舌下適用	120mg/g 12mg/g		
	局所; 溶液	17.00%				
DIMETHICONE 1000 (ジメチルポリシロキサン)	経口カプセル, 腸溶性被覆丸薬	2.50MG	一般外用剤 経皮 直腸尿道適用	100mg/g 376mg 1.5mg/g		
DIMETHICONE 350 (ジメチルポリシロキサン)	経口カプセル	3.70MG	一般外用剤 経皮 直腸尿道適用	100mg/g 376mg 1.5mg/g		
	経口カプセル, 徐効	0.11MG				
	局所; 乳液, クリーム	1.00%				
	局所; 溶液	0.50%				
DIMETHICONE 360 (ジメチルポリシロキサン)	局所; 乳液, クリーム	5.00%	一般外用剤 経皮 直腸尿道適用	100mg/g 376mg 1.5mg/g		
	経皮; フィルム, 制御放出	564.00MG				
DIMETHYL PHTHALATE	経口錠剤, 徐効	0.40MG	殺虫剤			
DIOCTYL PHTHALATE	眼; 坐薬, 挿入, 制御放出	2.00MG	殺虫剤			
	経皮; フィルム, 制御放出	600.12MG				
DIPROPYLENE GLYCOL	口腔; 貼布, 制御放出	29.90MG	一般外用剤 経皮	200mg/g 3.2mg/g		
	経皮; フィルム, 制御放出	12.00MG				
	経皮; 貼布, 制御放出	0.21MG				
DOCOSANOL (ドコサニールアルコール)	局所; 溶液	1.10%	一般外用剤 舌下適用	40mg/g 20mg/g		
DOCUSATE SODIUM (ジオクチルスルホサクシネート)	筋肉; 注射	0.01%	経口投与 一般外用剤 直腸尿道適用	36mg 10mg/g 5mg		
	経口カプセル	8.20MG				
	経口カプセル, 硬ゼラチン	0.64MG				
	経口カプセル, 徐効	1.0e-03MG				
	経口懸濁液	0.11%				
	経口懸濁液, 徐効	0.07%				
	経口錠剤	11.00MG				
	経口錠剤 (即時型/複合型) リー	0.03MG				
	経口錠剤, 被覆	2.0e-03MG				
	経口錠剤, フィルム被覆	0.50MG				
	経口錠剤, 徐効, フィルム被覆	0.03MG				
	局所; ゲル	3.00%				
	局所; シャンプー	2.00%				
EDETATE CALCIUM DISODIUM	動脈内; 注射	0.04%			動脈内注射 歯科外用及び口中用 その他の注射 脊椎腔内注射 静脈内注射 経口投与 皮下注射 直腸尿道適用	25mg 2mg/g 0.01mg 0.01mg 30mg 10mg 0.09mg 40mg
	筋肉; 注射	0.04%				
	筋肉; パウダー 注射 溶液用	5.00E-05				
	腹腔内; パウダー 注射 溶液用	5.00E-05				
	髄腔内; 注射	0.21%				
	脈管内; 注射	10.00%				
	静脈 (点滴); 注射	5.00E-05				
	静脈 (点滴); パウダー 注射 溶液用	5.00E-05				
	神経ブロック; 注射	0.01%				
	経口カプセル	0.27MG				
	経口濃縮物	0.02%				
	経口パウダー 溶液用	0.02%				
	経口溶液, エリキシル剤	0.50%				
	経口錠剤	4.00MG				
	経口錠剤, フィルム被覆	0.40MG				
	経口錠剤, 口腔内崩壊	0.77MG				
	皮下; 注射	0.17%				
	皮下; 溶液, 注射	0.02%				
	尿管; 溶液	0.01%				
	尿道; 溶液	0.01%				
	静脈; 注射	0.48%				
EDETATE DISODIUM	浸潤なし; 注射	0.01%	舌下適用	1mg/g		

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
耳(耳性); 溶液		0.10%	耳鼻科用剤	0.5mg/g
耳(耳性); 溶液, 点滴剤		0.10%	歯科外用及び口中用	0.2mg/g
硬膜外; 注射		0.01%	動脈内注射	29mg
筋肉 - 静脈皮下; 注射		0.20%	その他の注射	52mg
筋肉 静脈; I注射		0.05%		
筋肉 静脈; 注射		10.00%		
筋肉 皮下; 注射		0.20%		
吸入 ; 溶液		5.00%	吸入剤	0.250mg/g
関節内;		0.01%		
関節内; 注射		0.05%		
病巣内; I注射		0.01%		
病巣内; 注射		0.05%		
筋肉; I注射		0.01%		
筋肉; 注射		10.00%		
筋肉; 溶液, 注射		0.10%		
脈管内 ; 注射		0.04%		
静脈; 乳液, 注射		5.00E-05	静脈内注射	16mg
静脈; 点滴		0.01%		
静脈; I注射		0.01%		
静脈; 注射		10.00%		
静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結		1.44%		
静脈; 溶液		0.05%		
静脈; 溶液, 注射		0.11%		
イオントフォレシス; 貼布, 制御放出		0.10MG		
静脈(点滴); 注射		1.00%		
静脈(点滴); パウダー 注射 懸濁用		0.08%		
静脈(点滴); 溶液, 注射		0.04%		
鼻; 溶液		5.00%		
鼻; 溶液, 噴霧		0.05%		
鼻; 噴霧		0.10%		
鼻; 定量用スプレー		0.50%		
神経ブロック; 注射		0.01%		
眼; ゲル		0.01%	眼科用剤	1.27mg/g
眼; 溶液		10.00%		
眼; 溶液, 点滴剤		0.30%		
眼; 懸濁液		0.13%		
眼; 懸濁 点滴剤		0.10%		
経口 カプセル		1.00MG	経口投与	4.5mg
経口 カプセル, 軟ゼラチン		1.00MG		
経口 濃縮物		0.30%		
経口 液体		0.05%		
経口 パウダー 懸濁液用		0.06%		
経口 溶液		0.50%		
経口 懸濁液		0.37%		
経口 懸濁 点滴剤		0.10%		
経口 懸濁 FOR 吸入		0.02%		
経口 シロップ		2.50%		
経口 錠剤		4.00MG		
経口 錠剤, 被覆		0.21MG		
経口 錠剤, 徐放		5.00MG		
経口 錠剤, フィルム 被覆		4.00MG		
直腸; ENEMA		0.10%	直腸腔尿道適用	20mg
直腸; 溶液		0.04%		
(吸入; 溶液, 吸入 用		0.03%		
軟組織; 注射		0.05%		
皮下; I注射		0.10%		
皮下; 注射		0.20%		
局所; クリーム,		0.10%	一般外用剤	8mg/g
局所; クリーム, 乳液, 徐放		0.05%	その他の外用	0.11mg/mL
局所; 乳液		0.11%		
局所; 乳液, クリーム		1.00%		
局所; ゲル		0.17%		
局所; ローション		0.12%		
局所; 軟膏		6.50E-05		
局所; 貼布, 制御放出		0.10MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; パウダー 溶液用 局所; 溶液 局所; 溶液, 点滴剤 局所; 懸濁液 局所; 懸濁 点滴剤 経皮; ゲル 腔; 乳液, クリーム 腔; ゲル	0.01% 0.01% 0.05% 0.01% 0.10% 0.06% 0.05% 0.05%	殺虫剤	
EGG PHOSPHOLIPIDS (卵黄リン脂)	静脈; 乳液, 注射 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射	1.20% 1.20% 1.80%	高度精製卵黄レシチン 静脈内注射 卵黄リン脂質 一般外用剤 直腸腔尿道適用	36mg 3mg/g 40mg
ETHANOLAMINE (モノエタノールアミ)	経口 錠剤, 徐放性	1.00MG	静脈内注射 一般外用剤 眼科用剤	2.3mg 25mg/g 10.2mg/g
ETHANOLAMINE	静脈; 注射	0.15%	その他の外用	49mg/g
ETHYL ACETATE	経口 カプセル, 徐効 局所; 溶液 経皮; フィルム, 制御放出	382.25MG 31.00% 36138.00MG	一般外用剤 殺虫剤	0.4mL/mL
ETHYL HEXANEDIOL (2-エチル-	局所; 溶液	0.25%	一般外用剤	0.1mL/mL
ETHYL MALTOL	経口 溶液 経口 溶液, エリキシル剤 経口 シロップ	0.15% 0.06% 3.05%	経口投与	適量
ETHYL OLEATE	経皮; フィルム, 制御放出	8.64MG	筋肉内注射 皮内注射	微量 0.6mL
ETHYL VANILLIN	経口 カプセル 経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 懸濁液 経口 錠剤 (即時型/複合型リ-	0.34MG 0.12MG 0.64MG 8.00E-05 0.14MG	経口投与	0.432mg
ETHYLCELLULOSE	経口 カプセル 経口 カプセル, 徐放 経口 カプセル, 徐効 経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン 経口 顆粒 FOR 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型/複合型リ-	6.00MG 51.89MG 39.20MG 27.04MG 85.00MG 120.80MG 8.80MG	経口投与 一般外用剤 歯科外用及び口中用	489mg 2mg/mL 30mg/g
	経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 口腔内崩壊 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, 被覆 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 経口 28; 錠剤 局所; 貼布 経皮; フィルム, 制御放出	20.00MG 53.80MG 80.00MG 83.00MG 17.46MG 308.80MG 15.15MG 52.50MG 1.05MG 2.53MG 80.40MG		
ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL	経口 カプセル	9.0e-03MG	殺虫剤	
ETHYLENE VINYL ACETATE	移植; ROD 子宮内; 坐薬, 挿入, 制御放出 眼; 坐薬, 挿入, 制御放出 (歯周; フィルム, 制御放出 皮下; ROD 経皮; フィルム, 制御放出	61.00MG 160.00MG 14.00MG 51.00MG 61.00MG 735.00MG	眼科用剤 経皮	14mg 51mg/g
ETHYLENEDIAMINE	静脈; 注射 静脈(点滴); 注射 経口 溶液 局所; 乳液, クリーム	0.37% 0.39% 1.85% 0.18%	静脈内注射 皮下注射	30mg 30mg
FERRIC CHLORIDE	静脈; 注射	6.05%	静脈内注射	0.2mg
FERRIC OXIDE BROWN (褐色酸化)	経口 カプセル 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 錠剤	0.09MG 0.70MG 1.12MG	経口投与	1.2mg
FERRIC OXIDE RED (三二酸化鉄)	口腔; 錠剤	0.40MG	舌下適用	微量

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル	2.64MG	経口投与	95.4mg
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	2.28MG	一般外用剤	93mg/g
	経口 懸濁 徐効	0.27%	その他の外用	微量
	経口 錠剤	13.00MG	殺虫剤	
	経口 錠剤(即時型/複合型リリー	0.86MG		
	経口 錠剤(即時型/複合型リリー	1.19MG		
	経口 錠剤, 制御放出	5.24MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	2.30MG		
	経口 錠剤, 徐放	1.01MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	3.00MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 徐放	0.11MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	0.42MG		
	経口 錠剤, 徐効	3.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	3.60MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	1.80MG		
	経口21; 錠剤	1.9e-03MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	0.01MG		
	経口28; 錠剤	0.02MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	0.01MG		
FERRIC OXIDE YELLOW(黄色三二	口腔; 錠剤	1.00MG	経口投与 一般外用剤	5.67mg 0.8mg/g
	経口 カプセル	1.05MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	1.80MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	1.23MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	0.10MG		
	経口 カプセル, 徐効	3.04MG		
	経口 顆粒 FOR 経口懸濁液	1.80MG		
	経口 顆粒 FOR 再構成	0.25MG		
	経口 錠剤	2.00MG		
	経口 錠剤(即時型/複合型リリー	0.18MG		
	経口 錠剤, 被覆	0.38MG		
	経口 錠剤, 制御放出	0.93MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	0.43MG		
	経口 錠剤, 徐放	0.03MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	1.06MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 徐放	1.96MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	0.93MG		
	経口 錠剤, 徐効	3.00MG		
	経口21; 錠剤	0.01MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	8.0e-03MG		
経口28; 錠剤	0.02MG			
経口28; 錠剤, 被覆	8.0e-03MG			
FLUORESCIEIN (フルオレセインナト	経口 カプセル	6.8e-03MG	その他の注射	0.003mg
FORMALDEHYDE(ホルマリン)	局所; 乳液, クリーム	0.27%	皮下注射	0.05mg
FRUCTOSE	局所; 溶液	0.20%	殺虫剤	
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用,	5.00%	静脈内注射	900mg
	経口 BAR, 咀嚼剤	438.00MG	経口投与	10g
	経口 溶液	25.00%	歯科外用及び口中用	63mg
	経口 懸濁液	2.00%	耳鼻科用剤	10mg/mL
GELATIN	直腸; 溶液	10.00%		
	歯科L; ペースト	180.00MG	経口投与	2g
	筋肉 - 静脈皮下; パウダー FOR	1.40%	筋肉内注射	0.1mg
	筋肉 皮下; 注射	16.00%	皮下注射	1mg
	筋肉 皮下; 注射, 徐効	16.00%	その他の注射	0.1mg
	筋肉; 注射	0.26%	一般外用剤	100mg/g
	筋肉; 注射, 微小球	0.13%	経皮	1988mg
	静脈; 溶液	3.48%	直腸腔尿道適用	1.22g
	静脈(点滴); 注射	2.00%	歯科外用及び口中用	99.7mg/g
	経口 BAR, 咀嚼剤	1000.00MG	その他の外用	107.345mg/g
	経口 カプセル	756.00MG	精製ゼラチン	
	経口 カプセル(即時型/複合型リ	117.50MG	経口投与	420mg
	経口 カプセル(即時型/複合型リ	50.00MG	静脈内注射	200mg
	経口 カプセル, 被覆 丸薬	65.00MG	筋肉内注射	640mg
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	67.71MG	皮下注射	2.5mg
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	97.01MG	動脈内注射	240mg
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	60.75MG	歯科外用及び口中用	63mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル, 徐放	96.00MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	50.50MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	733.00MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	194.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	217.85MG		
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	107.00MG		
	経口 錠剤	143.00MG		
	経口 パウダー 懸濁液用			
	経口 溶液	3.48%		
	経口 錠剤	45.36MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型) リー	2.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	42.12MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	15.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	28.35MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	23.75MG		
	経口 錠剤, 復効	1.60MG		
	経口 錠剤, 徐効	40.00MG		
	経口 21; 錠剤	1.00MG		
	経口 28; 錠剤	1.00MG		
	舌下 錠剤	10.00MG		
GELLAN GUM	眼; 溶液	0.60%	眼科用剤	6mg/g
GLUCONOLACTONE (グルコノ-δ-ラ	局所; エアロゾル, 定量	0.25%	経口投与	228mg
	局所; 溶液	0.25%	一般外用剤	1mg/g
	局所; 海綿	2500.00MG		
GLUCOSE, LIQUID (ブドウ糖液)	経口 PASTILLE	826.00MG	経口投与	15.33g
	経口 溶液	10.00%		
	経口 シロップ	62.00%		
	経口 錠剤	10.37MG		
	経口 錠剤, 徐効	2.00MG		
GLUTAMIC ACID	経口 錠剤	30.00MG	経口投与 歯科外用及び口中用	210mg 15mg
GLUTAMIC ACID, DL-(L-グルタミン	腔; 乳液, クリーム	0.10%	経口投与 眼科用剤	50mg 2.5mg/g
GLYCERIN	耳 (耳性); 溶液	60.00%	耳鼻科用剤	60mg/g
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	63.63%		
	耳 (耳性); 懸濁液	0.05%		
	口腔; GUM, 咀嚼	28.80MG	舌下適用	50mg/g
	口腔; 貼布, 制御放出	66.00MG		
	歯科L; 溶液	15.00%	歯科外用及び口中用	900mg
	歯科L; 錠剤	0.53MG		
	筋肉 - 静脈皮下; 注射	15.36%		
	筋肉 - 静脈皮下; パウダー FOR	1.20%		
	筋肉 静脈; 注射	15.00%		
	筋肉 皮下; 注射	1.60%		
	吸入 ; 溶液	7.30%	吸入剤	250mg
	皮内; 注射	1.60%	筋肉内注射	60mg
	筋肉; I注射	1.24%	その他の注射	2mg
	筋肉; 注射	1.78%		
	静脈; 乳液, 注射	2.25%	静脈内注射	60mg
	静脈; I注射	2.25%		
	静脈; 注射	12.62%		
	イオントフォレシス; 貼布, 制御放出	168.10MG		
	静脈皮下; 注射	1.20%		
	静脈(点滴); 乳液, 注射	22.50%		
	静脈(点滴); 注射	2.50%		
	鼻; 溶液	2.50%		
	鼻; 定量用スプレー	0.22%		
	眼; 乳液	2.20%	眼科用剤	25mg/g
	眼; 溶液	3.00%		
	眼; 溶液, 点滴剤	2.60%		
	眼; 懸濁液	2.50%		
	眼; 懸濁 点滴剤	2.50%		
	経口 BAR, 咀嚼剤	48.00MG	経口投与	6g
	経口 カプセル	197.88MG		
	経口 カプセル(即時型/複合型)リ	75.00MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル(即時型/複合型リ)	25.00MG		
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	31.20MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	223.80MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	40.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	132.31MG		
	経口 濃縮物	75.00%		
	経口 点滴剤	10.00%		
	経口 液体	22.00%		
	経口 溶液	95.00%		
	経口 溶液, 濃縮物	20.00%		
	経口 溶液, エリキシル剤	75.00%		
	経口 溶液, シロップ	20.00%		
	経口 懸濁液	95.00%		
	経口 懸濁 点滴剤	25.00%		
	経口 懸濁 液体	50.00%		
	経口 シロップ	86.00%		
	経口 錠剤	16.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リ-	1.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	0.91MG		
	経口 錠剤, 徐効	3.45MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	0.13MG		
	経口28; 錠剤	0.28MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	0.13MG		
	PERFUSION, BILIARY; 液体	2.50%		
	直腸; 坐薬	128.00MG	直腸腔尿道適用	520mg
	皮下; I注射	2.00%	皮下注射	48mg
	皮下; 注射	32.50%		
	皮下; 懸濁 注射	1.60%		
	局所; クリーム,	4.00%	一般外用剤	0.92mL/mL
	局所; クリーム, 乳液, 徐放	2.00%	その他の外用	150mg/g
	局所; 乳液, エアロゾル FOAM	2.11%		
	局所; 乳液, クリーム	20.00%		
	局所; ゲル	20.00%		
	局所; ローション	50.00%		
局所; 貼布, 制御放出	168.10MG			
局所; 溶液	50.00%			
局所; 懸濁液	5.00%			
経皮; フィルム, 制御放出	306.20MG			
経皮; ゲル	5.00%	経皮	600mg	
腔; 乳液, クリーム	5.00%			
腔; ゲル	14.51%			
腔; 坐薬	227.90MG			
GLYCERYL CAPRYLATE (中鎖脂肪)	経口 カプセル, 軟ゼラチン	400.00MG	経口投与	適量
	経口 溶液	34.91%	一般外用剤 舌下適用 直腸腔尿道適用 静脈内注射	300mg/g 100mg/g 977mg 360mg/kg
GLYCERYL MONOSTEARATE	耳 (耳性); 懸濁液	0.50%	舌下適用	80mg/g
	歯科L; パースト	64.00MG	直腸腔尿道適用	4g
	眼; 懸濁液	0.50%		
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	1.89MG	経口投与	1.28g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	0.95MG	一般外用剤	200mg/g
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	13.75MG	親油型モノステアリン酸グリセ	
	経口 カプセル, 徐効	27.00MG	一般外用剤	141mg/g
	経口 顆粒 経口懸濁液用	1.90MG	直腸腔尿道適用	972mg/g
	経口 錠剤	6.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リ-	0.25MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	5.0e-03MG		
	経口 錠剤, 徐放	0.52MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	7.50MG		
	経口 錠剤, 徐効	154.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	264.30MG		
	直腸; 坐薬	32.30MG		
	舌下 錠剤	1.23MG		
局所; 乳液, クリーム	20.00%			

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	皮下; 溶液, 注射	0.11%	皮下注射	2mg/kg(体重)
HYALURONATE SODIUM	関節内; I注射	2.30%	一般外用剤	2000mg/g
	筋肉; I注射	2.30%	眼科用剤	0.2mg/g
	硝子体内; I注射	2.30%		
	局所; ゲル	2.50%		
HYDROCHLORIC ACID	AN浸潤; 注射	0.64%	皮内注射	適量
	耳 (耳性); 溶液	0.37%	耳鼻科用剤	適量
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	0.06%	局所麻酔注射	80 μL
	耳 (耳性); 懸濁液	0.04%	その他の注射	2.94 μL
	筋肉 静脈; I注射	0.02%	筋肉内注射	30 μL
	吸入 ; エアロゾル, 定量	1.72%	吸入剤	適量
	吸入 ; 溶液	3.50%	脊椎腔内注射	適量
	筋肉; I注射	8.00%	直腸腔尿道適用	4.24mg/mg
	静脈; I注射	8.00%	静脈内注射	0.256mL
	静脈; 注射	10.00%	動脈内注射	2.94 μL
	静脈; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	16.00%	歯科注射	適量
	静脈; 溶液	1.82%	歯科外用及び口中用	4.5 μL
	静脈(点滴); 注射	1.44%		
	静脈(点滴); パウダー FOR 注射 懸	0.83%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	12.70%		
	鼻; 溶液	24.70%		
	神経ブロック; 注射	0.64%		
	眼; 溶液	1.06%	眼科用剤	適量
	眼; 溶液, 点滴剤	0.17%		
	経口 濃縮物	3.10%	経口投与	42 μL
	経口 溶液	9.51%		
	経口 懸濁液	10.00%		
	経口 シロップ	0.20%		
	皮下; 注射	0.17%	皮下注射	30 μL
	皮下; 懸濁 注射	0.22%	溶解剤	4.86 μL
	局所; 乳液, クリーム	0.34%	一般外用剤	4.5 μL/mL
局所; シャンプー	4.00%	その他の外用	適量	
局所; 溶液	1.24%			
HYDROCHLORIC ACID, DILUTED	AN浸潤; 注射	1.36%	静脈内注射	26.25 μL
	神経ブロック; 注射	1.36%	筋肉内注射	12 μL
	経口 溶液	2.75%	経口投与	0.02mL
	経口 噴霧	0.24%	皮下注射	12 μL
	局所; シャンプー	2.35%	局所麻酔注射	4.2 μL、
	局所; 溶液	5.55%		
HYDROGENATED CASTOR OIL(硬)	経口 カプセル	8.00MG	経口投与	2.8g
	経口 カプセル, 徐放	2.40MG	経皮	28.8mg
	経口 カプセル, 徐効	410.82MG	直腸腔尿道適用	5.38g
	経口 錠剤	37.60MG	歯科外用及び口中用	210mg
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	1.30MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	3.30MG		
	経口 錠剤, 徐効	295.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	5.00MG		
	経口21; 錠剤	0.93MG		
	経口28; 錠剤	0.93MG		
	舌下 錠剤	1.60MG		
	局所; ゲル	2.00%	一般外用剤	80mg/g
HYDROGENATED SOYBEAN OIL	経口 カプセル	1.00MG	経口投与	45mg
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	15.30MG		
	経口 錠剤	13.50MG		
	経口 錠剤, 被覆	3.00MG		
HYDROXYETHYL CELLULOSE	耳 (耳性); 溶液	0.25%	歯科外用及び口中用	15mg/g
	口腔; フィルム, 溶解(性)	39.88MG		
	眼; 溶液	0.50%	眼科用剤	5.3mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	0.50%		
	眼; 懸濁液	0.25%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.35%		
	経口 カプセル	2.98MG	経口投与	60mg
	経口 溶液	2.25%		
	経口 懸濁液	15.00%		
経口 シロップ	10.00%			

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 錠剤	12.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	11.80MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	45.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	10.45MG		
	経口 錠剤, 徐効	150.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	140.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	47.99MG		
	局所; ゲル	1.25%	一般外用剤	25mg/g
	局所; ローション	0.80%		
	局所; 溶液	0.75%		
	局所; 海綿	9.09MG		
	局所; 懸濁液	0.68%		
	経皮; フィルム, 制御放出	20.00MG		
HYDROXYPROPYL CELLULOSE	口腔; フィルム, 溶解(性)	72.91MG	筋肉内注射	25mg
	口腔; GUM, 咀嚼	27.92MG	その他の内用	88mg
	経口 カプセル	36.00MG	経口投与	7.05g
	経口 カプセル, 被覆 丸薬	3.96MG	舌下適用	8mg
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	8.88MG	直腸腔尿道適用	60mg
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	41.40MG	耳鼻科用剤	1mg/g
	経口 カプセル, 徐放	214.48MG	歯科外用及び口中用	120mg
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	71.30MG	その他外用	10mg/g
	経口 カプセル, 徐効	41.50MG		
	経口 顆粒	10.40MG		
	経口 顆粒 FOR 経口懸濁液	39.00MG		
	経口 顆粒 FOR 再構成	20.00MG		
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	31.40MG		
	経口 パウダー FOR 経口懸濁液	6.70%		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	4.00E-06		
	経口 錠剤	46.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	24.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	2.85MG		
	経口 錠剤, 被覆	8.36MG		
	経口 錠剤, 制御放出	43.80MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	15.00MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	9.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	69.60MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	131.67MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 徐放	107.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	10.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	240.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	15.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	187.60MG		
	舌下 錠剤	1.00MG		
	局所; ゲル	4.00%	一般外用剤	30mg/g
	局所; ローション	0.54%		
	局所; ローション, 増加された	0.54%		
	局所; 貼布	1.26MG		
	局所; 溶液	0.60%		
	経皮; フィルム, 制御放出	19.00MG	経皮	80mg
	経口 錠剤	16.00MG	殺虫剤	
HYDROXYPROPYL	口腔; GUM, 咀嚼	14.00MG	経口投与	480mg
	口腔; 錠剤	2.25MG	一般外用剤	5mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	0.50%	眼科用剤	3.5mg/g
	経口 カプセル	3.50MG		
	経口 顆粒, 腸溶性 被覆	33.20MG		
	経口 錠剤	50.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	17.00MG		
HYDROXYPROPYL	鼻; 溶液, 噴霧	0.10%	一般外用剤	280mg/g
	鼻; 定量用スプレー	0.10%	舌下用剤	6mg
	眼; 溶液	0.50%	眼科用剤	3mg/g
	眼; 懸濁液	0.50%	歯科外用及び口中用	138mg
	眼; 懸濁 点滴剤	0.50%	耳鼻科用剤	2.5mg
	経口 カプセル	40.55MG	経口投与	1g
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	33.42MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	13.82MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル, 徐放	10.60MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	2.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	10.88MG		
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	4.77MG		
	経口 顆粒 FOR 経口懸濁液	26.60MG		
	経口 パウダー FOR 再構成	1.59%		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	3.00%		
	経口 懸濁液	0.50%		
	経口 シロップ	2.25%		
	経口 錠剤	54.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	16.76MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	11.80MG		
	経口 錠剤, 被覆	29.25MG		
	経口 錠剤, 制御放出	20.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	19.00MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	445.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	150.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	60.00MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 被覆	22.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	7.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	250.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	6.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	54.00MG		
	経口 21; 錠剤	0.75MG		
	経口 28; 錠剤	0.75MG		
HYPROMELLOSE 2208 (15000)	経口 カプセル	80.25MG	経口投与	40mg
	経口 カプセル, 徐効	336.00MG	一般外用剤	15mg/g
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	2.77MG	眼科用剤	1mg/g
	経口 錠剤	86.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	33.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出	7.80MG		
	経口 錠剤, 徐放	320.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	480.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	94.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	200.00MG		
	腔; 乳液, クリーム	0.30%	殺虫剤	
HYPROMELLOSE PHTHALATE	経口 カプセル	16.80MG	200731型	
	経口 カプセル, 被覆 丸薬	13.26MG	経口投与	504mg
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	97.20MG	一般外用剤	54mg
	経口 カプセル, 徐放	37.80MG	歯科外用剤及び口中用	0.019mg
	経口 カプセル, 徐効	19.63MG	220824型	
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	302.40MG	経口投与	175mg
	経口 錠剤	104.40MG		
	経口 錠剤, 徐放性 腸溶性 被覆	44.57MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	119.40MG		
ISOPROPYL ALCOHOL	経口 カプセル	46.40MG	一般外用剤	700mg/g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	300.50MG		
	経口 カプセル, 徐効	392.80MG		
	経口 錠剤	5.21MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	0.20MG		
	経口 錠剤, 徐効	0.50ML		
	経口 21; 錠剤	2.00MG		
	局所; エアロゾル, 定量	4.00%		
	局所; エアロゾル, 噴霧	10.00%		
	局所; ゲル	20.00%		
	局所; ローション	78.00%		
	局所; ローション,	30.00%		
	局所; 溶液	51.50%		
	局所; 海綿	56.10ML		
ISOPROPYL MYRISTATE	耳 (耳性); 懸濁液	0.02%		
	局所; 乳液, エアロゾル FOAM	7.90%	直腸腔尿道適用	50mg/g
	局所; 乳液, クリーム	10.00%	一般外用剤	450mg/g
	局所; 乳液, ローション	1.00%	舌下適用	100mg/g
	局所; ゲル	10.00%	その他の外用	44 μg
	局所; ローション	2.00%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; 軟膏 経皮; ゲル 腔; 乳液, クリーム	35.00% 0.86% 5.00%	経皮 12mg/g 殺虫剤	
ISOPROPYL PALMITATE	局所; クリーム, 乳液, 徐放 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 経皮; フィルム, 制御放出	1.80% 5.50% 3.90% 187.50MG	一般外用剤 舌下適用	102mg/g 15mg/g
ISOSTEARIC ACID	局所; 乳液, クリーム	25.00%	一般外用剤	60mg/g
ISOSTEARYL ALCOHOL	局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 懸濁液	3.00% 25.00% 2.50%	一般外用剤	30mg/g
ISOTONIC SODIUM CHLORIDE	静脈; 注射	0.90%	経口投与 静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 動脈内注射 皮内注射 歯科注射 その他の注射 一般外用剤 経皮 直腸腔尿道適用	適量 適量 適量 適量 適量 50mL 適量 適量 適量 適量 0.6mg/g 微量
KAOLIN	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 シロップ 経口 錠剤 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, 徐効	14.61MG 1.00% 30.40MG 8.00MG 18.50MG 66.00MG	経口投与 一般外用剤 その他の外用 殺虫剤	504mg 30mg/g 380mg
KARAYA GUM(カラヤガム末)	口腔; 貼布, 制御放出	68.10MG	歯科外用及び口中用	210mg
LACTIC ACID	AN浸潤; 注射 筋肉 - 静脈皮下; 注射 心臓内; 注射 静脈; I注射 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射 神経ブロック; 注射 経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体- 経口 濃縮物 皮下; 注射 局所; 乳液, エアロゾル 局所; 乳液, クリーム 局所; ゲル 局所; ローション 局所; 溶液 局所; 懸濁液 腔; 乳液, クリーム 腔; 錠剤 静脈(点滴); 注射 局所; 溶液 静脈; I注射 静脈; 注射 皮下; 注射	0.11% 0.01% 0.01% 7.11% 0.71% 32.20% 0.11% 0.11% 44.00MG 5.00% 0.34% 1.05% 1.00% 6.07% 5.70% 18.06% 0.70% 0.81% 70.00MG 2.82% 7.40% 0.40% 0.30% 0.30%	その他の注射 筋肉内注射 静脈内注射 経口投与 一般外用剤 皮下注射	120mg 36mg 214.5mg 480mg 100mg/g 34mg
LACTOSE(無水乳糖)	口腔/舌下 錠剤 口腔; 錠剤 筋肉 - 静脈皮下; パウダー FOR 吸入 ; カプセル 吸入 ; カプセル, 硬ゼラチン 吸入 ; 粉末 腔内療法; パウダー FOR 注射 溶 筋肉; パウダー FOR 注射 溶液 筋肉; パウダー FOR 注射 溶液, 凍 静脈; 注射 静脈; パウダー FOR 注射 溶液 静脈; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	296.70MG 183.30MG 13.30% 20.00MG 25.00MG 9.00% 19.38% 2.00% 1.00% 50.00% 5.00% 1.00%	経口投与	2.4g

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	静脈(点滴); 溶液, 注射	0.45%		
	経口 カプセル	530.00MG		
	経口 カプセル, 被覆 丸薬	102.44MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	135.20MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	100.00MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	115.75MG		
	経口 カプセル, 徐効	120.00MG		
	経口 溶液	90.00%		
	経口 錠剤	1020.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	117.70MG		
	経口 錠剤, 被覆	332.05MG		
	経口 錠剤, 制御放出	69.25MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION	92.02MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	209.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	590.00MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 徐放	122.00MG		
	経口 錠剤, 復効	153.20MG		
	経口 錠剤, 徐効	400.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	51.10MG		
	経口 錠剤, 徐放, フィルム 被覆	38.75MG		
	経口20; 錠剤	70.70MG		
	経口21; 錠剤	89.27MG		
	経口28; 錠剤	179.20MG		
	直腸; 溶液	90.00%		
	直腸; 錠剤	65.38MG		
	皮下; パウダー FOR 注射 溶液	2.00%		
	皮下; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	0.50%		
	舌下 錠剤	191.76MG		
	経皮; フィルム, 制御放出	675.00MG		
	経皮; 軟膏	18.90%		
	腔; 乳液, クリーム	3.00%		
腔; 錠剤	1013.00MG			
LACTOSE MONOHYDRATE	口腔; 錠剤	21.37MG	歯科外用及び口中用	500mg
	筋肉 - 静脈皮下; パウダー 注射	10.70%		
	筋肉 静脈; 粉末	2.75%	筋肉内注射	193.8mg
	筋肉 皮下; 注射	2.10%	皮下注射	96.9mg
	腔内療法; パウダー FOR 注射 溶	4.54%		
	筋肉; 注射	5.00%		
	静脈; 注射	90.00%	静脈内注射	1250mg
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	69.00%	動脈内注射	180mg
	静脈皮下; 注射	4.90%	皮内注射	0.5mg
	静脈(点滴); パウダー 注射用 溶液	20.00%	経皮	180mg
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用,	90.00%		
	経口 カプセル	427.26MG	経口投与	適量
	経口 カプセル(即時型/複合型リ	156.11MG		
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	178.90MG		
	経口 カプセル, 徐放	23.30MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	161.80MG		
	経口 カプセル, 徐効	67.00MG		
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	18.80MG		
	経口 DISPERSIBLE 錠剤	543.60MG		
	経口 パウダー 吸入用	1.25%		
	経口 錠剤	586.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	245.19MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	62.30MG		
	経口 錠剤, 被覆	346.50MG		
	経口 錠剤, 制御放出	152.75MG		
	経口 錠剤, 徐放性	203.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	157.95MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	150.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	538.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	587.44MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 被覆	22.70MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	29.75MG		
	経口 錠剤, 復効	25.00MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤, 徐効	299.20MG		
	経口錠剤, 徐効, 被覆	215.00MG		
	経口錠剤, 徐効, フィルム被覆	260.00MG		
	経口錠剤, 徐効, 多層構造, フィルム	374.50MG		
	経口錠剤, 徐放, フィルム被覆	81.90MG		
	経口21; 錠剤	83.64MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	35.19MG		
	経口28; 錠剤	93.86MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	82.89MG		
	(吸入); カプセル	25.00MG	吸入剤	399.2mg
	(吸入); パウダー吸入用	2.00%		
	舌下錠剤	33.87MG	舌下適用	756mg
	腔; 挿入	760.50MG	直腸腔尿道適用	1136mg
	腔; 錠剤, フィルム被覆	17.90MG		
LACTOSE MONOHYDRATE -	経口錠剤	422.52MG	経口投与	
	経口錠剤, 徐放	121.50MG		
LACTOSE, HYDROUS (乳糖水和)	筋肉静脈; 注射	2.50%	筋肉内注射 193.8mg	
	筋肉静脈; パウダー注射溶液用	2.50%	皮下注射 96.9mg	
	筋肉; パウダー注射溶液用, 凍結	1.05%	動脈内注射 180mg	
	静脈; 注射	25.00%	静脈内注射 1250mg	
	静脈; パウダー注射溶液用	75.00%	皮内注射 0.5mg	
	静脈(点滴); パウダー注射溶液用	20.00%	直腸腔尿道適用 1136mg	
	経口カプセル	430.42MG	経口投与 適量	
	経口カプセル, 硬ゼラチン	141.00MG	歯科外用及び口中用 500mg	
	経口カプセル, 徐効	147.60MG	吸入剤 399.2mg	
	経口顆粒 懸濁液用		経皮 180mg	
	経口錠剤	708.90MG		
	経口錠剤 (即時型/複合型) リー	100.00MG		
	経口錠剤, 被覆	186.00MG		
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆	88.50MG		
	経口錠剤, 徐放	43.23MG		
	経口錠剤, フィルム被覆	556.00MG		
	経口錠剤, 復効	155.28MG		
	経口錠剤, 徐効	156.80MG		
	経口錠剤, 徐効, 被覆	83.30MG		
	経口21; 錠剤	48.00MG		
	経口28; 錠剤	39.62MG		
	舌下錠剤	164.38MG	舌下適用 756mg	
	腔; 錠剤	596.00MG		
LANOLIN (精製ラノリン)	眼; 軟膏	2.00%	一般外用剤	555mg/g
	局所; 乳液, クリーム	2.00%	舌下適用	70mg/g、
	局所; ローション	2.50%	その他の外用	21.3mg/g
	局所; 軟膏	2.00%	眼科用剤	150mg/g
	腔; 乳液, クリーム	2.00%	直腸腔尿道適用	166mg/g
			加水ラノリン	
			経皮	0.49g/g
			歯科外用及び口中用	300mg/g
			その他の外用	1.13mg/g
			還元ラノリン	
			一般外用剤	60mg/g
			その他の外用	1mg/g
			吸着精製ラノリン	
			一般外用剤	3mg/g
LANOLIN ALCOHOLS	眼; 軟膏	10.00%	一般外用剤	200mg/g
	局所; 乳液, クリーム	6.00%	舌下適用	3.5mg
	局所; 軟膏	3.01%		
LAURETH-2 (ラウロマクロゴール)	局所; シャンプー	2.00%		
LAURETH-23 (ラウロマクロゴール)	局所; エアロゾル	0.45%	経口投与	8mg
	局所; 乳液	0.45%	一般外用剤	150mg/g
	局所; 乳液, エアロゾル	1.07%	経皮	160mg
			舌下適用	50mg/g
			直腸腔尿道適用	80mg/g
			歯科外用及び口中用	0.7mg/g
			その他の外用	10mg
			殺虫剤	

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
LAURIC DIETHANOLAMIDE	局所; 乳液	15.00%	一般外用剤	30mg/g
	局所; ローション	1.70%		
	局所; シャンプー	20.00%		
	局所; シャンプー, 懸濁液	4.00%		
	局所; 溶液	1.41%		
	局所; 懸濁液	0.47%		
LECITHIN (大豆レシチン)	吸入 ; エアロゾル, 定量	2.00E-06	吸入剤	3.36mg
	筋肉; 注射	2.30%	一般外用剤	20mg/g
	経口 BAR, 咀嚼剤	54.00MG	経口投与	300mg
	経口 カプセル	15.00MG	その他の内用	134mg
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	1.00MG	直腸腔尿道適用	120mg
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	2.60MG	経皮	28mg
	経口 パウダー FOR 懸濁液	16.70%	精製大豆レシチン	
	経口 懸濁液	11.00%	経口投与	120mg
	直腸; 坐薬	6.50MG	静脈内注射	1.2g
	局所; ゲル	1.00%	一般外用剤	10mg/g
	局所; 溶液	1.40%		
	経皮; フィルム, 制御放出	9.86MG		
	腔; 乳液, クリーム	1.00%		
	LECITHIN, EGG (精製卵黄レシチン)	静脈; 乳液, 注射	1.20%	静脈内注射
静脈; I注射		1.20%		
経口 錠剤		48.00MG		
LECITHIN, HYDROGENATED (水素)	耳 (耳性); 懸濁 液体	1.50%	一般外用剤	160mg/g
LECITHIN, HYDROGENATED	吸入 ; エアロゾル, 定量	0.28%	一般外用剤	160mg/g
	静脈; 注射, パウダー 凍結乾燥, リ	21.30%	部分水素添加大豆リン脂質	
	静脈; 注射, 懸濁 リポソーム	0.95%	一般外用剤	2mg/g
LECITHIN, SOYBEAN (大豆レシチ)	吸入 ; エアロゾル, 定量	0.10%	経口投与	300mg
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	11.25%	その他の内用	134mg
	経口 カプセル	5.00MG	一般外用剤	20mg/g
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	20.00MG	直腸腔尿道適用	120mg
	経口 懸濁液	0.20%	吸入剤	3.36mg
	腔; 乳液, クリーム	0.33%	経皮	28mg
LEMON OIL	経口 カプセル	5.00MG	経口投与	9mg
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	8.50MG	歯科外用及び口中用	116mg
	経口 錠剤	7.0e-04ML		
	局所; ゲル	1.00%		
LEUCINE (L-ロイシン)	静脈 (点滴); 注射	52.60%	皮下注射	20mg
	静脈 (点滴); 溶液, 注射	27.00%	筋肉内注射	20mg
	経口 錠剤	3.60MG		
LEVOMENTHOL (l-メントール)	口腔; GUM, 咀嚼	3.84MG	経口投与	45mg
	口腔; 吸入	0.10%	一般外用剤	40mg/g
	舌下 エアロゾル, 定量	2.00E-05	経皮	0.5mg
	口腔; GUM, 咀嚼	3.84MG	舌下適用	2mg
			直腸腔尿道適用	5mg/g
			眼科用剤	5mg/g
		耳鼻科用剤	0.3mg	
		歯科外用及び口中用	10mg/g	
		その他の外用	1.05mg	
LIGHT MINERAL OIL (軽質流動パラ)	経口 カプセル	0.80MG	経口投与	6mg
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	14.10MG	一般外用剤	250mg/g
	経口 香錠	3.60MG	直腸腔尿道適用	200mg
	経口 錠剤	1474.00MG	歯科外用及び口中用	1.30mg/g
	経口 錠剤, 被覆	4.80MG	その他の外用	70mg/g
	経口 錠剤, フィルム 被覆	2.49MG		
	経口 錠剤, 徐効	0.20MG		
	局所; クリーム,	25.00%		
	局所; 乳液	5.00%		
	局所; 乳液, エアロゾル FOAM	5.26%		
	局所; 乳液, クリーム	20.00%		
	局所; ローション	16.00%		
	局所; 軟膏	23.00%		
	経皮; フィルム, 制御放出	162.00MG		
LYSINE (L-リジン塩酸塩)	静脈 (点滴); 注射	61.00%	静脈内注射	8mg
	静脈 (点滴); 溶液, 注射	22.00%	皮下注射	0.05mg
MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE	経口 点滴剤	0.41%	経口投与	225mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 顆粒	8.30MG	一般外用剤	10mg/g
	経口 懸濁液	60.00%	殺虫剤	
	経口 錠剤	48.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	8.00MG		
	直腸; 懸濁液	60.00%		
	局所; 乳液, クリーム	1.50%		
	局所; ローション	1.50%		
	局所; シャンプー, 懸濁液	0.85%		
	腔; 軟膏	5.00%		
	経口 点滴剤	0.41%		
	経口 顆粒	8.30MG		
	経口 懸濁液	60.00%		
	経口 錠剤	48.00MG		
MAGNESIUM ASPARTATE	経口 錠剤	1.50MG	経口投与	10mg
MAGNESIUM CARBONATE	経口 カプセル	19.44MG	経口投与	300mg
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	22.40MG	一般外用剤	35mg/g
	経口 カプセル, 徐効	22.40MG	その他の外用	200mg/g
	経口 錠剤	175.00MG	殺虫剤	
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	100.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	1.15MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	250.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	250.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	10.00MG		
MAGNESIUM CHLORIDE	眼内「溶液	0.03%	経口投与	60mg
	腹腔内; 溶液	0.50%	一般外用剤	80mg/g
	硝子体内; 懸濁 注射	0.03%	眼科用剤	2mg/g
	静脈(点滴); 注射	10.20%	静脈内注射	213.6mg
	眼; パウダー FOR 溶液	0.03%	歯科外用及び口中用	50mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	6.50E-05		
	皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結	0.12%		
MAGNESIUM HYDROXIDE	経口 パウダー 経口懸濁液用	25.00%	経口投与	477mg
	経口 錠剤	40.00MG	殺虫剤	
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	450.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	60.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	43.40MG		
MAGNESIUM OXIDE	口腔; GUM, 咀嚼	7.20MG	経口投与	750mg
	経口 カプセル	10.00MG	一般外用剤	400mg/g
	経口 錠剤	26.40MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	63.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	40.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	25.74MG		
MAGNESIUM SILICATE	経口 カプセル	40.00MG	経口投与	984.8mg
	経口 錠剤	10.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	29.03MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	30.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	14.30MG		
MAGNESIUM STEARATE	口腔/舌下 錠剤	17.50MG		
	口腔; 錠剤	4.00MG		
	移植; 注射	1.50E-05		
	硝子体内; 筋肉PLANT	4.8e-03MG		
	硝子体内; 注射	1.50E-05		
	経口 カプセル	256.40MG	経口投与	3g
	経口 カプセル(即時型/複合型リ)	10.00MG	一般外用剤	40mg/g
	経口 カプセル, 被覆 丸薬	0.15MG	経皮	14.4mg
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	3.00MG	舌下適用	70mg
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	2.60MG	直腸腔尿道適用	34mg
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	34.87MG	耳鼻科用剤	0.18mg/g
	経口 カプセル, 徐放	9.15MG	歯科外用及び口中用	225mg
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	11.40MG	その他の外用	40mg/g
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	9.00MG	殺虫剤	
	経口 カプセル, 徐効	100.00MG		
	経口 分散錠剤	0.32MG		
	経口 顆粒	1.25MG		
	経口 顆粒 経口懸濁液用	2.60MG		
	経口 粘奨剤	4.50MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 パウダー 吸入用	2.80E-05		
	経口 パウダー 経口懸濁液用	0.30%		
	経口 パウダー 懸濁液用	3.25%		
	経口 懸濁液	5.75%		
	経口 懸濁 徐効	2.70%		
	経口 錠剤	400.74MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	6.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	20.50MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	50.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	40.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出	12.40MG		
	経口 錠剤, 徐放性	9.50MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	53.80MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	7.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	1200.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	28.31MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 被覆	3.00MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 徐放	1.20MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	71.43MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	6.00MG		
	経口 錠剤, 復効	1.50MG		
	経口 錠剤, 徐効	150.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	10.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	15.80MG		
	経口 錠剤, UN被覆, トローチ	20.00MG		
	経口 トローチ	21.00MG		
	経口 20; 錠剤	1.50MG		
	経口 21; 錠剤	1.50MG		
	経口 21; 錠剤, 被覆	0.88MG		
	経口 28; 錠剤	75.00MG		
	経口 28; 錠剤, 被覆	0.88MG		
	皮下; 筋肉 PLANT	0.50MG		
	舌下 錠剤	3.00MG		
	局所; 乳液, クリーム	8.00E-06		
	腔; 挿入	23.00MG		
	腔; 海綿	0.85MG		
	腔; 錠剤	17.00MG		
	腔; 錠剤, フィルム 被覆	0.40MG		
MAGNESIUM SULFATE (硫酸マグネ)	経口 錠剤	2.90MG	静脈内注射	50mg
	経口 錠剤, 徐放	4.00MG	筋肉内注射	15mg
	経口 錠剤, フィルム 被覆	14.00MG	局所麻酔注射	75mg
	経口 カプセル	29.80MG	一般外用剤	7mg/g
			皮下注射	1mg
			殺虫剤	
MAGNESIUM TRISILICATE (ケイ酸マ)	経口 錠剤	76.89MG	経口投与	984.8mg
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	15.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	20.00MG		
MALEIC ACID	静脈 (点滴); I注射ができる	0.01%	経口投与	1.6mg
	経口 カプセル	2.00MG	筋肉内注射	2mg
	経口 シロップ	0.17%		
	経口 錠剤	4.00MG		
MALIC ACID (DL- リンゴ酸)	経口 溶液	3.30%	経口投与	450mg
	経口 溶液 (L-)	0.21%	一般外用剤	14mg/g
			歯科外用及び口中用	33mg/g
MALTITOL	経口 溶液	65.00%	経口投与	200mg
MALTODEXTRIN (デキストリン)	経口 顆粒 懸濁液用	238.10MG	経口投与	12.015g
	経口 粉末	26.68%	一般外用剤	83.6mg/g
	経口 パウダー 懸濁液用	19.00%	歯科外用及び口中用	28mg
	経口 錠剤	80.00MG	注腸	53.065g
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	292.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	5.60MG		
	経口 錠剤, 徐放	150.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	72.50MG		
	経口 28; 錠剤	0.15MG		
MALTOL	経口 濃縮物	0.01%	経口投与	1.6mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 溶液	0.05%		
MANNITOL (D-マンニトール)	口腔/舌下 錠剤	52.50MG		
	口腔; 錠剤	97.68MG		
	筋肉 静脈; 注射	2.50%	動脈内注射	0.3mg
	筋肉 静脈; パウダー 注射 溶液用	30.00%	筋肉内注射	50mg
	筋肉 皮下; パウダー 注射 溶液用	2.00%		
	筋肉; 注射	10.66%	皮内注射	0.39mg
	筋肉; 注射, 微小球	13.49%	その他の注射	70mg
	筋肉; パウダー 注射 溶液用	11.92%	一般外用剤	50mg/g
	筋肉; パウダー 注射 溶液用, 凍結	8.50%	経皮	260mg
	筋肉; パウダー 注射 溶液用, 凍結	3.60%	舌下適用	300mg/g
	筋肉; パウダー 注射 懸濁用 凍結	5.19%	直腸腔尿道適用	41.49mg
	静脈; I注射	45.00%	静脈内注射	3200mg
	静脈; 注射	13.00%	歯科外用及び口中用	3.5mg/g
	静脈; 液体, 濃縮物, 注射	6.13%	その他の外用	2mg
	静脈; 粉末	45.00%	眼科用剤	41mg/g
	静脈; パウダー 注射 溶液用	34.00%		
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	60.00%		
	静脈; 溶液	4.15%		
	静脈; 溶液, 注射			
	静脈(点滴); 注射	20.00%		
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用	75.00%		
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用,	93.75%		
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用,	7.50%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	45.00%		
	眼; パウダー FOR 溶液	5.60%		
	眼; 溶液	23.00%		
	眼; 溶液, 点滴剤	4.60%		
	眼; 溶液, ゲル形成, 徐放	4.35%		
	眼; 懸濁液	2.40%		
	眼; 懸濁 点滴剤	4.00%		
	経口 カプセル	297.20MG	経口投与	8g
	経口 カプセル(即時型/複合型)	264.80MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	236.00MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	92.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	56.10MG		
	経口 分散 錠剤	8.60MG		
	経口 顆粒	484.20MG		
	経口 顆粒 懸濁液用	500.00MG		
	経口 パウダー 経口 溶液用	721.00MG		
	経口 パウダー 再構成用	29.36%		
	経口 パウダー 懸濁液用	20.00%		
	経口 溶液, 注射	5.00%		
	経口 錠剤	991.77MG		
	経口 錠剤(即時型/複合型)リリー	48.88MG		
	経口 錠剤(即時型/複合型)リリー	600.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	177.70MG		
	経口 錠剤, 制御放出			
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	42.70MG		
	経口 錠剤, 分散	90.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	30.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	218.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	606.72MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	221.00MG		
経口 錠剤, 徐効	392.20MG			
経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	274.97MG			
経口 トローチ	1035.17MG			
パウダー吸入 用	0.05%			
皮下; I注射	3.60%			
皮下; 注射	4.50%			
皮下; パウダー 注射 溶液用	9.00%			
皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結	22.05%			
皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結	4.00%			
皮下; パウダー 注射 懸濁用 凍結	10.00%			
皮下; 溶液, 注射	10.32%	皮下注射	210mg	

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	皮下; 懸濁 注射 舌下 錠剤 粘膜; 溶液, 注射 局所; 溶液 局所; 溶液, 点滴剤 局所; 懸濁 点滴剤 経口 錠剤 (即時型/複合型リリー 経口 錠剤, 口腔内崩壊 経口 錠剤, 口腔内崩壊	3.64% 158.45MG 5.00% 1.60% 1.60% 1.01% 32.58MG 174.78MG 174.76MG		
MEGLUMINE	筋肉; 注射 静脈; 点滴 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 錠剤 尿管; 溶液	15.92% 2.30% 15.92% 7.23% 3.00MG 24.00MG 7.23%	静脈内注射 経口投与	15.4g 80mg
MENTHOL (トメントール)	口腔; GUM, 咀嚼 吸入 ;エアロゾル, 定量 経口 カプセル 経口 濃縮物 経口 溶液 経口 溶液, 液体, 濃縮物, 経口 懸濁液 経口 シロップ 経口 錠剤 経口 錠剤, 口腔内崩壊 局所; ローション 局所; 溶液	10.00MG 0.05% 0.87MG 5.00E-05 0.07% 0.05% 0.04% 0.75% 0.58MG 14.00MG 0.05% 0.08%	経口投与 一般外用剤 経皮 舌下適用 直腸腔尿道適用 眼科用剤 耳鼻科用剤 歯科外用及び口中用 その他の外用 dl-メントール 経口投与 一般外用剤 歯科外用及び口中用	45mg 40mg/g 0.5mg 2mg 5mg/g 5mg/g 0.3mg 10mg/g 1.05mg 40mg 4mg 30mg/g
METAGRESOL (m-クレゾール)	筋肉 - 静脈皮下; 注射 筋肉 皮下; 注射 皮下; 注射 筋肉; パウダー注射 溶液用, 凍結 静脈(点滴); 注射 皮下; 注射 皮下; 注射 皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結 皮下; 溶液, 注射 皮下; 懸濁 注射	0.10% 0.25% 0.16% 0.30% 0.10% 0.31% 0.45% 0.30% 0.52% 0.17%	静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 皮内注射 クレゾール 静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射	30mg 6mg 30mg 2.0mg 20mg 20mg 158.2mg
METHACRYLIC ACID - ETHYL	経口 カプセル 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐放 経口 カプセル, 徐効 経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン 経口 錠剤 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, 徐効, 被覆 経口 カプセル 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐効 経口 錠剤	75.18MG 80.36MG 40.41MG 48.10MG 10.90MG 91.00MG 140.00MG 6.86MG 15.00MG 56.30MG 93.36MG 22.08MG 13.65MG	経口投与 乾燥メタクリル酸コポリマー 経口投与	700mg 21mg、
METHACRYLIC ACID - METHYL	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐効 経口 錠剤 経口 カプセル	93.36MG 22.08MG 13.65MG 56.30MG	経口投与	800mg
METHACRYLIC ACID - METHYL	経口 カプセル, 徐効 経口 錠剤	28.38MG 0.82MG		
METHACRYLIC ACID COPOLYMER	経口 カプセル 経口 カプセル, 徐放性ACTION 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐放 経口 カプセル, 徐効 経口 顆粒, 腸溶性 被覆 経口 顆粒 FOR 経口懸濁液	22.30MG 37.91MG 95.87MG 18.04MG 44.60MG 430.80MG 69.48MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤 経口錠剤, 徐放性ACTION 経口錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶 経口錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性 経口錠剤, 徐効 経口錠剤, 徐効, 被覆	5.80MG 160.00MG 54.00MG 106.89MG 35.00MG 24.60MG		
METHIONINE (DL -メチオニン)	筋肉; 溶液, 注射 髄腔内; I注射 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射 皮下; 注射 皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結 皮下; 溶液, 注射 皮下; 懸濁 注射	0.04% 5.00E-05 0.30% 49.20% 16.00% 0.01% 0.01% 0.04% 0.15%	筋肉内注射 皮下注射 動脈内注射 皮内注射 L-メチオニン 歯科注射	30mg 1mg 0.125 mg 1mg 25mg
METHYL ALCOHOL	経口カプセル, 徐効 経口濃縮物 経口錠剤 経口錠剤, 被覆 経口錠剤, フィルム 被覆 経皮; フィルム, 制御放出	0.03ML 4.42% 210.00MG 15.70MG 10.36MG 4015.00MG	一般外用剤 殺虫剤	878mg/g
METHYL ETHYL KETONE	経口錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	61.00MG	一般外用剤 舌下適用	適量 適量
METHYL SALICYLATE	経口カプセル 局所; ゲル	16.00MG 1.00%	一般外用剤 歯科外用及び口中用 その他の外用	8mg/mL 0.01g/g、 1.25mg/mL
METHYLCELLULOSE	口腔/舌下錠剤 関節内; 注射 筋肉; 注射 眼; 溶液 経口カプセル 経口カプセル, 徐放 経口カプセル, 徐効 経口パウダー 懸濁液用 経口懸濁液 経口錠剤 経口錠剤(即時型/複合型リリー 経口錠剤, 被覆 経口錠剤, フィルム 被覆 経口錠剤, 徐効 経口28; 錠剤 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション	4.00MG 0.10% 0.10% 0.16% 13.50MG 2.67MG 3.20MG 1.19% 0.12% 183.60MG 50.00MG 138.30MG 21.00MG 96.00MG 15.00MG 1.30% 1.50%	経口投与 経皮 一般外用剤 舌下適用 眼科用剤 歯科外用及び口中用 その他の外用	607.5mg 150mg 70mg/g 8mg 5mg/g 160mg/g 0.353mg
METHYLENE BLUE	静脈; 注射	1.00%	一般外用剤	10 µg/g
METHYL PARABEN	AN浸潤; 注射 耳(耳性); 懸濁液 口腔; フィルム, 溶解(性) 仙骨麻酔; 注射 硬膜外; 注射 筋肉 - 静脈皮下; 注射 筋肉 静脈; I注射 筋肉 静脈; 注射 筋肉 静脈; 溶液 筋肉 皮下; 注射 吸入 ; 溶液 関節内; 注射 滑液嚢内; 注射 皮内; 注射 病巣内; 注射 筋肉; 注射 静脈; I注射 静脈; 注射 静脈; パウダー FOR 注射 溶液 静脈; 溶液, 注射 イオントフォレス; 溶液	0.10% 1.40E-05 0.71MG 0.10% 0.10% 0.44% 0.12% 0.75% 0.12% 0.18% 0.07% 0.24% 0.18% 0.10% 0.15% 0.24% 0.18% 1.80% 1.50% 0.18% 0.10%	経口投与 静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 歯科注射 局所麻酔注射 一般外用剤 経皮 舌下適用 直腸腔尿道適用 眼科用剤 耳鼻科用剤 歯科外用及び口中用 その他の外用 皮内注射 その他の注射 吸入剤	40mg 30mg 25mg 25mg 0.018mg 40mg 26mg/g 0.26mg/g 1.5mg/g 1mg/g 0.25mg/g 1.5mg/g 2mg/g 1.5mg/mL 1.5mg/mL 1.5mg/mL

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	灌注 溶液	2.00%		
	静脈皮下; 注射	0.18%		
	静脈(点滴); 注射	0.44%		
	静脈(点滴); パウダー注射 溶液用	0.10%		
	鼻; 溶液	0.03%		
	鼻; 定量用スプレー	0.70%		
	神経ブロック; 注射	0.10%		
	眼; 軟膏	0.05%		
	眼; 溶液	0.05%		
	眼; 溶液, 点滴剤	0.05%		
	眼; 懸濁液	0.05%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.05%		
	経口 カプセル	1.00MG		
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	0.15MG		
	経口 カプセル, 徐効	0.86MG		
	経口 濃縮物	0.20%		
	経口 顆粒	50.00MG		
	経口 液体	0.50%		
	経口 パウダー経口溶液用	1.50MG		
	経口 パウダー溶液用	0.15%		
	経口 パウダー懸濁液用	0.10%		
	経口 溶液	13.00%		
	経口 溶液, 濃縮物	0.10%		
	経口 溶液, エリキシル剤	0.90%		
	経口 溶液, シロップ	0.90%		
	経口 懸濁液	2.40%		
	経口 懸濁 液体	1.00%		
	経口 懸濁 徐効	0.75%		
	経口 シロップ	5.00%		
	経口 錠剤	1.80MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	1.27MG		
	経口 錠剤, 被覆	0.01MG		
	経口 錠剤, 制御放出	0.08MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	0.23MG		
	経口 錠剤, 徐効	0.17MG		
	経口 錠剤, 徐効, 多層構造, フィル	0.09MG		
	硬膜外; 注射	0.10%		
	直腸; エアロゾル, 定量	0.09%		
	直腸; ENEMA	10.80%		
	直腸; 溶液	13.00%		
	直腸; 懸濁液	2.40%		
	軟組織; 注射	0.15%		
	皮下; 注射	0.18%		
	皮下; 懸濁 注射	0.16%		
	局所; クリーム,	0.20%		
	局所; クリーム, 乳液, 徐放	0.20%		
	局所; 乳液	0.20%		
	局所; 乳液, エアロゾル FOAM	0.10%		
	局所; 乳液, クリーム	18.00%		
	局所; 乳液, ローション	0.17%		
	局所; フィルム, 制御放出			
	局所; ゲル	0.30%		
	局所; ゼリー	70.00%		
	局所; ローション	15.00%		
	局所; 軟膏	0.20%		
	局所; 貼布,	0.35MG		
	局所; シャンプー	0.18%		
	局所; シャンプー, 懸濁液	0.15%		
	局所; 溶液	0.10%		
	局所; 懸濁液	0.30%		
	尿道; 注射	0.18%		
	腔; 乳液, クリーム	0.20%		
	腔; ゲル	0.08%		
METHYLPARABEN SODIUM	経口 パウダー FOR 懸濁液	0.10%	経口投与	0.06mg
	経口 懸濁液	0.65%		