

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
MICROCRYSTALLINE WAX	経口 錠剤	0.18MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	0.30MG		
	経口 カプセル, 徐効	6.00MG	一般外用剤	350mg/g
	局所; 軟膏	30.00%	経皮	47.2mg
MINERAL OIL	経口 カプセル, 徐効	0.45%	舌下適用	10mg
	経口 錠剤		直腸腔尿道適用	70mg/g
	経口 錠剤, 被覆		歯科外用及び口中用	30mg/g
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶		口腔内咀嚼	148.5mg/g
MONOSODIUM CITRATE(クエン酸)	局所; 乳液, クリーム		経口投与	19.2mg
	局所; 乳液, クリーム		一般外用剤	707.843mg/g
	局所; 乳液, クリーム		舌下適用	450mg/g
	局所; 乳液, ローション		直腸腔尿道適用	576mg/g
MONTAN WAX(精製モンタンワックス)	局所; ギャル		眼科用剤	250mg/g
	局所; ローション		歯科外用及び口中用	180mg/g
	局所; 軟膏		その他の外用	30mg/g
	局所; 懸濁液		経皮	19mg/g
MYRISTYL ALCOHOL	局所; 懸濁液		殺虫剤	
	経皮; フィルム, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
N,N-DIMETHYLACETAMIDE	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
NIACINAMIDE	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
N-LAUROYLSARCOSINE(ラウロイル)	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
OCTOXYNOL 9(ポリオキシエチレンオ)	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
OCTOXYNOL-40(ポリオキシエチレン)	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
OCTYLDODECANOL	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			
	経皮; 貼布, 制御放出			

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
OLEIC ACID	吸入；エアロゾル, 定量	0.26%	静脈内注射	4.8mg
	吸入；吸入抗原	0.16%		
	鼻; エアロゾル, 定量	0.13%		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	598.60MG	経口投与	237mg
	経口 錠剤, 被覆	0.72MG		
	経口 錠剤, 復効	1.85MG		
	経口 錠剤, 徐効	2.00MG	吸入剤	0.1668mg
	(吸入 エアロゾル, 定量	3.00E-06		
	局所; 溶液	7.40%		
	経皮; フィルム, 制御放出	22.00MG		
	経皮; 貼布, 制御放出	5.51MG		
OLEYL ALCOHOL	局所; 乳液, クリーム	10.00%	一般外用剤	100mg/g
	局所; 軟膏	5.00%		
OLEYL OLEATE	局所; 軟膏	2.55%	一般外用剤	60mg/g
OLIVE OIL	経口 溶液	42.50%	経口投与	450mg
	局所; 溶液	0.60%	一般外用剤	584.4mg/g
ORANGE OIL	経口 溶液, エリキシル剤 経口 懸濁液 経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	0.12%	経口投与	0.3mL
		0.05%	一般外用剤	10mg/g
		2.0e-03MG	直腸腔尿道適用	5mg/mg
PALM OIL - SOYBEAN OIL,	経口 カプセル	4.00MG	経口投与	2.8g
			一般外用剤	80mg/g
			経皮	28.8mg
			直腸腔尿道適用	5.38g
PALMITIC ACID	経口 錠剤	6.00MG	一般外用剤	210mg
PARABENS	経口 カプセル	0.16MG 10%	経口投与	33mg/g
	経口 カプセル(即時型／複合型リ		パラオキシ安息香酸イソプチ	0.36mg
	局所; エアロゾル, 定量		経口投与	14mg
			パラオキシ安息香酸イソプロ	60mg
			経口投与	1 μg
			パラオキシ安息香酸エチル	2.5mg
			経口投与	2.5mg/g
			その他の内用	8mg
			筋肉内注射	1mg/g
			一般外用剤	606mg
			経皮	0.26mg
			舌下適用	0.4mg/g
			直腸腔尿道適用	1mg/g、
			眼科用剤	12.6mg
			耳鼻科用剤	1 μg
			歯科外用及び口中用	2mg
			パラオキシ安息香酸ブチル	50mg/g
			経口投与	6mg
			その他の内用	1mg/g
			局所麻酔注射	10mg
			一般外用剤	0.5mg/L
			経皮	0.1mg/g
			舌下適用	1mg/g
			直腸腔尿道適用	0.2mg/g
			眼科用剤	0.2mg/g
			耳鼻科用剤	0.2mg/g
			歯科外用及び口中用	0.2mg/g
			パラオキシ安息香酸プロピル	0.2mg/g
			経口投与	33.6mg
			静脈内注射	4mg
			筋肉内注射	2.4mg
			皮下注射	4.2mg
			局所麻酔注射	0.2mg
			一般外用剤	2mg/g
			経皮	0.14mg/g
			舌下適用	1mg/g
			直腸腔尿道適用	0.2mg/g
			眼科用剤	0.2mg/g
			耳鼻科用剤	0.2mg/g

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
			歯科外用及び口中用 皮内注射 吸入剤 パラオキシ安息香酸メチル 経口投与 静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 歯科注射 局所麻酔注射 一般外用剤 経皮 舌下適用 直腸腔尿道適用 眼科用剤 耳鼻科用剤 歯科外用及び口中用 その他の外用 皮内注射 その他の注射 吸入剤	0.5mg/g 0.2mg/mL 0.2mg/mL 40mg 30mg 25mg 25mg 0.018mg 40mg 26mg/g 0.26mg/g 1.5mg/g 1mg/g 0.25mg/g 1.5mg/g 1mg/g 2mg/g 1.5mg/mL 1.5mg/mL 1.5mg/mL
PARAFFIN	経口 カプセル, 徐効 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, 徐効 局所; 乳液, クリーム 局所; 軟膏	50.00MG 0.07MG 0.06MG 150.20MG 4.50% 68.99%	経口投与 一般外用剤 直腸腔尿道適用 その他の外用	60mg 200mg/g 20mg/g 3 µg
PARAFFIN, WHITE SOFT(白色ワセリ	局所; 乳液, クリーム	15.00%	一般外用剤 経皮 舌下適用 直腸腔尿道適用 眼科用剤 歯科外用及び口中用	適量 750mg/g 320mg/g 3120mg 899mg/g 357mg/g
PEANUT OIL(ラッカセイ油)	経口 カプセル 経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン 局所; 乳液, クリーム 腔; 乳液, クリーム	313.80MG 149.00MG 3.00% 9.00%	経口投与 筋肉内注射 一般外用剤 直腸腔尿道適用	300mg 適量 190mg/g 750mg
PECTIN	歯科L; ペースト 経口 BAR, 咀嚼剤 経口 粉末 局所; ペースト	180.00MG 1400.00MG 25.50%	経口投与 一般外用剤 歯科外用及び口中用	60.06mg 260mg/g 170mg/g
PETROLATUM(ワセリン)	眼; 軟膏 経口 カプセル, 徐効 局所; 乳液 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 軟膏	85.00% 0.07MG 5.30% 16.43% 2.50% 99.98%	一般外用剤 眼科用剤	268.3mg/g 適量
PETROLATUM, WHITE(白色ワセリン)	歯科L; ペースト 眼; 軟膏 局所; クリーム 局所; 乳液, エアロゾル FOAM 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 軟膏 局所; 軟膏 経皮; 軟膏 腔; 軟膏	64.00MG 89.00% 26.00% 7.90% 58.20% 15.00% 99.98% 81.93% 29.00% 88.49%	舌下適用 眼科用剤 一般外用剤 歯科外用及び口中用 経皮 直腸腔尿道適用	320mg/g 899mg/g 適量 357mg/g 750mg/g 3120mg
PHENOL	筋肉 - 静脈皮下; 注射 筋肉 静脈; 注射 筋肉 皮下; 注射 筋肉 皮下; 注射, 徐効 関節内; 注射 皮内; 注射 病巣内; 注射 筋肉; 注射	0.45% 1.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.25% 0.50% 0.50%	その他の注射 経皮 歯科外用及び口中用 耳鼻科用剤 吸入剤 皮内注射 筋肉内注射	97mg 0.05mg 10mg 5mg/mL 3.33mg 1mg 64mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	筋肉; 注射, 徐効 筋肉; 溶液, 注射 滑液嚢内; 注射 静脈; 注射 静脈; 溶液, 注射 静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射 皮下; I注射 皮下; 注射 皮下; 溶液, 注射 皮下; 懸濁 注射	0.50% 0.45% 0.50% 0.50% 0.50% 1.00% 0.50% 0.18% 0.50% 0.50% 0.15%	静脈内注射 皮下注射 一般外用剤	64mg 50mg 5mg/g
PHENOL, LIQUEFIED(液状フェノール)	筋肉 静脈; 注射 筋肉 皮下; 注射 静脈; 注射 静脈皮下; 液体 皮下; 注射 皮下; 懸濁 注射	0.50% 0.20% 0.28% 0.50% 0.06% 0.07%	一般外用剤	0.05mL/mL
PHENOXYETHANOL	局所; クリーム, 局所; 乳液, エアゾール FOAM 局所; 乳液, クリーム 局所; ゲル 局所; ローション	0.50% 1.05% 0.70% 0.70% 0.70%	一般外用剤 筋肉内注射 皮下注射	1.2mg/g 2.8mg 2.8mg
PHENYLALANINE(L- フェニルアラニ	静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射	52.60% 17.00%	静脈内注射 筋肉内注射 動脈内注射	10mg 10mg 10mg
PHOSPHOLIPID(精製大豆レシチン)	静脈(点滴); 乳液, 注射 静脈(点滴); 注射	12.00% 1.20%	経口投与 静脈内注射 一般外用剤	120mg 1.2mg 10mg/g
PHOSPHOLIPID, EGG(精製卵黄レ	静脈(点滴); 注射	1.20%	静脈内注射	6g
PHOSPHORIC ACID	筋肉; パウダー FOR 注射 溶液用, 静脈(点滴); 注射 経口 溶液 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 皮下; 注射 皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結 皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結 局所; クリーム, 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; ローション 局所; 軟膏 局所; 溶液 腔; 乳液, クリーム	0.23% 11.50% 0.64% 2.97MG 0.20% 0.23% 0.13% 0.02% 0.50% 0.10% 0.01% 4.00E-05 0.23% 0.80%	筋肉内注射 静脈内注射 経口投与 225mg 歯科外用及び口中用 皮下注射 一般外用剤 殺虫剤	69.3mg 69.3mg 0.68mL/mL 35mg 20mg/g
POLOXAMER 124(ポリオキシエチレン	経口 懸濁液 局所; ゲル	9.00E-05 0.20%	一般外用剤 直腸腔尿道適用	150mg/mL 45mg
POLOXAMER 188(ポリオキシエチレン	静脈; 注射 静脈; パウダー 注射 溶液用 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 経口 カプセル(即時型／複合型)リ 経口 濃縮物 経口 顆粒 経口 パウダー 経口懸濁液用 経口 溶液 経口 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤, 制御放出 歯周L; ゲル 皮下; 注射 皮下; 溶液, 注射 局所; 乳液, クリーム	0.60% 0.22% 0.10% 0.10% 3.18MG 0.02% 0.34% 10.00% 2.50% 66.90MG 5.61MG 5.50% 0.20% 0.30% 0.01%	静脈内注射 筋肉内注射 一般外用剤 直腸腔尿道適用 経口投与 皮下注射	10mg 10mg 250mg/g 300mg 333mg 53mg/kg(体重)
POLOXAMER 331(ポリオキシエチレン	経口 パウダー 溶液用 経口 パウダー 懸濁液用 経口 懸濁液	2.59% 0.52% 1.25%	経口投与	400mg
POLOXAMER 407(ポリオキシエチレン	眼; 溶液	0.20%	一般外用剤	143mg/g

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	眼; 溶液, 点滴剤 眼; 懸濁 点滴剤 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 パウダー 経口懸濁液用 経口 溶液 経口 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤, フィルム 被覆 歯周L; ギェル 局所; 乳液, クリーム 局所; ギェル 局所; 懸濁 点滴剤	0.16% 0.10% 5.00MG 12.60% 5.00% 100.00MG 106.70MG 15.50% 1.00% 0.20% 0.10%		
POLYBUTENE	経皮; 貼布, 制御放出	3.25MG	一般外用剤 その他外用	250mg/g 161mg
POLYETHYLENE GLYCOL 1000(マ)	経口 濃縮物 経口 溶液 経口 錠剤, フィルム 被覆 直腸; 坐薬 吸入 局所; 乳液, クリーム	10.00% 15.00% 1.51MG 1625000.00MG 0.02% 7.20%	一般外用剤	2mg/g
POLYETHYLENE GLYCOL 1500(マ)	経口 錠剤 局所; 軟膏	1.20MG 5.00%	経口投与 一般外用剤 直腸腔尿道適用 経皮 その他の外用	100mg 765mg/g 5.2g 720mg 0.872mg
POLYETHYLENE GLYCOL 1540(マ)	歯科L; ギェル 経口 溶液 局所; 軟膏 局所; 溶液	5.00% 3.36% 38.00% 29.70%	直腸腔尿道適用 経口投与 一般外用剤	18650mg 2mg 248mg/g
POLYETHYLENE GLYCOL 200(マク)	局所; 軟膏 経口 溶液 筋肉; 注射	39.00% 20.00% 30.00%	一般外用剤 殺虫剤	200mg/g
POLYETHYLENE GLYCOL 20000(マ)	経口 カプセル 経口 カプセル, 硬ゼラチン 経口 錠剤 経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶 経口28; 錠剤	18.00MG 13.50MG 0.30MG 8.0e-03MG 0.30MG	一般外用剤 経口投与 歯科外用及び口中用	100mg/g 23.2mg 250mg、
POLYETHYLENE GLYCOL 300(マク)	筋肉 静脈; 注射 筋肉; 注射 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射 経口 錠剤 経口 錠剤, フィルム 被覆 局所; 軟膏 局所; 溶液	50.00% 50.00% 65.00% 65.00% 1.00MG 1.50MG 57.00% 29.70%	静脈内注射 経口投与 一般外用剤 その他外用	m ² (体表面積) 20mg 450mg/g 2mg
POLYETHYLENE GLYCOL 400(マク)	筋肉 静脈; 注射 筋肉 静脈; 溶液, 注射 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射 鼻; 定量用スプレー 眼; 軟膏 経口 カプセル 経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 徐放 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体- 経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン 経口 濃縮物 経口 溶液 経口 懸濁液 経口 シロップ 経口 錠剤 経口 錠剤(即時型/複合型リリー 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	20.30% 18.00% 11.25% 11.25% 20.00% 4.99% 500.00MG 103.55MG 1.70MG 960.78MG 324.50MG 1.70MG 60.00% 60.00% 25.00% 0.05% 105.06MG 20.00MG 3.15MG 12.50MG	筋肉内注射 皮下注射 静脈内注射 局所麻酔注射 舌下適用 耳鼻科用剤 経口投与 直腸腔尿道適用 歯科外用及び口中用	3.2g 3.2g 3.2g 7.881mg 720mg/g 50mg/mL 2.31g 3.07g 200mg/g

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤, 徐放 経口錠剤, フィルム被覆 経口錠剤, 徐効 経口錠剤, 徐効, フィルム被覆 経口21; 錠剤 経口28; 錠剤 局所; 乳液, クリーム 局所; ゲル 局所; ローション 局所; 軟膏 局所; 溶液	45.00MG 5.91MG 45.00MG 1.80MG 0.15MG 0.15MG 7.50% 45.00% 12.00% 65.00% 69.90%	一般外用剤 その他の外用	700mg/g 50mg
POLYETHYLENE GLYCOL 4000(マ)	関節内; 注射 病巣内; 注射 筋肉; 注射 滑液嚢内; 注射 経口カプセル 経口カプセル, 腸溶性被覆丸薬 経口カプセル, 軟ゼラチン 経口錠剤 経口錠剤, 被覆 経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆 経口錠剤, 徐放 経口錠剤, フィルム被覆 経口錠剤, 多層構造, 徐放 経口錠剤, 徐効 経口錠剤, 徐効, フィルム被覆 直腸; 坐薬 舌下錠剤 局所; 軟膏 腔; 乳液, クリーム	3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 449.60MG 75.00MG 15.00MG 15.00MG 2.00MG 0.96MG 45.00MG 1.85MG 2.80MG 454.00MG 1.80MG 1269.00MG 2.50MG 84.00% 0.50%	静脈内注射 皮下注射 筋肉内注射 その他の注射 経口投与 経皮 吸入剤 舌下適用 眼科用剤 耳鼻科用剤 歯科外用及び口中用 直腸腔尿道適用 一般外用剤	120mg 40mg 180mg 60mg 1206mg 2164mg/g 45mg 320mg/g 10mg/g 150mg/g 353mg/g 10g 570mg/g
POLYETHYLENE GLYCOL 600(マク)	静脈; 注射 静脈; 溶液, 注射 経口カプセル 経口カプセル, 軟ゼラチン 経口カプセル, 軟ゼラチン液体- 経口溶液 経口錠剤 経口錠剤, 徐効 局所; 溶液	5.00% 5.00% 448.40MG 324.00MG 580.60MG 65.00% 6.00MG 1.20MG 0.30%	静脈内注射 経口投与	300mg 1128.8mg
POLYETHYLENE GLYCOL 6000(マ)	経口カプセル 経口カプセル, 徐放 経口カプセル, 硬ゼラチン 経口カプセル, 徐効 経口錠剤 経口錠剤 (即時型／複合型リリー 経口錠剤, 被覆 経口錠剤, 徐放性 経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆 経口錠剤, 徐放 経口錠剤, フィルム被覆 経口錠剤, 徐効 経口錠剤, 徐効, 被覆 経口錠剤, 徐効, フィルム被覆 経口21; 錠剤, 被覆 経口28; 錠剤 経口28; 錠剤, 被覆 直腸; 坐薬 局所; 軟膏 腔; 錠剤 腔; 錠剤, フィルム被覆	10.00MG 18.88MG 450.00MG 17.46MG 375.00MG 0.32MG 40.00MG 1.71MG 0.60MG 1.40MG 30.00MG 12.50MG 0.50MG 0.32MG 2.14MG 0.20MG 2.14MG 128.00MG 1.00% 3.00MG 0.06MG	経口投与 経皮 眼科用剤 歯科外用及び口中用 直腸腔尿道適用 一般外用剤 殺虫剤	750mg 308.8mg 5mg/g 250mg 4.05g 75mg/g
POLYISOBUTYLENE	経皮; フィルム, 制御放出 経皮; 貼布, 制御放出	119.00MG 10.50MG	一般外用剤 その他外用 口腔内咀嚼 経皮	260mg/g 36mg/g 58mg/g 135mg/g
POLYOXYL 35 CASTOR OIL	膀胱内; 溶液	50.00%	経口投与	1440mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 経口 カプセル 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 溶液 経口 懸濁液 経口 錠剤	65.00% 52.75% 5.00% 5.00% 120.00MG 599.40MG 51.50% 0.04% 2.00MG		
POLYOXYL 40 CASTOR OIL(ポリオ)	筋肉 皮下; 注射	7.00%	静脈内注射 一般外用剤 殺虫剤	4.68g(酸化工 10mg/g
POLYOXYL 40 HYDROGENATED	歯科L; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 経口 カプセル 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 溶液 経口 錠剤, 徐効 局所; 乳液, クリーム	1.00% 0.50% 200.00MG 405.00MG 45.00% 25.00MG 1.00%	歯科外用及び口中用 直腸腔尿道適用 経口投与	9mg/g 60.0mg 160 μ g
POLYOXYL 40 STEARATE(ステアリ)	耳(耳性); 懸濁液 眼; 溶液 眼; 懸濁液 経口 カプセル 経口 カプセル, 硬ゼラチン 経口 錠剤 経口 錠剤, フィルム 被覆 局所; 乳液, エアロゾル 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション	1.00% 7.00% 0.50% 2.40MG 0.60MG 8.48MG 2.00MG 1.07% 8.80% 5.10%	経皮 眼科用剤 直腸腔尿道適用 経口投与 舌下適用 一般外用剤 その他の外用	144.8mg 0.8mg 200mg 357.6mg 28mg 100mg/g 1mg/g、
POLYOXYL 60 CASTOR OIL(ポリオ)	静脈(点滴); 注射	20.00%	静脈内注射 一般外用剤 殺虫剤	4.68g(酸化工 10mg/g
POLYOXYL 60 HYDROGENATED	局所; 乳液, クリーム	1.90%	経口投与 静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 脊椎腔内注射 一般外用剤 経皮 舌下適用 直腸腔尿道適用 眼科用剤 歯科外用及び口中用 その他の注射	1.2g 9600mg 500mg 500mg 500mg 60mg/g 20mg/g 50mg/g 40mg 5mg/g 30mg/g 12g
POLYOXYL 75 LANOLIN(ポリオキシ)	局所; エアロゾル 局所; 乳液 局所; 溶液	1.50% 1.50% 1.00%	一般外用剤	20mg/g
POLYOXYL LANOLIN(ポリオキシエチ)	局所; 溶液	0.94%	一般外用剤	20mg/g
POLYPROPYLENE GLYCOL(ポリプ)	筋肉 静脈; I注射 眼; 溶液 経口 錠剤	40.00% 15.00% 1.26MG	一般外用剤	0.2mg/mL
POLYSORBATE 20	耳(耳性); 懸濁 液体 筋肉 皮下; 注射 筋肉; パウダー注射 溶液用, 凍結 筋肉; 溶液, 注射 静脈; 注射 静脈; 溶液, 注射 静脈(点滴); 注射 鼻; 定量用スプレー 眼; 懸濁液 経口 カプセル 経口 パウダー懸濁液用 経口 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤, 徐放	1.00% 5.00E-06 0.01% 0.01% 0.40% 0.40% 2.40% 2.50% 0.05% 56.25MG 0.13% 0.50% 6.00MG 4.20MG	歯科外用及び口中用 静脈内注射 経口投与	0.6mg 40mg 0.76mg

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	皮下; I注射	2.00E-05	皮下注射	0.1mg
	皮下; 注射	1.00E-05		
	皮下; 液体	0.20%		
	皮下; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	0.01%		
	皮下; 溶液, 注射	0.40%		
	局所; 乳液	2.00%	一般外用剤	66mg
	局所; 乳液, クリーム	0.80%		
	局所; ローション	7.80%		
	局所; 溶液	15.00%		
	腔; タンポン	64.80MG		
POLYSORBATE 40	経口 溶液, エリキシル剤	5.00E-05	経口投与	5.90mg
	経口 懸濁液	0.50%		
	局所; 乳液, クリーム	6.00%		
	局所; ゲル	0.20%		
	局所; ローション	3.00%		
POLYSORBATE 60	眼; 軟膏	15.00%	舌下適用	70mg/g
	経口 懸濁液	2.50%	経口投与	50.4mg
	局所; エアロゾル	0.42%	一般外用剤	80mg/g
	局所; 乳液, エアロゾ	0.42%	歯科外用及び口中用	44mg/g
	局所; 乳液, クリーム	8.00%		
	局所; ローション	5.00%		
	局所; シャンプー	15.00%		
	局所; 懸濁液	2.85%		
	腔; クリーム,	1.50%	直腸腔尿道適用	46mg
	腔; 乳液, クリーム	7.50%		
POLYSORBATE 65	局所; 軟膏	5.00%	一般外用剤	20mg/g、
POLYSORBATE 80	耳 (耳性); 溶液	0.20%	耳鼻科用剤	2mg/g
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	0.10%	歯科外用及び口中用	37mg/g
	耳 (耳性); 懸濁液	5.00%		
	関節内; I注射	0.04%	皮内注射	2mg
	関節内; 注射	0.40%	その他の注射	8.6mg
	病巣内; I注射	0.04%		
	病巣内; 注射	0.20%		
	病巣内; 懸濁 注射	0.19%		
	筋肉; I注射	0.04%	筋肉内注射	100.2mg
	筋肉; 注射	12.00%		
	筋肉; 注射, 微小球	0.10%		
	筋肉; パウダー 注射溶液用, 凍結	0.20%		
	筋肉; 溶液, 注射	5.00%		
	筋肉; 懸濁 注射	0.19%		
	滑液嚢内; 注射	0.20%		
	滑液嚢内; 懸濁 注射	0.19%		
	静脈; I注射	10.00%	静脈内注射	500mg
	静脈; 注射	10.00%		
	静脈; パウダー 注射溶液用, 凍結	12.00%		
	静脈; 溶液, 注射	10.00%		
	硝子体内; 懸濁 注射	0.01%		
	静脈(点滴); 注射	8.00%		
	静脈(点滴); パウダー 注射溶液用,	12.50%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	10.00%		
	鼻; 溶液	0.10%		
	鼻; 噴霧	4.00E-05		
	鼻; 定量用スプレー	10.00%		
	眼; 乳液	4.00%	眼科用剤	5mg/g
	眼; 溶液	0.20%		
	眼; 溶液, 点滴剤	1.00%		
	眼; 溶液, ゲル形成, 徐放	0.05%		
	眼; 懸濁液	0.10%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.10%		
	経口 カプセル	418.37MG	経口投与	300mg
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	1.06MG	その他の内用	156.8mg
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	2.00MG		
	経口 カプセル, 徐放	0.52MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	0.41MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	6.00MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル, 徐効	2.60MG		
	経口 濃縮物	0.10%		
	経口 点滴剤	0.20%		
	経口 顆粒	20.00MG		
	経口 顆粒 経口懸濁液用	5.00MG		
	経口 粉末	3.00%		
	経口 パウダー 懸濁液用	0.20%		
	経口 溶液	12.60%		
	経口 溶液, エリキシル剤	0.25%		
	経口 懸濁液	12.50%		
	経口 懸濁 点滴剤	0.75%		
	経口 懸濁 FOR 吸入	0.04%		
	経口 懸濁 液体	0.29%		
	経口 懸濁 徐効	0.25%		
	経口 錠剤	21.25MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型) リー	0.50MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型) リー	24.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	2.20MG		
	経口 錠剤, 徐放	0.22MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	14.80MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	2.25MG		
	経口 錠剤, 徐効	0.12MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	8.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	0.20MG		
	直腸 浣腸	0.60%	直腸腔尿道適用	260mg
	直腸; 溶液	10.00%		
	直腸; 坐薬	72.15MG		
	軟組織; I注射	0.04%		
	軟組織; 注射	0.20%	皮下注射	50mg
	軟組織; 懸濁 注射	0.19%		
	皮下; 懸濁 注射	0.30%		
	舌下 錠剤	0.07MG		
	局所; 乳液	2.50%	一般外用剤	100mg/g
	局所; 乳液, クリーム	5.00%		
	局所; ゲル	8.50%	経皮 その他の外用	30mg/g 31mg/g
	局所; ローション	9.40%		
	局所; 軟膏	0.10%		
	腔; 乳液, クリーム	0.50%		
	腔; 坐薬	28.00MG		
POLYVINYL ACETATE (酢酸ビニル)	経口 錠剤	7.00MG	経口投与	110mg
	経口 錠剤, 徐効	46.00MG	一般外用剤	10mg/g
	経皮; フィルム, 制御放出	16.00MG		
	経皮; 貼布, 制御放出	3.99MG		
POLYVINYL ALCOHOL (ポリビニルア)	耳 (耳性); 懸濁 液体	20.00%	経口投与、	300mg
	INTRAOCULAR; 溶液	1.40%	一般外用剤	35mg/g
	硝子体内; 筋肉 PLANT	0.11MG	眼科用剤	10mg/g
	イオントフォoresis; DDS	119.00MG	歯科外用及び口中用	20mg/g
	眼; 溶液	1.40%	耳鼻科用剤	5mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	1.40%	殺虫剤	
	眼; 懸濁液	1.40%	ポリビニルアルコール (完全けん化物)	
	眼; 懸濁 点滴剤	1.40%	経口投与	69mg
	経口 錠剤	14.40MG		
	経口 錠剤, 被覆	0.69MG		
	経口 錠剤, 徐放	34.10MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	20.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	2.00MG		
	局所; ローション	2.50%		
	局所; 貼布	25.20MG		
	経皮; DDS	119.00MG		
POTASSIUM ACETATE	眼; パウダー FOR 溶液	4.00%	眼科用剤	0.45g
	直腸; ENEMA	0.41%	殺虫剤	
POTASSIUM BICARBONATE	経口 パウダー FOR 経口溶液	22.00MG	経口投与	1.5g
	経口 溶液	2.50%		
	経口 錠剤	12.20MG		
	経口 トローチ	4.00MG		

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
POTASSIUM CARBONATE	経口 カプセル 経口 溶液 経口 錠剤	27.69MG 2.48% 25.00MG	経口投与	50mg
POTASSIUM CHLORIDE	AN浸潤; 注射 仙骨麻酔; 注射 硬膜外; 注射 眼内; 溶液 静脈; 溶液, 注射 硝子体内; 懸濁 注射 神経ブロック; 注射 眼; パウダー溶液用 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 経口 カプセル 経口 カプセル, 徐放 経口 錠剤	0.03% 0.03% 0.03% 0.07% 0.38% 0.07% 0.03% 0.07% 22.20% 0.14% 62.00MG 0.40MG 40.00MG	筋肉内注射 皮下注射 眼科用剤 経口投与	0.1mg/g 0.1mg 2mg/g 200mg
POTASSIUM HYDROXIDE	経口 カプセル, 軟ゼラチン 局所; 乳液, クリーム 局所; 溶液 腔; 乳液, クリーム	25.60MG 0.50% 14.02% 0.50%	その他の外用 一般外用剤 舌下適用 直腸腔尿道適用	84mg/g、 76.5mg/g 63mg/g 76.5mg/g
POTASSIUM METABISULFITE(ピロ	耳(耳性); 溶液 耳(耳性); 溶液, 点滴剤 筋肉 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射 直腸; 注腸	0.11% 0.10% 0.10% 0.06% 5.00% 0.46%	皮下注射 筋肉内注射 静脈内注射	6mg 6mg 1250mg
POTASSIUM PHOSPHATE,	関節内; 注射 筋肉; 注射 静脈(点滴); 注射 経口 カプセル 経口 パウダー懸濁液用 経口 溶液 経口 シロップ 皮下; 注射 皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結	0.60% 0.60% 55.20% 30.00MG 5.00% 6.00% 2.20% 1.36% 0.19%	筋肉内注射 静脈内注射 経口投与 耳鼻科用剤 皮下注射 殺虫剤	6.92mg 11.6mg 420mg 5mg/g 6.92mg
POTASSIUM PHOSPHATE,	AN浸潤; 注射 耳(耳性); 溶液 筋肉 静脈; 注射 関節内; 注射 筋肉; I注射 筋肉; 注射 静脈; I注射 静脈; 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射 鼻; 噴霧 神経ブロック; 注射 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 眼; 懸濁液 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 溶液 経口 懸濁液 経口 シロップ 経口 錠剤 経口 錠剤, 徐効 皮下; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	2.72% 0.20% 0.09% 0.30% 0.09% 0.30% 0.09% 0.01% 1.36% 0.14% 2.72% 0.20% 0.06% 0.44% 17.00MG 2.00% 5.00% 0.27% 25.00MG 4.00MG 0.12%	耳鼻科用剤 筋肉内注射 静脈内注射 皮内注射 一般外用剤 その他の外用 眼科用剤 経口投与 その他 殺虫剤 皮下注射	8mg/g 350mg 350mg 0.217mg 30mg/g 0.54mg/g 6.1mg/g 72mg 13 μ 350mg
POTASSIUM SOAP	局所; 溶液	32.80%	一般外用剤	100mg/g
POTASSIUM SORBATE	鼻; 定量用スプレー 眼; 溶液 経口 濃縮物 経口 顆粒 FOR 懸濁液 経口 溶液 経口 懸濁液 経口 シロップ 経口 錠剤	8.40E-05 0.47% 0.01% 20.00MG 1.60% 1.00% 1.50% 0.80MG	眼科用剤 経口投与	1mg/g 334mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤, 徐放, フィルム被覆 直腸; 溶液 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 溶液	0.20MG 1.60% 2.70% 0.20% 0.47%	一般外用剤	0.1mg/g
POVIDONE K17	皮下; 懸濁注射	0.50%	耳鼻科用剤	240mg/mL
POVIDONE K25	経口カプセル 経口カプセル, 徐放 経口カプセル, 徐効 経口カプセル, 徐効, 硬ゼラチン 経口顆粒 FOR 経口懸濁液 経口溶液 経口錠剤 経口錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶 経口錠剤, フィルム被覆 経口錠剤, 多層構造, 徐放 (吸入 (吸入); 吸入	4.40MG 12.60MG 17.79MG 12.60MG 0.27MG 50.00% 52.00MG 20.00MG 22.50MG 1.80MG 1.00E-06	経口投与 眼科用剤	400mg 30mg/g
POVIDONE K30	眼; 溶液, 点滴剤 眼; 懸濁液 経口カプセル 経口カプセル, 腸溶性被覆丸薬 経口カプセル, 徐放 経口カプセル, 硬ゼラチン 経口カプセル, 軟ゼラチン 経口カプセル, 軟ゼラチン液体- 経口カプセル, 徐効 経口分散錠剤 経口液体 経口パウダー懸濁液用 経口懸濁液 経口錠剤 経口錠剤 (即時型／複合型リリー 経口錠剤 (即時型／複合型リリー 経口錠剤 (即時型／複合型リリー 経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆 経口錠剤, 徐放 経口錠剤, フィルム被覆 経口錠剤, 口腔内崩壊 経口錠剤, 徐効 経口21; 錠剤 経口28; 錠剤 舌下錠剤	2.00% 0.60% 20.00MG 26.80MG 5.62MG 8.00MG 30.00MG 25.20MG 6.87MG 51.20MG 5.00% 0.26% 1.85% 80.00MG 5.00MG 18.00MG 40.00MG 27.20MG 50.00MG 42.00MG 35.71MG 55.00MG 5.00MG 5.00MG 8.00MG	眼科用剤 耳鼻科用剤 経口投与 一般外用剤 経皮 歯科外用及び口中用 直腸腔尿道適用 舌下適用	20mg/g 50mg/g 600mg 50mg/g 70mg 40mg/g 60mg 11.58mg
POVIDONE K90	眼; 溶液, 点滴剤 経口カプセル 経口カプセル, 徐放 経口カプセル, 硬ゼラチン 経口カプセル, 徐効, 硬ゼラチン 経口顆粒 FOR 懸濁液 経口錠剤 経口錠剤, 被覆 経口錠剤, 制御放出 経口錠剤, 徐放性腸溶性被覆 経口錠剤, 腸溶性被覆粒子S 経口錠剤, 徐放 経口錠剤, フィルム被覆 経口錠剤, 徐効 経口28; 錠剤 局所; 溶液	1.20% 16.00MG 18.80MG 5.95MG 18.80MG 32.00MG 78.00MG 9.76MG 35.00MG 4.00MG 27.60MG 78.00MG 44.00MG 40.80MG 0.17MG 0.25%	経口投与 一般外用剤 眼科用剤 歯科外用及び口中用 その他外用	320mg 30mg/g 0.5mg/g 150mg/g 14mg/g
POWDERED CELLULOSE	経口カプセル 経口錠剤	170.00MG 44.00MG	経口投与	195mg
PROPYL GALLATE	経口カプセル, 軟ゼラチン 経口濃縮物 経口錠剤 経口錠剤, 徐効 経口錠剤, 徐効, 被覆	2.00MG 0.02% 0.04MG 0.06MG 0.04MG	経口投与 経皮 直腸腔尿道適用	5mg 0.19mg 3.6mg/g

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; ゲル	0.05%	一般外用剤	2mg/g
	局所; 軟膏	0.01%	殺虫剤	
PROPYLENE CARBONATE	局所; 軟膏	5.00%	一般外用剤	100mg/g
PROPYLENE GLYCOL	耳 (耳性); 溶液	94.92%	耳鼻科用剤	200mg/g
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	80.00%	眼科用剤	10mg/g
	耳 (耳性); 懸濁液	10.00%		
	口腔; フィルム, 溶解 (性)	1.02MG	舌下適用	320mg/g
	歯科L; 溶液	2.00%	歯科外用及び口中用	0.8mL/mL
	体外; 溶液	5.00%		
	筋肉 静脈; 注射	82.04%	皮下注射	0.5mL
	筋肉 静脈; 溶液, 注射	41.60%	皮内注射	0.18mg
	吸入 ; 溶液	25.00%	脊椎腔内注射	16mg
	筋肉; 注射	40.00%	筋肉内注射	0.5mL
	筋肉; 溶液, 注射	40.00%		
	静脈; I注射	30.00%	静脈内注射	3.32g
	静脈; 注射	50.00%		
	静脈; 溶液, 濃縮物	50.33%		
	静脈; 溶液, 注射	30.00%		
	静脈(点滴); 注射	51.80%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	30.00%		
	鼻; 定量用スプレー	20.00%		
	眼; 溶液	10.00%		
	眼; 溶液, 点滴剤	0.75%		
	眼; 懸濁液	5.00%		
	眼; 懸濁 点滴剤	1.00%		
	経口 カプセル	52.00MG	経口投与	2.08g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	1.70MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	148.31MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	17.70MG		
	経口 カプセル, 徐効	0.79MG		
	経口 濃縮物	70.00%		
	経口 点滴剤	0.12%		
	経口 液体	61.00%		
	経口 粉末	5.50%		
	経口 溶液	91.50%		
	経口 溶液, 濃縮物	47.80%		
	経口 溶液, エリキシル剤	50.00%		
	経口 溶液, シロップ	61.00%		
	経口 噴霧	3.74%		
	経口 懸濁液	89.02%		
	経口 懸濁 液体	25.00%		
	経口 懸濁 徐効	15.00%		
	経口 シロップ	92.00%		
	経口 錠剤	14.70MG		
	経口 錠剤, 被覆	1.50MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	6.95MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	4.30MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	14.40MG		
	経口 錠剤, 徐効	9.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆			
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	12.80MG		
	PHOTOPHERESIS; 溶液	5.00%		
	直腸; エアロゾル, 定量	18.00%	直腸膣尿道適用	3 μ g
	直腸; ゲル	41.44%		
	直腸; 懸濁液	5.00%		
	局所; エアロゾル	2.11%	一般外用剤	0.723mL/mL
	局所; クリーム,	30.00%	その他の外用	150mg/g
	局所; 乳液	8.00%		
	局所; 乳液, エアロゾル FOAM	21.05%		
	局所; 乳液, クリーム	71.08%		
	局所; 乳液, ローション	47.50%		
	局所; ゲル	98.09%		
	局所; ローション	50.90%		
	局所; ローション,	30.00%		
	局所; 軟膏	38.00%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; 軟膏, 局所; 貼布, 局所; シャンプー 局所; シャンプー, 懸濁液 局所; 溶液 局所; 溶液, 液体 局所; 懸濁液 局所; 綿棒で分泌物を採集 経皮; フィルム, 制御放出 経皮; ゲル 腔; 乳液, クリーム 腔; ゲル 腔; 坐薬 腔; タンポン	65.00% 0.44MG 3.50% 2.00% 61.50% 5.00% 5.27% 25.00ML 58.13MG 6.00% 20.00% 3.00% 252.00MG 62.10MG	経皮 殺虫剤	2.3mg/g
PROPYLENE GLYCOL ALGinate	経口 粉末	50.24%	経口投与 一般外用剤	360mg 11mg/g
PROPYLENE GLYCOL	局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 軟膏 局所; 軟膏, 腔; 乳液, クリーム	9.30% 4.69% 8.00% 2.00% 7.00%	一般外用剤	60mg/g
PROPYLPARABEN	AN浸潤; 注射 耳 (耳性); 懸濁液 口腔; フィルム, 溶解 (性) 筋肉 - 静脈皮下; 注射 筋肉 静脈; I注射 筋肉 静脈; 注射 筋肉 静脈; 溶液 筋肉 皮下; 注射 吸入 ; 溶液 関節内; 注射 滑液嚢内; 注射 病巣内; 注射 筋肉; 注射 静脈; I注射 静脈; 注射 静脈; パウダー 注射 溶液用 静脈; 溶液, 注射 静脈皮下; 注射 静脈(点滴); 注射 N/A; 液体 鼻; 溶液 鼻; 定量用スプレー 神経ブロック; 注射 眼; 軟膏 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 眼; 懸濁液 眼; 懸濁 点滴剤 経口 カプセル 経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 徐効 経口 濃縮物 経口 液体 経口 パウダー経口溶液用 経口 パウダー 溶液用 経口 パウダー 懸濁液用 経口 溶液 経口 溶液, 濃縮物 経口 溶液, エリキシル剤 経口 溶液, シロップ 経口 懸濁液 経口 懸濁 液体 経口 懸濁 徐効	0.01% 6.00E-06 0.18MG 20.00% 0.01% 0.20% 0.01% 0.02% 0.03% 0.16% 0.02% 0.02% 0.16% 0.02% 0.20% 0.08% 0.02% 0.02% 0.05% 0.01% 0.01% 0.30% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.21MG 0.04MG 0.12MG 0.21MG 0.25% 0.02% 0.15MG 0.01% 0.08% 10.00% 0.02% 0.30% 0.10% 20.00% 0.30% 0.15%	歯科外用及び口中用 局所麻酔注射 舌下適用 吸入剤 筋肉内注射 静脈内注射 皮内注射 耳鼻科用剤 眼科用剤 経口投与 経皮	0.5mg/g 0.2mg 1mg/g 0.2mg/mL 2.4mg 4mg 0.2mg/mL 0.2mg/g 0.2mg/g 33.6mg 0.14mg/g

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 シロップ	20.00%	直腸腔尿道適用	0.2mg/g
	経口 錠剤	0.20MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	0.14MG		
	経口 錠剤, 被覆	2.0e-03MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	0.04MG		
	経口 錠剤, 徐効	0.12MG		
	直腸; エアロゾル, 定量	9.00E-05		
	直腸; 溶液	1.50%		
	直腸; 懸濁液	1.20%		
	軟組織; 注射	0.02%		
	皮下; 注射	0.02%	皮下注射	4.2mg
	皮下; 懸濁 注射	0.01%		
	局所; クリーム,	0.03%	一般外用剤	2mg/g
	局所; クリーム, 乳液, 徐放	0.10%		
	局所; 乳液	0.06%		
	局所; 乳液, エアロゾル FOAM	0.01%		
	局所; 乳液, クリーム	1.00%		
	局所; 乳液, ローション	0.06%		
	局所; ゲル	0.08%		
	局所; ゼリー	30.00%		
	局所; ローション	10.00%		
	局所; 軟膏	0.20%		
	局所; 貼布,	0.02MG		
	局所; シャンプー	0.03%		
	局所; 溶液	0.03%		
	尿道; 注射	0.02%		
	腔; 乳液, クリーム	0.10%		
	腔; ゲル	0.02%		
PROPYLPARABEN SODIUM	経口 カプセル, 軟ゼラチン	0.35MG	経口投与	0.01mg
	経口 パウダー FOR 懸濁液	0.10%		
	経口 溶液	0.02%		
	経口 懸濁液	0.10%		
	経口 錠剤	0.06MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	0.10MG		
ROSIN	経口 錠剤, 被覆	3.44MG	経口投与 一般外用剤 直腸腔尿道適用 歯科外用及び口中用 その他の外用	30mg 適量 28.8mg/g 0.5g/g 0.155g/g
SACCHARIN	吸入 ; エアロゾル, 定量	0.11%	歯科外用及び口中用	5mg/g
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	16.00MG		
	経口 溶液	1.00%	経口投与	8mg
	経口 懸濁液	1.25%		
	経口 シロップ	0.35%		
	舌下 錠剤	0.20MG		
	局所; 軟膏	0.50%		
SACCHARIN SODIUM (サッカリンナト	口腔 / 舌下 錠剤	0.40MG	歯科外用及び口中用	1.75mg/mL
	口腔; フィルム, 溶解 (性)	0.57MG		
	歯科L; ゲル	0.30%		
	歯科L; 溶液	0.15%		
	筋肉 静脈; 注射	0.09%		
	吸入 ; エアロゾル, 定量	0.04%	吸入剤	0.05mg
	筋肉; 注射	0.09%		
	静脈; 注射	0.09%		
	静脈 (点滴); 注射	0.09%	経口投与 一般外用剤 経皮 その他の外用	660mg 2mg 5mg/g 1.25mg/g
	経口 カプセル	2.02MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	0.51MG		
	経口 濃縮物	0.15%		
	経口 分散「錠剤	0.36MG		
	経口 液体	0.06%		
	経口 パウダー 経口溶液用	5.00MG		
	経口 パウダー 経口懸濁液用	0.06%		
	経口 パウダー再構成用	0.31%		
	経口 パウダー 溶液用	53.32%		
	経口 パウダー懸濁液用	1.33%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 溶液	5.00%		
	経口 溶液, エリキシル剤	3.75%		
	経口 懸濁液	2.25%		
	経口 懸濁 液体	0.25%		
	経口 シロップ	5.00%		
	経口 錠剤	20.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	9.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	1.00MG		
	直腸; 溶液	0.08%	注腸	260mg
	直腸; 懸濁液	1.20%		
	直腸; 錠剤	0.60MG		
	舌下 錠剤	1.00MG	舌下適用	1mg
SAFFLOWER OIL	局所; ローション	3.00%	経口投与	920mg
SESAME OIL	筋肉; 注射	70.00%	経口投与	1.7g
	経口 カプセル	162.50MG	静脈内注射	30mg
			筋肉内注射	300mg
			その他の注射	2mL
			皮下注射	300mg
			一般外用剤	909mg/g
			直腸腔尿道適用	4.31g
SHELLAC	経口 カプセル	24.83MG	経口投与	108mg
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	29.00MG	精製セラック	
	経口 カプセル, 徐効	60.00MG	経口投与	300mg
	経口 錠剤	24.04MG	歯科外用及び口中用	0.045mg、
	経口 錠剤, 被覆	5.00MG	白色セラック	
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	3.31MG	経口投与	120mg
	経口 錠剤, フィルム 被覆	4.40MG	歯科外用及び口中用	0.53mg
	経口 錠剤, 徐効	7.30MG		
SILICON DIOXIDE (二酸化ケイ素)	歯科; ギル	19.00%	経口投与	152mg
	経口 カプセル	22.00MG	一般外用剤	5.5mg/g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	9.63MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	2.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	5.26MG		
	経口 点滴剤			
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	10.00MG		
	経口 パウダー 経口懸濁液用	0.90%		
	経口 パウダー 再構成用	4.00%		
	経口 パウダー 懸濁液用	4.50%		
	経口 錠剤	24.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	3.75MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	33.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	5.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性	170.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	85.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	15.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	8.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	7.10MG		
	経口 錠剤, 徐効	40.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	7.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	60.00MG		
	経口 錠剤, 徐放, フィルム 被覆	26.00MG		
	舌下 錠剤	1.20MG		
	局所; ギル	0.25%		
	腔; 乳液, クリーム	1.00%		
SILICON DIOXIDE, COLLOIDAL (二	口腔; 錠剤	1.25MG	経口投与	152mg
	ENDOCERVICAL; ギル	8.00%	一般外用剤	5.5mg/g
	経口 カプセル	11.66MG		
	経口 カプセル (即時型／複合型リ	2.10MG		
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	0.50MG		
	経口 カプセル, 徐放性 ACTION, 被	1.28MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	0.60MG		
	経口 カプセル, 徐放	3.60MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	6.00MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	1.73MG		
	経口 カプセル, 徐効	7.02MG		

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	1.70MG		
	経口 分散 錠剤	3.60MG		
	経口 FOR 懸濁液	0.30%		
	経口 顆粒	100.00MG		
	経口 顆粒, 腸溶性 被覆	3.20MG		
	経口 顆粒再構成用	16.25MG		
	経口 顆粒 懸濁液用	25.00MG		
	経口 粉末	10.00%		
	経口 パウダー 経口懸濁液用	11.00%		
	経口 パウダー 再構成用	2.50%		
	経口 パウダー 懸濁液用	5.50%		
	経口 懸濁液	5.00%		
	経口 懸濁 徐効	2.16%		
	経口 錠剤	99.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	2.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	8.50MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	84.80MG		
	経口 錠剤, 被覆	16.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出	5.60MG		
	経口 錠剤, 徐放性	23.75MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	6.00MG		
	経口 錠剤, 分散	6.00MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	3.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	24.80MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	33.00MG		
	経口 錠剤, FOR 溶液	0.75MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	7.80MG		
	経口 錠剤, 復効	0.50MG		
	経口 錠剤, 糖衣	0.80MG		
	経口 錠剤, 徐効	48.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	5.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	6.10MG		
	経口 錠剤, 徐効, 多層構造, フィル	1.55MG		
	経口 錠剤, 徐放, フィルム 被覆	30.00MG		
	経口 21; 錠剤	0.65MG		
	経口 28; 錠剤	0.65MG		
	直腸; 坐薬	14.00MG		
	舌下 錠剤	1.00MG		
	経皮; フィルム, 制御放出	49.00MG		
	腔; 乳液, クリーム	1.01%		
	腔; 挿入	2.50MG		
	腔; 錠剤	8.00MG		
SILICONE (シリコン油)	子宮内; 坐薬, 挿入, 制御放出	60.00MG	一般外用剤	30mg/g
	経口 カプセル	10.00MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	0.42MG		
	経口 カプセル, 徐効	0.14MG		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	0.10%		
	経皮; フィルム, 制御放出	353.51MG		
	腔;	8.70MG		
	腔; 子宮内 避妊リング	27.48MG		
SIMETHICONE (シリコン消泡剤)	経口 カプセル	5.70MG	一般外用剤 経口投与 注腸	0.1mg/g 360mg 1560mg
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	0.61MG		
	経口 カプセル, 徐放	0.04MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	0.02MG		
	経口 カプセル, 徐効	0.06MG		
	経口 顆粒	3.30MG		
	経口 顆粒 発泡性	36.00MG		
	経口 PASTILLE	0.40MG		
	経口 パウダー 懸濁液用	0.66%		
	経口 溶液			
	経口 懸濁液	0.20%		
	経口 懸濁 液体	1.00%		
	経口 懸濁 徐効			
	経口 錠剤	1.50MG		
	経口 錠剤, 被覆	4.0e-04MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	0.56MG		
	経口 錠剤, 徐放	0.61MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	0.18MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	0.04MG		
	経口 錠剤, 徐効	7.50MG		
	局所; 乳液, クリーム	1.00%		
	局所; ローション	0.50%		
	局所; 懸濁液	0.10%		
SODIUM ACETATE (酢酸ナトリウム)	耳 (耳性); 溶液	0.07%	一般外用剤 1.5mg/g	
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	0.02%	耳鼻科剤 0.2mg/g	
	耳 (耳性); 懸濁液	0.04%	直腸腔尿道適用 630mg	
	耳 (耳性); 懸濁 液体	6.80%		
	体外; 溶液	0.17%		
	筋肉 - 静脈皮下; 注射	0.65%	その他の注射 13.6mg	
	筋肉 静脈; 注射	0.96%		
	筋肉 皮下; 注射	0.20%		
	皮内; 注射	0.16%		
	筋肉; 注射	0.40%	筋肉内注射 14mg	
	眼内; 溶液	0.39%	眼科用剤 2.08mg/g	
	静脈; I注射	0.62%	静脈内注射 111.39mg	
	静脈; 注射	12.25%		
	静脈; 溶液, 注射	0.02%		
	硝子体内; 懸濁 注射	0.39%		
	静脈皮下; 注射	0.20%		
	静脈皮下; 液体	0.20%		
	静脈(点滴); I注射ができる	0.20%		
	静脈(点滴); 注射	59.40%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	1.70%		
	眼; 乳液	0.05%		
	眼; パウダー FOR 溶液	0.39%		
	眼; 溶液	0.35%		
	眼; 溶液, 点滴剤	1.27%		
	経口 パウダー FOR 溶液	9.93%		
	経口 溶液	0.34%		
	経口 溶液, 注射	0.13%		
	経口 溶液, シロップ	0.72%		
	フェレシス成分除去; 溶液	0.17%		
	皮下; 注射	0.14%	皮下注射 15mg	
	皮下; 液体	0.58%		
	皮下; 溶液, 注射	0.38%		
	粘膜; 溶液, 注射	0.13%		
	局所; 懸濁液	0.03%		
SODIUM ACETATE ANHYDROUS	筋肉 皮下; 注射	0.07%	筋肉内注射	1.64mg
	筋肉; 注射	0.47%		
	静脈; I注射	0.07%		
	静脈; 溶液	17.70%		
	静脈; 溶液, 注射	0.08%		
	静脈(点滴); 注射	6.25%		
	経口 溶液	17.70%		
	皮下; 注射	0.16%		
	皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結	0.01%		
SODIUM ALGinate	局所; 乳液, クリーム	0.02%		
	経口 カプセル	80.00MG	経口投与	2.4g
	経口 懸濁液	0.12%	その他の内用	90mg
	経口 シロップ	0.30%	一般外用剤	50mg/g
	経口 錠剤	35.00MG	直腸腔尿道適用	40mg
	経口 錠剤 (即時型／複合型) リー	320.00MG	歯科外用及び口中用	5.5mg/g
	経口 錠剤, 制御放出	262.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	350.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	240.00MG		
	経口 トローチ	64.30MG		
SODIUM ASCORBATE (L-アスコルビ	静脈; 注射	1.00%	経口投与	30mg
	静脈; 溶液, 注射	1.00%		
	経口 錠剤	5.00MG		
SODIUM BENZOATE	口腔; フィルム, 溶解 (性)	0.69MG	一般外用剤	5mg/g

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	歯科L; ギル	0.08%	歯科外用及び口中用	0.7mg/g
	筋肉 静脈; 注射	10.00%	その他の注射	0.3mg
	筋肉; 注射	5.00%	筋肉内注射	20mg
	筋肉; 溶液, 注射	4.80%	眼科用剤	0.2mg/mL
	静脈; I注射	0.07%	静脈内注射	40mg(点滴)
	静脈(点滴); 注射	5.00%		
	経口 カプセル	0.30MG	経口投与	2200mg
	経口 カプセル,硬ゼラチン	0.11MG		
	経口 濃縮物	0.20%		
	経口 点滴剤	0.30%		
	経口 FOR 懸濁液	0.20%		
	経口 顆粒、再構成用	10.00MG		
	経口 顆粒、懸濁液用	10.00MG		
	経口 液体	0.50%		
	経口 パウダー、経口懸濁液用	3.60%		
	経口 パウダー、再構成用	0.10%		
	経口 パウダー、溶液用	9.33%		
	経口 パウダー、懸濁液用	8.00%		
	経口 溶液	1.08%		
	経口 溶液, エリキシル剤	0.50%		
	経口 溶液, 液体	0.10%		
	経口 懸濁液	3.78%		
	経口 懸濁 点滴剤	0.60%		
	経口 懸濁 液体	1.00%		
	経口 シロップ	5.00%		
	経口 錠剤	0.75MG		
	経口 錠剤(即時型／複合型リリー	60.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	9.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性 腸溶性 被覆	0.34MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	0.02MG		
	経口 錠剤、溶液用	5.00MG		
	直腸; 浣腸	0.10%	注腸	1560mg
	局所; 乳液, クリーム	0.20%		
	局所; 貼布	0.44MG		
SODIUM BICARBONATE	口腔; GUM, 咀嚼	10.00MG	一般外用剤	380.8mg/g
	口腔; 錠剤	42.00MG	直腸腔尿道適用	352mg
	筋肉 静脈; パウダー、注射 溶液,	61.90%	歯科外用及び口中用	679mg/g
	筋肉; 注射	3.50%	筋肉内注射	2.3g
	筋肉; パウダー、注射 溶液用	3.00%	脊椎腔内注射	0.04mg
	腹腔内; パウダー、注射 溶液用	60.00%	皮内注射	0.54 μ g
	髄腔内; I注射		その他の注射	40mg
	髄腔内; 注射	5.00E-05	その他の外用	190mg/g
	気管内; 懸濁液		吸入剤	100mg
	静脈; 注射	5.00E-05		
	静脈; パウダー、注射 溶液用	2.10%		
	硝子体内; 注射	0.17%	眼科用剤	2.102mg/g
	静脈(点滴); 注射	83.00%	静脈内注射	1.75g
	静脈(点滴); パウダー、注射 溶液	81.94%		
	静脈(点滴); パウダー、注射 溶液,	0.18%		
	経口 カプセル	26.50MG	経口投与	1.35g
	経口 カプセル,硬ゼラチン	2.00MG		
	経口 パウダー、溶液用	8.72%		
	経口 錠剤	125.00MG		
	経口 錠剤(即時型／複合型リリー	4.24MG		
	経口 錠剤(即時型／複合型リリー	140.00MG		
	経口 錠剤(即時型／複合型リリー	267.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	9.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性 腸溶性 被覆	15.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	40.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	26.97MG		
	経口 錠剤, 徐効	2.56MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	2.56MG		
	皮下; パウダー、注射 溶液用	0.01%	皮下注射	2.3g
	腔; 挿入	43.00MG	殺虫剤	
SODIUM BISULFATE(亜硫酸水素ナ	筋肉 - 静脈皮下; 注射	0.10%	皮内注射	1mg/mL

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	筋肉 静脈; 注射	0.32%	その他の注射	43075mg
	吸入 ; 溶液	0.01%	局所麻酔注射	50mg
	経口 濃縮物	0.09%	経口投与	160mg
	AN浸潤; 注射	0.20%	舌下適用	3mg
	耳 (耳性); 溶液	0.10%	耳鼻科用剤	1mg/mL
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	0.10%		
	耳 (耳性); 懸濁液	1.00E-05		
	筋肉 - 静脈皮下; 注射	0.50%		
	筋肉 静脈; 注射	0.66%		
	筋肉 静脈; パウダー、注射 溶液	5.18%		
	吸入 ; 吸入抗原	0.07%	吸入剤	1mg/mL
	吸入 ; 溶液	0.20%		
	関節内; 注射	0.32%		
	心臓内; 注射	0.10%		
	病巣内; 注射	0.32%		
	筋肉; 注射	1.35%	筋肉内注射	150mg
	腹腔内; 注射	1.35%		
	滑液嚢内; 注射	0.32%		
	静脈; 注射	5.00%	静脈内注射	1250mg
	静脈; 溶液, 注射	5.00%		
	イオントフォoresis; 溶液	0.05%		
	灌注 注射	0.66%		
	静脈(点滴); 注射	10.00%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	0.02%		
	神経ブロック; 注射	2.20%		
	眼; 溶液	0.10%	眼科用剤	4mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	0.10%		
	眼; 懸濁液	0.06%		
	経口 カプセル	0.36MG		
	経口 濃縮物	0.04%		
	経口 溶液	0.10%		
	経口 懸濁液	0.20%		
	経口 錠剤	0.65MG		
	軟組織; 注射	0.10%		
	皮下; 注射	0.15%	皮下注射	1150mg
	舌下 錠剤	0.50MG		
	局所; 乳液, クリーム	0.30%	一般外用剤	3mg/g
	局所; ローション	0.22%		
	局所; パウダー、溶液用	0.10%		
	局所; 溶液	0.05%		
SODIUM BORATE(ホウ砂)	耳 (耳性); 溶液	0.30%	一般外用剤	5mg/g
	眼; 溶液	0.54%	経皮	1mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	1.10%	眼科用剤	4mg/mL
	眼; 懸濁 点滴剤	0.02%	耳鼻科用剤	5.7mg/mL
			その他の外用	5mg
SODIUM CARBONATE(炭酸ナトリウム)	口腔; GUM, 咀嚼	30.00MG		
	口腔; 錠剤	20.00MG		
	筋肉 静脈; 注射	1.64%	筋肉内注射	20.8mg
	筋肉 静脈; パウダー 注射 溶液用	70.80%	皮下注射	20.8mg
	静脈; 注射	0.04%	静脈内注射	3.5mg/kg(体重)
	硝子体内; 注射	8.20E-05	眼科用剤	1.62mg/g
	静脈(点滴); 注射	24.10%		
	静脈(点滴); パウダー注射 溶液用	63.00%		
	静脈(点滴); パウダー注射 溶液, 凍	0.17%		
	眼; 溶液	1.00%		
	経口 カプセル, 徐効	6.00MG	経口投与	
	経口 顆粒経口懸濁液用	6.50MG		
	経口 錠剤	25.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	10.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	30.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	25.00MG		
	経口 トローチ	25.00MG	殺虫剤	
SODIUM CASEINATE	経口 錠剤	100.00MG	経口投与 一般外用剤	120mg 50mg/g
SODIUM CHLORIDE	AN,CNBLK 髄腔内; 注射	0.80%	その他の内用	84mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	AN浸潤; 注射	0.85%	その他の注射	52mg
	AN,SYMPATHETIC NBLK; 注射	0.30%	歯科注射	18mg
	耳 (耳性); 溶液	9.00%	局所麻酔注射	1.5g
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	0.36%	その他の注射	425mg
	耳 (耳性); 懸濁 液体	9.00%	耳鼻科用剤	9mg/g、
	仙骨麻酔; 注射	0.90%		
	歯科L; I注射	0.30%	歯科外用及び口中用	9mg/g
	歯科L; 注射	0.60%		
	硬膜外; 注射	0.90%		
	硬膜外; 溶液, 注射	0.90%		
	体外; 注射	0.90%		
	体外; 溶液	0.80%		
	筋肉 - 静脈皮下; 注射	0.90%	筋肉内注射	700mg
	筋肉 静脈; I注射ができる	0.90%		
	筋肉 静脈; 注射	90.00%		
	筋肉 静脈; パウダー FOR 注射 溶	9.00%		
	筋肉 静脈; パウダー FOR 注射 溶	18.00%		
	筋肉 静脈; 溶液	0.90%		
	筋肉 静脈; 溶液, 注射	0.75%		
	筋肉 皮下; 注射	0.90%		
	INFILTRATION; 注射			
	INFILTRATION; 溶液, 注射	0.85%		
	吸入 ; 溶液	3.16%	吸入剤	6.67mg/mL
	動脈内 ; I注射	0.49%	動脈内注射	201.6mg
	動脈内 ; 注射	4.90%		
	動脈内 ; パウダー FOR 注射 溶液	0.13%		
	動脈内 ; 溶液	0.90%		
	関節内; I注射ができる	0.66%		
	関節内; 注射	0.90%		
	関節内; 注射, 徐効			
	滑液嚢内; 注射	0.32%		
	心臓内; 注射	0.70%		
	腔内療法; 注射	0.82%		
	皮内; 注射	0.70%	皮内注射	9mg
	病巣内; I注射ができる	0.66%		
	病巣内; 注射	0.85%		
	病巣内; 注射, 徐効	0.90%		
	病巣内; 懸濁 注射	0.22%		
	筋肉; I注射ができる	0.66%		
	筋肉; 注射	4.50%		
	筋肉; 注射, 徐効	0.90%		
	筋肉; パウダー FOR 注射 溶液	22.60%		
	筋肉; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	0.24%		
	筋肉; 溶液, 注射	0.90%		
	筋肉; 懸濁 注射	0.22%		
	INTRAOCULAR; 溶液	0.70%		
	腹腔内; パウダー FOR 注射 溶液	22.60%		
	腹腔内; 溶液	53.50%		
	胸膜内; パウダー FOR 注射 溶液	22.60%		
	滑液嚢内; 注射	0.90%		
	滑液嚢内; 注射, 徐効	0.90%		
	滑液嚢内; 懸濁 注射	0.22%		
	髄腔内; I注射	0.90%	脊椎腔内注射	9.75mg
	髄腔内; 注射	4.90%		
	髄腔内; 注射, 懸濁 リボソーム	9.00%		
	髄腔内; パウダー FOR 注射 溶液	0.13%		
	髄腔内; 溶液, 注射	0.90%		
	気管内; 注射	1.20%		
	気管内; パウダー FOR 懸濁液	4.67%		
	気管内; 懸濁液	0.08%		
	腫瘍内; 注射	1.20%		
	脈管内 ; 注射	0.18%		
	静脈 BOLUS; I注射ができる	0.90%		
	静脈 BOLUS; 溶液, 注射	0.90%		
	静脈; I注射ができる	12.00%		