

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
静脈; 注射		90.00%		
静脈; パウダー FOR 注射 溶液		45.20%		
静脈; パウダー FOR 注射 溶液, 凍		45.00%		
静脈; 溶液		0.90%		
静脈; 溶液, 注射		90.00%		
硝子体内; I注射ができる		0.90%		
硝子体内; 注射		0.77%		
硝子体内; 懸濁 注射		0.55%		
イオントフォレシス; DRUG DEL 静脈		0.60MG		
イオントフォレシス; 貼布, 制御放出		3.10MG		
イオントフォレシス; 溶液		0.60%		
静脈皮下; 注射		1.00%		
静脈皮下; 液体		0.70%		
静脈皮下; パウダー FOR 注射 溶		0.68%		
静脈(点滴); I注射		0.70%	静脈内注射	9g
静脈(点滴); 注射		90.00%		
静脈(点滴); パウダー FOR 注射 溶		45.00%		
静脈(点滴); 溶液, 注射		0.90%		
静脈(点滴); 懸濁 注射		0.90%		
鼻; 溶液		0.66%		
鼻; 噴霧		0.90%		
鼻; 定量用スプレー		1.90%		
神経ブロック; 注射		0.90%		
神経ブロック; 溶液, 注射		0.90%		
眼; ゲル		0.90%	眼科用剤	7.14mg/g
眼; パウダー FOR 溶液		0.90%		
眼; 溶液		55.00%		
眼; 溶液, 点滴剤		0.90%		
眼; 溶液/点滴剤		0.41%		
眼; 懸濁液		0.85%		
眼; 懸濁 点滴剤		0.68%		
経口 カプセル, 徐放		20.72MG	経口投与	240mg
経口 顆粒 FOR 懸濁液		13.50MG		
経口 パウダー FOR 経口懸濁液		0.10%		
経口 パウダー FOR 懸濁液		0.25%		
経口 溶液		4.00%		
経口 溶液, エリキシル剤		0.20%		
経口 懸濁液		4.11%		
経口 懸濁 FOR 吸入		1.70%		
経口 シロップ		0.30%		
経口 錠剤		148.00MG		
経口 錠剤 (即時型/複合型リリー		7.50MG		
経口 錠剤, 制御放出		36.00MG		
経口 錠剤, 徐放		335.10MG		
経口 錠剤, 徐効		143.26MG		
PERIDURAL; 注射		0.80%		
PHOTOPHERESIS; 溶液		0.80%		
直腸; 坐薬		52.50MG	直腸膣尿道適用	0.03mg/mg
(吸入 (吸入 )); 溶液		2.70%		
(吸入 (吸入 )); 溶液, エアロゾル,		1.12%		
(吸入 (吸入 )); 溶液, FOR 吸入		2.70%		
ROUTE NOT G 静脈EN; I注射がで		0.90%		
軟組織; I注射		0.66%		
軟組織; 注射		0.85%		
軟組織; 注射, 徐効		0.90%		
軟組織; 懸濁 注射		0.22%		
SUBARACHNOID; 溶液, 注射		0.90%		
皮下; 筋肉PLANT		77.00MG		
皮下; I注射		0.85%		
皮下; 注射		0.90%	皮下注射	540mg
皮下; 液体		0.58%		
皮下; 溶液, 注射		4.50%		
皮下; 懸濁 注射		0.80%		
粘膜; 溶液, 注射		16.00%		
局所; 乳液, クリーム		0.50%	一般外用剤	40mg/g

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; ローション	0.30%		
	局所; 貼布, 制御放出	3.10MG		
	局所; シャンプー	2.25%		
	局所; 溶液	0.83%		
	局所; 懸濁液	0.53%		
	局所; 懸濁 点滴剤	0.50%		
	経皮; DDS	0.60MG		
SODIUM CITRATE (クエン酸ナトリウム)	AN浸潤; 注射	0.03%		
	耳 (耳性); 溶液	2.00%	耳鼻科用剤	10mg/g
	硬膜外; 注射	2.20%		
	筋肉 - 静脈皮下; 注射	0.94%	筋肉内注射	112mg
	筋肉 静脈; I注射ができる	1.35%	動脈内注射	300mg
	筋肉 静脈; 注射	40.00%	脊椎腔内注射1	2.5mg
	筋肉 静脈; 溶液	0.02%	その他の注射	300mg
	筋肉 皮下; 注射	0.22%	歯科外用及び口中用	1mg/g
	吸入 ; 溶液	0.60%	その他の外用	15mg/g
	関節内; 注射	2.20%	皮内注射	0.25mg
	心臓内; 注射	0.80%	吸入剤	15mg
	腔内療法; 注射	0.15%		
	腔内療法; パウダー FOR 注射 溶	5.30E-05		
	病巣内; 注射	1.00%		
	筋肉; I注射	0.43%		
	筋肉; 注射	6.60%		
	筋肉; パウダー FOR 注射 溶液	4.62%		
	筋肉; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	0.64%		
	筋肉; 溶液, 注射	1.30%		
	INTRAOCULAR; 溶液	0.40%		
	腹腔内; 注射	6.60%		
	胸膜内; パウダー FOR 注射 溶液	4.62%		
	滑液嚢内; 注射	1.00%		
	髄腔内; パウダー FOR 注射 溶液	4.62%		
	脈管内; 注射	0.32%		
	静脈; I注射	0.02%	静脈内注射	1765mg
	静脈; 注射	30.00%		
	静脈; パウダー FOR 注射 溶液	16.40%		
	静脈; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	16.35%		
	静脈; 溶液	0.82%		
	静脈; 溶液, 注射	3.00%		
	イオントフォーシス; DDS	2.20MG		
	灌注 注射	2.20%		
	静脈(点滴); 注射	40.00%		
	静脈(点滴); パウダー FOR 注射 溶	8.00%		
	静脈(点滴); パウダー FOR 注射 溶	14.00%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	0.60%		
	鼻; 溶液	70.00%		
	鼻; 噴霧	0.44%		
	鼻; 定量用スプレー	0.03%		
	神経ブロック; 注射	0.03%		
	眼; パウダー FOR 溶液	0.17%	眼科用剤	8.5mg/g
	眼; 溶液	2.00%		
	眼; 溶液, 点滴剤	2.20%		
	眼; 懸濁液	0.30%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.45%		
	経口 濃縮物	0.50%	経口投与	微量
経口 点滴剤	5.00%			
経口 顆粒	210.62MG			
経口 顆粒 FOR 再構成	0.70MG			
経口 顆粒 FOR 懸濁液	15.00MG			
経口 パウダー FOR 経口懸濁液	4.50%			
経口 パウダー FOR 再構成	0.04%			
経口 パウダー FOR 溶液				
経口 パウダー FOR 懸濁液	3.50%			
経口 溶液	3.09%			
経口 溶液, 濃縮物	0.05%			
経口 溶液, エリキシル剤	2.25%			

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 溶液, 液体	0.70%		
	経口 懸濁液	26.00%		
	経口 懸濁 FOR 吸入	0.10%		
	経口 懸濁 液体	0.50%		
	経口 懸濁 徐効	2.35%		
	経口 シロップ	32.50%		
	経口 錠剤	275.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リ-	300.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	18.34MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	82.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	200.00MG		
	(吸入 (吸入); パウダー FOR 吸入	0.13%		
	軟組織; 注射	1.00%		
	皮下; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	0.64%		
	皮下; 溶液, 注射	1.30%	皮下注射	100mg
	舌下 錠剤	2.68MG		
	局所; 乳液, クリーム	0.31%	一般外用剤	7mg/g
	局所; 乳液, ローション	0.08%		
	局所; シャンプー	2.60%		
	局所; 溶液	0.10%		
	局所; 溶液, 点滴剤	0.29%		
	経皮; DDS	2.20MG	経皮	5mg/g
	腔; 海綿	7.60MG	殺虫剤	
SODIUM DESOXYCHOLATE	静脈(点滴); パウダー FOR 注射 溶	4.10%	皮内注射	0.82mg
			脊椎腔内注射	0.82mg
			静脈内注射	41mg
SODIUM GLUCONATE	静脈; 注射	2.30%	静脈内注射	57mg
	静脈(点滴); パウダー FOR 注射 溶	0.10%	筋肉内注射	57mg
SODIUM HYDROXIDE	AN浸潤; 注射	0.07%	動脈内注射	356mg
	耳 (耳性); 溶液	0.80%	その他の注射	1.6mg
	口腔; フィルム, 溶解 (性)	1.18MG	皮内注射	適量
	筋肉 静脈; 注射	10.68%	歯科注射	12mg
	筋肉 静脈; パウダー 注射 溶液用	0.70%	局所麻酔	適量
	筋肉 静脈; 溶液, 注射	0.13%	耳鼻科用剤	2.5mg/g
	吸入 ; 溶液	8.00%	吸入剤	0.15mg
	筋肉; 注射	3.14%	筋肉内注射	300mg
	静脈; I注射	0.60%	静脈内注射	600mg
	静脈; 注射	10.00%	歯科外用及び口中用	1mg、
	静脈; パウダー 注射 溶液用	13.65%		
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	19.27%		
	静脈; 溶液, 注射	0.09%		
	イオントフォレシス; DDS	4.20MG		
	静脈(点滴); 注射	13.00%		
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用	9.00%		
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用,	1.56%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	2.83%		
	鼻; 定量用スプレー	4.00E-05		
	神経ブロック; 注射	0.07%		
	眼; 乳液	0.39%	眼科用剤	7mg/g
	眼; 溶液	0.10%		
	経口 カプセル	0.74MG	経口投与	224mg
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	0.75MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	1.50MG		
	経口 濃縮物	1.00%		
	経口 溶液	8.00%		
	経口 懸濁液	40.00%		
	経口 シロップ	7.10%		
	経口 錠剤	6.72MG		
	経口 錠剤, 徐放性	0.21MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	0.32MG		
	経口 錠剤, 徐放	2.70MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	0.15MG		
	経口 錠剤, 徐効	0.40MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	0.04MG		
	直腸; 浣腸	26.40%	直腸尿道適用	46mg

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	直腸; 溶液 皮下; 注射 皮下; 注射 皮下; 懸濁 注射 局所; クリーム, 局所; クリーム, 乳液, 徐放 局所; 乳液 局所; 乳液, クリーム 局所; 乳液, ローション 局所; ゲル 局所; ゼリー 局所; ローション 局所; 軟膏, 局所; 溶液 経皮; DDS 経皮; フィルム, 制御放出 経皮; ゲル 腔; 乳液, クリーム 腔; ゲル	0.62% 0.42% 3.14% 0.22% 2.72% 2.72% 0.20% 0.52% 0.02% 10.00% 0.01% 2.60% 0.10% 0.02% 4.20MG 0.85MG 4.72% 0.18% 0.25%	皮下注射 一般外用剤 経皮	230mg 45mg/g 0.6mg/g
SODIUM IODIDE	静脈; 注射 静脈; パウダー-注射 溶液用 局所; 溶液, 液体	1.00% 5.00% 0.74%	一般外用剤	17.3mg/g
SODIUM LACTATE(乳酸ナトリウム)	仙骨麻酔; 注射 腹腔内; 溶液 静脈; 注射 静脈; パウダー FOR 注射 溶液, 凍 神経ブロック; 注射 経口 懸濁液 局所; ゲル 局所; 溶液	1.00E-06 44.80% 0.17% 1.87% 0.17% 2.00% 0.77% 1.62%	静脈内注射 一般外用剤	50mg 51.3mg/g
SODIUM LACTATE, L-(乳酸ナトリウム)	筋肉-静脈皮下; 注射 心臓内; 注射 静脈(点滴); 注射	0.18% 0.18% 0.18%	静脈内注射 一般外用剤	50mg 51.3mg/g
SODIUM LAURYL SULFATE	口腔/舌下 錠剤 歯科L; ゲル 経口 カプセル 経口 カプセル(即時型/複合型リ 経口 カプセル, 徐放性ACTION 経口 カプセル, 徐放性ACTION, 被 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐放 経口 カプセル, 硬ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 徐効 経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン 経口 DISPERSIBLE 錠剤 経口 パウダー FOR 懸濁液 経口 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤(即時型/複合型リ 経口 錠剤(即時型/複合型リ 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 徐放性ACTION 経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 多層構造, 徐放 経口 錠剤, 口腔内崩壊 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, 被覆 経口 28; 錠剤 舌下 錠剤 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 軟膏	1.10MG 1.47% 15.00MG 3.60MG 0.11MG 2.00MG 1.00MG 16.66MG 6.00MG 24.00MG 1.60MG 1.70MG 8.40MG 0.06% 0.25% 51.69MG 0.98MG 5.00MG 5.20MG 0.50MG 8.09MG 51.69MG 12.00MG 0.80MG 0.10MG 20.62MG 10.50MG 0.65MG 0.02MG 2.50% 0.50% 1.00%	歯科外用及び口中用 経口投与 直腸腔尿道適用 一般外用剤	16.4mg/g 300mg 18mg 20mg/g





添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	病巣内; 懸濁 注射	0.14%	皮内注射	1.62mg
	筋肉; 懸濁 注射	0.14%	筋肉内注射	480mg
	滑液嚢内; 懸濁 注射	0.14%	局所麻酔注射	20mg
	静脈; 注射	0.76%	静脈内注射	816mg
	眼; 溶液	0.29%	その他の注射	384mg
	眼; 懸濁液	0.43%	一般外用剤	41mg/g
	経口 濃縮物	1.70%	経口投与	800mg
	経口 溶液	4.75%	直腸膾尿道適用	71.6mg
	経口 シロップ	1.37%	眼科用剤	30.43mg/g
	軟組織; 懸濁 注射	0.14%	耳鼻科用剤	10mg/g
	皮下; パウダー 注射溶液用, 凍結	0.29%	皮下注射	294.5mg
	皮下; 懸濁 注射	0.05%	歯科外用及び口中用	4.5mg/g
	局所; 乳液, クリーム	0.20%	その他の外用 殺虫剤	18mg/g
SODIUM PHOSPHATE,	口腔; フィルム, 溶解(性)	0.76MG	眼科用剤	5.38mg/g
	筋肉 静脈; 注射	0.16%	皮内注射	0.33mg
	筋肉 静脈; 注射	1.47%	静脈内注射	mg/kg(体重)
	病巣内; 懸濁 注射	0.68%	耳鼻科用剤	5.38mg/g
	筋肉; 注射	0.57%	皮下注射	40.78mg
	筋肉; 懸濁 注射	0.68%		
	滑液嚢内; 懸濁 注射	0.68%		
	イオントフォレシス; 貼布, 制御放出	14.20MG		
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用	1.32%		
	眼; 溶液	0.19%		
	眼; 溶液, 点滴剤	0.01%		
	経口 溶液	1.37%		
	経口 錠剤	1.37MG		
	軟組織; 懸濁 注射	0.68%		
	皮下; パウダー注射 溶液用, 凍結	0.02%		
	皮下; 懸濁 注射	0.06%		
	局所; クリーム,	0.20%		
	局所; 乳液, クリーム	0.26%		
	局所; ローション	0.30%		
	局所; ローション,	0.20%		
	局所; 貼布, 制御放出	14.20MG		
	局所; シャンプー, 懸濁液	1.00%		
SODIUM PHOSPHATE,	耳(耳性); 溶液, 点滴剤	0.12%	耳鼻科用剤	5mg/g
	筋肉 静脈; 注射	1.28%	その他の注射	120mg
	筋肉 静脈; パウダー 注射 溶液用	1.28%	歯科外用及び口中用	25mg/g、
	筋肉 静脈; 溶液, 注射	0.62%		
	筋肉; 注射	0.50%	筋肉内注射	70mg
	筋肉; パウダー 注射 溶液用	0.50%		
	筋肉; パウダー 注射 溶液用, 凍結	1.20%		
	脈管内; 注射	0.01%		
	静脈; 注射	0.50%	静脈内注射	80mg
	静脈; パウダー 注射 溶液用	0.71%		
	静脈; 溶液	4.00%		
	静脈(点滴); 注射	0.50%		
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用	1.28%		
	鼻; 定量用スプレー	0.01%		
	眼; 溶液	0.72%	眼科用剤	8mg/g、
	眼; 溶液, 点滴剤	0.78%		
	眼; 懸濁液	0.65%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.05%		
	経口 溶液	4.00%		
	経口 シロップ	0.07%		
	経口 錠剤	4.18MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	23.40MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	30.97MG		
	経口20; 錠剤	0.07MG		
	経口21; 錠剤	0.07MG		
	皮下; 注射	3.31%		
	皮下; パウダー注射 溶液用	0.08%		
	皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結	0.11%		
	皮下; 溶液, 注射	0.15%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; シャンプー, 懸濁液 局所; 溶液	0.50% 0.60% 1.00% 0.17%	一般外用剤	6mg/g
SODIUM PROPIONATE	経口 カプセル 経口 パウダー 懸濁液用 経口 シロップ	0.36MG 0.25% 1.00%	耳鼻科用剤	50mg/g
SODIUM STARCH GLYCOLATE(カ)	口腔; 錠剤 経口 カプセル 経口 カプセル, 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐放性, 被覆, 硬ゼラ 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 硬ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 徐効 経口 分散 錠剤 経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型/複合型リリー 経口 錠剤 (即時型/複合型リリー 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 制御放出 経口 錠剤, 徐放性 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 多層構造, 被覆 経口 錠剤, 口腔内崩壊 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 経口 21; 錠剤 経口 28; 錠剤 舌下 錠剤	8.30MG 180.00MG 16.71MG 16.00MG 16.80MG 20.00MG 7.75MG 18.60MG 2.40MG 876.00MG 10.80MG 50.00MG 73.00MG 25.86MG 34.00MG 21.00MG 12.00MG 30.00MG 90.00MG 2.00MG 71.43MG 15.00MG 10.00MG 4.00MG 3.99MG 5.50MG	経口投与 直腸腔尿道適用	320mg 150.0mg
SODIUM STEARATE	経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型/複合型リリー 経口 錠剤, 徐放性 経口 錠剤, 口腔内崩壊	9.48MG 3.20MG 10.00MG 0.85MG	一般外用剤 直腸腔尿道適用	90mg/g 280mg/g、
SODIUM STEARYL FUMARATE(フマ)	経口 カプセル 経口 カプセル, 硬ゼラチン 経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型/複合型リリー 経口 錠剤 (即時型/複合型リリー 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 制御放出 経口 錠剤, 徐放性 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 口腔内崩壊 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, 被覆 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	7.26MG 2.70MG 24.40MG 2.00MG 2.00MG 1.18MG 2.00MG 7.00MG 27.00MG 20.00MG 26.00MG 6.00MG 8.90MG 4.00MG 16.00MG	経口投与	64mg
SODIUM SUCCINATE	静脈; 注射, パウダー 凍結乾燥, リ 経口 濃縮物	2.70%	経口投与	60mg
SODIUM SULFATE	眼; 溶液 眼; 懸濁液 経口 錠剤 経口 20; 錠剤	0.22% 1.20% 7.37MG 120.00MG	殺虫剤	
SODIUM SULFATE ANHYDROUS	吸入 ; 溶液 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 眼; 懸濁液 経口 錠剤 経口 21; 錠剤	0.02% 0.15% 0.17% 1.20% 105.10MG 96.00MG	経口投与 一般外用剤 殺虫剤	51.2mg 45mg/g
SODIUM SULFITE	耳 (耳性); 溶液	0.02%	経口投与	200mg

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	硬膜外; 注射 筋肉 静脈; 注射 吸入 ; 溶液 関節内; 注射 筋肉; 注射 静脈; 注射 眼; 溶液, 点滴剤 経口 濃縮物 皮下; 注射 局所; 乳液, クリーム	0.10% 0.20% 0.10% 0.10% 0.05% 0.10% 0.20% 0.03% 0.09% 0.20%	静脈内注射	60mg
SODIUM TARTRATE(DL - 酒石酸)	筋肉 静脈; 注射 筋肉; 注射 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射	1.20% 1.41% 1.20% 1.20%	経口投与 L- 酒石酸ナトリウム 経口投与 静脈内注射 一般外用剤	45mg  28.2mg 40mg 11.5mg/g
SODIUM THIOGLYCOLATE	皮下; 注射	0.66%	静脈内注射 皮下注射	20mg 20mg
SODIUM THIOSULFATE(チオ硫酸ナ)	眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 眼; 懸濁液 眼; 懸濁 点滴剤 経口 カプセル 経口 溶液 経口 錠剤 局所; クリーム, 局所; クリーム, 乳液, 徐放	5.00% 0.31% 0.32% 0.31% 20.00MG 9.30E-05 3.00MG 0.10% 0.10%	静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 舌下適用 眼科用剤	3mg 4mg 4mg 2mg/g 2mg/g
SORBIC ACID	眼; 乳液 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 経口 濃縮物 経口 溶液 経口 懸濁液 経口 シロップ 経口 錠剤 経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 舌下 錠剤 局所; 乳液, クリーム 局所; ゲル 局所; ローション 局所; 軟膏 腔; ゲル 腔; 海綿	0.10% 0.20% 0.20% 0.01% 1.18% 0.15% 0.50% 0.93MG 0.02MG 0.40MG 0.16MG 2.70% 0.17% 0.20% 0.10% 0.09% 6.00MG	眼科用剤 歯科外用及び口中用 経口投与 直腸腔尿道適用   一般外用剤	2mg/mL 225mg/g  270mg 09mg/g   2mg/g
SORBITAN MONOLAURATE(モノラ)	経口 懸濁液 経口 錠剤, フィルム 被覆 局所; 乳液, エアロゾル FOAM	0.25% 83.90MG 4.74%	経口投与 一般外用剤 直腸腔尿道適用	132mg 50mg/g 0.2g
SORBITAN MONOOLEATE(モノオレ)	経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体- 経口 溶液 経口 錠剤 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 直腸; 坐薬 局所; クリーム, 局所; クリーム, 乳液, 徐放 局所; 乳液 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション	153.90MG 10.00MG 15.00% 1.70MG 0.10MG 1.89MG 0.69MG 7.80MG 1.00MG 22.00MG 0.20% 0.20% 2.50% 3.50% 7.00%	経口投与 一般外用剤 その他の外用 殺虫剤	6mg 25mg/g 15.46mg
SORBITAN MONOPALMITATE(モノ)	局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 貼布 局所; 乳液, クリーム	2.00% 1.00% 10.50MG 2.00%	経口投与 一般外用剤	15mg 20mg/g



添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本		
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量	
	局所; ローション	1.00%			
	局所; 貼布	10.50MG			
SORBITAN MONOSTEARATE (モノ)	経口 懸濁液	6.25%	一般外用剤	50mg/g	
	局所; 乳液, クリーム	8.00%	舌下適用	25mg/g	
	局所; ローション	2.50%	直腸腔尿道適用	160mg	
	局所; 懸濁液	2.15%	歯科外用及び口中用	10mg/g	
	腔; クリーム, 腔; 乳液, クリーム	2.00% 5.00%			
SORBITAN SESQUIOLEATE	局所; 軟膏	2%	経口投与	50mg	
			静脈内注射	50mg	
			筋肉内注射	50mg	
			一般外用剤	50mg/g	
			経皮	1mg/g	
			舌下適用 直腸腔尿道適用	50mg 100mg	
SORBITAN TRIOLEATE	吸入 ; エアロゾル, 定量	0.06%	経口投与	116 µg	
	鼻; エアロゾル, 定量	0.01%	一般外用剤	30mg/g	
	経口 カプセル	0.02ML	吸入剤	0.784mg	
	経口 パウダー 経口懸濁液用	0.03%			
SORBITOL (D-ソルビトール)	口腔; GUM, 咀嚼	212.90MG	歯科外用及び口中用	150mg/g	
	関節内; 注射	45.00%	皮下注射	250mg	
	病巣内; 注射	45.00%	その他の注射	875mg	
	滑液嚢内; 注射	45.00%	筋肉内注射	800mg	
	静脈; 注射	30.00%	直腸腔尿道適用	216mg	
	静脈; 溶液, 注射	48.00%	静脈内注射	12g	
	静脈(点滴); 注射	4.50%	一般外用剤	30mg/g	
	静脈(点滴); 溶液, 注射	7.14%	眼科用剤	8.6mg/mL	
	鼻; 溶液	2.50%			
	鼻; 定量用スプレー	2.86%			
	眼; 溶液, 点滴剤	0.25%			
	経口 BAR, 咀嚼剤	144.00MG			
	経口 カプセル	185.18MG	経口投与	40g	
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	66.82MG			
	経口 濃縮物	40.00%			
	経口 点滴剤{	3.00%			
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	28.00MG			
	経口 パウダー FOR 懸濁液	34.28%			
	経口 溶液	35.00%			
	経口 溶液, エリキシル剤	20.00%			
	経口 懸濁液	91.28%			
	経口 シロップ	93.45%			
	経口 錠剤	337.28MG			
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	300.00MG			
	経口 錠剤, 被覆	12.96MG			
	経口 錠剤, フィルム 被覆	5.00MG			
	経口 錠剤, 徐効	53.75MG			
	舌下 錠剤	50.50MG			
	局所; 乳液	7.00%			
	局所; 乳液, クリーム	67.52%			
	SORBITOL SOLUTION (D-ソルビ	口腔; GUM, 咀嚼	38.10MG		
		筋肉; 注射	25.00%	筋肉内注射	50mg
		静脈; 注射	7.14%		
静脈; 溶液, 注射		7.14%	皮下注射	50mg	
静脈(点滴); 溶液, 注射		7.14%	その他の注射	0.438mL	
眼; 溶液, 点滴剤		39.99%	舌下適用	35mg/g	
経口 カプセル		3.11MG	耳鼻科用剤	17mg/mL	
経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン		3.11MG	歯科外用及び口中用	200mg/g	
経口 カプセル, 軟ゼラチン		28.90MG			
経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-		97.00MG			
経口 濃縮物		60.00%	経口投与	適量	
経口 点滴剤{		5.00%			
経口 溶液		90.00%			
経口 溶液, 濃縮物		30.00%			
経口 溶液, エリキシル剤		83.33%			
経口 懸濁液	71.40%				

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 懸濁 点滴剤 { 経口 シロップ 経口 錠剤 直腸; 懸濁液 局所; クリーム, 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 軟膏 局所; 溶液, 点滴剤 腔; 乳液, クリーム	25.00% 96.40% 14.00MG 36.00% 15.00% 25.00% 5.00% 1.50% 6.70% 36.80%	直腸腔尿道適用 一般外用剤	96.46mg 450mg/g
SOYBEAN OIL	静脈; 乳液, 注射 静脈; I注射 経口 カプセル 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体- 経口 錠剤 (即時型/複合型リ- 局所; ローション 局所; 溶液	10.00% 10.00% 263.00MG 227.00MG 129.87MG 0.14MG 50.20% 5.82%	静脈内注射 経口投与 その他の外用 直腸腔尿道適用 経皮 一般外用剤 殺虫剤	300mg 1962mg 0.3mL/mL 18606mg 3720mg 396mg/g
SOYBEAN OIL, REFINED	経口 カプセル	101.00MG	静脈内注射	500mg
SPEARMINT OIL	経口 溶液 経口 懸濁液 経口 シロップ	0.05% 2.90E-05 2.00%	一般外用剤	1.2mg/g
SQUALANE	局所; 乳液, クリーム 局所; 溶液	6.00% 1.00%	一般外用剤 舌下適用 直腸腔尿道適用 その他の外用 合成スクワラン 一般外用剤	150mg/g 10mg/g 150mg/g 43mg/g 100mg/g
STANNOUS CHLORIDE	静脈; 注射 静脈; パウダー 注射 溶液用 静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用,	0.34% 0.02% 0.05% 3.00E-05	静脈内注射	400 μg
STANNOUS CHLORIDE	静脈; 注射	5.00E-05	静脈内注射	0.002mg
STARCH, CORN	口腔; 錠剤 経口 カプセル 経口 カプセル, 硬ゼラチン 経口 カプセル, 徐効 経口 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型/複合型リ- 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 多層構造, 徐放 経口 錠剤, 復効 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 経口 20; 錠剤 経口 21; 錠剤 経口 21; 錠剤, 被覆 経口 28; 錠剤 経口 28; 錠剤, 被覆 舌下 錠剤 腔; 錠剤 腔; 錠剤, フィルム 被覆	16.60MG 1135.00MG 289.20MG 27.00MG 7.25% 433.32MG 170.00MG 285.00MG 54.00MG 18.00MG 158.00MG 10.00MG 32.00MG 92.00MG 74.30MG 57.00MG 33.00MG 9.90MG 30.10MG 9.90MG 60.00MG 150.00MG 8.00MG	経口投与 一般外用剤 舌下適用 直腸腔尿道適用 歯科外用及び口中用	19g 345mg/g 225mg 103mg 216mg
STARCH, POTATO	経口 錠剤 経口 錠剤, 被覆	80.58MG 2.10MG	経口投与 一般外用剤 直腸腔尿道適用 その他外用 殺虫剤	31.5g 500mg/g 160mg 500mg/g
STARCH, PREGELATINIZED (アル)	経口 カプセル 経口 カプセル(即時型/複合型リ 経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 硬ゼラチン	600.00MG 70.00MG 15.00MG 128.75MG	経口投与 一般外用剤 直腸腔尿道適用	2560mg 25.3mg/g 39mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル, 徐効	141.75MG		
	経口 点滴剤	1.20%		
	経口 懸濁液			
	経口 懸濁 液体	1.50%		
	経口 懸濁 徐効	12.50%		
	経口 錠剤	345.95MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	71.35MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	32.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	73.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出	86.94MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	64.80MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	240.00MG		
	経口 錠剤, SUGAR 被覆	9.40MG		
	経口 錠剤, 徐効	60.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	33.75MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	75.00MG		
	経口21; 錠剤	22.25MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	6.60MG		
	経口28; 錠剤	26.35MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	6.60MG		
	舌下 錠剤	43.00MG		
	経口 カプセル	600.00MG		
	経口 カプセル (即時型/複合型リ)	70.00MG		
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	15.00MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	128.75MG		
	経口 カプセル, 徐効	141.75MG		
	経口 点滴剤	1.20%		
	経口 懸濁 液体	1.50%		
	経口 懸濁 徐効	12.50%		
	経口 錠剤	345.95MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	71.35MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	32.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	73.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出	86.94MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	64.80MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	240.00MG		
	経口 錠剤, 糖衣	9.40MG		
	経口 錠剤, 徐効	60.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	33.75MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	75.00MG		
	経口21; 錠剤	22.25MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	6.60MG		
	経口28; 錠剤	26.35MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	6.60MG		
	舌下 錠剤	43.00MG		
STARCH, RICE	経口 錠剤, 徐効	301.00MG	経口投与	2g
STARCH, WHEAT	経口 カプセル, 徐効	0.75MG	経口投与	2.5g
	経口 錠剤	65.58MG	一般外用剤	100mg/g
	経口 錠剤, フィルム 被覆	49.00MG		
STEARETH-10 (ポリオキシエチレンス)	直腸; エアゾール, 定量	0.22%	一般外用剤	210mg/g
	局所; エアゾール, 定量	6.25%	舌下適用	25mg/g
	局所; 乳液, エアゾール FOAM		殺虫剤	
STEARETH-100	局所; 乳液, クリーム	0.35%		
	局所; 軟膏	0.60%		
STEARETH-2	局所; クリーム, 乳液, 徐放	0.85%		
	局所; 乳液, クリーム	4.50%		
	局所; ローション	0.40%		
	局所; 軟膏	5.00%		
STEARETH-20	局所; クリーム, 乳液, 徐放	4.15%		
STEARETH-21	局所; クリーム, 乳液, 徐放	2.50%		
	局所; 乳液, クリーム	3.00%		
	局所; ローション	3.00%		
STEARIC ACID	口腔/舌下 錠剤	6.00MG	耳鼻科用剤	0.3mg/g
	口腔; 錠剤	5.00MG		
	移植; 丸薬	0.20MG	直腸尿道適用	306mg/g

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル	52.00MG	経口投与	1200mg
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	3.00MG	歯科外用及び口中用	60mg
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	15.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	9.32MG		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	24.06%		
	経口 錠剤	72.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	15.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	42.40MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	8.00MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	5.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	180.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	22.00MG		
	経口 錠剤, SUGAR 被覆	0.90MG		
	経口 錠剤, 徐効	187.50MG		
	経口 錠剤, 徐効, 多層構造, フィル	26.48MG		
	経口 錠剤, 徐放, フィルム 被覆	9.00MG		
	経口 21; 錠剤	1.00MG		
	経口 28; 錠剤	1.00MG		
	皮下; 筋肉PLANT	1.04MG		
	舌下 錠剤	5.04MG	舌下適用	100mg/g
	局所; クリーム, 増加された	3.00%	一般外用剤	275mg/g
	局所; クリーム, 乳液, 徐放	4.00%		
	局所; 乳液, クリーム	22.60%		
	局所; ローション	20.00%		
	局所; 軟膏	15.00%		
	局所; 懸濁液	1.75%		
	腔; 乳液, クリーム	14.00%		
	腔; 錠剤	60.00MG	殺虫剤	
STEARYL ALCOHOL	経口 カプセル, 徐効	72.00MG	経口投与	160mg
	経口 錠剤, 制御放出	25.00MG	舌下適用	165mg/g
	経口 錠剤, 徐効	244.00MG	直腸腔尿道適用	100mg/g、
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	60.00MG		
	局所; エアロゾル	0.53%	一般外用剤	300mg/g
	局所; クリーム,	4.00%		
	局所; クリーム, 乳液, 徐放	3.00%		
	局所; 乳液, エアロゾル	0.53%		
	局所; 乳液, クリーム	30.00%		
	局所; ローション	12.00%		
	局所; 軟膏	8.00%		
	局所; 懸濁液	2.01%		
	腔; 乳液, クリーム	42.50%		
SUCCINIC ACID	経口 濃縮物	0.60%	経口投与	50mg
	経口 パウダー 経口懸濁液用	0.08%	静脈内注射	2mg
	経口 パウダー再構成用	0.15%	殺虫剤	
	経口 錠剤	65.10MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	2.85MG		
	経口 錠剤, 制御放出	4.00MG		
SUCRALOSE	口腔; GUM, 咀嚼	2.00MG	経口投与	45mg
	鼻; 溶液, 噴霧	0.15%		
	経口 パウダー経口懸濁液用	8.00%		
	経口 溶液	0.80%		
	経口 懸濁液	1.14%		
	経口 錠剤	4.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	1.88MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	5.75MG		
	経口 28; 錠剤	0.01MG		
SUCROSE (精製白糖)	口腔/舌下 錠剤	91.00MG	舌下適用	9g
	口腔; 錠剤	16.60MG	歯科外用及び口中用	2512mg
	筋肉; パウダー 注射 溶液用, 凍結	6.84%		
	筋肉; 溶液, 注射	4.42%		
	静脈; 注射	19.50%	静脈内注射	39.84g
	静脈; 注射, パウダー 凍結乾燥, リ	90.00%		
	静脈; 注射, 懸濁 リポソーム	9.40%		
	静脈; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	7.78%		
	静脈; 溶液, リポソーム 注射	8.50%		



添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	静脈(点滴); パウダー FOR 注射 溶	5.40%	経口投与	33g
	経口 カプセル	413.65MG		
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	175.14MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	140.75MG		
	経口 カプセル, 徐放	396.14MG		
	経口 カプセル, 徐効	481.70MG		
	経口 濃縮物	67.00%		
	経口 点滴剤	75.55%		
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	1052.90MG		
	経口 顆粒 FOR 懸濁 徐放			
	経口 液体	72.00%		
	経口 PASTILLE	426.00MG		
	経口 粉末	25.61%		
	経口 パウダー FOR 経口 溶液	54.57MG		
	経口 パウダー FOR 経口 懸濁液	90.27%		
	経口 パウダー FOR 溶液	48.40%		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	93.23%		
	経口 溶液	60.00%		
	経口 溶液, エリキシル剤	61.30%		
	経口 懸濁液	62.50%		
	経口 懸濁 点滴剤	12.50%		
	経口 懸濁 徐効	60.00%		
	経口 シロップ	82.10%		
	経口 錠剤	900.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型)リリー	1200.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	400.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	279.49MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	84.20MG		
	経口 錠剤, 復効	152.66MG		
	経口 錠剤, SUGAR 被覆	73.18MG		
	経口 錠剤, 徐効	202.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	119.12MG		
	経口20; 錠剤	12.00MG		
	経口21; 錠剤	12.00MG		
経口21; 錠剤, 被覆	19.37MG			
経口28; 錠剤	216.50MG			
経口28; 錠剤, 被覆	19.37MG			
皮下; 注射	9.00%	皮下注射	25mg	
皮下; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	6.84%			
皮下; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	4.10%			
皮下; 溶液, 注射	4.42%			
舌下 錠剤	8.41MG			
局所; 軟膏	20.00%	殺虫剤		
SUCROSE DISTEARATE (シヨ糖脂)	局所; 乳液, クリーム	5.00%		
SUCROSE PALMITATE (シヨ糖脂肪)	経口 パウダー FOR 懸濁液	1.00%		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	1.00%		
SUCROSE STEARATE (シヨ糖脂肪)	経口 カプセル, 徐放	31.83MG	経口投与	600mg
	経口 カプセル, 徐効	44.56MG	一般外用剤	35mg/g
	経口 錠剤, 徐放	44.56MG	歯科外用及び口中用	72mg、
SUGAR CONFECTIONERS (粉糖)	経口 カプセル	527.42MG	経口投与	4347mg
	経口 カプセル, 徐効	17.60MG		
	経口 パウダー 懸濁液用	3.32%		
	経口 錠剤	215.68MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型)リリー	1438.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	54.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	44.50MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	200.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	175.00MG		
	経口21; 錠剤	40.00MG		
経口28; 錠剤	40.00MG			
舌下 錠剤	17.00MG			
SULFURIC ACID	耳 (耳性); 懸濁液	0.02%	一般外用剤	14mg/g
	筋肉 静脈; 注射	56.60%	動脈内注射	適量
	吸入 ; 溶液	12.50%	眼科用剤	適量
	筋肉; 注射	2.09%	筋肉内注射	87.6mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	静脈; 注射	2.09%	静脈内注射	適量
	静脈(点滴); 注射	2.12%		
	鼻; 噴霧	0.40%	耳鼻科用剤	37.0mg/g
TALC	口腔/舌下錠剤	15.00MG	舌下適用	24mg
	口腔; 錠剤	1.50MG		
	経口カプセル	220.40MG	経口投与	3384mg
	経口カプセル, 被覆丸薬	0.25MG	歯科外用及び口中用	650mg
	経口カプセル, 徐放性ACTION	70.46MG	直腸腔尿道適用	12.6mg
	経口カプセル, 徐放性ACTION, 被覆丸薬	14.93MG	その他の外用	740mg/g
	経口カプセル, 腸溶性被覆丸薬	46.62MG		
	経口カプセル, 徐放	157.60MG		
	経口カプセル, 硬ゼラチン	139.17MG		
	経口カプセル, 軟ゼラチン	0.10MG		
	経口カプセル, 徐効	122.06MG		
	経口カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	16.70MG		
	経口顆粒, 腸溶性被覆	215.20MG		
	経口顆粒 FOR 経口懸濁液	34.00MG		
	経口 MUCILAGE	1.53MG		
	経口溶液, エリキシル剤	0.45%		
	経口錠剤	91.20MG		
	経口錠剤 (即時型/複合型リリー)	22.80MG		
	経口錠剤 (即時型/複合型リリー)	1.60MG		
	経口錠剤 (即時型/複合型リリー)	18.00MG		
	経口錠剤, 被覆	75.00MG		
	経口錠剤, 制御放出	31.61MG		
	経口錠剤, 徐放性ACTION	27.40MG		
	経口錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	110.00MG		
	経口錠剤, 腸溶性被覆粒子 S	6.50MG		
	経口錠剤, 徐放	47.04MG		
	経口錠剤, フィルム被覆	54.72MG		
	経口錠剤, 口腔内崩壊	36.00MG		
	経口錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	3.00MG		
	経口錠剤, 復効	73.93MG		
	経口錠剤, 徐効	91.00MG		
	経口錠剤, 徐効, 被覆	29.30MG		
	経口錠剤, 徐効, フィルム被覆	30.00MG		
	経口21; 錠剤	3.00MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	4.19MG		
	経口28; 錠剤	6.34MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	4.19MG		
	直腸; 錠剤	32.40MG		
	舌下錠剤	32.40MG		
	局所; ローション	7.28%	一般外用剤	787mg/g
	局所; 軟膏	8.27%		
	局所; 粉末	98.00%		
	局所; シャンプー	24.00%	殺虫剤	
TARTARIC ACID	筋肉; 注射	0.35%	筋肉内注射	8mg
	静脈; 注射	0.20%	静脈内注射	20mg
	静脈; 溶液, 注射	0.20%	経皮	3mg/g
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用,	2.00%	直腸腔尿道適用	212mg/g
	経口カプセル	9.00MG	経口投与	350mg
	経口カプセル, 徐効	215.10MG	一般外用剤	23mg/g
	経口溶液	0.75%	吸入剤	1mg/g
	経口錠剤	15.00MG	歯科外用及び口中用	48mg
	経口錠剤, 被覆	10.00MG		
	経口錠剤, フィルム被覆	30.00MG		
	経口錠剤, 口腔内崩壊	45.00MG		
	経口錠剤, 徐効	29.20MG		
TARTARIC ACID, DL-	経口シロップ	3.00%		
	経口錠剤	13.74MG		
	経口錠剤, 徐効	30.00MG		
	直腸; 坐薬	21.50MG		
	舌下錠剤	1.50MG		
	腔; 坐薬	32.30MG		
THIMEROSAL	耳(耳性); 懸濁液	0.01%	静脈内注射	12mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	筋肉; 注射	8.40E-05	筋肉内注射	12mg
	筋肉; 注射, 徐効	2.00E-05	皮下注射	12mg
	眼; 溶液	0.01%	一般外用剤	1mg/mL
	眼; 溶液, 点滴剤	0.01%	眼科用剤	2mg/mL
	眼; 懸濁液	4.00E-05	耳鼻科用剤	0.02mg/mL
	眼; 懸濁 点滴剤	1.00%	その他の外用	2mg/g
	皮下; 注射	0.01%		
	局所; 乳液, クリーム	5.00E-05		
	局所; 軟膏	0.04%		
THYMOL	吸入 ; 液体	0.01%	一般外用剤	49mg/g
			舌下適用	1mg/g
			歯科外用及び口中用	10mg、
TITANIUM DIOXIDE	口腔; フィルム, 溶解(性)	2.78MG	経皮	24mg
	口腔; GUM, 咀嚼	7.54MG	舌下適用	5.34mg
	子宮内; 坐薬, 挿入, 制御放出	1.00MG	直腸尿道適用	12mg
	眼; 坐薬, 挿入, 制御放出	0.40MG	その他の外用	
	経口 カプセル	1387.00MG	経口投与	384mg
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	0.78MG	眼科用剤	0.4mg
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	0.76MG	歯科外用及び口中用	2mg/g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	4.40MG		
	経口 カプセル, 徐放	5.20MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	0.85MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	6.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	4.40MG		
	経口 顆粒 経口懸濁液用	0.37MG		
	経口 顆粒 懸濁液用	35.70MG		
	経口 パウダー 経口懸濁液用	40.00%		
	経口 パウダー 懸濁液用	9.00%		
	経口 懸濁液	0.10%		
	経口 錠剤	27.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型) リー	2.11MG		
	経口 錠剤, 被覆	10.57MG		
	経口 錠剤, 制御放出	2.46MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION	7.80MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	358.00MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	15.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	7.93MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	12.50MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 徐放	1.10MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	3.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	358.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	4.17MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	3.00MG		
	経口 21; 錠剤	0.12MG		
	経口 21; 錠剤, 被覆	0.27MG		
	経口 28; 錠剤	1.17MG		
	経口 28; 錠剤, 被覆	0.27MG		
	局所; 乳液, クリーム	2.00%	一般外用剤	90mg/g
	局所; 軟膏	5.00%		
	局所; シャンプー, 懸濁液	3.00%		
TOCOPHEROL	局所; 軟膏	0.00002	経口投与	93mg
			一般外用剤	1mg/g
			直腸尿道適用	4mg
TRAGACANTH	口腔/舌下 錠剤	5.00MG	経口投与	1.92g
	経口 パウダー FOR 懸濁液	24.00%	その他の内用	10mg
	経口 懸濁液	1.33%	一般外用剤	適量
	経口 懸濁 徐効	2.25%	舌下適用	50mg/g
	経口 錠剤	4.00MG	直腸尿道適用	20mg/mL
	経口 錠剤, 被覆	7.50MG	歯科外用及び口中用	100mg
TRIACETIN	経口 カプセル	1.08MG	経口投与	21.6mg
	経口 カプセル, 被覆 丸薬	1.20MG	一般外用剤	300mg/g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	5.10MG	歯科外用及び口中用	120mg/g
	経口 カプセル, 徐効	2.76MG		
	経口 錠剤	3.70MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型) リー	0.72MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤, 被覆	1.00MG		
	経口錠剤, 制御放出	2.00MG		
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性, 被覆	6.00MG		
	経口錠剤, 徐放	1.39MG		
	経口錠剤, フィルム被覆	15.12MG		
	経口錠剤, 徐効	1.96MG		
	経皮; 貼布	22.10MG		
TRIETHYL CITRATE	経口カプセル	8.90MG	経口投与	152.8mg
	経口カプセル, 徐放性ACTION	3.84MG		
	経口カプセル, 腸溶性, 被覆, 丸薬	9.16MG		
	経口カプセル, 徐放	15.03MG		
	経口カプセル, 硬ゼラチン	4.00MG		
	経口カプセル, 徐効	7.50MG		
	経口カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	3.30MG		
	経口顆粒 FOR 経口懸濁液	6.94MG		
	経口錠剤	13.19MG		
	経口錠剤 (即時型/複合型リリー)	2.80MG		
	経口錠剤, 徐放性ACTION	4.80MG		
	経口錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	20.17MG		
	経口錠剤, 徐放	1.97MG		
	経口錠剤, フィルム被覆	3.60MG		
	経口錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	18.70MG		
	経口錠剤, 復効	0.90MG		
	経口錠剤, 徐効	1.60MG		
	経口錠剤, 徐効, 被覆	2.31MG		
	経口錠剤, 徐効, フィルム被覆	0.50MG		
TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN	経口カプセル	159.97MG	経口投与	適量
	経口溶液	94.46%	静脈内注射	360mg/kg
	舌下 定量用スプレー	3.66%	舌下適用	100mg/g
	局所; クリーム, 増加された	1.37%	一般外用剤	300mg/g
	局所; クリーム, 乳液, 徐放	1.37%	直腸腔尿道適用	977mg
	局所; 乳液, クリーム	15.00%		
	局所; ゲル	1.00%		
TTRISODIUM CITRATE	筋肉 静脈; I注射	0.02%	筋肉内注射	112mg
	筋肉 静脈; 溶液	0.02%	皮下注射	100mg
	静脈; I注射	0.02%	静脈内注射	1765mg
	静脈; 注射	0.63%	動脈内注射	300mg
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	23.52%	脊椎腔内注射	12.5mg
	静脈; 溶液, 注射	0.57%	その他の注射	300mg、
	硝子体内; 懸濁 注射	0.17%	一般外用剤	7mg/g
	鼻; 溶液, 噴霧	0.06%	経皮	5mg/g
	眼; 溶液	0.30%	眼科用剤	8.5mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	0.29%	耳鼻科用剤	10mg/g
	経口 溶液	1.00%	経口投与	微量
	経口 懸濁液	0.10%	歯科外用及び口中用	1mg/g
	経口錠剤	110.00MG	その他の外用	15mg/g
	局所; ローション	0.32%	皮内注射	0.25mg
	局所; 溶液	0.30%	吸入剤	15mg
	筋肉 静脈; I注射	0.02%		
	筋肉 静脈; 溶液	0.02%		
	静脈; I注射	0.02%		
	静脈; 注射	0.63%		
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	23.52%		
	静脈; 溶液, 注射	0.57%		
	硝子体内; 懸濁 注射	0.17%		
	鼻; 溶液, 噴霧	0.06%		
	眼; 溶液	0.30%		
	眼; 溶液, 点滴剤	0.29%	殺虫剤	
TROLAMINE (トリエタノールアミン)	局所; エアロゾル, 定量	1.00%	静脈内注射	30mg
	局所; 乳液	0.50%	一般外用剤	40mg/g
	局所; 乳液, クリーム	1.00%	舌下適用	3mg/g
	局所; ゲル	1.00%		
	局所; ローション	31.70%		
	経皮; ゲル	0.35%		
	腔; 乳液, クリーム	0.75%	殺虫剤	



添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
TROMETHAMINE (トロメタモール)	筋肉 静脈; I注射	1.10%	筋肉内注射	2.44mg
	筋肉 静脈; 注射, 溶液	1.21%	脊椎空内注射	121 $\mu$ g
	動脈内; 注射	0.24%	動脈内注射	60.5mg
	筋肉; 注射	0.10%	皮内注射	2.54 $\mu$ g
	脈管内; 注射	1.00%		
	静脈; I注射	1.20%	静脈内注射	266.20mg
	静脈; 注射	1.00%		
	静脈(点滴); 注射	5.00E-05		
	静脈(点滴); パウダー注射 懸濁用	1.21%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	0.12%		
	眼; 溶液	0.93%	眼科用剤	200mg/mL
	眼; 溶液, 点滴剤	0.75%		
	眼; 溶液, ゲル形成, 徐放	0.80%		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン (吸入); 溶液, 吸入用	15.00MG		
	皮下; 注射	0.60%	皮下注射	2.4mg
	局所; ゲル	0.80%		
	局所; 溶液	8.40%		
経皮; ゲル	0.10%			
尿道; 溶液	0.12%			
TYLOXAPOL	眼; 溶液	0.10%	眼科用剤	0.25mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	0.10%		
	眼; 懸濁液	0.30%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.30%		
	局所; 懸濁液	0.05%		
UREA	経口 錠剤, 被覆	0.01MG	静脈内注射	50mg
	腔; 乳液, クリーム	0.64%	筋肉内注射	40mg
	腔; 錠剤	50.00MG	皮下注射 一般外用剤 殺虫剤	50mg 50mg/g
VANILLIN	経口 パウダー FOR 懸濁液	0.66%	経口投与	60mg
	経口 溶液	0.25%	歯科外用及び口中用	1mg/g
	経口 溶液, エリキシル剤	1.40E-05		
	経口 懸濁液	0.50%		
	経口 錠剤	1.50MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	2.50MG		
	経口 錠剤, 被覆	65.50MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION	0.80MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	1.16MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	0.70MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	0.78MG		
	経口 錠剤, 徐効	3.40MG		
経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	0.80MG			
VEGETABLE OIL,	経口 カプセル	82.00MG	経口投与	2.8g
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	261.00MG	一般外用剤	80mg/g
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	82.80MG	経皮	28.8mg
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	2.09MG	直腸腔尿道適用	5.38g
	経口 錠剤	40.00MG	歯科外用及び口中用	210mg
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	8.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	2.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	20.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	33.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	228.50MG		
	直腸; 坐薬	2026.50MG		
	局所; 乳液, クリーム	72.00%		
	腔; 乳液, クリーム	72.00%		
	腔; 坐薬	2400.00MG		
VITAMIN E (トコフェロール)	口腔; フィルム, 溶解(性)	0.07MG	経口投与	93mg
	経口 カプセル	1.00MG	一般外用剤	1mg/g
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	1.00MG	直腸腔尿道適用	4mg
	経口 溶液	0.10%		
	経口 錠剤	0.03MG		
	経口 錠剤, 徐効	1.34MG		
	経口 21; 錠剤	0.10MG		
経口 28; 錠剤	0.10MG			

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; 軟膏	1.00E-05		
VITAMIN E ACETATE(トコフェロール)	経口 カプセル	2.00MG	経口投与 一般外用剤	6mg 2.7mg/g
XANTHAN GUM	眼; 溶液, ゲル形成, 徐放 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 点滴剤 経口 懸濁液用 経口 顆粒 経口 顆粒 経口懸濁液用 経口 顆粒 懸濁液用 経口 粉末 経口 パウダー-経口懸濁液用 経口 パウダー-再構成用 経口 パウダー-溶液用 経口 パウダー-懸濁液用 経口 懸濁液 経口 懸濁 点滴剤 経口 懸濁 液体 経口 懸濁 徐効 経口 錠剤 経口 錠剤, 制御放出 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, 口腔内崩壊 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, 被覆 経口 トローチ 直腸; 浣腸 局所; クリーム, 局所; クリーム, 乳液, 徐放 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 懸濁液	0.60% 75.00MG 0.29% 0.07%  75.00MG 15.00MG 9.00% 6.70% 2.50% 4.10% 8.00% 3.75% 0.21% 1.15% 18.68% 63.20MG 109.52MG 101.20MG 0.15MG 50.00MG 74.25MG 63.20MG 0.25% 0.21% 0.30% 0.75% 0.30% 0.10%	経口投与 一般外用剤 殺虫剤	240mg 3mg/g
XYLITOL	口腔; GUM, 咀嚼 経口 溶液 経口 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, 口腔内崩壊	506.13MG 30.00% 75.00% 15.04MG 72.00MG 42.30MG	経口投与 静脈内注射 筋肉内注射 眼科用剤 歯科外用及び口中用 その他の注射	4.2g 200mg 90mg 0.5mg/g 5.724g 27mg/mL
ZEIN	経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 復効 経口 錠剤, 徐効	7.12MG 4.71MG 135.00MG	経口投与	332mg
ZINC ACETATE	皮下; パウダー FOR 注射 懸濁液 局所; ローション 局所; 溶液 局所; 綿棒で分泌物を採集する	0.23% 1.20% 1.20E-05 12000.00MG	皮下注射	0.12mg
ZINC CHLORIDE	皮内; 注射 眼; 溶液, 点滴剤 皮下; I注射 皮下; 注射	0.04% 2.50E-05 6.30E-05 0.01%	筋肉内注射 皮下注射	6.25mg 0.42mg
ZINC OXIDE	直腸; 坐薬 (吸入 (吸入 ); 溶液, 注射 皮下; I注射 皮下; 注射 皮下; 懸濁 注射	375.00MG 3.11% 2.00E-05 0.01% 2.50E-05	皮下注射 一般外用剤 その他の外用 殺虫剤	0.192mg 0.432mg/g 250mg/g
ZINC STEARATE	経口 カプセル 経口 錠剤 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 徐効	2.04MG 10.20MG 4.61MG 36.00MG	経口投与 一般外用剤	2mg 59.3mg/g



日本医薬品添加剤協会は医薬品添加剤の質的向上と内容の充実、強化を図り国民の健康の維持、増進に貢献し、更に医薬品添加剤の基準、規格に関する国際的な調和に貢献することを目的としております

[ホーム](#)
[事業内容](#)
[組織](#)
[書籍行事](#)
[お問い合わせ](#)

## 医薬品添加剤資料

### 安全性データ

本データは平成15年～17年に検討した医薬品添加物の安全性に関するデータベースを広く公表し、医薬品の安全性の確保に貢献することを目的として作成されました。医薬品に使用される医薬品添加物については、自主的に全てのもが表示されるようになりました。使用されている添加剤は製剤中の使用範囲で安全であることで使用されておりますが、それがどのように安全であるかなどの詳細な情報を手軽に知る手段がこれまでありませんでした。これらの情報を公開することで医薬品に係わる規制当局、医薬品業界、添加剤業界、医療機関、薬局関係者等が医薬品添加物の安全性に関する情報を広く共有することができます。

▶ [安全性データ](#)

### ガイドラインデータ

医薬品業界のグローバル化において、特に、アメリカ、EUでの医薬品添加物の開発、規制、製造、品質管理、市場に流通するときに備える要件など、我が国における添加物の規制、開発や医薬品製剤の設計に役立つ情報をご提供致します。

▶ [ガイドライン](#)

▶ [back](#)

[メンバーログイン](#)▶▶

### ご案内

▶ [入会案内](#)

▶ [書籍](#)

▶ [会員会社](#)

▶ [薬添GMP審査会](#)

▶ [医薬品添加剤資料](#)

### 会員サイト

▶ [GMP自主基準](#)

▶ [ニュースレター](#)

▶ [通知](#)

▶ [English](#) ▶ [IPEC Federation](#) ▶ [厚生労働省](#) ▶ [セミナー](#) ▶ [アクセス](#) ▶ [メンバーサイト](#)



日本医薬品添加剤協会は医薬品添加剤の質的向上と内容の充実、強化を図り国民の健康の維持、増進に貢献し、更に医薬品添加剤の基準、規格に関する国際的な調和に貢献することを目的としております

ホーム	医薬品添加剤資料	ガイドラインリスト	ガイドライン概要	ダウンロード
-----	----------	-----------	----------	--------

### ガイドラインリスト

IPEC Qualification of Excipients for Use in Pharmaceuticals 「医薬品添加剤の必要要件ガイド」	Phase1 添加剤製造業者プロセス（製造管理）
	Phase1 添加剤製造業者プロセス（開発）
	Phase2 医薬品製造業者プロセス
	Phase3 交渉プロセス

Phase1 添加剤製造業者プロセス （製造管理）	Phase1に関する他のガイドライン
	Certificate of Analysis Guide for Bulk Pharmaceutical Excipients
	Significant Change Guide for Bulk Pharmaceutical Excipients
	FDA Guideline for Master File
	CPMP CVMP Note for Guidance on Quality of water for pharmaceutical use

Phase1 添加剤製造業者プロセス （開発）	Phase1に関する他のガイドライン
	The IPEC Quality Agreement Guide and Template
	GDP (Good Distribution Practices) for Pharmaceutical Excipients
	The IPEC GDP (Good Distribution Practices) Audit Guideline GDP Audit attachment
	GDP Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Product for Human use
	Fuctionality-Related characteristics of Excipient
	USP35(5) <1059> Excipient Performance
	Standardized Excipient Information Protocol User Guide (EIP)

Phase2 医薬品製造業者プロセス	Phase2に関する他のガイドライン
	The IPEC Excipient Composition Guide
	EudraLex Vol.3B Guidelines Human CHMP Guideline on Excipients in the Dossier for Application for Marketing Authorisation of a medicinal Product

GMP自主基準に関する ガイドライン	Good Manufacturing Practices for bulk pharmaceutical Excipients
	The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing Practices Audit Guideline 2008

安全性に関するガイド ライン	Guidance for Industry Nonclinical Studies for the Safety Evaluation of Pharmaceutical Excipients
	Guideline on the specification limits for residues of metal Reagents
	The Safety of pharmaceutical excipients (IL FARMACO)
	Excipient biological Safety Evaluation Guideline