

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
CORN OIL	経口錠剤, 徐効, フィルム被覆	6.10MG		
	経口カプセル	918.00MG	経口投与	540mg
	経口カプセル, 軟ゼラチン	416.00MG	一般外用剤	75mg/g
	経口錠剤	20.00MG		
	経口錠剤, 被覆	0.30MG		
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆 舌下錠剤	0.03MG 1.70MG		
COTTONSEED OIL	筋肉; 注射	87.46%	経口投与	540mg
COTTONSEED OIL,	経口カプセル	15.00MG	経口投与	2.8g
	経口カプセル, 徐効	58.00MG	一般外用剤	80mg/g
	経口錠剤	34.00MG	経皮	28.8mg
	経口錠剤, 被覆	0.60MG	直腸腔尿道適用	5.38g
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆	4.00MG	歯科外用及び口中用	210mg
	経口錠剤, 徐効	402.00MG		
	舌下錠剤	2.00MG		
	経口カプセル	15.00MG		
	経口カプセル, 徐効	58.00MG		
	経口錠剤	34.00MG		
	経口錠剤, 被覆	0.60MG		
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆	4.00MG		
	経口錠剤, 徐効	402.00MG		
	舌下錠剤	2.00MG		
CREATININE	耳 (耳性); 溶液	0.50%	耳鼻科用剤	12mg
	筋肉 静脈; 注射	0.80%	静脈内注射	160mg
	関節内; 注射	0.80%	皮下注射	20mg
	病巣内; 注射	0.80%	その他の注射	20mg、
	筋肉; 注射	0.50%	筋肉内注射	128mg
	滑液嚢内; 注射	0.80%	皮内注射	2.0mg
	眼; 溶液	0.50%	眼科用剤	5mg/mL
	眼; 溶液, 点滴剤	0.20%	吸入剤	3.75mg
	軟組織; 注射	0.80%		
	CROSCARMELLOSE SODIUM	筋肉; 注射	1.00%	経口投与
経口カプセル		50.00MG		
経口カプセル(即時型/複合型)		30.00MG		
経口カプセル, 腸溶性被覆丸薬		20.00MG		
経口カプセル, 徐放		7.30MG		
経口カプセル, 硬ゼラチン		30.00MG		
経口顆粒 FOR 再構成		143.50MG		
経口顆粒 FOR 懸濁液		35.30MG		
経口溶液				
経口錠剤		180.00MG		
経口錠剤 (即時型/複合型)リ-		28.00MG		
経口錠剤 (即時型/複合型)リ-		50.00MG		
経口錠剤 (即時型/複合型)リ-		18.00MG		
経口錠剤, 被覆		35.20MG		
経口錠剤, 徐放性		14.00MG		
経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆		32.44MG		
経口錠剤, 徐放性				
経口錠剤, 徐放		15.00MG		
経口錠剤, フィルム被覆		165.00MG		
経口錠剤, 口腔内崩壊		13.00MG		
経口錠剤, 糖衣		2.50MG		
経口錠剤, 徐効		28.00MG		
経口錠剤, 被覆なし, トローチ		10.00MG		
経口21; 錠剤		3.00MG		
経口28; 錠剤		3.00MG		
経口28; 錠剤, 被覆		2.00MG		
舌下錠剤	6.50MG			
CROSPVIDONE	移植; 丸薬	2.00MG	経口投与	470mg
	関節内; 注射	0.02%		
	筋肉; 注射	0.02%		
	経口カプセル	30.00MG		
	経口カプセル(即時型/複合型)	15.91MG		
	経口カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	14.00MG		
経口カプセル, 腸溶性被覆丸薬	75.00MG			

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
経口 カプセル,硬ゼラチン		70.00MG		
経口 カプセル,徐効		10.71MG		
経口 分散錠剤		340.00MG		
経口 顆粒 経口懸濁液用		75.00MG		
経口 粘奨剤		9.00MG		
経口 パウダー 懸濁液用		5.00%		
経口 懸濁液		0.05%		
経口 懸濁 徐効		18.68%		
経口 錠剤		300.00MG		
経口 錠剤 (即時型/複合型リ-		110.00MG		
経口 錠剤 (即時型/複合型リ-		9.60MG		
経口 錠剤 (即時型/複合型リ-		100.00MG		
経口 錠剤,被覆		792.00MG		
経口 錠剤,制御放出				
経口 錠剤,徐放性,腸溶性 被覆		50.00MG		
経口 錠剤,分散性		6.00MG		
経口 錠剤,腸溶性 被覆 粒子		130.00MG		
経口 錠剤,徐放		39.20MG		
経口 錠剤,フィルム 被覆		196.70MG		
経口 錠剤,多層構造,徐放		5.00MG		
経口 錠剤,口腔内崩壊		180.00MG		
経口 錠剤,口腔内崩壊,徐放性		15.00MG		
経口 錠剤,復効		10.00MG		
経口 錠剤,徐効		144.00MG		
経口 錠剤,徐効,被覆		15.40MG		
経口 錠剤,徐効,フィルム 被覆		5.00MG		
経口21;錠剤		4.45MG		
舌下錠剤		6.50MG		
局所;乳液		1.00%		
局所;ローション		0.18%		
経皮;フィルム,制御放出		60.00MG		
腔;坐薬		116.10MG		
腔;錠剤		35.00MG		
移植;丸薬		2.00MG		
関節内;注射		0.02%		
筋肉;注射		0.02%		
経口 カプセル		30.00MG		
経口 カプセル(即時型/複合型リ		15.91MG		
経口 カプセル,被覆,軟ゼラチン		14.00MG		
経口 カプセル,腸溶性 被覆 丸薬		75.00MG		
経口 カプセル,硬ゼラチン		70.00MG		
経口 カプセル,徐効		10.71MG		
経口 分散性錠剤		340.00MG		
経口 顆粒 FOR 経口懸濁液		75.00MG		
経口 粘奨剤		9.00MG		
経口 パウダー FOR 懸濁液		5.00%		
経口 懸濁液		0.05%		
経口 懸濁 徐効		18.68%		
経口 錠剤		300.00MG		
経口 錠剤 (即時型/複合型リ-		110.00MG		
経口 錠剤 (即時型/複合型リ-		9.60MG		
経口 錠剤 (即時型/複合型リ-		100.00MG		
経口 錠剤,被覆		792.00MG		
経口 錠剤,制御放出				
経口 錠剤,徐放性,腸溶性 被覆		50.00MG		
経口 錠剤,分散性		6.00MG		
経口 錠剤,腸溶性 被覆 粒子 S		130.00MG		
経口 錠剤,徐放		39.20MG		
経口 錠剤,フィルム 被覆		196.70MG		
経口 錠剤,多層構造,徐放		5.00MG		
経口 錠剤,口腔内崩壊		180.00MG		
経口 錠剤,口腔内崩壊,徐放性		15.00MG		
経口 錠剤,復効		10.00MG		
経口 錠剤,徐効		144.00MG		
経口 錠剤,徐効,被覆		15.40MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤, 徐効, フィルム被覆	5.00MG		
	経口21; 錠剤	4.45MG		
	舌下錠剤	6.50MG		
	局所; 乳液	1.00%		
	局所; ローション	0.18%		
	経皮; フィルム, 制御放出	60.00MG		
	腔; 坐薬	116.10MG		
	腔; 錠剤	35.00MG		
CUPRIC SULFATE	耳 (耳性); 溶液	0.00%	その他の外用	1 $\mu$ g/g
DEHYDROACETIC ACID	局所; ローション	11.60%	経口投与	1mg
DEXTRAN 40	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	30%	経口投与	24mg
			静脈内注射	120mg
			筋肉内注射	5.01mg
			動脈内注射	15mg
DEXTRIN	経口錠剤	21.70MG	経口投与	12.015g
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	9.25MG	一般外用剤	83.6mg/g
	局所; 乳液, クリーム	0.02%	歯科外用及び口中用	28mg
	局所; シャンプー	5.00%	注腸	53.065g
DEXTROSE (ブドウ糖)	筋肉 静脈; 注射	5.00%	皮内注射	0.18mg
	筋肉 静脈; パウダー 注射 溶液用	5.00%	歯科注射	0.5mg
	筋肉; 注射	4.40%	筋肉内注射	528mg
	髄腔内; 注射	5.00%		
	静脈; 注射	5.00%	静脈内注射	8g
	静脈; 注射	30.00%	皮下注射	300mg
	静脈; パウダー 注射 溶液用	5.00%	直腸腔尿道適用	224mg
	静脈; 溶液	5.00%	経皮	1.38g
	静脈; 溶液, 注射	5.00%	眼科用剤	2mg/g
	静脈(点滴); 注射	5.60%	歯科外用及び口中用	4.8mg
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用	5.00%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	5.17%		
	鼻; 噴霧	5.00%		
	鼻; 定量用スプレー	5.00%		
	経口 香錠	157.00MG	経口投与	27.5g
	経口 シロップ	0.40%		
	経口錠剤	183.66MG		
	経口錠剤 (即時型/複合型リ-	398.00MG		
	経口錠剤, 徐効, 被覆	103.95MG		
	経口錠剤, 被覆なし, トローチ	903.50MG		
	脊髄麻酔; 注射	7.50%	局所麻酔注射	2.25g
	舌下錠剤	115.77MG		
DEXTROSE SOLUTION (ブドウ糖液)	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用	5.00%	経口投与	15.33g
DEXTROSE MONOHYDRATE (ブドウ糖水和物)	経口錠剤	9.14MG	経口投与	340mg
	静脈; 溶液, 注射	5.00%		
	経口錠剤, 被覆	0.63MG		
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	1.20MG		
DIACETYLATED	経口錠剤, フィルム被覆	1.14MG	経口投与	微量
DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE (リン酸水素カルシウム水和物)	経口カプセル	400.00MG	経口投与	4.02g
	経口錠剤	512.00MG	一般外用剤	25mg/g
	経口錠剤, 被覆	488.70MG	歯科外用及び口中用	250mg/g
	経口錠剤, 徐放	108.00MG		
	経口錠剤, フィルム被覆	635.50MG		
	経口錠剤, 徐効	189.00MG		
DIBUTYL PHTHALATE	経口カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	8.20MG	経口投与	15mg
	経口カプセル, 徐放	11.18MG		
	経口錠剤, 制御放出	7.97MG		
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	1.70MG		
DIETHANOLAMINE	静脈(点滴); 注射	1.50%	静脈内注射	12mg
	局所; 乳液, クリーム	0.30%	一般外用剤	19mg/g
DIETHYL PHTHALATE	経口カプセル, 徐放性ACTION, 被覆	15.10MG	経口投与	8mg
	経口カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	12.00MG		
	経口カプセル, 徐放	8.48MG		
	経口カプセル, 徐効	3.60MG		
	経口錠剤	4.00MG		
	経口錠剤 (即時型/複合型リ-	0.50MG		
	経口錠剤, 被覆	1.25MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口錠剤, フィルム 被覆 経口錠剤, 徐効	16.80MG 2.30MG 12.00MG		
DIETHYL SEBACATE	局所; 溶液	24%	一般外用剤 舌下適用 歯科外用及び口中用	400mg/g 150 µL/mL 20mg/g
DIETHYLENE GLYCOL	局所; ゲル 経皮; ゲル	25.00% 5.00%	殺虫剤	
DIISOPROPANOLAMINE	局所; 乳液, クリーム 局所; ゲル	0.12% 0.20%	一般外用剤	50mg/g
DIISOPROPYL ADIPATE	局所; ローション 局所; 溶液	20.00% 17.00%	一般外用剤 舌下適用	120mg/g 12mg/g
DIMETHICONE 1000 (ジメチルポリシロキサン)	経口カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	2.50MG	一般外用剤 経皮 直腸腔尿道適用	100mg/g 376mg 1.5mg/g
DIMETHICONE 350 (ジメチルポリシロキサン)	経口カプセル 経口カプセル, 徐効 局所; 乳液, クリーム 局所; 溶液	3.70MG 0.11MG 1.00% 0.50%	一般外用剤 経皮 直腸腔尿道適用	100mg/g 376mg 1.5mg/g
DIMETHICONE 360 (ジメチルポリシロキサン)	局所; 乳液, クリーム 経皮; フィルム, 制御放出	5.00% 564.00MG	一般外用剤 経皮 直腸腔尿道適用	100mg/g 376mg 1.5mg/g
DIMETHYL PHTHALATE	経口錠剤, 徐効	0.40MG	殺虫剤	
DIOCTYLPHTHALATE	眼; 坐薬, 挿入, 制御放出 経皮; フィルム, 制御放出	2.00MG 600.12MG	殺虫剤	
DIPROPYLENE GLYCOL	口腔; 貼布, 制御放出 経皮; フィルム, 制御放出 経皮; 貼布, 制御放出	29.90MG 12.00MG 0.21MG	一般外用剤 経皮	200mg/g 3.2mg/g
DOCOSANOL (ドコシルアルコール)	局所; 溶液	1.10%	一般外用剤 舌下適用	40mg/g 20mg/g
DOCUSATE SODIUM (ジオクチルスルフォサクシネート)	筋肉; 注射 経口カプセル 経口カプセル, 硬ゼラチン 経口カプセル, 徐効 経口懸濁液 経口懸濁 徐効 経口錠剤 経口錠剤 (即時型/複合型リリー) 経口錠剤, 被覆 経口錠剤, フィルム 被覆 経口錠剤, 徐効, フィルム 被覆 局所; ゲル 局所; シャンプー	0.01% 8.20MG 0.64MG 1.0e-03MG 0.11% 0.07% 11.00MG 0.03MG 2.0e-03MG 0.50MG 0.03MG 3.00% 2.00%	経口投与 一般外用剤 直腸腔尿道適用	36mg 10mg/g 5mg
EDETATE CALCIUM DISODIUM	動脈内; 注射 筋肉; 注射 筋肉; パウダー 注射 溶液用 腹腔内; パウダー 注射 溶液用 髄腔内; 注射 脈管内; 注射 静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用 神経ブロック; 注射 経口カプセル 経口濃縮物 経口パウダー 溶液用 経口溶液, エリキシル剤 経口錠剤 経口錠剤, フィルム 被覆 経口錠剤, 口腔内崩壊 皮下; 注射 皮下; 溶液, 注射 尿管; 溶液 尿道; 溶液 静脈; 注射	0.04% 0.04% 5.00E-05 5.00E-05 0.21% 10.00% 5.00E-05 5.00E-05 0.01% 0.27MG 0.02% 0.02% 0.50% 4.00MG 0.40MG 0.77MG 0.17% 0.02% 0.01% 0.01% 0.48%	動脈内注射 歯科外用及び口中用 その他の注射 脊椎腔内注射 静脈内注射 経口投与 皮下注射 直腸腔尿道適用	25mg 2mg/g 0.01mg 0.01mg 30mg 10mg 0.09mg 40mg
EDETATE DISODIUM	浸潤なし; 注射	0.01%	舌下適用	1mg/g

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
耳 (耳性); 溶液		0.10%	耳鼻科用剤	0.5mg/g
耳 (耳性); 溶液, 点滴剤		0.10%	歯科外用及び口中用	0.2mg/g
硬膜外; 注射		0.01%	動脈内注射	29mg
筋肉 - 静脈皮下; 注射		0.20%	その他の注射	52mg
筋肉 静脈; I注射		0.05%		
筋肉 静脈; 注射		10.00%		
筋肉 皮下; 注射		0.20%		
吸入 ; 溶液		5.00%	吸入剤	0.250mg/g
関節内;		0.01%		
関節内; 注射		0.05%		
病巣内; I注射		0.01%		
病巣内; 注射		0.05%		
筋肉; I注射		0.01%		
筋肉; 注射		10.00%		
筋肉; 溶液, 注射		0.10%		
脈管内; 注射		0.04%		
静脈; 乳液, 注射		5.00E-05	静脈内注射	16mg
静脈; 点滴		0.01%		
静脈; I注射		0.01%		
静脈; 注射		10.00%		
静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結		1.44%		
静脈; 溶液		0.05%		
静脈; 溶液, 注射		0.11%		
イオントフォレシス; 貼布., 制御放出		0.10MG		
静脈(点滴); 注射		1.00%		
静脈(点滴); パウダー 注射 懸濁用		0.08%		
静脈(点滴); 溶液, 注射		0.04%		
鼻; 溶液		5.00%		
鼻; 溶液, 噴霧		0.05%		
鼻; 噴霧		0.10%		
鼻; 定量用スプレー		0.50%		
神経ブロック; 注射		0.01%		
眼; ゲル		0.01%	眼科用剤	1.27mg/g
眼; 溶液		10.00%		
眼; 溶液, 点滴剤		0.30%		
眼; 懸濁液		0.13%		
眼; 懸濁 点滴剤		0.10%		
経口 カプセル		1.00MG	経口投与	4.5mg
経口 カプセル, 軟ゼラチン		1.00MG		
経口 濃縮物		0.30%		
経口 液体		0.05%		
経口 パウダー 懸濁液用		0.06%		
経口 溶液		0.50%		
経口 懸濁液		0.37%		
経口 懸濁 点滴剤		0.10%		
経口 懸濁 FOR 吸入		0.02%		
経口 シロップ		2.50%		
経口 錠剤		4.00MG		
経口 錠剤, 被覆		0.21MG		
経口 錠剤, 徐放		5.00MG		
経口 錠剤, フィルム 被覆		4.00MG		
直腸; ENEMA		0.10%	直腸膀胱尿道適用	20mg
直腸; 溶液		0.04%		
(吸入; 溶液, 吸入用		0.03%		
軟組織; 注射		0.05%		
皮下; I注射		0.10%		
皮下; 注射		0.20%		
局所; クリーム,		0.10%	一般外用剤	8mg/g
局所; クリーム, 乳液, 徐放		0.05%	その他の外用	0.11mg/mL
局所; 乳液		0.11%		
局所; 乳液, クリーム		1.00%		
局所; ゲル		0.17%		
局所; ローション		0.12%		
局所; 軟膏		6.50E-05		
局所; 貼布., 制御放出		0.10MG		

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; パウダー 溶液用 局所; 溶液 局所; 溶液, 点滴剤 局所; 懸濁液 局所; 懸濁 点滴剤 経皮; ゲル 腔; 乳液, クリーム 腔; ゲル	0.01% 0.01% 0.05% 0.01% 0.10% 0.06% 0.05% 0.05%	経皮5mg/g 殺虫剤	
EGG PHOSPHOLIPIDS(卵黄リン脂)	静脈; 乳液, 注射 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射	1.20% 1.20% 1.80%	高度精製卵黄レシチン 静脈内注射 卵黄リン脂質 一般外用剤 直腸腔尿道適用	36mg 3mg/g 40mg
ETHANOLAMINE(モノエタノールアミ)	経口 錠剤, 徐放性	1.00MG	静脈内注射 一般外用剤 眼科用剤	2.3mg 25mg/g 10.2mg/g
ETHANOLAMINE	静脈; 注射	0.15%	その他の外用	49mg/g
ETHYL ACETATE	経口 カプセル, 徐効 局所; 溶液 経皮; フィルム, 制御放出	382.25MG 31.00% 36138.00MG	一般外用剤 殺虫剤	0.4mL/mL
ETHYL HEXANEDIOL(2-エチル)	局所; 溶液	0.25%	一般外用剤	0.1mL/mL
ETHYL MALTOL	経口 溶液 経口 溶液, エリキシル剤 経口 シロップ	0.15% 0.06% 3.05%	経口投与	適量
ETHYL OLEATE	経皮; フィルム, 制御放出	8.64MG	筋肉内注射 皮内注射	微量 0.6mL
ETHYL VANILLIN	経口 カプセル 経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 懸濁液 経口 錠剤(即時型/複合型リリー	0.34MG 0.12MG 0.64MG 8.00E-05 0.14MG	経口投与	0.432mg
ETHYLCELLULOSE	経口 カプセル 経口 カプセル, 徐放 経口 カプセル, 徐効 経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン 経口 顆粒 FOR 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤(即時型/複合型リリー 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 口腔内崩壊 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, 被覆 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 経口28; 錠剤 局所; 貼布 経皮; フィルム, 制御放出	6.00MG 51.89MG 39.20MG 27.04MG 85.00MG 120.80MG 8.80MG 20.00MG 53.80MG 80.00MG 83.00MG 17.46MG 308.80MG 15.15MG 52.50MG 1.05MG 2.53MG 80.40MG	経口投与 一般外用剤 歯科外用及び口中用	489mg 2mg/mL 30mg/g
ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL	経口 カプセル	9.0e-03MG	殺虫剤	
ETHYLENE VINYL ACETATE	移植; ROD 子宮内; 坐薬, 挿入, 制御放出 眼; 坐薬, 挿入, 制御放出 (歯周; フィルム, 制御放出 皮下; ROD 経皮; フィルム, 制御放出	61.00MG 160.00MG 14.00MG 51.00MG 61.00MG 735.00MG	眼科用剤 経皮	14mg 51mg/g
ETHYLENEDIAMINE	静脈; 注射 静脈(点滴); 注射 経口 溶液 局所; 乳液, クリーム	0.37% 0.39% 1.85% 0.18%	静脈内注射 皮下注射	30mg 30mg
FERRIC CHLORIDE	静脈; 注射	6.05%	静脈内注射	0.2mg
FERRIC OXIDE BROWN(褐色酸化)	経口 カプセル 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 錠剤	0.09MG 0.70MG 1.12MG	経口投与	1.2mg
FERRIC OXIDE RED(三二酸化鉄)	口腔; 錠剤	0.40MG	舌下適用	微量

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 懸濁 徐効 経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型/複合型リリー 経口 錠剤 (即時型/複合型リリー 経口 錠剤, 制御放出 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 多層構造, 徐放 経口 錠剤, 口腔内崩壊 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, 被覆 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 経口21; 錠剤 経口21; 錠剤, 被覆 経口28; 錠剤 経口28; 錠剤, 被覆	2.64MG 2.28MG 0.27% 13.00MG 0.86MG 1.19MG 5.24MG 2.30MG 1.01MG 3.00MG 0.11MG 0.42MG 3.00MG 3.60MG 1.80MG 1.9e-03MG 0.01MG 0.02MG 0.01MG	経口投与 一般外用剤 その他の外用 殺虫剤	95.4mg 93mg/g 微量
FERRIC OXIDE YELLOW (黄色三二	口腔; 錠剤 経口 カプセル 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体- 経口 カプセル, 徐効 経口 顆粒 FOR 経口懸濁液 経口 顆粒 FOR 再構成 経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型/複合型リリー 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 制御放出 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 多層構造, 徐放 経口 錠剤, 口腔内崩壊 経口 錠剤, 徐効 経口21; 錠剤 経口21; 錠剤, 被覆 経口28; 錠剤 経口28; 錠剤, 被覆	1.00MG 1.05MG 1.80MG 1.23MG 0.10MG 3.04MG 1.80MG 0.25MG 2.00MG 0.18MG 0.38MG 0.93MG 0.43MG 0.03MG 1.06MG 1.96MG 0.93MG 3.00MG 0.01MG 8.0e-03MG 0.02MG 8.0e-03MG	経口投与 一般外用剤	5.67mg 0.8mg/g
FLUORESCEIN (フルオレセインナト	経口 カプセル	6.8e-03MG	その他の注射	0.003mg
FORMALDEHYDE (ホルマリン)	局所; 乳液, クリーム 局所; 溶液	0.27% 0.20%	皮下注射 殺虫剤	0.05mg
FRUCTOSE	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用, 経口 BAR, 咀嚼剤 経口 溶液 経口 懸濁液 直腸; 溶液	5.00% 438.00MG 25.00% 2.00% 10.00%	静脈内注射 経口投与 歯科外用及び口中用 耳鼻科用剤	900mg 10g 63mg 10mg/mL
GELATIN	歯科L; ペースト 筋肉 - 静脈皮下; パウダー FOR 筋肉 皮下; 注射 筋肉 皮下; 注射, 徐効 筋肉; 注射 筋肉; 注射, 微小球 静脈; 溶液 静脈(点滴); 注射 経口 BAR, 咀嚼剤 経口 カプセル 経口 カプセル(即時型/複合型リ 経口 カプセル(即時型/複合型リ 経口 カプセル, 被覆 丸薬 経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 徐放性ACTION 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	180.00MG 1.40% 16.00% 16.00% 0.26% 0.13% 3.48% 2.00% 1000.00MG 756.00MG 117.50MG 50.00MG 65.00MG 67.71MG 97.01MG 60.75MG	経口投与 筋肉内注射 皮下注射 その他の注射 一般外用剤 経皮 直腸尿道適用 歯科外用及び口中用 その他の外用 精製ゼラチン 経口投与 静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 動脈内注射 歯科外用及び口中用	2g 0.1mg 1mg 0.1mg 100mg/g 1988mg 1.22g 99.7mg/g 107.345mg/g 420mg 200mg 640mg 2.5mg 240mg 63mg

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル, 徐放	96.00MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	50.50MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	733.00MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	194.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	217.85MG		
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	107.00MG		
	経口 錠剤	143.00MG		
	経口 パウダー 懸濁液用			
	経口 溶液	3.48%		
	経口 錠剤	45.36MG		
	経口 錠剤(即時型/複合型リ-	2.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	42.12MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	15.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	28.35MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	23.75MG		
	経口 錠剤, 復効	1.60MG		
	経口 錠剤, 徐効	40.00MG		
	経口21; 錠剤	1.00MG		
	経口28; 錠剤	1.00MG		
	舌下 錠剤	10.00MG		
GELLAN GUM	眼; 溶液	0.60%	眼科用剤	6mg/g
GLUCONOLACTONE(グルコノ-δ-ラ	局所; エアロゾル, 定量	0.25%	経口投与	228mg
	局所; 溶液	0.25%	一般外用剤	1mg/g
	局所; 海綿	2500.00MG		
GLUCOSE, LIQUID(ブドウ糖液)	経口 PASTILLE	826.00MG	経口投与	15.33g
	経口 溶液	10.00%		
	経口 シロップ	62.00%		
	経口 錠剤	10.37MG		
	経口 錠剤, 徐効	2.00MG		
GLUTAMIC ACID	経口 錠剤	30.00MG	経口投与 歯科外用及び口中用	210mg 15mg
GLUTAMIC ACID, DL-(L-グルタミン	腔; 乳液, クリーム	0.10%	経口投与 眼科用剤	50mg 2.5mg/g
GLYCERIN	耳(耳性); 溶液	60.00%	耳鼻科用剤	60mg/g
	耳(耳性); 溶液, 点滴剤	63.63%		
	耳(耳性); 懸濁液	0.05%		
	口腔; GUM, 咀嚼	28.80MG	舌下適用	50mg/g
	口腔; 貼布, 制御放出	66.00MG		
	歯科L; 溶液	15.00%	歯科外用及び口中用	900mg
	歯科L; 錠剤	0.53MG		
	筋肉 - 静脈皮下; 注射	15.36%		
	筋肉 - 静脈皮下; パウダー FOR	1.20%		
	筋肉 静脈; 注射	15.00%		
	筋肉 皮下; 注射	1.60%		
	吸入 ; 溶液	7.30%	吸入剤	250mg
	皮内; 注射	1.60%	筋肉内注射	60mg
	筋肉; I注射	1.24%	その他の注射	2mg
	筋肉; 注射	1.78%		
	静脈; 乳液, 注射	2.25%	静脈内注射	60mg
	静脈; I注射	2.25%		
	静脈; 注射	12.62%		
	イオントフォレシス; 貼布, 制御放出	168.10MG		
	静脈皮下; 注射	1.20%		
	静脈(点滴); 乳液, 注射	22.50%		
	静脈(点滴); 注射	2.50%		
	鼻; 溶液	2.50%		
	鼻; 定量用スプレー	0.22%		
	眼; 乳液	2.20%	眼科用剤	25mg/g
	眼; 溶液	3.00%		
	眼; 溶液, 点滴剤	2.60%		
	眼; 懸濁液	2.50%		
	眼; 懸濁 点滴剤	2.50%		
	経口 BAR, 咀嚼剤	48.00MG	経口投与	6g
	経口 カプセル	197.88MG		
	経口 カプセル(即時型/複合型リ	75.00MG		



添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル(即時型/複合型リ	25.00MG		
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	31.20MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	223.80MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	40.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	132.31MG		
	経口 濃縮物	75.00%		
	経口 点滴剤	10.00%		
	経口 液体	22.00%		
	経口 溶液	95.00%		
	経口 溶液, 濃縮物	20.00%		
	経口 溶液, エリキシル剤	75.00%		
	経口 溶液, シロップ	20.00%		
	経口 懸濁液	95.00%		
	経口 懸濁 点滴剤	25.00%		
	経口 懸濁 液体	50.00%		
	経口 シロップ	86.00%		
	経口 錠剤	16.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リ-	1.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	0.91MG		
	経口 錠剤, 徐効	3.45MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	0.13MG		
	経口28; 錠剤	0.28MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	0.13MG		
	PERFUSION, BILIARY; 液体	2.50%		
	直腸; 坐薬	128.00MG	直腸腔尿道適用	520mg
	皮下; I注射	2.00%	皮下注射	48mg
	皮下; 注射	32.50%		
	皮下; 懸濁 注射	1.60%		
	局所; クリーム,	4.00%	一般外用剤	0.92mL/mL
	局所; クリーム, 乳液, 徐放	2.00%	その他の外用	150mg/g
	局所; 乳液, エアロゾル FOAM	2.11%		
	局所; 乳液, クリーム	20.00%		
	局所; ゲル	20.00%		
	局所; ローション	50.00%		
	局所; 貼布, 制御放出	168.10MG		
	局所; 溶液	50.00%		
	局所; 懸濁液	5.00%		
	経皮; フィルム, 制御放出	306.20MG		
	経皮; ゲル	5.00%	経皮	600mg
	腔; 乳液, クリーム	5.00%		
	腔; ゲル	14.51%		
	腔; 坐薬	227.90MG		
GLYCERYL CAPRYLATE (中鎖脂肪	経口 カプセル, 軟ゼラチン	400.00MG	経口投与	適量
	経口 溶液	34.91%	一般外用剤	300mg/g
			舌下適用	100mg/g
			直腸腔尿道適用	977mg
			静脈内注射	360mg/kg
GLYCERYL MONOSTEARATE	耳 (耳性); 懸濁液	0.50%	舌下適用	80mg/g
	歯科L; ペースト	64.00MG	直腸腔尿道適用	4g
	眼; 懸濁液	0.50%		
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	1.89MG	経口投与	1.28g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	0.95MG	一般外用剤	200mg/g
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	13.75MG	親油性モノステアリン酸グリセ	
	経口 カプセル, 徐効	27.00MG	一般外用剤	141mg/g
	経口 顆粒 経口懸濁液用	1.90MG	直腸腔尿道適用	972mg/g
	経口 錠剤	6.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リ-	0.25MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	5.0e-03MG		
	経口 錠剤, 徐放	0.52MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	7.50MG		
	経口 錠剤, 徐効	154.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	264.30MG		
	直腸; 坐薬	32.30MG		
	舌下 錠剤	1.23MG		
	局所; 乳液, クリーム	20.00%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; ローション	11.50%		
	局所; 軟膏	5.00%		
	腔; 乳液, クリーム	17.00%		
GLYCERYL OLEATE(モノオレイン酸)	経口錠剤	0.15MG	経口投与	150mg
	経口28; 錠剤	0.15MG	一般外用剤	
	局所; クリーム,	3.50%	親油型モノオレイン酸グリセリ	
	経皮; フィルム, 制御放出	18.80MG	一般外用剤	5mg/g
GLYCERYL STEARATE SE(自己乳)	局所; 乳液, クリーム	7.00%	一般外用剤	234mg/g
	局所; ローション	0.50%		
	局所; 懸濁液	1.25%		
GLYCINE	筋肉; I注射	2.25%	筋肉内注射	2700mg
	筋肉; 注射	1.12%	皮内注射	67.5mg
	筋肉; パウダー 注射 溶液用	4.00%	その他の注射	67.5mg
	筋肉; パウダー 注射 溶液用 凍結	2.76%	一般外用剤	20mg/g
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	25.00%	静脈内注射	2250mg
	静脈; 溶液, リポソーム, 注射	0.37%	その他の外用	0.75mg
	静脈(点滴); 注射	90.00%	直腸腔尿道適用	300mg
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用	0.37%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	42.00%		
	経口カプセル	25.00MG	経口投与	800mg
	経口カプセル, 軟ゼラチン	3.60MG		
	経口パウダー 経口懸濁液用	0.10%		
	経口パウダー 溶液用	9.08%		
	経口パウダー 懸濁液用	1.00%		
	経口溶液	5.00%		
	経口懸濁液	2.00%		
	経口懸濁 点滴剤			
	経口錠剤	163.31MG		
	経口錠剤 (即時型/複合型リリー)	200.00MG		
	経口錠剤, 口腔内崩壊	12.00MG		
	直腸; 溶液	5.00%		
	(吸入; パウダー 吸入用)	0.01%		
	皮下; I注射	0.13%	皮下注射	160mg
	皮下; パウダー 注射 溶液用	2.40%		
	皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結	2.76%		
GLYCOL STEARATE(モノステアリン)	局所; 乳液, クリーム	1.00%	一般外用剤	30mg/g
	局所; シャンプー	3.00%		
	局所; シャンプー, 懸濁液	1.00%		
GLYCYRRHIZIN(グリチルリチン酸)	経口シロップ	0.12%	経口投与	15mg
GLYCYRRHIZIN, AMMONIATED(グリ)	経口溶液	0.13%	経口投与	20mg
	経口シロップ	0.12%	グリチルリチン酸二アンモニウ	
	経口錠剤 (即時型/複合型リリー)	0.50MG	経口投与	1.25mg
GUAR GUM	口腔/舌下錠剤	1.10MG	経口投与	500mg
	経口BAR, 咀嚼剤	40.00MG	その他の内用	60mg
	経口カプセル	3.30MG		
	経口FOR 懸濁液	0.20%		
	経口パウダー 経口懸濁液用	0.25%		
	経口パウダー 懸濁液用	0.20%		
	経口懸濁液	0.49%		
	経口錠剤	12.95MG		
	経口錠剤, フィルム 被覆	35.40MG		
	経口錠剤, 徐効	5.04MG		
	腔; 錠剤	2.76MG		
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(ポ)	口腔/舌下錠剤	70.00MG	一般外用剤	56mg/g
	歯科L; ペースト	40.00MG		
	経口カプセル	2.00MG		
	経口錠剤, 徐効	0.64MG		
	局所; ゲル	26.00%		
	局所; 軟膏	9.00%		
	経皮; フィルム, 制御放出	85.00MG		
	腔; 坐薬	3321.20MG		
HISTIDINE(L- ヒスチジン)	静脈; 注射, 懸濁 リポソーム	0.15%	静脈内注射	624mg
	静脈(点滴); 注射	37.20%	筋肉内注射	7mg/kg(体重)
	静脈(点滴); 溶液, 注射	8.50%		
	経口懸濁液	0.50%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	皮下; 溶液, 注射	0.11%	皮下注射	2mg/kg(体重)
HYALURONATE SODIUM	関節内; I注射	2.30%	一般外用剤	2000mg/g
	筋肉; I注射	2.30%	眼科用剤	0.2mg/g
	硝子体内; I注射	2.30%		
	局所; ゲル	2.50%		
HYDROCHLORIC ACID	AN浸潤; 注射	0.64%	皮内注射	適量
	耳 (耳性); 溶液	0.37%	耳鼻科用剤	適量
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	0.06%	局所麻酔注射	80 $\mu$ L
	耳 (耳性); 懸濁液	0.04%	その他の注射	2.94 $\mu$ L
	筋肉 静脈; I注射	0.02%	筋肉内注射	30 $\mu$ L
	吸入 ; エアゾール, 定量	1.72%	吸入剤	適量
	吸入 ; 溶液	3.50%	脊椎腔内注射	適量
	筋肉; I注射	8.00%	直腸腔尿道適用	4.24mg/mg
	静脈; I注射	8.00%	静脈内注射	0.256mL
	静脈; 注射	10.00%	動脈内注射	2.94 $\mu$ L
	静脈; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	16.00%	歯科注射	適量
	静脈; 溶液	1.82%	歯科外用及び口中用	4.5 $\mu$ L
	静脈(点滴); 注射	1.44%		
	静脈(点滴); パウダー FOR 注射 懸	0.83%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	12.70%		
	鼻; 溶液	24.70%		
	神経ブロック; 注射	0.64%		
	眼; 溶液	1.06%	眼科用剤	適量
	眼; 溶液, 点滴剤	0.17%		
	経口 濃縮物	3.10%	経口投与	42 $\mu$ L
	経口 溶液	9.51%		
	経口 懸濁液	10.00%		
	経口 シロップ	0.20%		
	皮下; 注射	0.17%	皮下注射	30 $\mu$ L
皮下; 懸濁 注射	0.22%	溶解剤	4.86 $\mu$ L	
局所; 乳液, クリーム	0.34%	一般外用剤	4.5 $\mu$ L/mL	
局所; シャンプー	4.00%	その他の外用	適量	
局所; 溶液	1.24%			
HYDROCHLORIC ACID, DILUTED	AN浸潤; 注射	1.36%	静脈内注射	26.25 $\mu$ L
	神経ブロック; 注射	1.36%	筋肉内注射	12 $\mu$ L
	経口 溶液	2.75%	経口投与	0.02mL
	経口 噴霧	0.24%	皮下注射	12 $\mu$ L
	局所; シャンプー	2.35%	局所麻酔注射	4.2 $\mu$ L、
	局所; 溶液	5.55%		
HYDROGENATED CASTOR OIL(硬)	経口 カプセル	8.00MG	経口投与	2.8g
	経口 カプセル, 徐放	2.40MG	経皮	28.8mg
	経口 カプセル, 徐効	410.82MG	直腸腔尿道適用	5.38g
	経口 錠剤	37.60MG	歯科外用及び口中用	210mg
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	1.30MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	3.30MG		
	経口 錠剤, 徐効	295.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	5.00MG		
	経口 21; 錠剤	0.93MG		
	経口 28; 錠剤	0.93MG		
	舌下 錠剤	1.60MG		
	局所; ゲル	2.00%	一般外用剤	80mg/g
	HYDROGENATED SOYBEAN OIL	経口 カプセル	1.00MG	経口投与
経口 カプセル, 軟ゼラチン		15.30MG		
経口 錠剤		13.50MG		
経口 錠剤, 被覆		3.00MG		
HYDROXYETHYL CELLULOSE	耳 (耳性); 溶液	0.25%	歯科外用及び口中用	15mg/g
	口腔; フィルム, 溶解(性)	39.88MG		
	眼; 溶液	0.50%	眼科用剤	5.3mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	0.50%		
	眼; 懸濁液	0.25%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.35%		
	経口 カプセル	2.98MG	経口投与	60mg
	経口 溶液	2.25%		
	経口 懸濁液	15.00%		
	経口 シロップ	10.00%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤 経口錠剤(即時型/複合型リリー 経口錠剤,徐放性ACTION,腸溶 経口錠剤,徐放 経口錠剤,徐効 経口錠剤,徐効,被覆 経口錠剤,徐効,フィルム被覆 局所;ゲル 局所;ローション 局所;溶液 局所;海綿 局所;懸濁液 経皮;フィルム,制御放出	12.00MG 11.80MG 45.00MG 10.45MG 150.00MG 140.00MG 47.99MG 1.25% 0.80% 0.75% 9.09MG 0.68% 20.00MG	一般外用剤	25mg/g
HYDROXYPROPYL CELLULOSE	口腔;フィルム,溶解(性) 口腔;GUM,咀嚼 経口カプセル 経口カプセル,被覆丸薬 経口カプセル,徐放性ACTION 経口カプセル,腸溶性被覆丸薬 経口カプセル,徐放 経口カプセル,硬ゼラチン 経口カプセル,徐効 経口顆粒 経口顆粒 FOR 経口懸濁液 経口顆粒 FOR 再構成 経口顆粒 FOR 懸濁液 経口パウダー FOR 経口懸濁液 経口パウダー FOR 懸濁液 経口錠剤 経口錠剤(即時型/複合型リリー 経口錠剤(即時型/複合型リリー 経口錠剤,被覆 経口錠剤,制御放出 経口錠剤,徐放性ACTION,腸溶 経口錠剤,腸溶性被覆粒子S 経口錠剤,徐放 経口錠剤,フィルム被覆 経口錠剤,多層構造,徐放 経口錠剤,口腔内崩壊,徐放性 経口錠剤,徐効 経口錠剤,徐効,被覆 経口錠剤,徐効,フィルム被覆 舌下錠剤 局所;ゲル 局所;ローション 局所;ローション,増加された 局所;貼布 局所;溶液 経皮;フィルム,制御放出 経口錠剤	72.91MG 27.92MG 36.00MG 3.96MG 8.88MG 41.40MG 214.48MG 71.30MG 41.50MG 10.40MG 39.00MG 20.00MG 31.40MG 6.70% 4.00E-06 46.00MG 24.00MG 2.85MG 8.36MG 43.80MG 15.00MG 9.00MG 69.60MG 131.67MG 107.00MG 10.00MG 240.00MG 15.00MG 187.60MG 1.00MG 4.00% 0.54% 0.54% 1.26MG 0.60% 19.00MG 16.00MG	筋肉内注射 その他の内用 経口投与 舌下適用 直腸腔尿道適用 耳鼻科用剤 歯科外用及び口中用 その他外用	25mg 88mg 7.05g 8mg 60mg 1mg/g 120mg 10mg/g
	経口錠剤 局所;ゲル 局所;ローション 局所;ローション,増加された 局所;貼布 局所;溶液 経皮;フィルム,制御放出 経口錠剤	46.00MG 24.00MG 2.85MG 8.36MG 43.80MG 15.00MG 9.00MG 69.60MG 131.67MG 107.00MG 10.00MG 240.00MG 15.00MG 187.60MG 1.00MG 4.00% 0.54% 0.54% 1.26MG 0.60% 19.00MG 16.00MG	一般外用剤	30mg/g
HYDROXYPROPYL	口腔;GUM,咀嚼 口腔;錠剤 眼;溶液,点滴剤 経口カプセル 経口顆粒,腸溶性被覆 経口錠剤 経口錠剤,徐放	14.00MG 2.25MG 0.50% 3.50MG 33.20MG 50.00MG 17.00MG	経口投与 一般外用剤 眼科用剤	480mg 5mg/g 3.5mg/g
HYDROXYPROPYL	鼻;溶液,噴霧 鼻;定量用スプレー 眼;溶液 眼;懸濁液 眼;懸濁液,点滴剤 経口カプセル 経口カプセル,徐放性ACTION 経口カプセル,腸溶性被覆丸薬	0.10% 0.10% 0.50% 0.50% 0.50% 40.55MG 33.42MG 13.82MG	一般外用剤 舌下用剤 眼科用剤 歯科外用及び口中用 耳鼻科用剤 経口投与	280mg/g 6mg 3mg/g 138mg 2.5mg 1g

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル, 徐放	10.60MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	2.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	10.88MG		
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	4.77MG		
	経口 顆粒 FOR 経口懸濁液	26.60MG		
	経口 パウダー FOR 再構成	1.59%		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	3.00%		
	経口 懸濁液	0.50%		
	経口 シロップ	2.25%		
	経口 錠剤	54.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	16.76MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	11.80MG		
	経口 錠剤, 被覆	29.25MG		
	経口 錠剤, 制御放出	20.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	19.00MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	445.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	150.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	60.00MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 被覆	22.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	7.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	250.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	6.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	54.00MG		
	経口21; 錠剤	0.75MG		
	経口28; 錠剤	0.75MG		
HYPROMELLOSE 2208 (15000)	経口 カプセル	80.25MG	経口投与	40mg
	経口 カプセル, 徐効	336.00MG	一般外用剤	15mg/g
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	2.77MG	眼科用剤	1mg/g
	経口 錠剤	86.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	33.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出	7.80MG		
	経口 錠剤, 徐放	320.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	480.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	94.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	200.00MG		
	腔; 乳液, クリーム	0.30%	殺虫剤	
HYPROMELLOSE PHTHALATE	経口 カプセル	16.80MG	200731型	
	経口 カプセル, 被覆 丸薬	13.26MG	経口投与	504mg
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	97.20MG	一般外用剤	54mg
	経口 カプセル, 徐放	37.80MG	歯科外用剤及び口中用	0.019mg
	経口 カプセル, 徐効	19.63MG	220824型	
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	302.40MG	経口投与	175mg
	経口 錠剤	104.40MG		
	経口 錠剤, 徐放性 腸溶性 被覆	44.57MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	119.40MG		
ISOPROPYL ALCOHOL	経口 カプセル	46.40MG	一般外用剤	700mg/g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	300.50MG		
	経口 カプセル, 徐効	392.80MG		
	経口 錠剤	5.21MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	0.20MG		
	経口 錠剤, 徐効	0.50ML		
	経口21; 錠剤	2.00MG		
	局所; エアロゾル, 定量	4.00%		
	局所; エアロゾル, 噴霧	10.00%		
	局所; ゲル	20.00%		
	局所; ローション	78.00%		
	局所; ローション,	30.00%		
	局所; 溶液	51.50%		
	局所; 海綿	56.10ML		
ISOPROPYL MYRISTATE	耳 (耳性); 懸濁液	0.02%		
	局所; 乳液, エアロゾル FOAM	7.90%	直腸腔尿道適用	50mg/g
	局所; 乳液, クリーム	10.00%	一般外用剤	450mg/g
	局所; 乳液, ローション	1.00%	舌下適用	100mg/g
	局所; ゲル	10.00%	その他の外用	44 μg
	局所; ローション	2.00%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; 軟膏 経皮; ゲル 腔; 乳液, クリーム	35.00% 0.86% 5.00%	経皮 12mg/g 殺虫剤	
ISOPROPYL PALMITATE	局所; クリーム, 乳液, 徐放 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 経皮; フィルム, 制御放出	1.80% 5.50% 3.90% 187.50MG	一般外用剤 舌下適用	102mg/g 15mg/g
ISOSTEARIC ACID	局所; 乳液, クリーム	25.00%	一般外用剤	60mg/g
ISOSTEARYL ALCOHOL	局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 懸濁液	3.00% 25.00% 2.50%	一般外用剤	30mg/g
ISOTONIC SODIUM CHLORIDE	静脈; 注射	0.90%	経口投与 静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 動脈内注射 皮内注射 歯科注射 その他の注射 一般外用剤 経皮 直腸腔尿道適用	適量 適量 適量 適量 適量 50mL 適量 適量 適量 適量 0.6mg/g 微量
KAOLIN	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 シロップ 経口 錠剤 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, 徐効	14.61MG 1.00% 30.40MG 8.00MG 18.50MG 66.00MG	経口投与 一般外用剤 その他の外用 殺虫剤	504mg 30mg/g 380mg
KARAYA GUM (カラヤガム末)	口腔; 貼布, 制御放出	68.10MG	歯科外用及び口中用	210mg
LACTIC ACID	AN浸潤; 注射 筋肉 - 静脈皮下; 注射 心臓内; 注射 静脈; I注射 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射 神経ブロック; 注射 経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体- 経口 濃縮物 皮下; 注射 局所; 乳液, エアロゾル 局所; 乳液, クリーム 局所; ゲル 局所; ローション 局所; 溶液 局所; 懸濁液 腔; 乳液, クリーム 腔; 錠剤 静脈(点滴); 注射 局所; 溶液 静脈; I注射 静脈; 注射 皮下; 注射	0.11% 0.01% 0.01% 7.11% 0.71% 32.20% 0.11% 0.11% 44.00MG 5.00% 0.34% 1.05% 1.00% 6.07% 5.70% 18.06% 0.70% 0.81% 70.00MG 2.82% 7.40% 0.40% 0.30% 0.30%	その他の注射 筋肉内注射 静脈内注射 経口投与 一般外用剤 皮下注射	120mg 36mg 214.5mg 480mg 100mg/g 34mg
LACTOSE (無水乳糖)	口腔/舌下 錠剤 口腔; 錠剤 筋肉 - 静脈皮下; パウダー FOR 吸入 ; カプセル 吸入 ; カプセル, 硬ゼラチン 吸入 ; 粉末 腔内療法; パウダー FOR 注射 溶 筋肉; パウダー FOR 注射 溶液 筋肉; パウダー FOR 注射 溶液, 凍 静脈; 注射 静脈; パウダー FOR 注射 溶液 静脈; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	296.70MG 183.30MG 13.30% 20.00MG 25.00MG 9.00% 19.38% 2.00% 1.00% 50.00% 5.00% 1.00%	経口投与	2.4g

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	静脈(点滴); 溶液, 注射	0.45%		
	経口 カプセル	530.00MG		
	経口 カプセル, 被覆 丸薬	102.44MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	135.20MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	100.00MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	115.75MG		
	経口 カプセル, 徐効	120.00MG		
	経口 溶液	90.00%		
	経口 錠剤	1020.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	117.70MG		
	経口 錠剤, 被覆	332.05MG		
	経口 錠剤, 制御放出	69.25MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION	92.02MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	209.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	590.00MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 徐放	122.00MG		
	経口 錠剤, 復効	153.20MG		
	経口 錠剤, 徐効	400.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	51.10MG		
	経口 錠剤, 徐放, フィルム 被覆	38.75MG		
	経口20; 錠剤	70.70MG		
	経口21; 錠剤	89.27MG		
	経口28; 錠剤	179.20MG		
	直腸; 溶液	90.00%		
	直腸; 錠剤	65.38MG		
	皮下; パウダー FOR 注射 溶液	2.00%		
	皮下; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	0.50%		
	舌下 錠剤	191.76MG		
	経皮; フィルム, 制御放出	675.00MG		
	経皮; 軟膏	18.90%		
	腔; 乳液, クリーム	3.00%		
	腔; 錠剤	1013.00MG		
LACTOSE MONOHYDRATE	口腔; 錠剤	21.37MG	歯科外用及び口中用	500mg
	筋肉 - 静脈皮下; パウダー 注射	10.70%		
	筋肉 静脈; 粉末	2.75%	筋肉内注射	193.8mg
	筋肉 皮下; 注射	2.10%	皮下注射	96.9mg
	腔内療法; パウダー FOR 注射 溶	4.54%		
	筋肉; 注射	5.00%		
	静脈; 注射	90.00%	静脈内注射	1250mg
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	69.00%	動脈内注射	180mg
	静脈皮下; 注射	4.90%	皮内注射	0.5mg
	静脈(点滴); パウダー 注射用 溶液	20.00%	経皮	180mg
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用,	90.00%		
	経口 カプセル	427.26MG	経口投与	適量
	経口 カプセル(即時型/複合型リ)	156.11MG		
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	178.90MG		
	経口 カプセル, 徐放	23.30MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	161.80MG		
	経口 カプセル, 徐効	67.00MG		
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	18.80MG		
	経口 DISPERSIBLE 錠剤	543.60MG		
	経口 パウダー 吸入用	1.25%		
	経口 錠剤	586.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	245.19MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	62.30MG		
	経口 錠剤, 被覆	346.50MG		
	経口 錠剤, 制御放出	152.75MG		
	経口 錠剤, 徐放性	203.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	157.95MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	150.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	538.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	587.44MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 被覆	22.70MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	29.75MG		
	経口 錠剤, 復効	25.00MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤, 徐効 経口錠剤, 徐効, 被覆 経口錠剤, 徐効, フィルム被覆 経口錠剤, 徐効, 多層構造, フィルム 経口錠剤, 徐放, フィルム被覆 経口21; 錠剤 経口21; 錠剤, 被覆 経口28; 錠剤 経口28; 錠剤, 被覆 (吸入); カプセル (吸入); パウダー吸入用 舌下錠剤 腔; 挿入 腔; 錠剤, フィルム被覆	299.20MG 215.00MG 260.00MG 374.50MG 81.90MG 83.64MG 35.19MG 93.86MG 82.89MG 25.00MG 2.00% 33.87MG 760.50MG 17.90MG	吸入剤 舌下適用 直腸腔尿道適用	399.2mg 756mg 1136mg
LACTOSE MONOHYDRATE -	経口錠剤 経口錠剤, 徐放	422.52MG 121.50MG	経口投与	
LACTOSE, HYDROUS (乳糖水和)	筋肉静脈; 注射 筋肉静脈; パウダー注射溶液用 筋肉; パウダー注射溶液用, 凍結 静脈; 注射 静脈; パウダー注射溶液用 静脈(点滴); パウダー注射溶液用 経口カプセル 経口カプセル, 硬ゼラチン 経口カプセル, 徐効 経口顆粒 懸濁液用 経口錠剤 経口錠剤 (即時型/複合型リリー 経口錠剤, 被覆 経口錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口錠剤, 徐放 経口錠剤, フィルム被覆 経口錠剤, 復効 経口錠剤, 徐効 経口錠剤, 徐効, 被覆 経口21; 錠剤 経口28; 錠剤 舌下錠剤 腔; 錠剤	2.50% 2.50% 1.05% 25.00% 75.00% 20.00% 430.42MG 141.00MG 147.60MG 708.90MG 100.00MG 186.00MG 88.50MG 43.23MG 556.00MG 155.28MG 156.80MG 83.30MG 48.00MG 39.62MG 164.38MG 596.00MG	筋肉内注射 193.8mg 皮下注射 96.9mg 動脈内注射 180mg 静脈内注射 1250mg 皮内注射 0.5mg 直腸腔尿道適用 1136mg 経口投与 適量 歯科外用及び口中用 500mg 吸入剤 399.2mg 経皮 180mg 舌下適用 756mg	
LANOLIN (精製ラノリン)	眼; 軟膏 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 軟膏 腔; 乳液, クリーム	2.00% 2.00% 2.50% 2.00% 2.00%	一般外用剤 舌下適用 その他の外用 眼科用剤 直腸腔尿道適用 加水ラノリン 経皮 歯科外用及び口中用 その他の外用 還元ラノリン 一般外用剤 その他の外用 吸着精製ラノリン 一般外用剤	555mg/g 70mg/g、 21.3mg/g 150mg/g 166mg/g 0.49g/g 300mg/g 1.13mg/g 60mg/g 1mg/g 3mg/g
LANOLIN ALCOHOLS	眼; 軟膏 局所; 乳液, クリーム 局所; 軟膏	10.00% 6.00% 3.01%	一般外用剤 舌下適用	200mg/g 3.5mg
LAURETH-2 (ラウロマクロゴール)	局所; シャンプー	2.00%		
LAURETH-23 (ラウロマクロゴール)	局所; エアロゾル 局所; 乳液 局所; 乳液, エアロゾル	0.45% 0.45% 1.07%	経口投与 一般外用剤 経皮 舌下適用 直腸腔尿道適用 歯科外用及び口中用 その他の外用 殺虫剤	8mg 150mg/g 160mg 50mg/g 80mg/g 0.7mg/g 10mg



添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
LAURIC DIETHANOLAMIDE	局所; 乳液	15.00%	一般外用剤	30mg/g
	局所; ローション	1.70%		
	局所; シャンプー	20.00%		
	局所; シャンプー, 懸濁液	4.00%		
	局所; 溶液	1.41%		
	局所; 懸濁液	0.47%		
LECITHIN (大豆レシチン)	吸入 ; エアロゾル, 定量	2.00E-06	吸入剤	3.36mg
	筋肉; 注射	2.30%	一般外用剤	20mg/g
	経口 BAR, 咀嚼剤	54.00MG	経口投与	300mg
	経口 カプセル	15.00MG	その他の内用	134mg
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	1.00MG	直腸腔尿道適用	120mg
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	2.60MG	経皮	28mg
	経口 パウダー FOR 懸濁液	16.70%	精製大豆レシチン	
	経口 懸濁液	11.00%	経口投与	120mg
	直腸; 坐薬	6.50MG	静脈内注射	1.2g
	局所; ゲル	1.00%	一般外用剤	10mg/g
	局所; 溶液	1.40%		
	経皮; フィルム, 制御放出	9.86MG		
	腔; 乳液, クリーム	1.00%		
LECITHIN, EGG (精製卵黄レシチン)	静脈; 乳液, 注射	1.20%	静脈内注射	6g
	静脈; I注射	1.20%		
	経口 錠剤	48.00MG		
LECITHIN, HYDROGENATED (水素	耳 (耳性); 懸濁 液体	1.50%	一般外用剤	160mg/g
LECITHIN, HYDROGENATED	吸入 ; エアロゾル, 定量	0.28%	一般外用剤	160mg/g
	静脈; 注射, パウダー 凍結乾燥, リ	21.30%	部分水素添加大豆リン脂質	
	静脈; 注射, 懸濁 リボソーム	0.95%	一般外用剤	2mg/g
LECITHIN, SOYBEAN (大豆レシチ	吸入 ; エアロゾル, 定量	0.10%	経口投与	300mg
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	11.25%	その他の内用	134mg
	経口 カプセル	5.00MG	一般外用剤	20mg/g
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	20.00MG	直腸腔尿道適用	120mg
	経口 懸濁液	0.20%	吸入剤	3.36mg
	腔; 乳液, クリーム	0.33%	経皮	28mg
LEMON OIL	経口 カプセル	5.00MG	経口投与	9mg
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	8.50MG	歯科外用及び口中用	116mg
	経口 錠剤	7.0e-04ML		
	局所; ゲル	1.00%		
LEUCINE (L-ロイシン)	静脈(点滴); 注射	52.60%	皮下注射	20mg
	静脈(点滴); 溶液, 注射	27.00%	筋肉内注射	20mg
	経口 錠剤	3.60MG		
LEVOMENTHOL (l-メントール)	口腔; GUM, 咀嚼	3.84MG	経口投与	45mg
	口腔; 吸入	0.10%	一般外用剤	40mg/g
	舌下 エアロゾル, 定量	2.00E-05	経皮	0.5mg
	口腔; GUM, 咀嚼	3.84MG	舌下適用	2mg
			直腸腔尿道適用	5mg/g
LIGHT MINERAL OIL (軽質流動パラ	経口 カプセル	0.80MG	経口投与	6mg
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	14.10MG	一般外用剤	250mg/g
	経口 香錠	3.60MG	直腸腔尿道適用	200mg
	経口 錠剤	1474.00MG	歯科外用及び口中用	1.30mg/g
	経口 錠剤, 被覆	4.80MG	その他の外用	70mg/g
	経口 錠剤, フィルム 被覆	2.49MG		
	経口 錠剤, 徐効	0.20MG		
	局所; クリーム,	25.00%		
	局所; 乳液	5.00%		
	局所; 乳液, エアロゾル FOAM	5.26%		
	局所; 乳液, クリーム	20.00%		
	局所; ローション	16.00%		
	局所; 軟膏	23.00%		
	経皮; フィルム, 制御放出	162.00MG		
LYSINE (L-リジン塩酸塩)	静脈(点滴); 注射	61.00%	静脈内注射	8mg
	静脈(点滴); 溶液, 注射	22.00%	皮下注射	0.05mg
MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE	経口 点滴剤	0.41%	経口投与	225mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 顆粒 経口 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型/複合型リリー直腸; 懸濁液 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; シャンプー, 懸濁液 腔; 軟膏 経口 点滴剤 経口 顆粒 経口 懸濁液 経口 錠剤	8.30MG 60.00% 48.00MG 8.00MG 60.00% 1.50% 1.50% 0.85% 5.00% 0.41% 8.30MG 60.00% 48.00MG	一般外用剤 殺虫剤	10mg/g
MAGNESIUM ASPARTATE	経口 錠剤	1.50MG	経口投与	10mg
MAGNESIUM CARBONATE	経口 カプセル 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐効 経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型/複合型リリー 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 徐放性 腸溶性 被覆 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	19.44MG 22.40MG 22.40MG 175.00MG 100.00MG 1.15MG 250.00MG 250.00MG 10.00MG	経口投与 一般外用剤 その他の外用 殺虫剤	300mg 35mg/g 200mg/g
MAGNESIUM CHLORIDE	眼内「溶液 腹腔内; 溶液 硝子体内; 懸濁 注射 静脈(点滴); 注射 眼; パウダー FOR 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結	0.03% 0.50% 0.03% 10.20% 0.03% 6.50E-05 0.12%	経口投与 一般外用剤 眼科用剤 静脈内注射 歯科外用及び口中用	60mg 80mg/g 2mg/g 213.6mg 50mg/g
MAGNESIUM HYDROXIDE	経口 パウダー 経口懸濁液用 経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型/複合型リリー 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, フィルム 被覆	25.00% 40.00MG 450.00MG 60.00MG 43.40MG	経口投与 殺虫剤	477mg
MAGNESIUM OXIDE	口腔; GUM, 咀嚼 経口 カプセル 経口 錠剤 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 徐効	7.20MG 10.00MG 26.40MG 63.00MG 40.00MG 25.74MG	経口投与 一般外用剤	750mg 400mg/g
MAGNESIUM SILICATE	経口 カプセル 経口 錠剤 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S 経口 錠剤, フィルム 被覆	40.00MG 10.00MG 29.03MG 30.00MG 14.30MG	経口投与	984.8mg
MAGNESIUM STEARATE	口腔/舌下 錠剤 口腔; 錠剤 移植; 注射 硝子体内; 筋肉PLANT 硝子体内; 注射 経口 カプセル 経口 カプセル(即時型/複合型リ 経口 カプセル, 被覆 丸薬 経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 徐放性ACTION 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐放 経口 カプセル, 硬ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 徐効 経口 分散錠剤 経口 顆粒 経口 顆粒 経口懸濁液用 経口 粘奨剤	17.50MG 4.00MG 1.50E-05 4.8e-03MG 1.50E-05 256.40MG 10.00MG 0.15MG 3.00MG 2.60MG 34.87MG 9.15MG 11.40MG 9.00MG 100.00MG 0.32MG 1.25MG 2.60MG 4.50MG	経口投与 一般外用剤 経皮 舌下適用 直腸腔尿道適用 耳鼻科用剤 歯科外用及び口中用 その他の外用 殺虫剤	3g 40mg/g 14.4mg 70mg 34mg 0.18mg/g 225mg 40mg/g

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 パウダー 吸入用	2.80E-05		
	経口 パウダー 経口懸濁液用	0.30%		
	経口 パウダー 懸濁液用	3.25%		
	経口 懸濁液	5.75%		
	経口 懸濁 徐効	2.70%		
	経口 錠剤	400.74MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	6.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	20.50MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	50.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	40.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出	12.40MG		
	経口 錠剤, 徐放性	9.50MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	53.80MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	7.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	1200.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	28.31MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 被覆	3.00MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 徐放	1.20MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	71.43MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	6.00MG		
	経口 錠剤, 復効	1.50MG		
	経口 錠剤, 徐効	150.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	10.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	15.80MG		
	経口 錠剤, UN被覆, トローチ	20.00MG		
	経口 トローチ	21.00MG		
	経口20; 錠剤	1.50MG		
	経口21; 錠剤	1.50MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	0.88MG		
	経口28; 錠剤	75.00MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	0.88MG		
	皮下; 筋肉PLANT	0.50MG		
	舌下 錠剤	3.00MG		
	局所; 乳液, クリーム	8.00E-06		
	腔; 挿入	23.00MG		
	腔; 海綿	0.85MG		
	腔; 錠剤	17.00MG		
	腔; 錠剤, フィルム 被覆	0.40MG		
MAGNESIUM SULFATE (硫酸マグネ)	経口 錠剤	2.90MG	静脈内注射	50mg
	経口 錠剤, 徐放	4.00MG	筋肉内注射	15mg
	経口 錠剤, フィルム 被覆	14.00MG	局所麻酔注射	75mg
	経口 カプセル	29.80MG	一般外用剤	7mg/g
			皮下注射	1mg
			殺虫剤	
MAGNESIUM TRISILICATE (ケイ酸マ)	経口 錠剤	76.89MG	経口投与	984.8mg
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	15.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	20.00MG		
MALEIC ACID	静脈 (点滴); I注射ができる	0.01%	経口投与	1.6mg
	経口 カプセル	2.00MG	筋肉内注射	2mg
	経口 シロップ	0.17%		
	経口 錠剤	4.00MG		
MALIC ACID (DL- リンゴ酸)	経口 溶液	3.30%	経口投与	450mg
	経口 溶液(L-)	0.21%	一般外用剤	14mg/g
			歯科外用及び口中用	33mg/g
MALTITOL	経口 溶液	65.00%	経口投与	200mg
MALTODEXTRIN (デキストリン)	経口 顆粒 懸濁液用	238.10MG	経口投与	12.015g
	経口 粉末	26.68%	一般外用剤	83.6mg/g
	経口 パウダー 懸濁液用	19.00%	歯科外用及び口中用	28mg
	経口 錠剤	80.00MG	注腸	53.065g
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	292.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	5.60MG		
	経口 錠剤, 徐放	150.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	72.50MG		
	経口28; 錠剤	0.15MG		
MALTOL	経口 濃縮物	0.01%	経口投与	1.6mg

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 溶液	0.05%		
MANNITOL(D-マンニトール)	口腔/舌下 錠剤	52.50MG		
	口腔; 錠剤	97.68MG		
	筋肉 静脈; 注射	2.50%	動脈内注射	0.3mg
	筋肉 静脈; パウダー 注射 溶液用	30.00%	筋肉内注射	50mg
	筋肉 皮下; パウダー 注射 溶液用	2.00%		
	筋肉; 注射	10.66%	皮内注射	0.39mg
	筋肉; 注射, 微小球	13.49%	その他の注射	70mg
	筋肉; パウダー 注射 溶液用	11.92%	一般外用剤	50mg/g
	筋肉; パウダー 注射 溶液用, 凍結	8.50%	経皮	260mg
	筋肉; パウダー 注射 溶液用, 凍結	3.60%	舌下適用	300mg/g
	筋肉; パウダー 注射 懸濁用 凍結	5.19%	直腸腔尿道適用	41.49mg
	静脈; I注射	45.00%	静脈内注射	3200mg
	静脈; 注射	13.00%	歯科外用及び口中用	3.5mg/g
	静脈; 液体, 濃縮物, 注射	6.13%	その他の外用	2mg
	静脈; 粉末	45.00%	眼科用剤	41mg/g
	静脈; パウダー 注射 溶液用	34.00%		
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	60.00%		
	静脈; 溶液	4.15%		
	静脈; 溶液, 注射			
	静脈(点滴); 注射	20.00%		
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用	75.00%		
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用,	93.75%		
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用,	7.50%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	45.00%		
	眼; パウダー FOR 溶液	5.60%		
	眼; 溶液	23.00%		
	眼; 溶液, 点滴剤	4.60%		
	眼; 溶液, ゲル形成, 徐放	4.35%		
	眼; 懸濁液	2.40%		
	眼; 懸濁 点滴剤	4.00%		
	経口 カプセル	297.20MG	経口投与	8g
	経口 カプセル(即時型/複合型)	264.80MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	236.00MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	92.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	56.10MG		
	経口 分散 錠剤	8.60MG		
	経口 顆粒	484.20MG		
	経口 顆粒 懸濁液用	500.00MG		
	経口 パウダー 経口溶液用	721.00MG		
	経口 パウダー 再構成用	29.36%		
	経口 パウダー 懸濁液用	20.00%		
	経口 溶液, 注射	5.00%		
	経口 錠剤	991.77MG		
	経口 錠剤(即時型/複合型)リ-	48.88MG		
	経口 錠剤(即時型/複合型)リ-	600.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	177.70MG		
	経口 錠剤, 制御放出			
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	42.70MG		
	経口 錠剤, 分散	90.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	30.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	218.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	606.72MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	221.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	392.20MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	274.97MG		
	経口 トローチ	1035.17MG		
	パウダー吸入用	0.05%		
皮下; I注射	3.60%			
皮下; 注射	4.50%			
皮下; パウダー 注射 溶液用	9.00%			
皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結	22.05%			
皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結	4.00%			
皮下; パウダー 注射 懸濁用 凍結	10.00%			
皮下; 溶液, 注射	10.32%	皮下注射	210mg	