

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	皮下; 懸濁 注射 舌下 錠剤 粘膜; 溶液, 注射 局所; 溶液 局所; 溶液, 点滴剤 局所; 懸濁 点滴剤 経口 錠剤 (即時型/複合型リリー 経口 錠剤, 口腔内崩壊 経口 錠剤, 口腔内崩壊	3.64% 158.45MG 5.00% 1.60% 1.60% 1.01% 32.58MG 174.78MG 174.76MG		
MEGLUMINE	筋肉; 注射 静脈; 点滴 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 錠剤 尿管; 溶液	15.92% 2.30% 15.92% 7.23% 3.00MG 24.00MG 7.23%	静脈内注射    経口投与	15.4g    80mg
MENTHOL (l-メントール)	口腔; GUM, 咀嚼 吸入 ; エアロゾル, 定量 経口 カプセル 経口 濃縮物 経口 溶液 経口 溶液, 液体, 濃縮物, 経口 懸濁液 経口 シロップ 経口 錠剤 経口 錠剤, 口腔内崩壊 局所; ローション 局所; 溶液	10.00MG 0.05% 0.87MG 5.00E-05 0.07% 0.05% 0.04% 0.75% 0.58MG 14.00MG 0.05% 0.08%	経口投与 一般外用剤 経皮 舌下適用 直腸腔尿道適用 眼科用剤 耳鼻科用剤 歯科外用及び口中用 その他の外用 dl-メントール 経口投与 一般外用剤 歯科外用及び口中用	45mg 40mg/g 0.5mg 2mg 5mg/g 5mg/g 0.3mg 10mg/g 1.05mg  40mg 4mg 30mg/g
METACRESOL (m-クレゾール)	筋肉 - 静脈皮下; 注射 筋肉 皮下; 注射 皮内; 注射 筋肉; パウダー注射 溶液用, 凍結 静脈(点滴); 注射 皮下; l注射 皮下; 注射 皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結 皮下; 溶液, 注射 皮下; 懸濁 注射	0.10% 0.25% 0.16% 0.30% 0.10% 0.31% 0.45% 0.30% 0.52% 0.17%	静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 皮内注射 クレゾール 静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射	30mg 6mg 30mg 2.0mg  20mg 20mg 158.2mg
METHACRYLIC ACID - ETHYL	経口 カプセル 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐放 経口 カプセル, 徐効 経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン 経口 錠剤 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, 徐効, 被覆 経口 カプセル 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐効 経口 錠剤	75.18MG 80.36MG 40.41MG 48.10MG 10.90MG 91.00MG 140.00MG 6.86MG 15.00MG 56.30MG 93.36MG 22.08MG 13.65MG	経口投与 乾燥メタクリル酸コポリマー 経口投与	700mg  21mg、
METHACRYLIC ACID - METHYL	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐効 経口 錠剤 経口 カプセル	93.36MG 22.08MG 13.65MG 56.30MG	経口投与	800mg
METHACRYLIC ACID - METHYL	経口 カプセル, 徐効 経口 錠剤	28.38MG 0.82MG		
METHACRYLIC ACID COPOLYMER	経口 カプセル 経口 カプセル, 徐放性ACTION 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐放 経口 カプセル, 徐効 経口 顆粒, 腸溶性 被覆 経口 顆粒 FOR 経口懸濁液	22.30MG 37.91MG 95.87MG 18.04MG 44.60MG 430.80MG 69.48MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤 経口錠剤, 徐放性ACTION 経口錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶 経口錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性 経口錠剤, 徐効 経口錠剤, 徐効, 被覆	5.80MG 160.00MG 54.00MG 106.89MG 35.00MG 24.60MG		
METHIONINE (DL-メチオニン)	筋肉; 溶液, 注射 髄腔内; I注射 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射 皮下; 注射 皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結 皮下; 溶液, 注射 皮下; 懸濁 注射	0.04% 5.00E-05 0.30% 49.20% 16.00% 0.01% 0.01% 0.04% 0.15%	筋肉内注射 皮下注射 動脈内注射 皮内注射 L-メチオニン 歯科注射	30mg 1mg 0.125 mg 1mg 25mg
METHYL ALCOHOL	経口カプセル, 徐効 経口濃縮物 経口錠剤 経口錠剤, 被覆 経口錠剤, フィルム 被覆 経皮; フィルム, 制御放出	0.03ML 4.42% 210.00MG 15.70MG 10.36MG 4015.00MG	一般外用剤    殺虫剤	878mg/g
METHYL ETHYL KETONE	経口錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	61.00MG	一般外用剤 舌下適用	適量 適量
METHYL SALICYLATE	経口カプセル 局所; ゲル	16.00MG 1.00%	一般外用剤 歯科外用及び口中用 その他の外用	8mg/mL 0.01g/g、 1.25mg/mL
METHYLCELLULOSE	口腔/舌下錠剤 関節内; 注射 筋肉; 注射 眼; 溶液 経口カプセル 経口カプセル, 徐放 経口カプセル, 徐効 経口パウダー 懸濁液用 経口懸濁液 経口錠剤 経口錠剤 (即時型/複合型) リー 経口錠剤, 被覆 経口錠剤, フィルム 被覆 経口錠剤, 徐効 経口28; 錠剤 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション	4.00MG 0.10% 0.10% 0.16% 13.50MG 2.67MG 3.20MG 1.19% 0.12% 183.60MG 50.00MG 138.30MG 21.00MG 96.00MG 15.00MG 1.30% 1.50%	経口投与 経皮 一般外用剤 舌下適用 眼科用剤 歯科外用及び口中用 その他の外用	607.5mg 150mg 70mg/g 8mg 5mg/g 160mg/g 0.353mg
METHYLENE BLUE	静脈; 注射	1.00%	一般外用剤	10 µg/g
METHYL PARABEN	AN浸潤; 注射 耳 (耳性); 懸濁液 口腔; フィルム, 溶解 (性) 仙骨麻酔; 注射 硬膜外; 注射 筋肉 - 静脈皮下; 注射 筋肉 静脈; I注射 筋肉 静脈; 注射 筋肉 静脈; 溶液 筋肉 皮下; 注射 吸入 ; 溶液 関節内; 注射 滑液嚢内; 注射 皮内; 注射 病巣内; 注射 筋肉; 注射 静脈; I注射 静脈; 注射 静脈; パウダー FOR 注射 溶液 静脈; 溶液, 注射 イオントフォーシス; 溶液	0.10% 1.40E-05 0.71MG 0.10% 0.10% 0.44% 0.12% 0.75% 0.12% 0.18% 0.07% 0.24% 0.18% 0.10% 0.15% 0.24% 0.18% 1.80% 1.50% 0.18% 0.10%	経口投与 静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 歯科注射 局所麻酔注射 一般外用剤 経皮 舌下適用 直腸尿道適用 眼科用剤 耳鼻科用剤 歯科外用及び口中用 その他の外用 皮内注射 その他の注射 吸入剤	40mg 30mg 25mg 25mg 0.018mg 40mg 26mg/g 0.26mg/g 1.5mg/g 1mg/g 0.25mg/g 1.5mg/g 1mg/g、 2mg/g 1.5mg/mL 1.5mg/mL 1.5mg/mL

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	灌注 溶液	2.00%		
	静脈皮下; 注射	0.18%		
	静脈(点滴); 注射	0.44%		
	静脈(点滴); パウダー注射 溶液用	0.10%		
	鼻; 溶液	0.03%		
	鼻; 定量用スプレー	0.70%		
	神経ブロック; 注射	0.10%		
	眼; 軟膏	0.05%		
	眼; 溶液	0.05%		
	眼; 溶液, 点滴剤	0.05%		
	眼; 懸濁液	0.05%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.05%		
	経口 カプセル	1.00MG		
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	0.15MG		
	経口 カプセル, 徐効	0.86MG		
	経口 濃縮物	0.20%		
	経口 顆粒	50.00MG		
	経口 液体	0.50%		
	経口 パウダー経口溶液用	1.50MG		
	経口 パウダー溶液用	0.15%		
	経口 パウダー懸濁液用	0.10%		
	経口 溶液	13.00%		
	経口 溶液, 濃縮物	0.10%		
	経口 溶液, エリキシル剤	0.90%		
	経口 溶液, シロップ	0.90%		
	経口 懸濁液	2.40%		
	経口 懸濁 液体	1.00%		
	経口 懸濁 徐効	0.75%		
	経口 シロップ	5.00%		
	経口 錠剤	1.80MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	1.27MG		
	経口 錠剤, 被覆	0.01MG		
	経口 錠剤, 制御放出	0.08MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	0.23MG		
	経口 錠剤, 徐効	0.17MG		
	経口 錠剤, 徐効, 多層構造, フィル	0.09MG		
	硬膜外; 注射	0.10%		
	直腸; エアロゾル, 定量	0.09%		
	直腸; ENEMA	10.80%		
	直腸; 溶液	13.00%		
	直腸; 懸濁液	2.40%		
	軟組織; 注射	0.15%		
	皮下; 注射	0.18%		
	皮下; 懸濁 注射	0.16%		
	局所; クリーム,	0.20%		
	局所; クリーム, 乳液, 徐放	0.20%		
	局所; 乳液	0.20%		
	局所; 乳液, エアロゾル FOAM	0.10%		
	局所; 乳液, クリーム	18.00%		
	局所; 乳液, ローション	0.17%		
	局所; フィルム, 制御放出			
	局所; ゲル	0.30%		
	局所; ゼリー	70.00%		
	局所; ローション	15.00%		
	局所; 軟膏	0.20%		
	局所; 貼布,	0.35MG		
	局所; シャンプー	0.18%		
	局所; シャンプー, 懸濁液	0.15%		
	局所; 溶液	0.10%		
	局所; 懸濁液	0.30%		
	尿道; 注射	0.18%		
	腔; 乳液, クリーム	0.20%		
	腔; ゲル	0.08%		
METHYLPARABEN SODIUM	経口 パウダー FOR 懸濁液	0.10%	経口投与	0.06mg
	経口 懸濁液	0.65%		



添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤	0.18MG		
	経口錠剤, 口腔内崩壊	0.30MG		
MICROCRYSTALLINE WAX	経口カプセル, 徐効	6.00MG	一般外用剤	350mg/g
	局所; 軟膏	30.00%	経皮	47.2mg
	腔; 乳液, クリーム	0.45%	舌下適用	10mg
			直腸腔尿道適用	70mg/g
			歯科外用及び口中用	30mg/g
			口腔内咀嚼	148.5mg/g
MINERAL OIL	耳(耳性); 懸濁液	0.50%	経口投与	19.2mg
	歯科; ペースト	457.95MG	一般外用剤	707.843mg/g
	眼; 軟膏	59.50%	舌下適用	450mg/g
	眼; 懸濁液	0.10%	直腸腔尿道適用	576mg/g
	経口カプセル	5.00MG	眼科用剤	250mg/g
	経口カプセル, 徐効	50.00MG	歯科外用及び口中用	180mg/g
	経口錠剤	50.00MG	その他の外用	30mg/g
	経口錠剤, 被覆	1.30MG	経皮	19mg/g
	経口錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	5.67MG	殺虫剤	
	局所; クリーム,	50.61%		
	局所; クリーム, 乳液, 徐放	23.63%		
	局所; 乳液, クリーム	40.00%		
	局所; 乳液, ローション	20.00%		
	局所; ゲル	82.00%		
	局所; ローション	19.47%		
	局所; 軟膏	95.00%		
	局所; 懸濁液	2.01%		
	経皮; フィルム, 制御放出	11.80MG		
	経皮; 貼布, 制御放出	1.52MG		
	腔; 乳液, クリーム	15.00%		
	腔; ゲル	4.72%		
MONOSODIUM CITRATE(クエン酸)	経口パウダー-再構成用	0.12%	経口投与	209mg
	経口パウダー 懸濁液用	2.20%	直腸腔尿道適用	36.5mg
	経口錠剤	50.00MG		
MONTAN WAX(精製モンタンワックス)	経口錠剤	0.06MG	一般外用剤	3mg/g
	経口錠剤, フィルム 被覆	0.03MG		
	経口21; 錠剤	0.03MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	0.05MG		
	経口28; 錠剤	0.05MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	0.05MG		
MYRISTYL ALCOHOL	経口錠剤, 徐効	2.00MG	経口投与	2mg
	局所; 乳液, クリーム	3.00%	一般外用剤	35mg/g
	局所; ローション	1.00%		
	局所; 懸濁液	1.05%		
	局所; ローション	92.80%		
N,N-DIMETHYLACETAMIDE	静脈; 注射	1.80%	静脈内注射	300mg
NIACINAMIDE	筋肉 静脈; 注射	2.50%	経口投与	10mg
	局所; ゲル	1.25%	静脈内注射	250mg
			筋肉内注射	250mg
			皮下注射	75mg
			一般外用剤	5mg/g
			その他の注射	25mg/mL
			耳鼻科用剤	25mg/mL
			吸入剤	37.5mg
N-LAUROYLSARCOSINE(ラウロイル)	眼; 懸濁 点滴剤	0.03%	歯科外用及び口中用	5mg/mg
			一般外用剤	5mg/g
OCTOXYNOL 9(ポリオキシエチレンオ)	局所; ゲル	0.01%	一般外用剤	50mg/g
	局所; 溶液	22.00%	殺虫剤	
OCTOXYNOL-40(ポリオキシエチレン)	眼; 溶液	0.05%	一般外用剤	50mg/g
			殺虫剤	
OCTYLDODECANOL	局所; 乳液, クリーム	12.00%	一般外用剤	350mg/g
	局所; ゲル	10.00%		
	局所; ローション	3.30%		
	局所; 懸濁液	2.01%		
	経皮; フィルム, 制御放出	253.40MG		
	腔; クリーム,	13.50%		
	腔; 乳液, クリーム	13.50%		



添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
OLEIC ACID	吸入 ; エアロゾル, 定量	0.26%	静脈内注射	4.8mg
	吸入 ; 吸入抗原	0.16%		
	鼻; エアロゾル, 定量	0.13%	経口投与	237mg
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	598.60MG		
	経口 錠剤, 被覆	0.72MG		
	経口 錠剤, 復効	1.85MG		
	経口 錠剤, 徐効	2.00MG		
	(吸入 エアロゾル, 定量	3.00E-06	吸入剤	0.1668mg
	局所; 溶液	7.40%	一般外用剤	8mg/gL
	経皮; フィルム, 制御放出	22.00MG	経皮	71mg
	経皮; 貼布, 制御放出	5.51MG	殺虫剤	
OLEYL ALCOHOL	局所; 乳液, クリーム	10.00%	一般外用剤	100mg/g
	局所; 軟膏	5.00%		
OLEYL OLEATE	局所; 軟膏	2.55%	一般外用剤	60mg/g
OLIVE OIL	経口 溶液	42.50%	経口投与	450mg
	局所; 溶液	0.60%	一般外用剤	584.4mg/g
			舌下適用	200mg/g
ORANGE OIL	経口 溶液, エリキシル剤	0.12%	経口投与	0.3mL
	経口 懸濁液	0.05%	一般外用剤	10mg/g
	経口 錠剤 (即時型/複合型) リー	2.0e-03MG		
			直腸腔尿道適用	5mg/mg
PALM OIL - SOYBEAN OIL,	経口 カプセル	4.00MG	経口投与	2.8g
			一般外用剤	80mg/g
			経皮	28.8mg
			直腸腔尿道適用	5.38g
			歯科外用及び口中用	210mg
PALMITIC ACID	経口 錠剤	6.00MG	一般外用剤	33mg/g
PARABENS	経口 カプセル	0.16MG	パラオキシ安息香酸イソプロチ	0.36mg
	経口 カプセル(即時型/複合型) リー			
	局所; エアロゾル, 定量	10%	経口投与	14mg
			経口投与	60mg
			その他の内用	1 µg
			筋肉内注射	2.5mg
			一般外用剤	2.5mg/g
			経皮	8mg
			舌下適用	1mg/g
			直腸腔尿道適用	606mg
			眼科用剤	0.26mg
			耳鼻科用剤	0.4mg/g
			歯科外用及び口中用	1mg/g、
			パラオキシ安息香酸ブチル	
			経口投与	12.6mg
			その他の内用	1 µg
			局所麻酔注射	2mg
			一般外用剤	50mg/g
			経皮	6mg
			舌下適用	1mg/g
			直腸腔尿道適用	10mg
			眼科用剤	0.5mg/L
			耳鼻科用剤	0.1mg/g
			歯科外用及び口中用	1mg/g
			パラオキシ安息香酸プロピル	
			経口投与	33.6mg
			静脈内注射	4mg
			筋肉内注射	2.4mg
			皮下注射	4.2mg
			局所麻酔注射	0.2mg
		一般外用剤	2mg/g	
		経皮	0.14mg/g	
		舌下適用	1mg/g	
		直腸腔尿道適用	0.2mg/g	
		眼科用剤	0.2mg/g	
		耳鼻科用剤	0.2mg/g	

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
			歯科外用及び口中用 皮内注射 吸入剤 パラオキシ安息香酸メチル 経口投与 静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 歯科注射 局所麻酔注射 一般外用剤 経皮 舌下適用 直腸腔尿道適用 眼科用剤 耳鼻科用剤 歯科外用及び口中用 その他の外用 皮内注射 その他の注射 吸入剤	0.5mg/g 0.2mg/mL 0.2mg/mL 40mg 30mg 25mg 25mg 0.018mg 40mg 26mg/g 0.26mg/g 1.5mg/g 1mg/g 0.25mg/g 1.5mg/g 1mg/g 2mg/g 1.5mg/mL 1.5mg/mL 1.5mg/mL
PARAFFIN	経口 カプセル, 徐効 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, 徐効 局所; 乳液, クリーム 局所; 軟膏	50.00MG 0.07MG 0.06MG 150.20MG 4.50% 68.99%	経口投与 一般外用剤 直腸腔尿道適用 その他の外用	60mg 200mg/g 20mg/g 3µg
PARAFFIN, WHITE SOFT(白色ワセリン)	局所; 乳液, クリーム	15.00%	一般外用剤 経皮 舌下適用 直腸腔尿道適用 眼科用剤 歯科外用及び口中用	適量 750mg/g 320mg/g 3120mg 899mg/g 357mg/g
PEANUT OIL(ラッカセイ油)	経口 カプセル 経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン 局所; 乳液, クリーム 腔; 乳液, クリーム	313.80MG 149.00MG 3.00% 9.00%	経口投与 筋肉内注射 一般外用剤 直腸腔尿道適用	300mg 適量 190mg/g 750mg
PECTIN	歯科L; ペースト 経口 BAR, 咀嚼剤 経口 粉末 局所; ペースト	180.00MG 1400.00MG 25.50%	経口投与 一般外用剤 歯科外用及び口中用	60.06mg 260mg/g 170mg/g
PETROLATUM(ワセリン)	眼; 軟膏 経口 カプセル, 徐効 局所; 乳液 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 軟膏	85.00% 0.07MG 5.30% 16.43% 2.50% 99.98%	一般外用剤 眼科用剤	268.3mg/g 適量
PETROLATUM, WHITE(白色ワセリン)	歯科L; ペースト 眼; 軟膏 局所; クリーム, 局所; 乳液, エアロゾル FOAM 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 軟膏 局所; 軟膏, 経皮; 軟膏 腔; 軟膏	64.00MG 89.00% 26.00% 7.90% 58.20% 15.00% 99.98% 81.93% 29.00% 88.49%	舌下適用 眼科用剤 一般外用剤 歯科外用及び口中用 経皮 直腸腔尿道適用	320mg/g 899mg/g 適量 357mg/g 750mg/g 3120mg
PHENOL	筋肉 - 静脈皮下; 注射 筋肉 静脈; 注射 筋肉 皮下; 注射 筋肉 皮下; 注射, 徐効 関節内; 注射 皮内; 注射 病巣内; 注射 筋肉; 注射	0.45% 1.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.25% 0.50% 0.50%	その他の注射 経皮 歯科外用及び口中用 耳鼻科用剤 吸入剤 皮内注射 筋肉内注射	97mg 0.05mg 10mg 5mg/mL 3.33mg 1mg 64mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	筋肉; 注射, 徐効 筋肉; 溶液, 注射 滑液嚢内; 注射 静脈; 注射 静脈; 溶液, 注射 静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射 皮下; I注射 皮下; 注射 皮下; 溶液, 注射 皮下; 懸濁 注射	0.50% 0.45% 0.50% 0.50% 0.50% 1.00% 0.50% 0.18% 0.50% 0.50% 0.15%	静脈内注射    皮下注射 一般外用剤	64mg    50mg 5mg/g
PHENOL, LIQUEFIED(液状フェノール)	筋肉 静脈; 注射 筋肉 皮下; 注射 静脈; 注射 静脈皮下; 液体 皮下; 注射 皮下; 懸濁 注射	0.50% 0.20% 0.28% 0.50% 0.06% 0.07%	一般外用剤	0.05mL/mL
PHENOXYETHANOL	局所; クリーム, 局所; 乳液, エアロゾル FOAM 局所; 乳液, クリーム 局所; ゲル 局所; ローション	0.50% 1.05% 0.70% 0.70% 0.70%	一般外用剤 筋肉内注射 皮下注射	1.2mg/g 2.8mg 2.8mg
PHENYLALANINE(L- フェニルアラニ	静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射	52.60% 17.00%	静脈内注射 筋肉内注射 動脈内注射	10mg 10mg 10mg
PHOSPHOLIPID(精製大豆レシチン)	静脈(点滴); 乳液, 注射 静脈(点滴); 注射	12.00% 1.20%	経口投与 静脈内注射 一般外用剤	120mg 1.2mg 10mg/g
PHOSPHOLIPID, EGG(精製卵黄レ	静脈(点滴); 注射	1.20%	静脈内注射	6g
PHOSPHORIC ACID	筋肉; パウダー FOR 注射 溶液用, 静脈(点滴); 注射 経口 溶液 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 皮下; 注射 皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結 皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結 局所; クリーム, 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; ローション 局所; 軟膏 局所; 溶液 腔; 乳液, クリーム	0.23% 11.50% 0.64% 2.97MG 0.20% 0.23% 0.13% 0.02% 0.50% 0.10% 0.01% 4.00E-05 0.23% 0.80%	筋肉内注射 静脈内注射 経口投与 225mg 歯科外用及び口中用 皮下注射   一般外用剤   殺虫剤	69.3mg 69.3mg  0.68mL/mL 35mg   20mg/g
POLOXAMER 124(ポリオキシエチレン	経口 懸濁液 局所; ゲル	9.00E-05 0.20%	一般外用剤 直腸腔尿道適用	150mg/mL 45mg
POLOXAMER 188(ポリオキシエチレン	静脈; 注射 静脈; パウダー 注射 溶液用 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 経口 カプセル(即時型/複合型) 経口 濃縮物 経口 顆粒 経口 パウダー 経口懸濁液用 経口 溶液 経口 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤, 制御放出 歯周L; ゲル 皮下; 注射 皮下; 溶液, 注射 局所; 乳液, クリーム	0.60% 0.22% 0.10% 0.10% 3.18MG 0.02% 0.34% 10.00% 2.50% 66.90MG 5.61MG 5.50% 0.20% 0.30% 0.01%	静脈内注射 筋肉内注射 一般外用剤 直腸腔尿道適用  経口投与     皮下注射	10mg 10mg 250mg/g 300mg  333mg     53mg/kg(体重)
POLOXAMER 331(ポリオキシエチレン	経口 パウダー 溶液用 経口 パウダー 懸濁液用 経口 懸濁液	2.59% 0.52% 1.25%	経口投与	400mg
POLOXAMER 407(ポリオキシエチレン	眼; 溶液	0.20%	一般外用剤	143mg/g



添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	眼; 溶液, 点滴剤	0.16%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.10%		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	5.00MG		
	経口 パウダー 経口懸濁液用	12.60%		
	経口 溶液	5.00%		
	経口 懸濁液			
	経口 錠剤	100.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	106.70MG		
	歯周L; ゲル	15.50%		
	局所; 乳液, クリーム	1.00%		
	局所; ゲル	0.20%		
	局所; 懸濁 点滴剤	0.10%		
POLYBUTENE	経皮; 貼布, 制御放出	3.25MG	一般外用剤 その他外用	250mg/g 161mg
POLYETHYLENE GLYCOL 1000(マ	経口 濃縮物	10.00%	一般外用剤	2mg/g
	経口 溶液	15.00%		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	1.51MG		
	直腸; 坐薬	1625000.00MG		
	吸入	0.02%		
	局所; 乳液, クリーム	7.20%		
POLYETHYLENE GLYCOL 1500(マ	経口 錠剤	1.20MG	経口投与	100mg
	局所; 軟膏	5.00%	一般外用剤 直腸腔尿道適用 経皮 その他の外用	765mg/g 5.2g 720mg 0.872mg
POLYETHYLENE GLYCOL 1540(マ	歯科L; ゲル	5.00%	直腸腔尿道適用	18650mg
	経口 溶液	3.36%	経口投与	2mg
	局所; 軟膏	38.00%	一般外用剤	248mg/g
	局所; 溶液	29.70%		
POLYETHYLENE GLYCOL 200(マク	局所; 軟膏	39.00%	一般外用剤	200mg/g
	経口 溶液	20.00%		
	筋肉; 注射	30.00%	殺虫剤	
POLYETHYLENE GLYCOL 20000(マ	経口 カプセル	18.00MG	一般外用剤	100mg/g
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	13.50MG	経口投与	23.2mg
	経口 錠剤	0.30MG	歯科外用及び口中用	250mg、
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	8.0e-03MG		
	経口28; 錠剤	0.30MG		
POLYETHYLENE GLYCOL 300(マク	筋肉 静脈; 注射	50.00%		
	筋肉; 注射	50.00%		
	静脈; 注射	65.00%	静脈内注射	m <sup>2</sup> (体表面積)
	静脈(点滴); 注射	65.00%		
	経口 錠剤	1.00MG	経口投与	20mg
	経口 錠剤, フィルム 被覆	1.50MG		
	局所; 軟膏	57.00%	一般外用剤	450mg/g
	局所; 溶液	29.70%	その他外用	2mg
POLYETHYLENE GLYCOL 400(マク	筋肉 静脈; 注射	20.30%	筋肉内注射	3.2g
	筋肉 静脈; 溶液, 注射	18.00%	皮下注射	3.2g
	静脈; 注射	11.25%	静脈内注射	3.2g
	静脈(点滴); 注射	11.25%	局所麻酔注射	7.881mg
	鼻; 定量用スプレー	20.00%	舌下適用	720mg/g
	眼; 軟膏	4.99%	耳鼻科用剤	50mg/mL
	経口 カプセル	500.00MG	経口投与	2.31g
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	103.55MG	直腸腔尿道適用	3.07g
	経口 カプセル, 徐放	1.70MG	歯科外用及び口中用	200mg/g
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	960.78MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	324.50MG		
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	1.70MG		
	経口 濃縮物	60.00%		
	経口 溶液	60.00%		
	経口 懸濁液	25.00%		
	経口 シロップ	0.05%		
	経口 錠剤	105.06MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リ-	20.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	3.15MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	12.50MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤, 徐放	45.00MG	一般外用剤 その他の外用	700mg/g 50mg
	経口錠剤, フィルム被覆	5.91MG		
	経口錠剤, 徐効	45.00MG		
	経口錠剤, 徐効, フィルム被覆	1.80MG		
	経口21; 錠剤	0.15MG		
	経口28; 錠剤	0.15MG		
	局所; 乳液, クリーム	7.50%		
	局所; ゲル	45.00%		
	局所; ローション	12.00%		
	局所; 軟膏	65.00%		
	局所; 溶液	69.90%		
POLYETHYLENE GLYCOL 4000(マ)	関節内; 注射	3.00%	静脈内注射	120mg
	病巣内; 注射	3.00%	皮下注射	40mg
	筋肉; 注射	3.00%	筋肉内注射	180mg
	滑液嚢内; 注射	3.00%	その他の注射	60mg
	経口カプセル	449.60MG	経口投与	1206mg
	経口カプセル, 腸溶性被覆丸薬	75.00MG	経皮	2164mg/g
	経口カプセル, 軟ゼラチン	15.00MG	吸入剤	45mg
	経口錠剤	15.00MG	舌下適用	320mg/g
	経口錠剤, 被覆	2.00MG	眼科用剤	10mg/g
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆	0.96MG	耳鼻科用剤	150mg/g
	経口錠剤, 徐放	45.00MG	歯科外用及び口中用	353mg/g
	経口錠剤, フィルム被覆	1.85MG		
	経口錠剤, 多層構造, 徐放	2.80MG		
	経口錠剤, 徐効	454.00MG		
	経口錠剤, 徐効, フィルム被覆	1.80MG		
	直腸; 坐薬	1269.00MG	直腸腔尿道適用	10g
	舌下錠剤	2.50MG		
	局所; 軟膏	84.00%	一般外用剤	570mg/g
	腔; 乳液, クリーム	0.50%		
	POLYETHYLENE GLYCOL 600(マク)	静脈; 注射	5.00%	静脈内注射
静脈; 溶液, 注射		5.00%		
経口カプセル		448.40MG	経口投与	1128.8mg
経口カプセル, 軟ゼラチン		324.00MG		
経口カプセル, 軟ゼラチン液体-		580.60MG		
経口溶液		65.00%		
経口錠剤		6.00MG		
経口錠剤, 徐効		1.20MG		
局所; 溶液	0.30%			
POLYETHYLENE GLYCOL 6000(マ)	経口カプセル	10.00MG	経口投与	750mg
	経口カプセル, 徐放	18.88MG	経皮	308.8mg
	経口カプセル, 硬ゼラチン	450.00MG	眼科用剤	5mg/g
	経口カプセル, 徐効	17.46MG	歯科外用及び口中用	250mg
	経口錠剤	375.00MG		
	経口錠剤(即時型/複合型)リ-	0.32MG		
	経口錠剤, 被覆	40.00MG		
	経口錠剤, 徐放性	1.71MG		
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆	0.60MG		
	経口錠剤, 徐放	1.40MG		
	経口錠剤, フィルム被覆	30.00MG		
	経口錠剤, 徐効	12.50MG		
	経口錠剤, 徐効, 被覆	0.50MG		
	経口錠剤, 徐効, フィルム被覆	0.32MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	2.14MG		
	経口28; 錠剤	0.20MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	2.14MG		
	直腸; 坐薬	128.00MG	直腸腔尿道適用	4.05g
	局所; 軟膏	1.00%	一般外用剤	75mg/g
	腔; 錠剤	3.00MG		
腔; 錠剤, フィルム被覆	0.06MG	殺虫剤		
POLYISOBUTYLENE	経皮; フィルム, 制御放出	119.00MG	一般外用剤	260mg/g
	経皮; 貼布, 制御放出	10.50MG	その他外用	36mg/g
			口腔内咀嚼	58mg/g
		経皮	135mg/g	
POLYOXYL 35 CASTOR OIL	膀胱内; 溶液	50.00%	経口投与	1440mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 経口 カプセル 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 溶液 経口 懸濁液 経口 錠剤	65.00% 52.75% 5.00% 5.00% 120.00MG 599.40MG 51.50% 0.04% 2.00MG		
POLYOXYL 40 CASTOR OIL(ポリオ)	筋肉 皮下; 注射	7.00%	静脈内注射 一般外用剤 殺虫剤	4.68g(酸化工) 10mg/g
POLYOXYL 40 HYDROGENATED	歯科L; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 経口 カプセル 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 溶液 経口 錠剤, 徐効 局所; 乳液, クリーム	1.00% 0.50% 200.00MG 405.00MG 45.00% 25.00MG 1.00%	歯科外用及び口中用 直腸腔尿道適用 経口投与	9mg/g 60.0mg 160 µg
POLYOXYL 40 STEARATE(ステアリ)	耳(耳性); 懸濁液 眼; 溶液 眼; 懸濁液 経口 カプセル 経口 カプセル, 硬ゼラチン 経口 錠剤 経口 錠剤, フィルム 被覆 局所; 乳液, エアロゾル 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション	1.00% 7.00% 0.50% 2.40MG 0.60MG 8.48MG 2.00MG 1.07% 8.80% 5.10%	経皮 眼科用剤 直腸腔尿道適用 経口投与 舌下適用 一般外用剤 その他の外用	144.8mg 0.8mg 200mg 357.6mg 28mg 100mg/g 1mg/g、
POLYOXYL 60 CASTOR OIL(ポリオ)	静脈(点滴); 注射	20.00%	静脈内注射 一般外用剤 殺虫剤	4.68g(酸化工) 10mg/g
POLYOXYL 60 HYDROGENATED	局所; 乳液, クリーム	1.90%	経口投与 静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 脊椎腔内注射 一般外用剤 経皮 舌下適用 直腸腔尿道適用 眼科用剤 歯科外用及び口中用 その他の注射	1.2g 9600mg 500mg 500mg 500mg 60mg/g 20mg/g 50mg/g 40mg 5mg/g 30mg/g 12g
POLYOXYL 75 LANOLIN(ポリオキシ)	局所; エアロゾル 局所; 乳液 局所; 溶液	1.50% 1.50% 1.00%	一般外用剤	20mg/g
POLYOXYL LANOLIN(ポリオキシエチ)	局所; 溶液	0.94%	一般外用剤	20mg/g
POLYPROPYLENE GLYCOL(ポリプ)	筋肉 静脈; 注射 眼; 溶液 経口 錠剤	40.00% 15.00% 1.26MG	一般外用剤	0.2mg/mL
POLYSORBATE 20	耳(耳性); 懸濁 液体 筋肉 皮下; 注射 筋肉; パウダー注射 溶液用, 凍結 筋肉; 溶液, 注射 静脈; 注射 静脈; 溶液, 注射 静脈(点滴); 注射 鼻; 定量用スプレー 眼; 懸濁液 経口 カプセル 経口 パウダー懸濁液用 経口 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤, 徐放	1.00% 5.00E-06 0.01% 0.01% 0.40% 0.40% 2.40% 2.50% 0.05% 56.25MG 0.13% 0.50% 6.00MG 4.20MG	歯科外用及び口中用 静脈内注射 経口投与	0.6mg 40mg 0.76mg



添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	皮下; I注射	2.00E-05	皮下注射	0.1mg
	皮下; 注射	1.00E-05		
	皮下; 液体	0.20%		
	皮下; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	0.01%		
	皮下; 溶液, 注射	0.40%		
	局所; 乳液	2.00%	一般外用剤	66mg
	局所; 乳液, クリーム	0.80%		
	局所; ローション	7.80%		
	局所; 溶液	15.00%		
	腔; タンポン	64.80MG		
POLYSORBATE 40	経口 溶液, エリキシル剤	5.00E-05	経口投与	5.90mg
	経口 懸濁液	0.50%		
	局所; 乳液, クリーム	6.00%		
	局所; ゲル	0.20%		
	局所; ローション	3.00%		
POLYSORBATE 60	眼; 軟膏	15.00%	舌下適用	70mg/g
	経口 懸濁液	2.50%	経口投与	50.4mg
	局所; エアロゾル	0.42%	一般外用剤	80mg/g
	局所; 乳液, エアロゾ	0.42%	歯科外用及び口中用	44mg/g
	局所; 乳液, クリーム	8.00%		
	局所; ローション	5.00%		
	局所; シャンプー	15.00%		
	局所; 懸濁液	2.85%		
	腔; クリーム,	1.50%	直腸腔尿道適用	46mg
	腔; 乳液, クリーム	7.50%		
POLYSORBATE 65	局所; 軟膏	5.00%	一般外用剤	20mg/g
POLYSORBATE 80	耳 (耳性); 溶液	0.20%	耳鼻科用剤	2mg/g
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	0.10%	歯科外用及び口中用	37mg/g
	耳 (耳性); 懸濁液	5.00%		
	関節内; I注射	0.04%	皮内注射	2mg
	関節内; 注射	0.40%	その他の注射	8.6mg
	病巣内; I注射	0.04%		
	病巣内; 注射	0.20%		
	病巣内; 懸濁 注射	0.19%		
	筋肉; I注射	0.04%	筋肉内注射	100.2mg
	筋肉; 注射	12.00%		
	筋肉; 注射, 微小球	0.10%		
	筋肉; パウダー 注射溶液用, 凍結	0.20%		
	筋肉; 溶液, 注射	5.00%		
	筋肉; 懸濁 注射	0.19%		
	滑液嚢内; 注射	0.20%		
	滑液嚢内; 懸濁 注射	0.19%		
	静脈; I注射	10.00%	静脈内注射	500mg
	静脈; 注射	10.00%		
	静脈; パウダー 注射溶液用, 凍結	12.00%		
	静脈; 溶液, 注射	10.00%		
	硝子体内; 懸濁 注射	0.01%		
	静脈(点滴); 注射	8.00%		
	静脈(点滴); パウダー 注射溶液用,	12.50%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	10.00%		
	鼻; 溶液	0.10%		
	鼻; 噴霧	4.00E-05		
	鼻; 定量用スプレー	10.00%		
	眼; 乳液	4.00%	眼科用剤	5mg/g
	眼; 溶液	0.20%		
	眼; 溶液, 点滴剤	1.00%		
	眼; 溶液, ゲル形成, 徐放	0.05%		
	眼; 懸濁液	0.10%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.10%		
	経口 カプセル	418.37MG	経口投与	300mg
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	1.06MG	その他の内用	156.8mg
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	2.00MG		
	経口 カプセル, 徐放	0.52MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	0.41MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	6.00MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル, 徐効	2.60MG		
	経口 濃縮物	0.10%		
	経口 点滴剤	0.20%		
	経口 顆粒	20.00MG		
	経口 顆粒 経口懸濁液用	5.00MG		
	経口 粉末	3.00%		
	経口 パウダー 懸濁液用	0.20%		
	経口 溶液	12.60%		
	経口 溶液, エリキシル剤	0.25%		
	経口 懸濁液	12.50%		
	経口 懸濁 点滴剤	0.75%		
	経口 懸濁 FOR 吸入	0.04%		
	経口 懸濁 液体	0.29%		
	経口 懸濁 徐効	0.25%		
	経口 錠剤	21.25MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	0.50MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	24.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	2.20MG		
	経口 錠剤, 徐放	0.22MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	14.80MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	2.25MG		
	経口 錠剤, 徐効	0.12MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	8.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	0.20MG		
	直腸 洗腸	0.60%	直腸腔尿道適用	260mg
	直腸; 溶液	10.00%		
	直腸; 坐薬	72.15MG		
	軟組織; I注射	0.04%		
	軟組織; 注射	0.20%		
	軟組織; 懸濁 注射	0.19%		
	皮下; 懸濁 注射	0.30%	皮下注射	50mg
	舌下 錠剤	0.07MG		
	局所; 乳液	2.50%	一般外用剤	100mg/g
	局所; 乳液, クリーム	5.00%	経皮	30mg/g
	局所; ゲル	8.50%	その他の外用	31mg/g
	局所; ローション	9.40%		
	局所; 軟膏	0.10%		
	腔; 乳液, クリーム	0.50%		
	腔; 坐薬	28.00MG		
POLYVINYL ACETATE (酢酸ビニル)	経口 錠剤	7.00MG	経口投与	110mg
	経口 錠剤, 徐効	46.00MG	一般外用剤	10mg/g
	経皮; フィルム, 制御放出	16.00MG		
	経皮; 貼布, 制御放出	3.99MG		
POLYVINYL ALCOHOL (ポリビニルア	耳 (耳性); 懸濁 液体	20.00%	経口投与、	300mg
	INTRAOCULAR; 溶液	1.40%	一般外用剤	35mg/g
	硝子体内; 筋肉PLANT	0.11MG	眼科用剤	10mg/g
	イオントフォレシス; DDS	119.00MG	歯科外用及び口中用	20mg/g
	眼; 溶液	1.40%	耳鼻科用剤	5mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	1.40%	殺虫剤	
	眼; 懸濁液	1.40%	ポリビニルアルコール (完全けん化物)	
	眼; 懸濁 点滴剤	1.40%	経口投与	69mg
	経口 錠剤	14.40MG		
	経口 錠剤, 被覆	0.69MG		
	経口 錠剤, 徐放	34.10MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	20.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	2.00MG		
	局所; ローション	2.50%		
	局所; 貼布	25.20MG		
	経皮; DDS	119.00MG		
POTASSIUM ACETATE	眼; パウダー FOR 溶液	4.00%	眼科用剤	0.45g
	直腸; ENEMA	0.41%	殺虫剤	
POTASSIUM BICARBONATE	経口 パウダー FOR 経口溶液	22.00MG	経口投与	1.5g
	経口 溶液	2.50%		
	経口 錠剤	12.20MG		
	経口 トローチ	4.00MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
POTASSIUM CARBONATE	経口 カプセル 経口 溶液 経口 錠剤	27.69MG 2.48% 25.00MG	経口投与	50mg
POTASSIUM CHLORIDE	AN浸潤; 注射 仙骨麻酔; 注射 硬膜外; 注射 眼内; 溶液 静脈; 溶液, 注射 硝子体内; 懸濁 注射 神経ブロック; 注射 眼; パウダー-溶液用 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 経口 カプセル 経口 カプセル, 徐放 経口 錠剤	0.03% 0.03% 0.03% 0.07% 0.38% 0.07% 0.03% 0.07% 22.20% 0.14% 62.00MG 0.40MG 40.00MG	筋肉内注射 皮下注射 眼科用剤 経口投与	0.1mg/g 0.1mg 2mg/g 200mg
POTASSIUM HYDROXIDE	経口 カプセル, 軟ゼラチン 局所; 乳液, クリーム 局所; 溶液 腔; 乳液, クリーム	25.60MG 0.50% 14.02% 0.50%	その他の外用 一般外用剤 舌下適用 直腸腔尿道適用	84mg/g、 76.5mg/g 63mg/g 76.5mg/g
POTASSIUM METABISULFITE(ピロ	耳 (耳性); 溶液 耳 (耳性); 溶液, 点滴剤 筋肉 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射 直腸; 注腸	0.11% 0.10% 0.10% 0.06% 5.00% 0.46%	皮下注射 筋肉内注射 静脈内注射	6mg 6mg 1250mg
POTASSIUM PHOSPHATE,	関節内; 注射 筋肉; 注射 静脈(点滴); 注射 経口 カプセル 経口 パウダー-懸濁液用 経口 溶液 経口 シロップ 皮下; 注射 皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結	0.60% 0.60% 55.20% 30.00MG 5.00% 6.00% 2.20% 1.36% 0.19%	筋肉内注射 静脈内注射 経口投与 耳鼻科用剤 皮下注射 殺虫剤	6.92mg 11.6mg 420mg 5mg/g 6.92mg
POTASSIUM PHOSPHATE,	AN浸潤; 注射 耳 (耳性); 溶液 筋肉 静脈; 注射 関節内; 注射 筋肉; I注射 筋肉; 注射 静脈; I注射 静脈; 注射 静脈(点滴); 溶液, 注射 鼻; 噴霧 神経ブロック; 注射 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 眼; 懸濁液 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 溶液 経口 懸濁液 経口 シロップ 経口 錠剤 経口 錠剤, 徐効 皮下; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	2.72% 0.20% 0.09% 0.30% 0.09% 0.30% 0.09% 0.01% 1.36% 0.14% 2.72% 0.20% 0.06% 0.44% 17.00MG 2.00% 5.00% 0.27% 25.00MG 4.00MG 0.12%	耳鼻科用剤 筋肉内注射 静脈内注射 皮内注射 一般外用剤 その他の外用 眼科用剤 経口投与 その他 殺虫剤 皮下注射	8mg/g 350mg 350mg 0.217mg 30mg/g 0.54mg/g 6.1mg/g 72mg 13μ 350mg
POTASSIUM SOAP	局所; 溶液	32.80%	一般外用剤	100mg/g
POTASSIUM SORBATE	鼻; 定量用スプレー 眼; 溶液 経口 濃縮物 経口 顆粒 FOR 懸濁液 経口 溶液 経口 懸濁液 経口 シロップ 経口 錠剤	8.40E-05 0.47% 0.01% 20.00MG 1.60% 1.00% 1.50% 0.80MG	眼科用剤 経口投与	1mg/g 334mg



添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤, 徐放, フィルム被覆 直腸; 溶液 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 溶液	0.20MG 1.60% 2.70% 0.20% 0.47%	一般外用剤	0.1mg/g
POVIDONE K17	皮下; 懸濁注射	0.50%	耳鼻科用剤	240mg/mL
POVIDONE K25	経口カプセル 経口カプセル, 徐放 経口カプセル, 徐効 経口カプセル, 徐効, 硬ゼラチン 経口顆粒 FOR 経口懸濁液 経口溶液 経口錠剤 経口錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶 経口錠剤, フィルム被覆 経口錠剤, 多層構造, 徐放 (吸入(吸入); 吸入)	4.40MG 12.60MG 17.79MG 12.60MG 0.27MG 50.00% 52.00MG 20.00MG 22.50MG 1.80MG 1.00E-06	経口投与 眼科用剤	400mg 30mg/g
POVIDONE K30	眼; 溶液, 点滴剤 眼; 懸濁液 経口カプセル 経口カプセル, 腸溶性被覆丸薬 経口カプセル, 徐放 経口カプセル, 硬ゼラチン 経口カプセル, 軟ゼラチン 経口カプセル, 軟ゼラチン液体- 経口カプセル, 徐効 経口分散錠剤 経口液体 経口パウダー 懸濁液用 経口懸濁液 経口錠剤 経口錠剤 (即時型/複合型リ- 経口錠剤 (即時型/複合型リ- 経口錠剤 (即時型/複合型リ- 経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆 経口錠剤, 徐放 経口錠剤, フィルム被覆 経口錠剤, 口腔内崩壊 経口錠剤, 徐効 経口21; 錠剤 経口28; 錠剤 舌下錠剤	2.00% 0.60% 20.00MG 26.80MG 5.62MG 8.00MG 30.00MG 25.20MG 6.87MG 51.20MG 5.00% 0.26% 1.85% 80.00MG 5.00MG 18.00MG 40.00MG 27.20MG 50.00MG 42.00MG 35.71MG 55.00MG 5.00MG 5.00MG 8.00MG	眼科用剤 耳鼻科用剤 経口投与 一般外用剤 経皮 歯科外用及び口中用 直腸尿道適用 舌下適用	20mg/g 50mg/g 600mg 50mg/g 70mg 40mg/g 60mg 11.58mg
POVIDONE K90	眼; 溶液, 点滴剤 経口カプセル 経口カプセル, 徐放 経口カプセル, 硬ゼラチン 経口カプセル, 徐効, 硬ゼラチン 経口顆粒 FOR 懸濁液 経口錠剤 経口錠剤, 被覆 経口錠剤, 制御放出 経口錠剤, 徐放性, 腸溶性被覆 経口錠剤, 腸溶性被覆粒子S 経口錠剤, 徐放 経口錠剤, フィルム被覆 経口錠剤, 徐効 経口28; 錠剤 局所; 溶液	1.20% 16.00MG 18.80MG 5.95MG 18.80MG 32.00MG 78.00MG 9.76MG 35.00MG 4.00MG 27.60MG 78.00MG 44.00MG 40.80MG 0.17MG 0.25%	経口投与 一般外用剤 眼科用剤 歯科外用及び口中用 その他外用	320mg 30mg/g 0.5mg/g 150mg/g 14mg/g
POWDERED CELLULOSE	経口カプセル 経口錠剤	170.00MG 44.00MG	経口投与	195mg
PROPYL GALLATE	経口カプセル, 軟ゼラチン 経口濃縮物 経口錠剤 経口錠剤, 徐効 経口錠剤, 徐効, 被覆	2.00MG 0.02% 0.04MG 0.06MG 0.04MG	経口投与 経皮 直腸尿道適用	5mg 0.19mg 3.6mg/g

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; ゲル	0.05%	一般外用剤	2mg/g
	局所; 軟膏	0.01%	殺虫剤	
PROPYLENE CARBONATE	局所; 軟膏	5.00%	一般外用剤	100mg/g
PROPYLENE GLYCOL	耳 (耳性); 溶液	94.92%	耳鼻科用剤	200mg/g
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	80.00%	眼科用剤	10mg/g
	耳 (耳性); 懸濁液	10.00%		
	口腔; フィルム, 溶解(性)	1.02MG	舌下適用	320mg/g
	歯科L; 溶液	2.00%	歯科外用及び口中用	0.8mL/mL
	体外; 溶液	5.00%		
	筋肉 静脈; 注射	82.04%	皮下注射	0.5mL
	筋肉 静脈; 溶液, 注射	41.60%	皮内注射	0.18mg
	吸入 ; 溶液	25.00%	脊椎腔内注射	16mg
	筋肉; 注射	40.00%	筋肉内注射	0.5mL
	筋肉; 溶液, 注射	40.00%		
	静脈; I注射	30.00%	静脈内注射	3.32g
	静脈; 注射	50.00%		
	静脈; 溶液, 濃縮物	50.33%		
	静脈; 溶液, 注射	30.00%		
	静脈(点滴); 注射	51.80%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	30.00%		
	鼻; 定量用スプレー	20.00%		
	眼; 溶液	10.00%		
	眼; 溶液, 点滴剤	0.75%		
	眼; 懸濁液	5.00%		
	眼; 懸濁 点滴剤	1.00%		
	経口 カプセル	52.00MG	経口投与	2.08g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	1.70MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	148.31MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	17.70MG		
	経口 カプセル, 徐効	0.79MG		
	経口 濃縮物	70.00%		
	経口 点滴剤	0.12%		
	経口 液体	61.00%		
	経口 粉末	5.50%		
	経口 溶液	91.50%		
	経口 溶液, 濃縮物	47.80%		
	経口 溶液, エリキシル剤	50.00%		
	経口 溶液, シロップ	61.00%		
	経口 噴霧	3.74%		
	経口 懸濁液	89.02%		
	経口 懸濁 液体	25.00%		
	経口 懸濁 徐効	15.00%		
	経口 シロップ	92.00%		
	経口 錠剤	14.70MG		
	経口 錠剤, 被覆	1.50MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	6.95MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	4.30MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	14.40MG		
	経口 錠剤, 徐効	9.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆			
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	12.80MG		
	PHOTOPHERESIS; 溶液	5.00%		
	直腸; エアロゾル, 定量	18.00%	直腸腔尿道適用	3 μg
	直腸; ゲル	41.44%		
	直腸; 懸濁液	5.00%		
	局所; エアロゾル	2.11%	一般外用剤	0.723mL/mL
	局所; クリーム,	30.00%	その他の外用	150mg/g
	局所; 乳液	8.00%		
	局所; 乳液, エアロゾル FOAM	21.05%		
	局所; 乳液, クリーム	71.08%		
	局所; 乳液, ローション	47.50%		
	局所; ゲル	98.09%		
	局所; ローション	50.90%		
	局所; ローション,	30.00%		
	局所; 軟膏	38.00%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; 軟膏, 局所; 貼布, 局所; シャンプー 局所; シャンプー, 懸濁液 局所; 溶液 局所; 溶液, 液体 局所; 懸濁液 局所; 綿棒で分泌物を採集 経皮; フィルム, 制御放出 経皮; ゲル 腔; 乳液, クリーム 腔; ゲル 腔; 坐薬 腔; タンポン	65.00% 0.44MG 3.50% 2.00% 61.50% 5.00% 5.27% 25.00ML 58.13MG 6.00% 20.00% 3.00% 252.00MG 62.10MG	経皮         殺虫剤	2.3mg/g
PROPYLENE GLYCOL ALGINATE	経口 粉末	50.24%	経口投与 一般外用剤	360mg 11mg/g
PROPYLENE GLYCOL	局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 軟膏 局所; 軟膏, 腔; 乳液, クリーム	9.30% 4.69% 8.00% 2.00% 7.00%	一般外用剤	60mg/g
PROPYLPARABEN	AN浸潤; 注射 耳 (耳性); 懸濁液 口腔; フィルム, 溶解 (性) 筋肉 - 静脈皮下; 注射 筋肉 静脈; I注射 筋肉 静脈; 注射 筋肉 静脈; 溶液 筋肉 皮下; 注射 吸入 ; 溶液 関節内; 注射 滑液嚢内; 注射 病巣内; 注射 筋肉; 注射 静脈; I注射 静脈; 注射 静脈; パウダー 注射 溶液用 静脈; 溶液, 注射 静脈皮下; 注射 静脈(点滴); 注射 N/A; 液体 鼻; 溶液 鼻; 定量用スプレー 神経ブロック; 注射 眼; 軟膏 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 眼; 懸濁液 眼; 懸濁 点滴剤 経口 カプセル 経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 徐効 経口 濃縮物 経口 液体 経口 パウダー-経口 溶液用 経口 パウダー 溶液用 経口 パウダー 懸濁液用 経口 溶液 経口 溶液, 濃縮物 経口 溶液, エリキシル剤 経口 溶液, シロップ 経口 懸濁液 経口 懸濁 液体 経口 懸濁 徐効	0.01% 6.00E-06 0.18MG 20.00% 0.01% 0.20% 0.01% 0.02% 0.03% 0.16% 0.02% 0.02% 0.16% 0.02% 0.20% 0.08% 0.02% 0.02% 0.05% 0.01% 0.01% 0.30% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.21MG 0.04MG 0.12MG 0.21MG 0.25% 0.02% 0.15MG 0.01% 0.08% 10.00% 0.02% 0.30% 0.10% 20.00% 0.30% 0.15%	歯科外用及び口中用    局所麻酔注射 舌下適用  吸入剤  筋肉内注射 静脈内注射 皮内注射  耳鼻科用剤  眼科用剤  経口投与 経皮	0.5mg/g    0.2mg 1mg/g  0.2mg/mL  2.4mg 4mg 0.2mg/mL  0.2mg/g  0.2mg/g  33.6mg 0.14mg/g





添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 溶液	5.00%		
	経口 溶液, エリキシル剤	3.75%		
	経口 懸濁液	2.25%		
	経口 懸濁 液体	0.25%		
	経口 シロップ	5.00%		
	経口 錠剤	20.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	9.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	1.00MG		
	直腸; 溶液	0.08%	注腸	260mg
	直腸; 懸濁液	1.20%		
	直腸; 錠剤	0.60MG		
	舌下 錠剤	1.00MG	舌下適用	1mg
SAFFLOWER OIL	局所; ローション	3.00%	経口投与	920mg
SESAME OIL	筋肉; 注射	70.00%	経口投与	1.7g
	経口 カプセル	162.50MG	静脈内注射	30mg
			筋肉内注射	300mg
			その他の注射	2mL
			皮下注射	300mg
			一般外用剤	909mg/g
			直腸膀胱尿道適用	4.31g
SHELLAC	経口 カプセル	24.83MG	経口投与	108mg
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	29.00MG	精製セラック	
	経口 カプセル, 徐効	60.00MG	経口投与	300mg
	経口 錠剤	24.04MG	歯科外用及び口中用	0.045mg、
	経口 錠剤, 被覆	5.00MG	白色セラック	
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	3.31MG	経口投与	120mg
	経口 錠剤, フィルム 被覆	4.40MG	歯科外用及び口中用	0.53mg
	経口 錠剤, 徐効	7.30MG		
SILICON DIOXIDE (二酸化ケイ素)	歯科L; ギャル	19.00%	経口投与	152mg
	経口 カプセル	22.00MG	一般外用剤	5.5mg/g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	9.63MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	2.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	5.26MG		
	経口 点滴剤			
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	10.00MG		
	経口 パウダー 経口懸濁液用	0.90%		
	経口 パウダー 再構成用	4.00%		
	経口 パウダー 懸濁液用	4.50%		
	経口 錠剤	24.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	3.75MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー)	33.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	5.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性	170.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	85.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	15.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	8.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	7.10MG		
	経口 錠剤, 徐効	40.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	7.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	60.00MG		
	経口 錠剤, 徐放, フィルム 被覆	26.00MG		
	舌下 錠剤	1.20MG		
	局所; ギャル	0.25%		
	腔; 乳液, クリーム	1.00%		
SILICON DIOXIDE, COLLOIDAL (二	口腔; 錠剤	1.25MG	経口投与	152mg
	ENDOCERVICAL; ギャル	8.00%	一般外用剤	5.5mg/g
	経口 カプセル	11.66MG		
	経口 カプセル (即時型/複合型リ)	2.10MG		
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	0.50MG		
	経口 カプセル, 徐放性 ACTION, 被	1.28MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	0.60MG		
	経口 カプセル, 徐放	3.60MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	6.00MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	1.73MG		
	経口 カプセル, 徐効	7.02MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	1.70MG		
	経口 分散 錠剤	3.60MG		
	経口 FOR 懸濁液	0.30%		
	経口 顆粒	100.00MG		
	経口 顆粒, 腸溶性 被覆	3.20MG		
	経口 顆粒再構成用	16.25MG		
	経口 顆粒 懸濁液用	25.00MG		
	経口 粉末	10.00%		
	経口 パウダー 経口懸濁液用	11.00%		
	経口 パウダー 再構成用	2.50%		
	経口 パウダー 懸濁液用	5.50%		
	経口 懸濁液	5.00%		
	経口 懸濁 徐効	2.16%		
	経口 錠剤	99.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リ-	2.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リ-	8.50MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リ-	84.80MG		
	経口 錠剤, 被覆	16.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出	5.60MG		
	経口 錠剤, 徐放性	23.75MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	6.00MG		
	経口 錠剤, 分散	6.00MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	3.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	24.80MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	33.00MG		
	経口 錠剤, FOR 溶液	0.75MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	7.80MG		
	経口 錠剤, 復効	0.50MG		
	経口 錠剤, 糖衣	0.80MG		
	経口 錠剤, 徐効	48.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	5.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	6.10MG		
	経口 錠剤, 徐効, 多層構造, フィル	1.55MG		
	経口 錠剤, 徐放, フィルム 被覆	30.00MG		
	経口 21; 錠剤	0.65MG		
	経口 28; 錠剤	0.65MG		
	直腸; 坐薬	14.00MG		
	舌下 錠剤	1.00MG		
	経皮; フィルム, 制御放出	49.00MG		
	腔; 乳液, クリーム	1.01%		
	腔; 挿入	2.50MG		
	腔; 錠剤	8.00MG		
SILICONE (シリコン油)	子宮内; 坐薬, 挿入, 制御放出	60.00MG	一般外用剤	30mg/g
	経口 カプセル	10.00MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	0.42MG		
	経口 カプセル, 徐効	0.14MG		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	0.10%		
	経皮; フィルム, 制御放出	353.51MG		
	腔;	8.70MG		
	腔; 子宮内 避妊リング	27.48MG		
SIMETHICONE (シリコン消泡剤)	経口 カプセル	5.70MG	一般外用剤	0.1mg/g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	0.61MG	経口投与	360mg
	経口 カプセル, 徐放	0.04MG	注腸	1560mg
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	0.02MG		
	経口 カプセル, 徐効	0.06MG		
	経口 顆粒	3.30MG		
	経口 顆粒 発泡性	36.00MG		
	経口 PASTILLE	0.40MG		
	経口 パウダー 懸濁液用	0.66%		
	経口 溶液			
	経口 懸濁液	0.20%		
	経口 懸濁 液体	1.00%		
	経口 懸濁 徐効			
	経口 錠剤	1.50MG		
	経口 錠剤, 被覆	4.0e-04MG		



添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路/剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	0.56MG		
	経口錠剤, 徐放	0.61MG		
	経口錠剤, フィルム 被覆	0.18MG		
	経口錠剤, 口腔内崩壊	0.04MG		
	経口錠剤, 徐効	7.50MG		
	局所: 乳液, クリーム	1.00%		
	局所: ローション	0.50%		
	局所: 懸濁液	0.10%		
SODIUM ACETATE (酢酸ナトリウム)	耳 (耳性); 溶液	0.07%	一般外用剤 1.5mg/g	
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	0.02%	耳鼻科剤 0.2mg/g	
	耳 (耳性); 懸濁液	0.04%	直腸腔尿道適用 630mg	
	耳 (耳性); 懸濁 液体	6.80%		
	体外; 溶液	0.17%		
	筋肉 - 静脈皮下; 注射	0.65%	その他の注射 13.6mg	
	筋肉 静脈; 注射	0.96%		
	筋肉 皮下; 注射	0.20%		
	皮内; 注射	0.16%		
	筋肉; 注射	0.40%	筋肉内注射 14mg	
	眼内; 溶液	0.39%	眼科用剤 2.08mg/g	
	静脈; I注射	0.62%	静脈内注射 111.39mg	
	静脈; 注射	12.25%		
	静脈; 溶液, 注射	0.02%		
	硝子体内; 懸濁 注射	0.39%		
	静脈皮下; 注射	0.20%		
	静脈皮下; 液体	0.20%		
	静脈(点滴); I注射ができる	0.20%		
	静脈(点滴); 注射	59.40%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	1.70%		
	眼; 乳液	0.05%		
	眼; パウダー FOR 溶液	0.39%		
	眼; 溶液	0.35%		
	眼; 溶液, 点滴剤	1.27%		
	経口 パウダー FOR 溶液	9.93%		
	経口 溶液	0.34%		
	経口 溶液, 注射	0.13%		
	経口 溶液, シロップ	0.72%		
	フェレシス成分除去; 溶液	0.17%		
	皮下; 注射	0.14%	皮下注射 15mg	
	皮下; 液体	0.58%		
	皮下; 溶液, 注射	0.38%		
	粘膜; 溶液, 注射	0.13%		
	局所; 懸濁液	0.03%		
SODIUM ACETATE ANHYDROUS	筋肉 皮下; 注射	0.07%	筋肉内注射	1.64mg
	筋肉; 注射	0.47%		
	静脈; I注射	0.07%		
	静脈; 溶液	17.70%		
	静脈; 溶液, 注射	0.08%		
	静脈(点滴); 注射	6.25%		
	経口 溶液	17.70%		
	皮下; 注射	0.16%		
	皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結	0.01%		
	局所: 乳液, クリーム	0.02%		
SODIUM ALGINATE	経口 カプセル	80.00MG	経口投与	2.4g
	経口 懸濁液	0.12%	その他の内用	90mg
	経口 シロップ	0.30%	一般外用剤	50mg/g
	経口 錠剤	35.00MG	直腸腔尿道適用	40mg
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	320.00MG	歯科外用及び口中用	5.5mg/g
	経口 錠剤, 制御放出	262.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	350.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	240.00MG		
	経口 トローチ	64.30MG		
SODIUM ASCORBATE (L-アスコルビ	静脈; 注射	1.00%	経口投与	30mg
	静脈; 溶液, 注射	1.00%		
	経口 錠剤	5.00MG		
SODIUM BENZOATE	口腔; フィルム, 溶解(性)	0.69MG	一般外用剤	5mg/g