

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	歯科L; ギル	0.08%	歯科外用及び口中用	0.7mg/g
	筋肉 静脈; 注射	10.00%	その他の注射	0.3mg
	筋肉; 注射	5.00%	筋肉内注射	20mg
	筋肉; 溶液, 注射	4.80%	眼科用剤	0.2mg/mL
	静脈; I注射	0.07%	静脈内注射	40mg(点滴)
	静脈(点滴); 注射	5.00%		
	経口 カプセル	0.30MG	経口投与	2200mg
	経口 カプセル,硬ゼラチン	0.11MG		
	経口 濃縮物	0.20%		
	経口 点滴剤	0.30%		
	経口 FOR 懸濁液	0.20%		
	経口 顆粒、再構成用	10.00MG		
	経口 顆粒、懸濁液用	10.00MG		
	経口 液体	0.50%		
	経口 パウダー、経口懸濁液用	3.60%		
	経口 パウダー、再構成用	0.10%		
	経口 パウダー、溶液用	9.33%		
	経口 パウダー、懸濁液用	8.00%		
	経口 溶液	1.08%		
	経口 溶液, エリキシル剤	0.50%		
	経口 溶液, 液体	0.10%		
	経口 懸濁液	3.78%		
	経口 懸濁 点滴剤	0.60%		
	経口 懸濁 液体	1.00%		
	経口 シロップ	5.00%		
	経口 錠剤	0.75MG		
	経口 錠剤(即時型／複合型)リリー	60.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	9.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性 腸溶性 被覆	0.34MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	0.02MG		
	経口 錠剤、溶液用	5.00MG		
	直腸; 浣腸	0.10%	注腸	1560mg
	局所; 乳液, クリーム	0.20%		
	局所; 貼布	0.44MG		
SODIUM BICARBONATE	口腔; GUM, 咀嚼	10.00MG	一般外用剤	380.8mg/g
	口腔; 錠剤	42.00MG	直腸腔尿道適用	352mg
	筋肉 静脈; パウダー、注射 溶液,	61.90%	歯科外用及び口中用	679mg/g
	筋肉; 注射	3.50%	筋肉内注射	2.3g
	筋肉; パウダー、注射 溶液用	3.00%	脊椎腔内注射	0.04mg
	腹腔内; パウダー、注射 溶液用	60.00%	皮内注射	0.54 μ g
	髄腔内; I注射		その他の注射	40mg
	髄腔内; 注射	5.00E-05	その他の外用	190mg/g
	気管内; 懸濁液		吸入剤	100mg
	静脈; 注射	5.00E-05		
	静脈; パウダー、注射 溶液用	2.10%		
	硝子体内; 注射	0.17%	眼科用剤	2.102mg/g
	静脈(点滴); 注射	83.00%	静脈内注射	1.75g
	静脈(点滴); パウダー、注射 溶液	81.94%		
	静脈(点滴); パウダー、注射 溶液,	0.18%		
	経口 カプセル	26.50MG	経口投与	1.35g
	経口 カプセル,硬ゼラチン	2.00MG		
	経口 パウダー、溶液用	8.72%		
	経口 錠剤	125.00MG		
	経口 錠剤(即時型／複合型)リリー	4.24MG		
	経口 錠剤(即時型／複合型)リリー	140.00MG		
	経口 錠剤(即時型／複合型)リリー	267.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	9.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性 腸溶性 被覆	15.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	40.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	26.97MG		
	経口 錠剤, 徐効	2.56MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	2.56MG		
	皮下; パウダー、注射 溶液用	0.01%	皮下注射	2.3g
	腔; 挿入	43.00MG	殺虫剤	
SODIUM BISULFATE(亜硫酸水素ナ	筋肉 - 静脈皮下; 注射	0.10%	皮内注射	1mg/mL

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	筋肉 静脈; 注射	0.32%	その他の注射	43075mg
	吸入 ; 溶液	0.01%	局所麻酔注射	50mg
	経口 濃縮物	0.09%	経口投与	160mg
	AN浸潤; 注射	0.20%	舌下適用	3mg
	耳 (耳性); 溶液	0.10%	耳鼻科用剤	1mg/mL
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	0.10%		
	耳 (耳性); 懸濁液	1.00E-05		
	筋肉 - 静脈皮下; 注射	0.50%		
	筋肉 静脈; 注射	0.66%		
	筋肉 静脈; パウダー、注射 溶液	5.18%		
	吸入 ; 吸入抗原	0.07%	吸入剤	1mg/mL
	吸入 ; 溶液	0.20%		
	関節内; 注射	0.32%		
	心臓内; 注射	0.10%		
	病巣内; 注射	0.32%		
	筋肉; 注射	1.35%	筋肉内注射	150mg
	腹腔内; 注射	1.35%		
	滑液嚢内; 注射	0.32%		
	静脈; 注射	5.00%	静脈内注射	1250mg
	静脈; 溶液, 注射	5.00%		
	イオントフォoresis; 溶液	0.05%		
	灌注 注射	0.66%		
	静脈(点滴); 注射	10.00%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	0.02%		
	神経ブロック; 注射	2.20%		
	眼; 溶液	0.10%	眼科用剤	4mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	0.10%		
	眼; 懸濁液	0.06%		
	経口 カプセル	0.36MG		
	経口 濃縮物	0.04%		
	経口 溶液	0.10%		
	経口 懸濁液	0.20%		
	経口 錠剤	0.65MG		
	軟組織; 注射	0.10%		
	皮下; 注射	0.15%	皮下注射	1150mg
	舌下 錠剤	0.50MG		
	局所; 乳液, クリーム	0.30%	一般外用剤	3mg/g
	局所; ローション	0.22%		
	局所; パウダー、溶液用	0.10%		
	局所; 溶液	0.05%		
SODIUM BORATE (ホウ砂)	耳 (耳性); 溶液	0.30%	一般外用剤	5mg/g
	眼; 溶液	0.54%	経皮	1mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	1.10%	眼科用剤	4mg/mL
	眼; 懸濁液 点滴剤	0.02%	耳鼻科用剤	5.7mg/mL
			その他の外用	5mg
SODIUM CARBONATE (炭酸ナトリウム)	口腔; GUM, 咀嚼	30.00MG		
	口腔; 錠剤	20.00MG		
	筋肉 静脈; 注射	1.64%	筋肉内注射	20.8mg
	筋肉 静脈; パウダー 注射 溶液用	70.80%	皮下注射	20.8mg
	静脈; 注射	0.04%	静脈内注射	3.5mg/kg(体重)
	硝子体内; 注射	8.20E-05	眼科用剤	1.62mg/g
	静脈(点滴); 注射	24.10%		
	静脈(点滴); パウダー注射 溶液用	63.00%		
	静脈(点滴); パウダー注射 溶液, 凍	0.17%		
	眼; 溶液	1.00%		
	経口 カプセル, 徐効	6.00MG	経口投与	
	経口 顆粒経口懸濁液用	6.50MG		
	経口 錠剤	25.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	10.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	30.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	25.00MG		
	経口 トローチ	25.00MG	殺虫剤	
SODIUM CASEINATE	経口 錠剤	100.00MG	経口投与	120mg
			一般外用剤	50mg/g
SODIUM CHLORIDE	AN,CNBLK 髄腔内; 注射	0.80%	その他の内用	84mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	AN浸潤; 注射	0.85%	その他の注射	52mg
	AN, SYMPATHETIC NBLK; 注射	0.30%	歯科注射	18mg
	耳 (耳性); 溶液	9.00%	局所麻酔注射	1.5g
	耳 (耳性); 溶液, 点滴剤	0.36%	その他の注射	425mg
	耳 (耳性); 懸濁 液体	9.00%	耳鼻科用剤	9mg/g、
	仙骨麻酔; 注射	0.90%		
	歯科L; I注射	0.30%	歯科外用及び口中用	9mg/g
	歯科L; 注射	0.60%		
	硬膜外; 注射	0.90%		
	硬膜外; 溶液, 注射	0.90%		
	体外; 注射	0.90%		
	体外; 溶液	0.80%		
	筋肉 - 静脈皮下; 注射	0.90%	筋肉内注射	700mg
	筋肉 静脈; I注射ができる	0.90%		
	筋肉 静脈; 注射	90.00%		
	筋肉 静脈; パウダー FOR 注射 溶	9.00%		
	筋肉 静脈; パウダー FOR 注射 溶	18.00%		
	筋肉 静脈; 溶液	0.90%		
	筋肉 静脈; 溶液, 注射	0.75%		
	筋肉 皮下; 注射	0.90%		
	INFILTRATION; 注射			
	INFILTRATION; 溶液, 注射	0.85%		
	吸入 ; 溶液	3.16%	吸入剤	6.67mg/mL
	動脈内; I注射	0.49%	動脈内注射	201.6mg
	動脈内; 注射	4.90%		
	動脈内; パウダー FOR 注射 溶液	0.13%		
	動脈内; 溶液	0.90%		
	関節内; I注射ができる	0.66%		
	関節内; 注射	0.90%		
	関節内; 注射, 徐効			
	滑液嚢内; 注射	0.32%		
	心臓内; 注射	0.70%		
	腔内療法; 注射	0.82%		
	皮内; 注射	0.70%	皮内注射	9mg
	病巣内; I注射ができる	0.66%		
	病巣内; 注射	0.85%		
	病巣内; 注射, 徐効	0.90%		
	病巣内; 懸濁 注射	0.22%		
	筋肉; I注射ができる	0.66%		
	筋肉; 注射	4.50%		
	筋肉; 注射, 徐効	0.90%		
	筋肉; パウダー FOR 注射 溶液	22.60%		
	筋肉; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	0.24%		
	筋肉; 溶液, 注射	0.90%		
	筋肉; 懸濁 注射	0.22%		
	INTRAOCULAR; 溶液	0.70%		
	腹腔内; パウダー FOR 注射 溶液	22.60%		
	腹腔内; 溶液	53.50%		
	胸膜内; パウダー FOR 注射 溶液	22.60%		
	滑液嚢内; 注射	0.90%		
	滑液嚢内; 注射, 徐効	0.90%		
	滑液嚢内; 懸濁 注射	0.22%		
	髄腔内; I注射	0.90%	脊椎腔内注射	9.75mg
	髄腔内; 注射	4.90%		
	髄腔内; 注射, 懸濁 リポソーム	9.00%		
	髄腔内; パウダー FOR 注射 溶液	0.13%		
	髄腔内; 溶液, 注射	0.90%		
	気管内; 注射	1.20%		
	気管内; パウダー FOR 懸濁液	4.67%		
	気管内; 懸濁液	0.08%		
	腫瘍内; 注射	1.20%		
	脈管内; 注射	0.18%		
	静脈 BOLUS; I注射ができる	0.90%		
	静脈 BOLUS; 溶液, 注射	0.90%		
	静脈; I注射ができる	12.00%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	静脈; 注射	90.00%		
	静脈; パウダー FOR 注射 溶液	45.20%		
	静脈; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	45.00%		
	静脈; 溶液	0.90%		
	静脈; 溶液, 注射	90.00%		
	硝子体内; I注射ができる	0.90%		
	硝子体内; 注射	0.77%		
	硝子体内; 懸濁 注射	0.55%		
	イオントフォレシス; DRUG DEL 静脈	0.60MG		
	イオントフォレシス; 貼布, 制御放出	3.10MG		
	イオントフォレシス; 溶液	0.60%		
	静脈皮下; 注射	1.00%		
	静脈皮下; 液体	0.70%		
	静脈皮下; パウダー FOR 注射 溶	0.68%		
	静脈(点滴); I注射	0.70%	静脈内注射	9g
	静脈(点滴); 注射	90.00%		
	静脈(点滴); パウダー FOR 注射 溶	45.00%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	0.90%		
	静脈(点滴); 懸濁 注射	0.90%		
	鼻; 溶液	0.66%		
	鼻; 噴霧	0.90%		
	鼻; 定量用スプレー	1.90%		
	神経ブロック; 注射	0.90%		
	神経ブロック; 溶液, 注射	0.90%		
	眼; ゲル	0.90%	眼科用剤	7.14mg/g
	眼; パウダー FOR 溶液	0.90%		
	眼; 溶液	55.00%		
	眼; 溶液, 点滴剤	0.90%		
	眼; 溶液/点滴剤	0.41%		
	眼; 懸濁液	0.85%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.68%		
	経口 カプセル, 徐放	20.72MG	経口投与	240mg
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	13.50MG		
	経口 パウダー FOR 経口懸濁液	0.10%		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	0.25%		
	経口 溶液	4.00%		
	経口 溶液, エリキシル剤	0.20%		
	経口 懸濁液	4.11%		
	経口 懸濁 FOR 吸入	1.70%		
	経口 シロップ	0.30%		
	経口 錠剤	148.00MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	7.50MG		
	経口 錠剤, 制御放出	36.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	335.10MG		
	経口 錠剤, 徐効	143.26MG		
	PERIDURAL; 注射	0.80%		
	PHOTOPHERESIS; 溶液	0.80%		
	直腸; 坐薬	52.50MG	直腸腔尿道適用	0.03mg/mg
	(吸入 (吸入); 溶液	2.70%		
	(吸入 (吸入); 溶液, エアロゾル,	1.12%		
	(吸入 (吸入); 溶液, FOR 吸入	2.70%		
	ROUTE NOT G 静脈EN; I注射がで	0.90%		
	軟組織; I注射	0.66%		
	軟組織; 注射	0.85%		
	軟組織; 注射, 徐効	0.90%		
	軟組織; 懸濁 注射	0.22%		
	SUBARACHNOID; 溶液, 注射	0.90%		
	皮下; 筋肉PLANT	77.00MG		
	皮下; I注射	0.85%		
	皮下; 注射	0.90%	皮下注射	540mg
	皮下; 液体	0.58%		
	皮下; 溶液, 注射	4.50%		
	皮下; 懸濁 注射	0.80%		
	粘膜; 溶液, 注射	16.00%		
	局所; 乳液, クリーム	0.50%	一般外用剤	40mg/g

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; ローション	0.30%		
	局所; 貼布, 制御放出	3.10MG		
	局所; シャンプー	2.25%		
	局所; 溶液	0.83%		
	局所; 懸濁液	0.53%		
	局所; 懸濁 点滴剤	0.50%		
	経皮; DDS	0.60MG		
SODIUM CITRATE (クエン酸ナトリウム)	AN浸潤; 注射	0.03%		
	耳 (耳性); 溶液	2.00%	耳鼻科用剤	10mg/g
	硬膜外; 注射	2.20%		
	筋肉 - 静脈皮下; 注射	0.94%	筋肉内注射	112mg
	筋肉 静脈; I注射ができる	1.35%	動脈内注射	300mg
	筋肉 静脈; 注射	40.00%	脊椎腔内注射1	2.5mg
	筋肉 静脈; 溶液	0.02%	その他の注射	300mg
	筋肉 皮下; 注射	0.22%	歯科外用及び口中用	1mg/g
	吸入 ; 溶液	0.60%	その他の外用	15mg/g
	関節内; 注射	2.20%	皮内注射	0.25mg
	心臓内; 注射	0.80%	吸入剤	15mg
	腔内療法; 注射	0.15%		
	腔内療法; パウダー FOR 注射 溶液	5.30E-05		
	病巣内; 注射	1.00%		
	筋肉; I注射	0.43%		
	筋肉; 注射	6.60%		
	筋肉; パウダー FOR 注射 溶液	4.62%		
	筋肉; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	0.64%		
	筋肉; 溶液, 注射	1.30%		
	INTRAOCULAR; 溶液	0.40%		
	腹腔内; 注射	6.60%		
	胸膜内; パウダー FOR 注射 溶液	4.62%		
	滑液嚢内; 注射	1.00%		
	髄腔内; パウダー FOR 注射 溶液	4.62%		
	脈管内 ; 注射	0.32%		
	静脈; I注射	0.02%	静脈内注射	1765mg
	静脈; 注射	30.00%		
	静脈; パウダー FOR 注射 溶液	16.40%		
	静脈; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	16.35%		
	静脈; 溶液	0.82%		
	静脈; 溶液, 注射	3.00%		
	イオントフォoresis; DDS	2.20MG		
	灌注 注射	2.20%		
	静脈(点滴); 注射	40.00%		
	静脈(点滴); パウダー FOR 注射 溶液	8.00%		
	静脈(点滴); パウダー FOR 注射 溶液	14.00%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	0.60%		
	鼻; 溶液	70.00%		
	鼻; 噴霧	0.44%		
	鼻; 定量用スプレー	0.03%		
	神経ブロック; 注射	0.03%		
	眼; パウダー FOR 溶液	0.17%	眼科用剤	8.5mg/g
	眼; 溶液	2.00%		
	眼; 溶液, 点滴剤	2.20%		
	眼; 懸濁液	0.30%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.45%		
	経口 濃縮物	0.50%	経口投与	微量
	経口 点滴剤	5.00%		
	経口 顆粒	210.62MG		
	経口 顆粒 FOR 再構成	0.70MG		
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	15.00MG		
	経口 パウダー FOR 経口懸濁液	4.50%		
	経口 パウダー FOR 再構成	0.04%		
	経口 パウダー FOR 溶液			
	経口 パウダー FOR 懸濁液	3.50%		
	経口 溶液	3.09%		
	経口 溶液, 濃縮物	0.05%		
	経口 溶液, エリキシル剤	2.25%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 溶液, 液体	0.70%		
	経口 懸濁液	26.00%		
	経口 懸濁 FOR 吸入	0.10%		
	経口 懸濁 液体	0.50%		
	経口 懸濁 徐効	2.35%		
	経口 シロップ	32.50%		
	経口 錠剤	275.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	300.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	18.34MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	82.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	200.00MG		
	(吸入 (吸入)); パウダー FOR 吸入	0.13%		
	軟組織; 注射	1.00%		
	皮下; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	0.64%		
	皮下; 溶液, 注射	1.30%	皮下注射	100mg
	舌下 錠剤	2.68MG		
	局所; 乳液, クリーム	0.31%	一般外用剤	7mg/g
	局所; 乳液, ローション	0.08%		
	局所; シャンプー	2.60%		
	局所; 溶液	0.10%		
	局所; 溶液, 点滴剤	0.29%		
	経皮; DDS	2.20MG	経皮	5mg/g
	腔; 海綿	7.60MG	殺虫剤	
SODIUM DESOXYCHOLATE	静脈 (点滴); パウダー FOR 注射 溶	4.10%	皮内注射	0.82mg
			脊椎腔内注射	0.82mg
			静脈内注射	41mg
SODIUM GLUCONATE	静脈; 注射	2.30%	静脈内注射	57mg
	静脈 (点滴); パウダー FOR 注射 溶	0.10%	筋肉内注射	57mg
SODIUM HYDROXIDE	AN浸潤; 注射	0.07%	動脈内注射	356mg
	耳 (耳性); 溶液	0.80%	その他の注射	1.6mg
	口腔; フィルム, 溶解 (性)	1.18MG	皮内注射	適量
	筋肉 静脈; 注射	10.68%	歯科注射	12mg
	筋肉 静脈; パウダー 注射 溶液用	0.70%	局所麻酔	適量
	筋肉 静脈; 溶液, 注射	0.13%	耳鼻科用剤	2.5mg/g
	吸入 ; 溶液	8.00%	吸入剤	0.15mg
	筋肉; 注射	3.14%	筋肉内注射	300mg
	静脈; I注射	0.60%	静脈内注射	600mg
	静脈; 注射	10.00%	歯科外用及び口中用	1mg、
	静脈; パウダー 注射 溶液用	13.65%		
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	19.27%		
	静脈; 溶液, 注射	0.09%		
	イオントフォoresis; DDS	4.20MG		
	静脈 (点滴); 注射	13.00%		
	静脈 (点滴); パウダー 注射 溶液用	9.00%		
	静脈 (点滴); パウダー 注射 溶液用,	1.56%		
	静脈 (点滴); 溶液, 注射	2.83%		
	鼻; 定量用スプレー	4.00E-05		
	神経ブロック; 注射	0.07%		
	眼; 乳液	0.39%	眼科用剤	7mg/g
	眼; 溶液	0.10%		
	経口 カプセル	0.74MG	経口投与	224mg
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	0.75MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	1.50MG		
	経口 濃縮物	1.00%		
	経口 溶液	8.00%		
	経口 懸濁液	40.00%		
	経口 シロップ	7.10%		
	経口 錠剤	6.72MG		
	経口 錠剤, 徐放性	0.21MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	0.32MG		
	経口 錠剤, 徐放	2.70MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	0.15MG		
	経口 錠剤, 徐効	0.40MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	0.04MG		
	直腸; 浣腸	26.40%	直腸腔尿道適用	46mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	直腸; 溶液 皮下; I注射 皮下; 注射 皮下; 懸濁 注射 局所; クリーム, 局所; クリーム, 乳液, 徐放 局所; 乳液 局所; 乳液, クリーム 局所; 乳液, ローション 局所; ゲル 局所; ゼリー 局所; ローション 局所; 軟膏, 局所; 溶液 経皮; DDS 経皮; フィルム, 制御放出 経皮; ゲル 腔; 乳液, クリーム 腔; ゲル	0.62% 0.42% 3.14% 0.22% 2.72% 2.72% 0.20% 0.52% 0.02% 10.00% 0.01% 2.60% 0.10% 0.02% 4.20MG 0.85MG 4.72% 0.18% 0.25%	皮下注射 一般外用剤 経皮	230mg 45mg/g 0.6mg/g
SODIUM IODIDE	静脈; 注射 静脈; パウダー 注射 溶液用 局所; 溶液, 液体	1.00% 5.00% 0.74%	一般外用剤	17.3mg/g
SODIUM LACTATE (乳酸ナトリウム)	仙骨麻酔; 注射 腹腔内; 溶液 静脈; 注射 静脈; パウダー FOR 注射 溶液, 凍 神経ブロック; 注射 経口 懸濁液 局所; ゲル 局所; 溶液	1.00E-06 44.80% 0.17% 1.87% 0.17% 2.00% 0.77% 1.62%	静脈内注射 一般外用剤	50mg 51.3mg/g
SODIUM LACTATE, L-((乳酸ナトリウム))	筋肉 - 静脈皮下; 注射 心臓内; 注射 静脈(点滴); 注射	0.18% 0.18% 0.18%	静脈内注射 一般外用剤	50mg 51.3mg/g
SODIUM LAURYL SULFATE	口腔/舌下 錠剤 歯科; ゲル 経口 カプセル 経口 カプセル(即時型/複合型)リ 経口 カプセル, 徐放性ACTION 経口 カプセル, 徐放性ACTION, 被 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐放 経口 カプセル, 硬ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 徐効 経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン 経口 DISPERSIBLE 錠剤 経口 パウダー FOR 懸濁液 経口 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤(即時型/複合型)リ 経口 錠剤(即時型/複合型)リ 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 徐放性ACTION 経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 多層構造, 徐放 経口 錠剤, 口腔内崩壊 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, 被覆 経口 28; 錠剤 舌下 錠剤 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 軟膏	1.10MG 1.47% 15.00MG 3.60MG 0.11MG 2.00MG 1.00MG 16.66MG 6.00MG 24.00MG 1.60MG 1.70MG 8.40MG 0.06% 0.25% 51.69MG 0.98MG 5.00MG 5.20MG 0.50MG 8.09MG 51.69MG 12.00MG 0.80MG 0.10MG 20.62MG 10.50MG 0.65MG 0.02MG 2.50% 0.50% 1.00%	歯科外用及び口中用 経口投与 直腸腔尿道適用 一般外用剤	16.4mg/g 300mg 18mg 20mg/g

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; シャンプー, 懸濁液	40.00%		
	腔; 乳液, クリーム	0.33%		
	腔; 挿入	5.00MG	殺虫剤	
SODIUM METABISULFITE	AN浸潤; 注射	0.50%	歯科注射	25 μ g
	仙骨麻酔; 注射	0.18%	局所麻酔注射	50mg
	硬膜外; 注射	0.18%	耳鼻科用剤	0.3mg/mL
	筋肉 - 静脈皮下; 注射	0.15%	筋肉内注射	60mg
	筋肉 静脈; 注射	27.50%	皮下注射	60mg
	吸入 ; 溶液	1.00%	皮内注射	40mg
	関節内; 注射	0.20%	直腸腔尿道適用	100mg
	滑液嚢内; 注射	0.20%		
	心臓内; 注射	0.09%		
	筋肉; 注射	27.50%		
	腹腔内; 注射	0.66%		
	静脈; 乳液, 注射	0.02%	静脈内注射	60mg
	静脈; 注射	0.32%		
	静脈; 溶液, 注射	0.05%		
	イオントフォレシス; 貼布, 制御放出	0.50MG		
	イオントフォレシス; 溶液	0.05%		
	静脈(点滴); 注射	7.00%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	22.00%		
	神経ブロック; 注射	0.50%		
	眼; 溶液	0.20%	眼科用剤	20 μ g/g
	眼; 溶液, 点滴剤	0.25%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.10%		
	経口 カプセル	0.36MG	経口投与	20mg
	経口 濃縮物	0.20%		
	経口 液体	0.10%		
	経口 懸濁液	0.10%		
	経口 シロップ	0.10%		
	経口 錠剤	8.00MG		
	直腸; 錠剤	2.00MG		
	皮下; 注射	0.30%		
	舌下 錠剤	2.00MG		
	粘膜; 溶液, 注射	5.00%		
	局所; クリーム,	0.20%	一般外用剤	1.5mg/g
	局所; 乳液, クリーム	0.03%		
	局所; ローション	0.20%		
	局所; 貼布, 制御放出	0.50MG		
	局所; パウダー FOR 溶液	0.10%		
	局所; 懸濁液	0.31%		
	腔; 海綿	1.50MG		
SODIUM PHOSPHATE(無水リン酸)	筋肉 静脈; 注射	0.30%	一般外用剤	3mg/g
	筋肉 静脈; パウダー FOR 注射 溶	2.47%		
	筋肉 静脈; 溶液, 注射	0.17%	殺虫剤	
	皮内; 注射	0.20%		
	筋肉; 注射	0.42%		
	筋肉; パウダー FOR 注射 溶液	0.10%		
	静脈; 注射	1.60%		
	静脈; パウダー FOR 注射 溶液	1.00%		
	静脈(点滴); 注射	79.00%		
	鼻; 溶液	0.18%		
	神経ブロック; 注射	0.02%		
	眼; 溶液	0.81%		
	眼; 溶液, 点滴剤	0.29%		
	眼; 懸濁液	0.20%		
	経口 カプセル	36.00MG		
	経口 溶液	2.70%		
	経口 錠剤	16.00MG		
	経口 21; 錠剤	0.75MG		
	皮下; 注射	0.37%		
	局所; 軟膏	0.15%		
	局所; シャンプー	0.66%		
SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC(U)	筋肉 静脈; 注射	1.74%	動脈内注射	62mg
	皮内; 注射	0.20%	脊椎腔内注射	7.53mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	病巣内; 懸濁 注射 筋肉; 懸濁 注射 滑液嚢内; 懸濁 注射 静脈; 注射 眼; 溶液 眼; 懸濁液 経口 濃縮物 経口 溶液 経口 シロップ 軟組織; 懸濁 注射 皮下; パウダー 注射溶液用, 凍結 皮下; 懸濁 注射 局所; 乳液, クリーム	0.14% 0.14% 0.14% 0.76% 0.29% 0.43% 1.70% 4.75% 1.37% 0.14% 0.29% 0.05% 0.20%	皮内注射 筋肉内注射 局所麻酔注射 静脈内注射 その他の注射 一般外用剤 経口投与 直腸尿道適用 眼科用剤 耳鼻科用剤 皮下注射 歯科外用及び口中用 その他の外用 殺虫剤	1.62mg 480mg 20mg 816mg 384mg 41mg/g 800mg 71.6mg 30.43mg/g 10mg/g 294.5mg 4.5mg/g 18mg/g
SODIUM PHOSPHATE,	口腔; フィルム, 溶解(性) 筋肉 静脈; 注射 筋肉 静脈; 注射 病巣内; 懸濁 注射 筋肉; 注射 筋肉; 懸濁 注射 滑液嚢内; 懸濁 注射 イオントフォoresis; 貼布., 制御放出 静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 経口 溶液 経口 錠剤 軟組織; 懸濁 注射 皮下; パウダー注射 溶液用, 凍結 皮下; 懸濁 注射 局所; クリーム, 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; ローション, 局所; 貼布., 制御放出 局所; シャンプー, 懸濁液	0.76MG 0.16% 1.47% 0.68% 0.57% 0.68% 0.68% 14.20MG 1.32% 0.19% 0.01% 1.37% 1.37MG 0.68% 0.02% 0.06% 0.20% 0.26% 0.30% 0.20% 14.20MG 1.00%	眼科用剤 皮内注射 静脈内注射 耳鼻科用剤 皮下注射	5.38mg/g 0.33mg mg/kg(体重) 5.38mg/g 40.78mg
SODIUM PHOSPHATE,	耳(耳性); 溶液, 点滴剤 筋肉 静脈; 注射 筋肉 静脈; パウダー 注射 溶液用 筋肉 静脈; 溶液, 注射 筋肉; 注射 筋肉; パウダー 注射 溶液用 筋肉; パウダー 注射 溶液用, 凍結 脈管内; 注射 静脈; 注射 静脈; パウダー 注射 溶液用 静脈; 溶液 静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用 鼻; 定量用スプレー 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 眼; 懸濁液 眼; 懸濁 点滴剤 経口 溶液 経口 シロップ 経口 錠剤 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 経口20; 錠剤 経口21; 錠剤 皮下; 注射 皮下; パウダー注射 溶液用 皮下; パウダー 注射 溶液用, 凍結 皮下; 溶液, 注射	0.12% 1.28% 1.28% 0.62% 0.50% 0.50% 1.20% 0.01% 0.50% 0.71% 4.00% 0.50% 1.28% 0.01% 0.72% 0.78% 0.65% 0.05% 4.00% 0.07% 4.18MG 23.40MG 30.97MG 0.07MG 0.07MG 3.31% 0.08% 0.11% 0.15%	耳鼻科用剤 その他の注射 歯科外用及び口中用 筋肉内注射 静脈内注射 眼科用剤	5mg/g 120mg 25mg/g、 70mg 80mg 8mg/g、

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所: 乳液, クリーム 局所: ローション 局所: シャンプー, 懸濁液 局所: 溶液	0.50% 0.60% 1.00% 0.17%	一般外用剤	6mg/g
SODIUM PROPIONATE	経口 カプセル 経口 パウダー 懸濁液用 経口 シロップ	0.36MG 0.25% 1.00%	耳鼻科用剤	50mg/g
SODIUM STARCH GLYCOLATE(カ	口腔; 錠剤 経口 カプセル 経口 カプセル, 被覆 丸薬 経口 カプセル, 徐放性, 被覆, 硬ゼラ 経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬 経口 カプセル, 硬ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 徐効 経口 分散 錠剤 経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型／複合型リリー 経口 錠剤 (即時型／複合型リリー 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 制御放出 経口 錠剤, 徐放性 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 多層構造, 被覆 経口 錠剤, 口腔内崩壊 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 経口 21; 錠剤 経口 28; 錠剤 舌下 錠剤	8.30MG 180.00MG 16.71MG 16.00MG 16.80MG 20.00MG 7.75MG 18.60MG 2.40MG 876.00MG 10.80MG 50.00MG 73.00MG 25.86MG 34.00MG 21.00MG 12.00MG 30.00MG 90.00MG 2.00MG 71.43MG 15.00MG 10.00MG 4.00MG 3.99MG 5.50MG	経口投与 直腸尿道適用	320mg 150.0mg
SODIUM STEARATE	経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型／複合型リリー 経口 錠剤, 徐放性 経口 錠剤, 口腔内崩壊	9.48MG 3.20MG 10.00MG 0.85MG	一般外用剤 直腸尿道適用	90mg/g 280mg/g、
SODIUM STEARYL FUMARATE(フマ	経口 カプセル 経口 カプセル, 硬ゼラチン 経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型／複合型リリー 経口 錠剤 (即時型／複合型リリー 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 制御放出 経口 錠剤, 徐放性 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 口腔内崩壊 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, 被覆 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	7.26MG 2.70MG 24.40MG 2.00MG 2.00MG 1.18MG 2.00MG 7.00MG 27.00MG 20.00MG 26.00MG 6.00MG 8.90MG 4.00MG 16.00MG	経口投与	64mg
SODIUM SUCCINATE	静脈; 注射, パウダー 凍結乾燥, リ 経口 濃縮物	2.70%	経口投与	60mg
SODIUM SULFATE	眼; 溶液 眼; 懸濁液 経口 錠剤 経口 20; 錠剤	0.22% 1.20% 7.37MG 120.00MG	殺虫剤	
SODIUM SULFATE ANHYDROUS	吸入 ; 溶液 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 眼; 懸濁液 経口 錠剤 経口 21; 錠剤	0.02% 0.15% 0.17% 1.20% 105.10MG 96.00MG	経口投与 一般外用剤 殺虫剤	51.2mg 45mg/g
SODIUM SULFITE	耳 (耳性); 溶液	0.02%	経口投与	200mg

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	硬膜外; 注射 筋肉 静脈; 注射 吸入 ; 溶液 関節内; 注射 筋肉; 注射 静脈; 注射 眼; 溶液, 点滴剤 経口 濃縮物 皮下; 注射 局所; 乳液, クリーム	0.10% 0.20% 0.10% 0.10% 0.05% 0.10% 0.20% 0.03% 0.09% 0.20%	静脈内注射	60mg
SODIUM TARTRATE(DL - 酒石酸	筋肉 静脈; 注射 筋肉; 注射 静脈; 注射 静脈(点滴); 注射	1.20% 1.41% 1.20% 1.20%	経口投与 L- 酒石酸ナトリウム 経口投与 静脈内注射 一般外用剤	45mg 28.2mg 40mg 11.5mg/g
SODIUM THIOGLYCOLATE	皮下; 注射	0.66%	静脈内注射 皮下注射	20mg 20mg
SODIUM THIOSULFATE(チオ硫酸ナ	眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 眼; 懸濁液 眼; 懸濁 点滴剤 経口 カプセル 経口 溶液 経口 錠剤 局所; クリーム, 局所; クリーム, 乳液, 徐放	5.00% 0.31% 0.32% 0.31% 20.00MG 9.30E-05 3.00MG 0.10% 0.10%	静脈内注射 筋肉内注射 皮下注射 舌下適用 眼科用剤	3mg 4mg 4mg 2mg/g 2mg/g
SORBIC ACID	眼; 乳液 眼; 溶液 眼; 溶液, 点滴剤 経口 濃縮物 経口 溶液 経口 懸濁液 経口 シロップ 経口 錠剤 経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 舌下 錠剤 局所; 乳液, クリーム 局所; ゲル 局所; ローション 局所; 軟膏 腔; ゲル 腔; 海綿	0.10% 0.20% 0.20% 0.01% 1.18% 0.15% 0.50% 0.93MG 0.02MG 0.40MG 0.16MG 2.70% 0.17% 0.20% 0.10% 0.09% 6.00MG	眼科用剤 歯科外用及び口中用 経口投与 直腸腔尿道適用 一般外用剤	2mg/mL 225mg/g 270mg 09mg/g 2mg/g
SORBITAN MONOLAURATE(モノラ	経口 懸濁液 経口 錠剤, フィルム 被覆 局所; 乳液, エアロゾル FOAM	0.25% 83.90MG 4.74%	経口投与 一般外用剤 直腸腔尿道適用	132mg 50mg/g 0.2g
SORBITAN MONOOLEATE(モノオレ	経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体- 経口 溶液 経口 錠剤 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 直腸; 坐薬 局所; クリーム, 局所; クリーム, 乳液, 徐放 局所; 乳液 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション	153.90MG 10.00MG 15.00% 1.70MG 0.10MG 1.89MG 0.69MG 7.80MG 1.00MG 22.00MG 0.20% 0.20% 2.50% 3.50% 7.00%	経口投与 一般外用剤 その他の外用 殺虫剤	6mg 25mg/g 15.46mg
SORBITAN MONOPALMITATE(モノ	局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 貼布 局所; 乳液, クリーム	2.00% 1.00% 10.50MG 2.00%	経口投与 一般外用剤	15mg 20mg/g

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	局所; ローション	1.00%		
	局所; 貼布	10.50MG		
SORBITAN MONOSTEARATE (モノ)	経口 懸濁液	6.25%	一般外用剤	50mg/g
	局所; 乳液, クリーム	8.00%	舌下適用	25mg/g
	局所; ローション	2.50%	直腸腔尿道適用	160mg
	局所; 懸濁液	2.15%	歯科外用及び口中用	10mg/g
	腔; クリーム	2.00%		
	腔; 乳液, クリーム	5.00%		
SORBITAN SESQUIOLEATE	局所; 軟膏	2%	経口投与	50mg
			静脈内注射	50mg
			筋肉内注射	50mg
			一般外用剤	50mg/g
			経皮	1mg/g
			舌下適用	50mg
SORBITAN TRIOLEATE	吸入 ; エアロゾル, 定量	0.06%	経口投与	116 μ g
	鼻; エアロゾル, 定量	0.01%	一般外用剤	30mg/g
	経口 カプセル	0.02ML	吸入剤	0.784mg
	経口 パウダー 経口懸濁液用	0.03%		
SORBITOL (D-ソルビトール)	口腔; GUM, 咀嚼	212.90MG	歯科外用及び口中用	150mg/g
	関節内; 注射	45.00%	皮下注射	250mg
	病巣内; 注射	45.00%	その他の注射	875mg
	滑液嚢内; 注射	45.00%	筋肉内注射	800mg
	静脈; 注射	30.00%	直腸腔尿道適用	216mg
	静脈; 溶液, 注射	48.00%	静脈内注射	12g
	静脈(点滴); 注射	4.50%	一般外用剤	30mg/g
	静脈(点滴); 溶液, 注射	7.14%	眼科用剤	8.6mg/mL
	鼻; 溶液	2.50%		
	鼻; 定量用スプレー	2.86%		
	眼; 溶液, 点滴剤	0.25%		
	経口 BAR, 咀嚼剤	144.00MG		
	経口 カプセル	185.18MG	経口投与	40g
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	66.82MG		
	経口 濃縮物	40.00%		
	経口 点滴剤{	3.00%		
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	28.00MG		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	34.28%		
	経口 溶液	35.00%		
	経口 溶液, エリキシル剤	20.00%		
	経口 懸濁液	91.28%		
	経口 シロップ	93.45%		
	経口 錠剤	337.28MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	300.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	12.96MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	5.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	53.75MG		
	舌下 錠剤	50.50MG		
	局所; 乳液	7.00%		
	局所; 乳液, クリーム	67.52%		
SORBITOL SOLUTION (D-ソルビ	口腔; GUM, 咀嚼	38.10MG		
	筋肉; 注射	25.00%	筋肉内注射	50mg
	静脈; 注射	7.14%		
	静脈; 溶液, 注射	7.14%	皮下注射	50mg
	静脈(点滴); 溶液, 注射	7.14%	その他の注射	0.438mL
	眼; 溶液, 点滴剤	39.99%	舌下適用	35mg/g
	経口 カプセル	3.11MG	耳鼻科用剤	17mg/mL
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	3.11MG	歯科外用及び口中用	200mg/g
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	28.90MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	97.00MG		
	経口 濃縮物	60.00%	経口投与	適量
	経口 点滴剤{	5.00%		
	経口 溶液	90.00%		
	経口 溶液, 濃縮物	30.00%		
	経口 溶液, エリキシル剤	83.33%		
	経口 懸濁液	71.40%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 懸濁 点滴剤 { 経口 シロップ 経口 錠剤 直腸; 懸濁液 局所; クリーム, 局所; 乳液, クリーム 局所; ローション 局所; 軟膏 局所; 溶液, 点滴剤 腔; 乳液, クリーム	25.00% 96.40% 14.00MG 36.00% 15.00% 25.00% 5.00% 1.50% 6.70% 36.80%	直腸腔尿道適用 一般外用剤	96.46mg 450mg/g
SOYBEAN OIL	静脈; 乳液, 注射 静脈; I注射 経口 カプセル 経口 カプセル, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体- 経口 錠剤 (即時型／複合型リリー 局所; ローション 局所; 溶液	10.00% 10.00% 263.00MG 227.00MG 129.87MG 0.14MG 50.20% 5.82%	静脈内注射 経口投与 その他の外用 直腸腔尿道適用 経皮 一般外用剤 殺虫剤	300mg 1962mg 0.3mL/mL 18606mg 3720mg 396mg/g
SOYBEAN OIL, REFINED	経口 カプセル	101.00MG	静脈内注射	500mg
SPEARMINT OIL	経口 溶液 経口 懸濁液 経口 シロップ	0.05% 2.90E-05 2.00%	一般外用剤	1.2mg/g
SQUALANE	局所; 乳液, クリーム 局所; 溶液	6.00% 1.00%	一般外用剤 舌下適用 直腸腔尿道適用 その他の外用 合成スクワラン 一般外用剤	150mg/g 10mg/g 150mg/g 43mg/g 100mg/g
STANNOUS CHLORIDE	静脈; 注射 静脈; パウダー 注射 溶液用 静脈(点滴); 注射 静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用,	0.34% 0.02% 0.05% 3.00E-05	静脈内注射	400 μg
STANNOUS CHLORIDE	静脈; 注射	5.00E-05	静脈内注射	0.002mg
STARCH, CORN	口腔; 錠剤 経口 カプセル 経口 カプセル, 硬ゼラチン 経口 カプセル, 徐効 経口 懸濁液 経口 錠剤 経口 錠剤 (即時型／複合型リリー 経口 錠剤, 被覆 経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶 経口 錠剤, 徐放 経口 錠剤, フィルム 被覆 経口 錠剤, 多層構造, 徐放 経口 錠剤, 復効 経口 錠剤, 徐効 経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆 経口20; 錠剤 経口21; 錠剤 経口21; 錠剤, 被覆 経口28; 錠剤 経口28; 錠剤, 被覆 舌下 錠剤 腔; 錠剤 腔; 錠剤, フィルム 被覆	16.60MG 1135.00MG 289.20MG 27.00MG 7.25% 433.32MG 170.00MG 285.00MG 54.00MG 18.00MG 158.00MG 10.00MG 32.00MG 92.00MG 74.30MG 57.00MG 33.00MG 9.90MG 30.10MG 9.90MG 60.00MG 150.00MG 8.00MG	経口投与 一般外用剤 舌下適用 直腸腔尿道適用 歯科外用及び口中用	19g 345mg/g 225mg 103mg 216mg
STARCH, POTATO	経口 錠剤 経口 錠剤, 被覆	80.58MG 2.10MG	経口投与 一般外用剤 直腸腔尿道適用 その他外用 殺虫剤	31.5g 500mg/g 160mg 500mg/g
STARCH, PREGELATINIZED (アル	経口 カプセル 経口 カプセル(即時型／複合型リ 経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン 経口 カプセル, 硬ゼラチン	600.00MG 70.00MG 15.00MG 128.75MG	経口投与 一般外用剤 直腸腔尿道適用	2560mg 25.3mg/g 39mg

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル, 徐効	141.75MG		
	経口 点滴剤	1.20%		
	経口 懸濁液			
	経口 懸濁 液体	1.50%		
	経口 懸濁 徐効	12.50%		
	経口 錠剤	345.95MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	71.35MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	32.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	73.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出	86.94MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	64.80MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	240.00MG		
	経口 錠剤, SUGAR 被覆	9.40MG		
	経口 錠剤, 徐効	60.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	33.75MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	75.00MG		
	経口21; 錠剤	22.25MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	6.60MG		
	経口28; 錠剤	26.35MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	6.60MG		
	舌下 錠剤	43.00MG		
	経口 カプセル	600.00MG		
	経口 カプセル (即時型／複合型リ	70.00MG		
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	15.00MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	128.75MG		
	経口 カプセル, 徐効	141.75MG		
	経口 点滴剤	1.20%		
	経口 懸濁 液体	1.50%		
	経口 懸濁 徐効	12.50%		
	経口 錠剤	345.95MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	71.35MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	32.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	73.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出	86.94MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	64.80MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	240.00MG		
	経口 錠剤, 糖衣	9.40MG		
	経口 錠剤, 徐効	60.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	33.75MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	75.00MG		
	経口21; 錠剤	22.25MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	6.60MG		
	経口28; 錠剤	26.35MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	6.60MG		
	舌下 錠剤	43.00MG		
STARCH, RICE	経口 錠剤, 徐効	301.00MG	経口投与	2g
STARCH, WHEAT	経口 カプセル, 徐効	0.75MG	経口投与	2.5g
	経口 錠剤	65.58MG	一般外用剤	100mg/g
	経口 錠剤, フィルム 被覆	49.00MG		
STEARETH-10 (ポリオキシエチレンス	直腸; エアロゾル, 定量	0.22%	一般外用剤	210mg/g
	局所; エアロゾル, 定量	6.25%	舌下適用	25mg/g
	局所; 乳液, エアロゾル FOAM		殺虫剤	
STEARETH-100	局所; 乳液, クリーム	0.35%		
	局所; 軟膏	0.60%		
STEARETH-2	局所; クリーム, 乳液, 徐放	0.85%		
	局所; 乳液, クリーム	4.50%		
	局所; ローション	0.40%		
	局所; 軟膏	5.00%		
STEARETH-20	局所; クリーム, 乳液, 徐放	4.15%		
STEARETH-21	局所; クリーム, 乳液, 徐放	2.50%		
	局所; 乳液, クリーム	3.00%		
	局所; ローション	3.00%		
STEARIC ACID	口腔/舌下 錠剤	6.00MG	耳鼻科用剤、	0.3mg/g
	口腔; 錠剤	5.00MG	直腸腔尿道適用	306mg/g
	移植; 丸薬	0.20MG		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 カプセル	52.00MG	経口投与 歯科外用及び口中用	1200mg 60mg
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	3.00MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	15.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	9.32MG		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	24.06%		
	経口 錠剤	72.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	15.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	42.40MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	8.00MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	5.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	180.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	22.00MG		
	経口 錠剤, SUGAR 被覆	0.90MG		
	経口 錠剤, 徐効	187.50MG		
	経口 錠剤, 徐効, 多層構造, フィル	26.48MG		
	経口 錠剤, 徐放, フィルム 被覆	9.00MG		
	経口 21; 錠剤	1.00MG		
	経口 28; 錠剤	1.00MG		
	皮下; 筋肉PLANT	1.04MG		
	舌下 錠剤	5.04MG	舌下適用 一般外用剤	100mg/g 275mg/g
	局所; クリーム, 増加された	3.00%		
	局所; クリーム, 乳液, 徐放	4.00%		
	局所; 乳液, クリーム	22.60%		
	局所; ローション	20.00%		
	局所; 軟膏	15.00%		
	局所; 懸濁液	1.75%		
	腔; 乳液, クリーム	14.00%		
	腔; 錠剤	60.00MG		
	腔; 錠剤		殺虫剤	
STEARYL ALCOHOL	経口 カプセル, 徐効	72.00MG	経口投与 舌下適用 直腸腔尿道適用 一般外用剤	160mg 165mg/g 100mg/g、 300mg/g
	経口 錠剤, 制御放出	25.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	244.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	60.00MG		
	局所; エアロゾル	0.53%		
	局所; クリーム,	4.00%		
	局所; クリーム, 乳液, 徐放	3.00%		
	局所; 乳液, エアロゾル	0.53%		
	局所; 乳液, クリーム	30.00%		
	局所; ローション	12.00%		
	局所; 軟膏	8.00%		
	局所; 懸濁液	2.01%		
SUCCINIC ACID	腔; 乳液, クリーム	42.50%		
	経口 濃縮物	0.60%	経口投与 静脈内注射 殺虫剤	50mg 2mg
	経口 パウダー 経口懸濁液用	0.08%		
	経口 パウダー再構成用	0.15%		
	経口 錠剤	65.10MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	2.85MG		
SUCRALOSE	経口 錠剤, 制御放出	4.00MG	経口投与	45mg
	口腔; GUM, 咀嚼	2.00MG		
	鼻; 溶液, 噴霧	0.15%		
	経口 パウダー経口懸濁液用	8.00%		
	経口 溶液	0.80%		
	経口 懸濁液	1.14%		
	経口 錠剤	4.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	1.88MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	5.75MG		
SUCROSE (精製白糖)	経口 28; 錠剤	0.01MG	舌下適用 歯科外用及び口中用 静脈内注射	9g 2512mg 39.84g
	口腔/舌下 錠剤	91.00MG		
	口腔; 錠剤	16.60MG		
	筋肉; パウダー 注射 溶液用, 凍結	6.84%		
	筋肉; 溶液, 注射	4.42%		
	静脈; 注射	19.50%		
	静脈; 注射, パウダー 凍結乾燥, リ	90.00%		
	静脈; 注射, 懸濁 リポソーム	9.40%		
	静脈; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	7.78%		
	静脈; 溶液, リポソーム 注射	8.50%		

添加物 (INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	静脈(点滴); パウダー FOR 注射 溶	5.40%	経口投与	33g
	経口 カプセル	413.65MG		
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	175.14MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	140.75MG		
	経口 カプセル, 徐放	396.14MG		
	経口 カプセル, 徐効	481.70MG		
	経口 濃縮物	67.00%		
	経口 点滴剤	75.55%		
	経口 顆粒 FOR 懸濁液	1052.90MG		
	経口 顆粒 FOR 懸濁 徐放			
	経口 液体	72.00%		
	経口 PASTILLE	426.00MG		
	経口 粉末	25.61%		
	経口 パウダー FOR 経口溶液	54.57MG		
	経口 パウダー FOR 経口懸濁液	90.27%		
	経口 パウダー FOR 溶液	48.40%		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	93.23%		
	経口 溶液	60.00%		
	経口 溶液, エリキシル剤	61.30%		
	経口 懸濁液	62.50%		
	経口 懸濁 点滴剤	12.50%		
	経口 懸濁 徐効	60.00%		
	経口 シロップ	82.10%		
	経口 錠剤	900.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	1200.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	400.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	279.49MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	84.20MG		
	経口 錠剤, 復効	152.66MG		
	経口 錠剤, SUGAR 被覆	73.18MG		
	経口 錠剤, 徐効	202.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	119.12MG		
	経口20; 錠剤	12.00MG		
	経口21; 錠剤	12.00MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	19.37MG		
	経口28; 錠剤	216.50MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	19.37MG		
	皮下; 注射	9.00%	皮下注射	25mg
	皮下; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	6.84%		
	皮下; パウダー FOR 注射 溶液, 凍	4.10%		
	皮下; 溶液, 注射	4.42%		
	舌下 錠剤	8.41MG	殺虫剤	
	局所; 軟膏	20.00%		
SUCROSE DISTEARATE (ショ糖脂	局所; 乳液, クリーム	5.00%		
SUCROSE PALMITATE (ショ糖脂肪	経口 パウダー FOR 懸濁液	1.00%		
	経口 パウダー FOR 懸濁液	1.00%		
SUCROSE STEARATE (ショ糖脂肪	経口 カプセル, 徐放	31.83MG	経口投与 一般外用剤 歯科外用及び口中用	600mg 35mg/g 72mg、
	経口 カプセル, 徐効	44.56MG		
	経口 錠剤, 徐放	44.56MG		
SUGAR CONFECTIONERS (粉糖)	経口 カプセル	527.42MG	経口投与	4347mg
	経口 カプセル, 徐効	17.60MG		
	経口 パウダー 懸濁液用	3.32%		
	経口 錠剤	215.68MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	1438.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	54.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	44.50MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	200.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	175.00MG		
	経口21; 錠剤	40.00MG		
	経口28; 錠剤	40.00MG		
	舌下 錠剤	17.00MG		
SULFURIC ACID	耳 (耳性); 懸濁液	0.02%	一般外用剤 動脈内注射 眼科用剤 筋肉内注射	14mg/g 適量 適量 87.6mg
	筋肉 静脈; 注射	56.60%		
	吸入 ; 溶液	12.50%		
	筋肉; 注射	2.09%		

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
TALC	静脈; 注射	2.09%	静脈内注射	適量
	静脈(点滴); 注射	2.12%		
	鼻; 噴霧	0.40%	耳鼻科用剤	37.0mg/g
	口腔/舌下 錠剤	15.00MG	舌下適用	24mg
	口腔; 錠剤	1.50MG		
	経口 カプセル	220.40MG	経口投与	3384mg
	経口 カプセル, 被覆 丸薬	0.25MG	歯科外用及び口中用	650mg
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	70.46MG	直腸腔尿道適用	12.6mg
	経口 カプセル, 徐放性ACTION, 被	14.93MG	その他の外用	740mg/g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	46.62MG		
	経口 カプセル, 徐放	157.60MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	139.17MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	0.10MG		
	経口 カプセル, 徐効	122.06MG		
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	16.70MG		
	経口 顆粒, 腸溶性 被覆	215.20MG		
	経口 顆粒 FOR 経口懸濁液	34.00MG		
	経口 MUCILAGE	1.53MG		
	経口 溶液, エリキシル剤	0.45%		
	経口 錠剤	91.20MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	22.80MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	1.60MG		
	経口 錠剤 (即時型/複合型リリー	18.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	75.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出	31.61MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION	27.40MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	110.00MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	6.50MG		
	経口 錠剤, 徐放	47.04MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	54.72MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	36.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	3.00MG		
	経口 錠剤, 復効	73.93MG		
	経口 錠剤, 徐効	91.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	29.30MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	30.00MG		
	経口21; 錠剤	3.00MG		
	経口21; 錠剤, 被覆	4.19MG		
	経口28; 錠剤	6.34MG		
	経口28; 錠剤, 被覆	4.19MG		
	直腸; 錠剤	32.40MG		
	舌下 錠剤	32.40MG		
	局所; ローション	7.28%	一般外用剤	787mg/g
	局所; 軟膏	8.27%		
	局所; 粉末	98.00%		
	局所; シャンプー	24.00%	殺虫剤	
TARTARIC ACID	筋肉; 注射	0.35%	筋肉内注射	8mg
	静脈; 注射	0.20%	静脈内注射	20mg
	静脈; 溶液, 注射	0.20%	経皮	3mg/g
	静脈(点滴); パウダー 注射 溶液用,	2.00%	直腸腔尿道適用	212mg/g
	経口 カプセル	9.00MG	経口投与	350mg
	経口 カプセル, 徐効	215.10MG	一般外用剤	23mg/g
	経口 溶液	0.75%	吸入剤	1mg/g
	経口 錠剤	15.00MG	歯科外用及び口中用	48mg、
	経口 錠剤, 被覆	10.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	30.00MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊	45.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	29.20MG		
	経口 シロップ	3.00%		
TARTARIC ACID, DL-	経口 錠剤	13.74MG		
	経口 錠剤, 徐効	30.00MG		
	直腸; 坐薬	21.50MG		
	舌下 錠剤	1.50MG		
	腔; 坐薬	32.30MG		
THIMEROSAL	耳 (耳性); 懸濁液	0.01%	静脈内注射	12mg

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	筋肉; 注射	8.40E-05	筋肉内注射	12mg
	筋肉; 注射, 徐効	2.00E-05	皮下注射	12mg
	眼; 溶液	0.01%	一般外用剤	1mg/mL
	眼; 溶液, 点滴剤	0.01%	眼科用剤	2mg/mL
	眼; 懸濁液	4.00E-05	耳鼻科用剤	0.02mg/mL
	眼; 懸濁 点滴剤	1.00%	その他の外用	2mg/g
	皮下; 注射	0.01%		
	局所; 乳液, クリーム	5.00E-05		
	局所; 軟膏	0.04%		
THYMOL	吸入 ; 液体	0.01%	一般外用剤	49mg/g
			舌下適用	1mg/g
			歯科外用及び口中用	10mg、
TITANIUM DIOXIDE	口腔; フィルム, 溶解(性)	2.78MG	経皮	24mg
	口腔; GUM, 咀嚼	7.54MG	舌下適用	5.34mg
	子宮内; 坐薬, 挿入, 制御放出	1.00MG	直腸腔尿道適用	12mg
	眼; 坐薬, 挿入, 制御放出	0.40MG	その他の外用	
	経口 カプセル	1387.00MG	経口投与	384mg
	経口 カプセル, 被覆, 軟ゼラチン	0.78MG	眼科用剤	0.4mg
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	0.76MG	歯科外用及び口中用	2mg/g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	4.40MG		
	経口 カプセル, 徐放	5.20MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	0.85MG		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	6.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	4.40MG		
	経口 顆粒 経口懸濁液用	0.37MG		
	経口 顆粒 懸濁液用	35.70MG		
	経口 パウダー 経口懸濁液用	40.00%		
	経口 パウダー 懸濁液用	9.00%		
	経口 懸濁液	0.10%		
	経口 錠剤	27.00MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	2.11MG		
	経口 錠剤, 被覆	10.57MG		
	経口 錠剤, 制御放出	2.46MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION	7.80MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	358.00MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	15.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	7.93MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	12.50MG		
	経口 錠剤, 多層構造, 徐放	1.10MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	3.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	358.00MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	4.17MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	3.00MG		
	経口 21; 錠剤	0.12MG		
	経口 21; 錠剤, 被覆	0.27MG		
	経口 28; 錠剤	1.17MG		
	経口 28; 錠剤, 被覆	0.27MG		
	局所; 乳液, クリーム	2.00%	一般外用剤 90mg/g	
	局所; 軟膏	5.00%		
	局所; シャンプー, 懸濁液	3.00%		
TOCOPHEROL	局所; 軟膏	0.00002	経口投与	93mg
			一般外用剤	1mg/g
			直腸腔尿道適用	4mg
TRAGACANTH	口腔/舌下 錠剤	5.00MG	経口投与	1.92g
	経口 パウダー FOR 懸濁液	24.00%	その他の内用	10mg
	経口 懸濁液	1.33%	一般外用剤	適量
	経口 懸濁 徐効	2.25%	舌下適用	50mg/g
	経口 錠剤	4.00MG	直腸腔尿道適用	20mg/mL
	経口 錠剤, 被覆	7.50MG	歯科外用及び口中用	100mg
TRIACETIN	経口 カプセル	1.08MG	経口投与	21.6mg
	経口 カプセル, 被覆 丸薬	1.20MG	一般外用剤	300mg/g
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	5.10MG	歯科外用及び口中用	120mg/g
	経口 カプセル, 徐効	2.76MG		
	経口 錠剤	3.70MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	0.72MG		

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
	経口 錠剤, 被覆	1.00MG		
	経口 錠剤, 制御放出	2.00MG		
	経口 錠剤, 徐放性, 腸溶性 被覆	6.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	1.39MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	15.12MG		
	経口 錠剤, 徐効	1.96MG		
	経皮, 貼布	22.10MG		
TRIETHYL CITRATE	経口 カプセル	8.90MG	経口投与	152.8mg
	経口 カプセル, 徐放性ACTION	3.84MG		
	経口 カプセル, 腸溶性 被覆 丸薬	9.16MG		
	経口 カプセル, 徐放	15.03MG		
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	4.00MG		
	経口 カプセル, 徐効	7.50MG		
	経口 カプセル, 徐効, 硬ゼラチン	3.30MG		
	経口 顆粒 FOR 経口懸濁液	6.94MG		
	経口 錠剤	13.19MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	2.80MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION	4.80MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	20.17MG		
	経口 錠剤, 徐放	1.97MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	3.60MG		
	経口 錠剤, 口腔内崩壊, 徐放性	18.70MG		
	経口 錠剤, 復効	0.90MG		
	経口 錠剤, 徐効	1.60MG		
	経口 錠剤, 徐効, 被覆	2.31MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	0.50MG		
TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN	経口 カプセル	159.97MG	経口投与	適量
	経口 溶液	94.46%	静脈内注射	360mg/kg
	舌下 定量用スプレー	3.66%	舌下適用	100mg/g
	局所; クリーム, 増加された	1.37%	一般外用剤	300mg/g
	局所; クリーム, 乳液, 徐放	1.37%	直腸腔尿道適用	977mg
	局所; 乳液, クリーム	15.00%		
	局所; ゲル	1.00%		
TTRISODIUM CITRATE	筋肉 静脈; I注射	0.02%	筋肉内注射	112mg
	筋肉 静脈; 溶液	0.02%	皮下注射	100mg
	静脈; I注射	0.02%	静脈内注射	1765mg
	静脈; 注射	0.63%	動脈内注射	300mg
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	23.52%	脊椎腔内注射	12.5mg
	静脈; 溶液, 注射	0.57%	その他の注射	300mg、
	硝子体内; 懸濁 注射	0.17%	一般外用剤	7mg/g
	鼻; 溶液, 噴霧	0.06%	経皮	5mg/g
	眼; 溶液	0.30%	眼科用剤	8.5mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	0.29%	耳鼻科用剤	10mg/g
	経口 溶液	1.00%	経口投与	微量
	経口 懸濁液	0.10%	歯科外用及び口中用	1mg/g
	経口 錠剤	110.00MG	その他の外用	15mg/g
	局所; ローション	0.32%	皮内注射	0.25mg
	局所; 溶液	0.30%	吸入剤	15mg
	筋肉 静脈; I注射	0.02%		
	筋肉 静脈; 溶液	0.02%		
	静脈; I注射	0.02%		
	静脈; 注射	0.63%		
	静脈; パウダー 注射 溶液用, 凍結	23.52%		
	静脈; 溶液, 注射	0.57%		
	硝子体内; 懸濁 注射	0.17%		
	鼻; 溶液, 噴霧	0.06%		
	眼; 溶液	0.30%		
	眼; 溶液, 点滴剤	0.29%	殺虫剤	
TROLAMINE (トリエタノールアミン)	局所; エアロゾル, 定量	1.00%	静脈内注射	30mg
	局所; 乳液	0.50%	一般外用剤	40mg/g
	局所; 乳液, クリーム	1.00%	舌下適用	3mg/g
	局所; ゲル	1.00%		
	局所; ローション	31.70%		
	経皮; ゲル	0.35%		
	腔; 乳液, クリーム	0.75%	殺虫剤	

添加物(INACTIVE INGREDIENT)	アメリカ		日本	
	投与経路／剤型	投与量	投与経路	投与量
TROMETHAMINE(トロメタモール)	筋肉 静脈; I注射	1.10%	筋肉内注射	2.44mg
	筋肉 静脈; 注射, 溶液	1.21%	脊椎空内注射	121 μ g
	動脈内; 注射	0.24%	動脈内注射	60.5mg
	筋肉; 注射	0.10%	皮内注射	2.54 μ g
	脈管内; 注射	1.00%		
	静脈; I注射	1.20%	静脈内注射	266.20mg
	静脈; 注射	1.00%		
	静脈(点滴); 注射	5.00E-05		
	静脈(点滴); パウダー注射 懸濁用	1.21%		
	静脈(点滴); 溶液, 注射	0.12%		
	眼; 溶液	0.93%	眼科用剤	200mg/mL
	眼; 溶液, 点滴剤	0.75%		
	眼; 溶液, ゲル形成, 徐放	0.80%		
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	15.00MG		
	(吸入); 溶液, 吸入用	0.01%		
	皮下; 注射	0.60%	皮下注射	2.4mg
	局所; ゲル	0.80%		
	局所; 溶液	8.40%		
	経皮; ゲル	0.10%		
	尿道; 溶液	0.12%		
TYLOXAPOL	眼; 溶液	0.10%	眼科用剤	0.25mg/g
	眼; 溶液, 点滴剤	0.10%		
	眼; 懸濁液	0.30%		
	眼; 懸濁 点滴剤	0.30%		
	局所; 懸濁液	0.05%		
UREA	経口 錠剤, 被覆	0.01MG	静脈内注射	50mg
	腔; 乳液, クリーム	0.64%	筋肉内注射	40mg
	腔; 錠剤	50.00MG	皮下注射	50mg
			一般外油剤	50mg/g
VANILLIN	経口 パウダー FOR 懸濁液	0.66%	経口投与	60mg
	経口 溶液	0.25%	歯科外用及び口中用	1mg/g
	経口 溶液, エリキシル剤	1.40E-05		
	経口 懸濁液	0.50%		
	経口 錠剤	1.50MG		
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	2.50MG		
	経口 錠剤, 被覆	65.50MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION	0.80MG		
	経口 錠剤, 徐放性ACTION, 腸溶	1.16MG		
	経口 錠剤, 腸溶性 被覆 粒子 S	0.70MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	0.78MG		
	経口 錠剤, 徐効	3.40MG		
	経口 錠剤, 徐効, フィルム 被覆	0.80MG		
VEGETABLE OIL,	経口 カプセル	82.00MG	経口投与	2.8g
	経口 カプセル, 硬ゼラチン	261.00MG	一般外用剤	80mg/g
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	82.80MG	経皮	28.8mg
	経口 カプセル, 軟ゼラチン 液体-	2.09MG	直腸腔尿道適用	5.38g
	経口 錠剤	40.00MG	歯科外用及び口中用	210mg
	経口 錠剤 (即時型／複合型リリー	8.00MG		
	経口 錠剤, 被覆	2.00MG		
	経口 錠剤, 徐放	20.00MG		
	経口 錠剤, フィルム 被覆	33.00MG		
	経口 錠剤, 徐効	228.50MG		
	直腸; 坐薬	2026.50MG		
	局所; 乳液, クリーム	72.00%		
	腔; 乳液, クリーム	72.00%		
	腔; 坐薬	2400.00MG		
VITAMIN E (トコフェロール)	口腔; フィルム, 溶解(性)	0.07MG	経口投与	93mg
	経口 カプセル	1.00MG	一般外用剤	1mg/g
	経口 カプセル, 軟ゼラチン	1.00MG	直腸腔尿道適用	4mg
	経口 溶液	0.10%		
	経口 錠剤	0.03MG		
	経口 錠剤, 徐効	1.34MG		
	経口 21; 錠剤	0.10MG		
	経口 28; 錠剤	0.10MG		