

Table 4. The weight average of the SI value and the variance component τ^2

Code	Chemical	Low-dose		Middle-dose		High-dose	
		SI	τ^2	SI	τ^2	SI	τ^2
A	Nickel sulfate	1.79	0.000	2.17	0.000	2.96	0.016
B	Isopropanol	1.08	0.144	0.89	0.000	0.99	0.044
C	Eugenol	1.79	0.169	3.05	0.049	4.20	0.201
D	trans-Cinnamic aldehyde	1.24	0.000	2.46	0.017	3.64	0.000
E	2,4-Dinitrochlorobenzene	4.87	0.345	6.98	0.315	7.40	0.255
F	Glutaraldehyde solution	2.11	0.787	3.60	0.864	5.99	1.661
G	Methyl salicylate	1.27	0.008	1.25	0.000	1.31	0.000
H	Hexylcinnamic aldehyde	1.82	0.073	2.83	0.006	4.14	0.231
I	Lactic acid	1.25	0.000	1.90	0.000	1.97	0.000
J	Formaldehyde solution	2.46	0.154	2.44	0.245	3.56	1.279

The variance component τ^2 represents the interlaboratory variance for the log-transformed SI, which is obtained by decomposing the total variance into the between variance and within variance by performing meta-analysis with a random effect model. Since τ^2 indicates variance, its value is greater than 0, and a higher value indicates greater inter-laboratory variation.

Table 5. Judgement based on the SI values greater than 2 for LLNA:BrdU-ELISA and the referenced values for LLNA and GPMT/BT in this study

Code	Chemical	LLNA	GPMT/BT	Laboratory						
				1	2	3	4	5	6	7
A	Nickel sulfate	-	+			+	+			+
B	Isopropanol	-	-	-	-	-	-	-	+	-
C	Eugenol	+	+		+				+	+
D	trans-Cinnamic aldehyde	+	+		+		+	+	+	
E	2,4-Dinitrochlorobenzene	+	+	+	+	+	+	+	+	+
F	Glutaraldehyde solution	+		+				+	+	
G	Methyl salicylate	-	-	-	-	-				
H	Hexylcinnamic aldehyde	+	+	+		+	+	+	+	+
I	Lactic acid	-	-			-	-			+
J	Formaldehyde solution	+	+	+				+	-	

dinitrochlorobenzene) were tested by all seven laboratories; it was observed that the SI value of the inter-laboratory variation was small and that the dose-response relationships were similar. These results indicate that LLNA:BrdU-ELISA is a robust technique using the revised protocol.

We did not change the criteria for the positive control in any phase. Data were accepted only when the SI value on the positive control group was equal to or greater than 2. When the SI for the positive control was less than 2, the sensitivity of the test was considered to be inadequate.

The cut-off value of the SI was determined on the basis of the prior examinations. During our validation studies, the value was prespecified and was not changed. We did not intend to optimize the value because the number of chemicals was too limited. The sensitivity, specificity and accuracy in Table 7 were estimated using the SI cut-off value, which showed high relevance. From the above discussion, we derived the current recommendation about the acceptance criteria on the assay as follows.

Final Recommended Acceptance and Positive Criteria

The target mean absorbance for negative control (vehicles) is 0.1–0.2. To set achieve these values, every laboratory should

decide its own optimal target volume of LN cell suspension in advance. The values for the treatment groups are divided by the mean absorbance of the control group to determine the SI values for each treatment group. When the positive control produces an $SI \geq 2$, the data derived from the test substances that are tested concurrently are accepted. If any concentration of the test substance yields $SI \geq 2$, the substance is identified as a sensitizer.

The phase II study also presented certain limitations. First, the results are representative of only 10 chemicals. The variance component τ^2 represents the inter-laboratory variance for the log-transformed SI, which is obtained by decomposing the total variance into the between variance and within variance by performing meta-analysis with a random effect model. Since τ^2 indicates variance, its value is greater than 0, and a higher value indicates greater inter-laboratory variation. The chemicals used in the present studies were selected from a wide range of chemicals, and their skin sensitization potentials were determined by the application of the LLNA method. Further, the precision of the measure of relevance was low because only 10 chemicals were tested by this assay method; therefore, even a difference in only a single chemical would affect the sensitivity. Since the study demonstrated the strong reliability of the assay, further assessments

Table 6. EC2 and chemical classification in this study

Code	Chemical	EC2	LLNA:BrdU-ELISA	EC3	LLNA	Classification
			Classification			
A	Nickel sulfate	2.2	Positive	–	Negative	
B	Isopropanol	–	Negative	–	Negative	
C	Eugenol	12.0	Positive	12.9	Weak	
D	Cinnamic aldehyde	2.2	Positive	3.1	Moderate	
E	2,4-Dinitrochlorobenzene	<0.1	Positive	0.04	Extreme	
F	Glutaraldehyde solution	<0.1	Positive	0.1	Extreme	
G	Methyl salicylate	–	Negative	–	Negative	
H	Hexylcinnamic aldehyde	12.0	Positive	8.4	Moderate	
I	Lactic acid	–	Negative	>25	Negative	
J	Formaldehyde solution	<0.1	Positive	0.7	Strong	

The EC2 for LLNA:BrdU-ELISA is based on the weighted average. The SI values obtained for chemical E (2,4-dinitrochlorobenzene) with LLNA:BrdU-ELISA were greater than 2 for all the doses; however, since the dose-response relationship yielded a v-shaped curve, the EC2 could not be determined.

Although the weighted averages of the SI values were greater than 2 for all the doses, the EC2 and classification were determined because the dose-response relationship exhibited a v-shaped curve.

Table 7. Sensitivity, specificity, accuracy, positive predictivity and negative predictivity in the study

	Sensitivity	Specificity	Accuracy	Positive predictivity	Negative predictivity
LLNA:BrdU-ELISA vs GPMT/BT	100.0% (6/6)	100.0% (3/3)	100.0% (9/9)	100.0% (6/6)	100.0% (3/3)
LLNA:BrdU-ELISA vs. LLNA	100.0% (6/6)	75.0% (3/4)	90.0% (9/10)	85.7% (6/7)	100.0% (3/3)

For LLNA:BrdU-ELISA, the judgment was based on the weighted average of the SI values. For LLNA and GPMT/BT, judgments were based on the referenced data.

using other known chemicals should be conducted in other studies.

Another limitation is with regard to the quality of the data. It was extremely difficult to ensure complete compliance with GLP in these studies. However, although the experiments involved in the studies were not conducted in complete accordance with GLP, the format file for data recording of individual experiments was devised at the planning stage of the study, and the data files collected for all the experiments complied with this format. Furthermore, since all the data used for the analyses were based on the database, if required, we can provide for review the database regarding the BrdU labeling index obtained for the individual animals with the standard protocol that was used.

Many researchers have provided considerable evidence for the reliability of LLNA. Several inter-laboratory studies on LLNA have been reported, but they did not necessarily employ the same protocol; additionally, these studies were conducted by approximately five experimental laboratories (Baskettter *et al.*, 1991; Kimber *et al.*, 1991, 1995, 1998; Loveless *et al.*, 1996; Scholes *et al.*, 1992). On the other hand, limited evidence is available for the reliability of LLNA:BrdU-ELISA. Since the methods involved in LLNA:BrdU-ELISA and the original LLNA are essentially identical, the results of our study, which tested coded chemicals using a standardized protocol, provide adequate evidence in support of LLNA:BrdU-ELISA as an alternative assay method to original LLNA.

In conclusion, this study provides valuable evidence for the reliability of LLNA:BrdU-ELISA. Unlike LLNA, LLNA:BrdU-ELISA measures the BrdU incorporation. It is a simple method for measuring the BrdU using ELISA and it yields quick results. In addition, this method assesses cell-turnover with the same endpoint, lymphocyte proliferation, as in the original LLNA by measuring the incorporation of the thymidine analog BrdU using ELISA. Thus, the principle and study design of the LLNA:BrdU-ELISA and the original LLNA are basically the same. Taken together, these facts indicate that the LLNA:BrdU-ELISA is a promising new version LLNA.

Acknowledgment

This study was partially supported by a grant from the Ministry of Health, Labour and Welfare (principal investigator: Yasuo Ohno) and Japanese Society for Alternatives to Animal Experiments. We would like to express our appreciation to the editors and the reviewers of the original manuscript, who made insightful suggestions that improved the clarity of the presentation.

REFERENCES

- Baskettter DA, Scholes EW. 1992. Comparison of the local lymph node assay with the guinea-pig maximization test for the detection of a range of contact allergens. *Food Chem. Toxicol.* **30**: 65–69.

- Baskett DA, Scholes EW, Kimber I, Botham PA, Hilton J, Miller K. 1991. Interlaboratory evaluation of the local lymph node assay with 25 chemicals and comparison with guinea pig test data. *Toxicol. Meth.* **1**: 30–43.
- Baskett DA, Gerberick GF, Kimber I, Loveless SE. 1996. The local lymph node assay: a viable alternative to currently accepted skin sensitization tests. *Food Chem. Toxicol.* **34**: 985–997.
- Baskett DA, Gerberick GF, Kimber I. 1998. Strategies for identifying false positive responses in predictive skin sensitization tests. *Food Chem. Toxicol.* **36**: 327–333.
- Baskett DA, Lea LJ, Cooper KJ, Ryan CA, Gerberick GF, Dearman RJ. 1999a. Identification of metal allergens in the local lymph node assay. *Am. J. Contact Dermat.* **10**: 207–212.
- Baskett DA, Lea LJ, Dickens A, Briggs D, Pate I, Dearman RJ, Kimber I. 1999b. A comparison of statistical approaches to the derivation of EC3 values from local lymph node assay dose responses. *J. Appl. Toxicol.* **19**: 261–266.
- Baskett DA, Blaikie L, Dearman RJ, Kimber I, Ryan CA, Gerberick GF, Harvey P, Evans P, White IR, Rycroft RJ. 2000. Use of the local lymph node assay for the estimation of relative contact allergenic potency. *Contact Dermat.* **42**: 344–348.
- Baskett DA, Evans P, Fielder RJ, Gerberick GF, Dearman RJ, Kimber I. 2002. Local lymph node assay—Validation, conduct and use in practice. *Food Chem. Toxicol.* **40**: 593–598.
- Baskett DA, Casati S, Gerberick GF, Griem P, Philips B, Worth A. 2005. Skin sensitisation. *Altern. Lab. Anim.* **33**(suppl. 1): 83–103.
- Dean JH, Twedok LE, Tice RR, Sailstad DM, Hattan DG, Stokes WS. 2001. ICCVAM evaluation of the murine local lymph node assay. II. Conclusions and recommendations of an independent scientific peer review panel. *Regul. Toxicol. Pharmacol.* **34**: 258–273.
- Dearman RJ, Hilton J, Baskett DA, Kimber I. 1999. Cytokine endpoints for the local lymph node assay: Consideration of interferon- γ and interleukin 12. *J. Appl. Toxicol.* **19**: 149–155.
- Durand G, De Burlet G, Virat M, Nauman BD. 2003. Use of the local lymph node assay in the evaluation of the sensitizing potential of pharmaceutical process intermediates. *Contact Dermat.* **49**: 148–154.
- Ehling G, Hecht M, Heusener A, Huesler J, Gamer AO, van Loveren H, Maurer T, Riecke K, Ullmann L, Ulrich P, Vandebriel R, Vohr HW. 2005a. An European inter-laboratory validation of alternative endpoints of the murine local lymph node assay: first round. *Toxicology* **212**: 60–68.
- Ehling G, Hecht M, Heusener A, Huesler J, Gamer AO, van Loveren H, Maurer T, Riecke K, Ullmann L, Ulrich P, Vandebriel R, Vohr HW. 2005b. An European inter-laboratory validation of alternative endpoints of the murine local lymph node assay: 2nd round. *Toxicology* **212**: 69–79.
- FDA. 2002. *Guidance for Industry—Immunotoxicology Evaluation of Investigational New Drugs*.
- Gad SC, Dunn BJ, Dobbs DW, Relly C, Walsh RD. 1986. Development and validation of an alternative dermal sensitization test: the mouse ear swelling test (MEST). *Toxicol. Appl. Pharmacol.* **84**: 93–114.
- Gerberick GF, Ryan CA, Kimber I, Dearman RJ, Lea LJ, Baskett DA. 2000. Local lymph node assay: validation assessment for regulatory purposes. *Toxicology* **11**: 3–18.
- Gerberick GF, Ryan CA, Kern PS, Dearman RJ, Kimber I, Patlewicz GY, Baskett DA. 2004. A chemical dataset for evaluation of alternative approaches to skinsensitization testing. *Contact Dermat.* **50**: 274–288.
- Haneke KE, Tice RR, Carson BL, Margolin BH, Stokes WS. 2001. ICCVAM evaluation of the murine local lymph node assay. III. Data analyses completed by the national toxicology program interagency center for the evaluation of alternative toxicological methods. *Regul. Toxicol. Pharmacol.* **34**: 274–286.
- Hastings KL. 2001. Pre-clinical methods for detecting the hypersensitivity potential of pharmaceuticals: regulatory considerations. *Toxicology* **158**: 85–89.
- Hatao M, Hariya T, Katsumura Y, Kato S. 1995. A modification of the local lymph node assay for contact allergenicity screening: measurement of interleukin-2 as an alternative to radioisotope-dependent proliferation assay. *Toxicology* **98**: 15–22.
- ICCVAM. 2009. *Independent Scientific Peer Review Panel Report: Updated Validation Status of New Versions and Applications of the Murine Local Lymph Node Assay: A Test Method for Assessing the Allergic Contact Dermatitis Potential of Chemicals and Products*. National Institute of Environmental Health Sciences: Research Triangle Park, NC.
- Idehara K, Yamagishi G, Yamashita K, Ito M. 2008. Characterization and evaluation of amodified local lymph node assay using ATP content as a non-radio isotopic endpoint. *J. Pharmacol. Toxicol. Meth.* **58**: 1–10.
- Kimber I. 2001. The local lymph node assay and potential application to the identification of drug allergens. *Toxicology* **158**: 59–64.
- Kimber I, Hilton J, Botham PA, Baskett DA, Scholes EW, Miller K, Robbins MC, Harrison PT, Gray TJ, Waite SJ. 1991. The murine local lymph node assay: Results of an inter-laboratory trial. *Toxicol. Lett.* **55**: 203–213.
- Kimber I, Hilton J, Dearman RJ, Gerberick GF, Ryan CA, Baskett DA, Lea L, House RV, Ladics GS, Loveless SE, Hastings KL. 1998. Assessment of the skin sensitization potential of topical medicaments using the local lymph node assay: an interlaboratory evaluation. *J. Toxicol. Environ. Health A* **53**: 563–579.
- Lee JK, Park JH, Park SH, Kim HS, Oh HY. 2002. A nonradioisotopic endpoint for measurement of lymph node cell proliferation in a murine allergic contact dermatitis model, using bromodeoxyuridine immunohistochemistry. *J. Pharmacol. Toxicol. Meth.* **48**: 53–61.
- Loveless SE, Ladics GS, Gerberick GF, Ryan CA, Baskett DA, Scholes EW, House RV, Hilton J, Dearman RJ, Kimber I. 1996. Further evaluation of the local lymph node assay in the final phase of an international collaborative trial. *Toxicology* **108**: 141–152.
- Normand SLT. 1999. Meta-analysis: Formulating, evaluating, combining, and reporting. *Stat. Med.* **18**: 321–359.
- OECD. 1992. *Organization for Economic Co-operation and Development – OECD Guidelines for Testing of Chemicals. No. 406: Skin Sensitization*.
- OECD. 2002. *Organization for Economic Co-operation and Development – OECD Guidelines for Testing of Chemicals. No. 429: Skin Sensitization: Local Lymph Node Assay*.
- OECD. 2005. *Organization for Economic Co-operation and Development – OECD Series on Testing and Assessment. No. 34: Guidance Document on the Validation and International Acceptance of New or Updated Test Methods for Hazard Assessment*.
- Omori T, Sozu T. 2007. Variance of the stimulation index for the local lymph node assay. *AATEX* **12**: 321–359.
- Omori T, Idehara K, Kojima H, Sozu T, Arima K, Goto H, Hanada T, Ikarashi Y, Inoda T, Kanazawa Y, Kosaka T, Maki E, Morimoto T, Shinoda S, Shinoda N, Takeyoshi M, Tanaka M, Uratani M, Usami M, Yamanaka A, Yoneda T, Yoshimura I, Yuasa A. 2008. Interlaboratory validation of the modified murine local lymph node assay based on adenosine triphosphate measurement. *J. Pharmacol. Toxicol. Meth.* **58**: 11–26.
- Sailstad DM, Hattan D, Hill RN, Stokes WS. 2001. ICCVAM evaluation of the murine local lymph node assay. I. The ICCVAM review process. *Regul. Toxicol. Pharmacol.* **34**: 249–257.
- Scholes EW, Baskett DA, Sarll AE, Kimber I, Evans CD, Miller K, Robbins MC, Harrison PT, Waite SJ. 1992. The local lymph node assay: results of a final inter-laboratory validation under field conditions. *J. Appl. Toxicol.* **12**: 217–222.
- Takeyoshi M, Yamasaki K, Yakabe Y, Takatsuki M, Kimber I. 2001. Development of non-radio isotopic endpoint of murine local lymph node assay based on 5-bromo-2'deoxyuridine (BrdU) incorporation. *Toxicol. Lett.* **119**: 203–208.
- Takeyoshi M, Iida K, Shiraishi K, Hoshuyama S. 2005. Novel approach for classifying chemicals according to skin sensitizing potency by non-radioisotopic modification of the local lymph node assay. *J. Appl. Toxicol.* **5**(2): 129–134.
- Takeyoshi M, Noda S, Yamasaki K. 2006. Advantage of using CBA/N strain mice in a non-radioisotopic modification of the local lymph node assay. *J. Appl. Toxicol.* **26**(1): 5–9.
- Yamashita K, Idehara K, Fukuda N, Yamagishi G, Kawada N. 2005. Development of a modified local lymph node assay using ATP measurement as an endpoint. *AATEX* **11**: 136–144.

動物実験の3Rにおける国内外の動向

National and International trends of 3Rs in animal experiments



小島 肇夫

国立医薬品食品衛生研究所
安全性生物試験研究センター
薬理部 新規試験法評価室 室長

要約

There is slow, steadily progressing the movement of 3Rs (to Replace them with non-sentient alternatives, to Reduce to a minimum the number of animals used, and to Refine experiments which used animals so that they caused the minimum pain and distress) of animal experiments in Japan.

The Japan Health Sciences Foundation established the Center for Accreditation of Laboratory Animal Care and Use in 2007. With the purpose of assessing and verifying compliance with the "Basic Guidelines for Proper Conduct of Animal Testing and Related Activities in the Research Institutions under the Jurisdiction of the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW)", the objective of the center is to promote the optimum

enforcement of scientific animal testing. Other Jurisdiction systems have been established by successive in Japan.

On the other hand, MHLW created the Japanese Center for the Validation of Alternative Methods (JaCVAM) at the National Institute of Health Sciences (NIHS) in 2005. JaCVAM has promoted the 3Rs in animal experiments for the evaluation of chemical substance safety and established guidelines for new alternative experimental methods through international collaboration for 5 years. Many Japanese colleagues have supported JaCVAM activities by performing validation studies and peer reviews and by providing regulatory acceptance for new alternative experimental methods. Furthermore, we must push forward with international harmonization efforts in accordance with the International Cooperation on Alternative Test Methods (ICATM) framework, which was organized in April, 2009. We think that developments and continued activities of these centers are key contributions in 3Rs.

We expect these Japanese activities may contribute to the International harmonization in 3Rs.

キーワード：

動物実験代替法、代替法、バリデーション、第三者評価、3R

1. 国内の動向 -1-

1.1 「動物愛護及び管理に関する法律の改訂」および関連指針

昭和 48 年（1973）に制定された「動物の愛護及び管理に関する法律（以後、「動物愛護法」と記す）」が 2006 年（平成 18 年）6 月、環境省より施行され、第 41 条「動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等が改訂された¹⁾。これまでの、「できる限り動物に苦痛を与えない方法によって実験を行わなければならないこと」に加え、「できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮することとする」と記載された。さらに、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」が環境省より告示された²⁾。その基本的な考え方には、動物を科学上利用することは必要不可欠であるので、3R（Reduction：実験動物の削減、Refinement：実験動物の苦痛の軽減、Replacement：実験動物の置き換え）を徹底するために、適正な飼養および保管並びに科学上の利用に努めることが記載されている。加えて、環境省は平成 18 年 10 月「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」を定めた³⁾。この中では、実験動物の適正な取扱いの推進について述べられている。

これらを受け、同時に文部科学省⁴⁾、厚生労働省⁵⁾、農林水産省⁶⁾が関連「研究機関等における実験動物の実施に関する基本指針」を告示した。動物実験責任者の責務、動物実験委員会の設置、機関内規定の策定、動物実験計画の承認、データの信頼性を確保する観点から、適切な動物実験方法の選択、動物実験等の施設および設備を踏まえて動物実験計画を立案し、適正に実施することが記載されている。実験方法の選択には動物実験代替法（以下、「代替法」と記す）の利用、実験動物の選択、苦痛の軽減への配慮が明記されている。

さらに、同時期に日本学術会議は「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」を示している⁷⁾。動物愛護法の基本指針を踏まえて、各研究機関が動物実験等に関する規定を整備するに際してモデルとなる共通ガイドラインを作成した。この他にも、日本実験動物学会、日本薬理学会、日本トキシコロジー学会、日本生理学会、日本神経科学会、日本実験動物協会などがそれぞれに指針を示している⁸⁾。

さて、動物愛護法には附則第 9 条において、「政府は、この法律の施行 5 年後を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされている。これに基づけば、平成 23 年度を目指して施行状況を検討し、必要であれば法改正を行うことになる。実際、中央環境審議会動物愛護部会において、動物愛護

管理法見直しに向けた議論が平成22年6月より進んでいる⁹⁾。この中で、実験動物の福祉が議題にあがっており、どのような追加記載がなされるのか注目していきたい。ただし、混同がないように、用語を正確に区別しておきたい。環境省が扱っているものは、「実験動物」であり、一方、その他省庁が扱っているのは、「動物実験」である。改訂が検討されているものは、「実験動物」であり、「動物実験」の規制が今後どう改正されるのか定かでない。

ところで、5年前の動愛法の改訂にあたり、3Rの原則が導入された理由について考えてみたい。これについては、鍵山が興味深い記述を残している¹⁰⁾。すなわち、3Rは国際原則であり、先進国で3Rを法令で謳っていない国は日本以外に見当たらなかつたこと、研究論文のレフエリーの指摘事項の背景に3Rの原則の非明文化があつたこと、我が国の製薬会社は欧米からアウトロー呼ばわりされ、国際展開に苦戦していたことがその理由であると記載している。日本の3Rの必要性は、動物福祉のためでなく、国際社会の中での生き残り、科学水準や国際経済力の維持のためのようである。今回の動愛法の改正によつても、この考え方を中心であろう。

1.2 動物実験施設の第三者認証機関

日本学術会議の「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」には、実験動物等の適正化に必要な教育訓練、自己点検・評価および検証ならびに情報公開に関する記述がある⁷⁾。この自己点検・評価には、「当該機関以外の者による検証を行うことを考慮する」と示されている。この検証機関として、米国ではAAALAC (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care) が国際認証ができる組織としてよく知られているが¹¹⁾、日本ではこれまで当該機関以外の者が評価する公的な仕組みがなかつた。この当該機関以外の者による審査を担当する組織として、2007年、財団法人ヒューマンサイエンス振興財団が第三者認証機関を設立し¹²⁾、公私立大学実験動物施設協議会、国立大学法人動物実験施設協議会¹³⁾、日本動物実験協同組合¹⁴⁾など複数の認証制度においても審査が進んでいる。日本においても本格的な当該機関以外の者による検証が始まったことを意味している。

2. 国際動向

これまで説明してきた動愛法や動物福祉問題はすべて欧米にその起源が遡る。そこで、我が国の現状を客観的にみるために、欧米諸国の仕組みについて確認しておきたい。

2.1 EUの動向

欧米諸国には、前述した「実験動物」と「動物実験」の線引きはない。例えば、英国はAnimal Actで3つの免許制度を導入している¹⁵⁾。実験実施施設の指定、実験者の免許、実験計画の審査および免許の交付である。ところが、この法律はEUの法律と比べ表現が弱いとされており、2013年には改訂を予定している。このEUの法律とは、欧州議会が、EUの研究室で使用されている年間1200万以上の実験動物を規定するEU指令609-86に代わる新しいものであり、2010年9月に改正案の採用が決議され、ヨーロッパの多くの加盟国に、動物実験の水準向上を促した¹⁶⁾。以下が特記すべき事項である。

- チンパンジーなどの類人猿の使用禁止（一部の例外を除く）。
- 事前の倫理的・科学的な評価の権威化。

- 実験動物のすべてのブリーダー、サプライヤー、ユーザが、機器や動物のケージの選択およびトレーニング等に関する法令の順守。

- EUと加盟国レベルにおける医学研究や教育などを含むすべての分野での、非動物の方法の開発および推進。

このようなEUの思想、法律的な問題が経済にまで波及した事例が、化粧品開発における動物実験の規制問題¹⁷⁾およびリーチ法 (REACH : Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals) 問題である¹⁸⁾。

化粧品の規制に関しては、2003年に化粧品指令7次改正が公布され、2009年3月に代替法が確立されている試験がある場合には、①EU域内での動物試験の完全禁止、②動物試験した製品、動物試験をした原料を含む製品の販売禁止が決められている¹⁷⁾。さらに、EU委員会は、期限内の開発が困難と判断された試験法の場合には、2013年まで延長する法案を提出している。これに対応すべく、EUでは欧州化粧品工業会 (COLIPA : European Trade Association for the Cosmetic, Toiletry and Perfumery Industry)¹⁹⁾と欧州代替法評価センター (ECVAM : European Centre for the Validation of Alternative Methods)²⁰⁾が共同で試験法の開発、バリデーションおよび専門家による第三者評価（以後、第三者評価と記す）を進めている。

一方、REACHとはすでにEU市場に流通している約3万の化学物質に関し、その製造・輸入を行う事業者は、その安全性データなどを揃え、登録することが義務づけられる規制を指す。登録、評価、認可、制限の総称である¹⁸⁾。この背景にはEUで化学品会社が27,000社（売上額590 billion €）あり、170万人の従業員、国際市場の33%を占めている事情がある一方、職業性皮膚炎の治療費に3 million €／日、約600 million €／年が必要であるとともに、既存化学物質86%の毒性データが不足していることに端を発している²¹⁾。この安全性評価はハザードベースではなく、リスクベース（ハザードと曝露評価）を中心である、2009年までに事前登録された約18万の化学物質について、70%の試験を2017年までに実施しなければならない。実験を行う場合にはITS (Integrated Testing Strategies) という戦略に従い、Read-acrossという関連物質情報の調査、構造活性相関 (QSAR : Quantitative Structure-Activity (またはAffinity) Relationship) などのin silicoの利用、代替法を優先せざるを得ないと記されている。1t以上の製造／輸入物質には代替法により有害性を同定する。さらに製造量が増えるにつれて、曝露評価まで求められており、動物実験を有効に使っていかねばならない²²⁾。

ただし、新規代替法が開発されても、例えば、経済協力開発機構 (OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development) テストガイドラインなどに²³⁾、受け入れられるためには10年が掛かると言われており、これまで通りの方法では2017年までには多くの新規試験法を用意できない。新規試験法に求められるものは、化学物質等の安全・安心の確保であり、代替が第一優先ではない。新規試験法の採用においては、各分野の専門家により、適用範囲や再現性、正確性などの視点で慎重に議論されねばならないからである。そこで、類似した試験法については、既存試験法の性能標準 (performance standard)に基づいたバリデーションにより、REACHのために“適切な”方法を短期間で選択するme-tooバリデーションという方策が検討されている²³⁾。

2.2 米国における動向

アメリカにおいては、実験動物はAnimal Welfare Act²⁴⁾、動物




図 1. 試験法の公定化の過程

実験は Health Research Extension Act で規制されている²⁵⁾。これらを国立科学アカデミー (NAC : National Academy of Sciences) 傘下の実験動物研究協会 (ILAR : Institute for Laboratory Animal Research) が関係省庁の支援を受けて、実験動物の管理および使用に関する指針を編集し、実験動物および動物実験の倫理・科学的な自主管理を促している²⁶⁾。以上のような状況は、日本に近い。ただし、その詳細は大きく異なっている。一番大きな相違点は、獣医師の役割である。日本学術会議のガイドラインでは、獣医師の役割は少ないが、ILAR の指針では、実験動物を専門とする獣医師が科学と動物福祉の推進役として定められている。また、前述した AAALAC の国際認証なども厳しいものであると聞いている。

2.3 國際協調機関

このような動物実験の 3R は欧米主導ということもあり、OECD、世界動物保健機関 (OIE : World Organisation for Animal Health)、日米 EU 医薬品規制調和国際会議 (ICH : International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use)、動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力会議 (VICH : International Cooperation on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Veterinary Products)、化粧品国際規制会議 (ICCR : International Cooperation on Cosmetics Regulations)、国際標準化機構 (ISO : International Organisation for Standardization) などの規制に関わる国際協調機関においても 3R に関する声明を出している。これらの中で、OECD では、今後提案されるテストガイドライン案には 3R の精神が盛り込まれることを望んでおり²⁷⁾、代替法や動物実験でも複数の試験を組み合わせたガイドラインが増えている。OIE の実験動物福祉綱領では、

加盟国に実験動物福祉に関する法的整備を勧告している²⁸⁾。ICH では、動物実験数削減の可能性もテーマの一つとしてあげられており、*in vitro* 試験の議論も少しずつはあるが、増えている²⁹⁾。比較的知名度が低い ICCR とは、厚生労働省、米国医薬食品庁 (FDA : Food and Drug Administration)、カナダ厚生省 (Health Canada) および欧州委員会企業産業総局により 2007 年 9 月に設立された化粧品規制のための国際的な協力会議である。その具体的な議題の一つとして、EU の動物実験事情に国際的に対応するため、「化粧品成分の安全性評価と代替法」が挙げられている²⁹⁾。

2.4 代替法のための国際機関

代替法の開発の中で、化学物質等の安全性試験の公定化には厳密な国際ルールが作られている。これが 2005 年に発行された OECD ガイダンス文書 (Guidance Document : GD) No. 34 である³⁰⁾。この文書の中には、今後、新規試験法が公定化される場合のバリデーションや第三者評価に関する手順、手法が記載されている。すなわち、図 2 に示すように³¹⁾、新規試験法が公定化されるにはバリデーションや第三者評価、行政的な受け入れのための評価を経なければいけない。ところが、図 1 に示すように、バリデーションや第三者評価を実施すると言っても、正確性や再現性の確認に種々の過程を要する。ましてやバリデーションの実施や実行委員会の構築にはノウハウが多い。第三者評価においても種々の専門家への要請、公的な認証までの手順を考慮する必要がある。そこで、このガイドラインに先立ち、世界各地にバリデーションセンターが設立された。1990 年代に米国では NICEATM (The National Toxicology Program Interagency Center for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods) / ICCVAM (Interagency Coordinating Committee on the Validation of




図2. 公的な試験法ができるまで

Alternative Methods)³²⁾、欧州には ECVAM が設立された²⁰⁾。これらのセンターの役割はそれぞれ法律で規定されており、代替法への関与を肅々と進めている。さらに、遅れて 2009 年には韓国³³⁾とブラジル³⁴⁾にもバリデーションセンターが設立された。いよいよ国際的なバリデーションセンター時代の幕開けである。これらセンターの混乱を避ける理由もあり、2009 年 4 月には代替試験法協力国際会議 (ICATM : International Cooperation on Alternative Test Methods) が設立され³⁵⁾、代替法の開発に国際協調の重要性が謳われている。この ICATM が設立された理由は、限られた人・物量的な資源の中、それぞれのセンターが重複した検討を避け、代替法研究を加速することにある。

ただ、欧米のセンターは米国の Alternative Research & Development Foundation³⁶⁾、CAAT (Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing)³⁷⁾ や EU 内の各国の専門機関 FRAME (Fund for

the Replacement of Animals in Medical Experiments)³⁸⁾、NCA (Netherlands Center for Alternatives to animal use)³⁹⁾、NC3R (UK National Center for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research)⁴⁰⁾ や ZEBET (German Center for the Documentation and Evaluation of Alternatives to Animal Experiments)⁴¹⁾、EPAA (European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing)⁴²⁾ というような歴史ある助成機関や代替法専門研究機関を下地にしており、我が国と研究者の層が違うことを認識しておかねばならない。

2.5 代替法に関する欧米の取り組み

2004 年以降、多くの代替法が OECD でテストガイドラインとして認められるようになった。表 1 に示すように、2001 年以降に認められた動物実験の 3R に関する試験法を示す。光毒性試験⁴³⁾、腐食性試験⁴⁴⁻⁴⁶⁾などである。

化粧品の規制を考慮に入れ、2008 年には、三つの局所刺激性試験のガイドライン案が OECD に提出された²³⁾。一つは培養表皮モデル EPIISKIN を用いた *in vitro* 皮膚刺激性試験である。ECVAM 科学諮問委員会 (ESAC : ECVAM Scientific Advisory Committee) の認証を経て⁴⁷⁾、EU から OECD に提出された。さらに、ESAC は他の培養表皮モデル EpiDerm や SkinEthics をも認証し⁴⁸⁾、これらを合わせ、2010 年にテストガイドライン No. 439 として承認されている⁴⁹⁾。

後の二つは眼刺激性試験代替法 BCOP (Bovine Corneal Opacity/Permeability Assay : 牛摘出角膜混濁試験) および ICE (Isolated Chicken Eye Assay : 鶏摘出眼球試験) である。いずれも腐食性・強い眼刺激性を検出できる方法として ICCVAM から提案され⁵⁰⁾、ECVAM も認証した⁵¹⁾。これら代替法は異例の早さで 2009 年 9 月に OECD テストガイドラインとなつた^{52,53)}。昨今では、これらの素材に病理学的な評価を組合せ、弱い刺激性を評価しようというガイダンスが検討中である²³⁾。さらに、ECVAM では眼刺激性試験の代替法として、過去に実施された細胞毒性試験 (ニュートラルレッド放出試験、赤血球試験、蛍光物質放出およびマイクロフィジオロメーターの各試験) の回顧的なバリデーションを行い、ESAC は 2009 年 7 月、蛍光物質放出試験およびマイクロフィジオロメーター試験を限定的な使用で認証した⁵⁴⁾。これらの試験法は、OECD テストガイドラインとして検討されること

表1 2001年以降成立した動物実験3Rに関するOECDテストガイドライン(TG)

Method	International Acceptance
CORROSITEX Skin Corrosivity Test	OECD TG 435 (2006)
EpiSkin Skin Corrosivity Test	OECD TG 431 (2004)
EpiDerm Skin Corrosivity Test	OECD TG 431 (2004)
SkinEthic RHE Skin Corrosivity Test	OECD TG 431 (2004)
EST-1000 Skin Corrosivity Test	OECD TG 431 (2004)
Rat TER Skin Corrosivity Test	OECD TG 431 (2004)
<i>In vitro</i> reconstructed human epidermis test methods	OECD TG 439 (2010)
EpiDerm, EPIISKIN, SkinEthic RHE	
3T3 NRU Phototoxicity Test	OECD TG 432 (2004)
Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) Test Method	OECD TG 437 (2009)
Isolated Chicken Eye (ICE) Test Method	OECD TG 438 (2009)

Method	International Acceptance
Updated Murine local lymph node assay (LLNA) for skin sensitization (20% reduction)	OECD TG 429 (2010)
Reduced LLNA (rLLNA)	OECD TG 429 (2010)
Nonradioactive LLNA protocol, LLNA : BrdU-ELISA	OECD TG 442B (2010)
Nonradioactive LLNA protocol, LLNA : DA	OECD TG 442A (2010)
Up and Down Procedure (UDP)	OECD TG 425 (2001)
<i>In vitro</i> micronucleus test	OECD TG 487 (2010)
Fixed Dose Procedure (FDP)	OECD TG 420 (2001)
Acute Toxic Class Method (ATC)	OECD TG 423 (2001)
Inhalation toxicity - acute toxic class method	OECD TG 436 (2009)
Stably transfected human estrogen receptor- α transcriptional activation assay for detection of estrogenic agonist-activity of chemicals	OECD TG 455 (2009)




図3. JaCVAMの試験法評価システム

が2010年3月に決まっている²³⁾。なお、次のステップとして、EpiOcular、SkinEthicsなどの培養角膜モデルのバリデーションが進捗中である。

もう一つの開発を急がねばならない代替法である急性毒性試験については、ICCVAMから細胞毒性試験で急性毒性試験の最高適用濃度を定めるという第三者評価報告書⁵⁵⁾が2009年、OECDに提案され、2010年にガイダンスとして承認されている⁵⁶⁾。

また、*in vitro*皮膚感作性試験代替法のプレバリデーションがECVAMで始まった²⁰⁾。本試験の代替法として、ペプチド結合試験⁵⁷⁾および細胞株を用いた試験が挙がっており⁵⁸⁻⁶⁰⁾、株式会社資生堂および花王株式会社が日本化粧品工業連合会の有志やCOLIPAの協力を得て開発を進めてきたヒト細胞株活性化試験(Human Cell Line Activation Test : h-CLAT)をも含めた検討が、2010年3月に開始された²³⁾。

一方、10年以上前に問題となった環境ホルモンの検出(スクリーニング)を指標としたガイドラインがStably Transfected Human Estrogen Receptor-alpha Transcriptional Activation Assay for Detection of Estrogenic Agonist(STTA) NO.455が2009年に成立し⁶¹⁾、H295R Steroidogenesis Assayの成立が2011年に予定されている²³⁾。

繰り返しになるが、これら試験法の開発を支えているものは、EUや米国における研究資金である。EPAAという政府と産業界が資金を出し合う団体にて、適切な資金・資源の提供を通して、代替法の開発やバリデーションを加速し、安全性評価のための代替法の行政による承認の迅速化を目指している⁴²⁾。また、動物愛護国際協会(Humane Society International)の支援も貢献度が高い⁶²⁾。現在でも、これら団体等によりEUでの第7次の研究支援がな

されており、さらにAXLR8(accelerate)という第三者評価により、研究が推進されている⁶³⁾。

一方、米国においても、NASは21世紀の毒性試験の中で、“包括的な*in vitro*試験の利用は、ヒトの生物学に基づいた細胞や分子システムと関連する生物学的挙動を明確にし、最終的には、作用機構を基にしたアプローチにより、動物実験の必要性を排除できるかもしれない”と述べている⁶⁴⁾。

また、米国毒性プログラム(NTP: National Toxicology Program)により開発およびバリデートされた試験方法は動物実験の3Rを可能にする。NTPのロードマップの活動と試験法は、規制当局への価値を最大化するため、ICCVAMとの協力および協議を促すと述べている⁶⁵⁾。さらに、米国環境省(EPA: Environmental Protection Agency)、米国環境健康科学研究所(NIEHS: National Institutes of Environmental Health Sciences)、米国衛生研究所(NIH: National Institutes of Health)／米国ヒトゲノム研究所(NCGC: NIH Chemical Genomics Center)およびFDAが進めているToxCastというプロジェクトでは⁶⁶⁾、化学物質のリスク評価のためのツールとして、ハイスループットシステムを検討している。特に、EPAの戦略では、1) 将来の化学物質のスクリーニングや優先順位付けのための毒性経路情報の利用、2) リスク評価における毒性経路情報の利用、3) 技術移転を主眼としている。

3. 国内の動向 -2-

さて、欧米の状況から世界の潮流を理解して頂いたところで、もう一度、国内の動向、特に代替法に特化して説明していきたい。

3.1 日本動物実験代替法学会の動向

日本動物実験代替法学会は⁶⁷⁾、設立されて20年を越える世界で初めて設立されたの代替法に関する学会である。これまで、日本でも眼刺激性、皮膚刺激性、感作性、光毒性試験などの代替法についてバリデーションや第三者評価を行ってきた⁶⁸⁾。これらの内容はレベルの高いものであり、欧米での評価は高い。

2007年8月に第6回国際動物実験代替法会議(6th World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Sciences: WC6)⁶⁹⁾、2008年2月にWC6フォローアップをいすれも東京で開催し⁷⁰⁾、日本国内での盛り上がり以上に日本の活動に対する国際的な評価が高い。大会の内容も世界のトップレベルに近いものであったと感じている。ただし、残念ながら、日本は世界の代替法研究の中心にはいない。よって、その情報は欧米から遠く、高い代替法開発の技術を持ちながら、その技術を利用して、世界のニーズに対応させるという戦略が欠けているようである。

3.2 代替法のための機関

欧米の組織と同様、日本においても置き換えや動物数の削減につながる新規または改良代替法の開発・評価のために、2005年11月に国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター内に新規試験法評価室が設立された⁷¹⁻⁷⁴⁾。この部署の業務の一つが新規または改良試験法の評価という活動である。この活動を我々はJaCVAM (Japanese Center for the Validation of Alternative Methods) と呼んでいる⁷⁵⁾。JaCVAMの活動目的は、1) 日本における動物実験の3Rの普及、2) 国際協調を重視した新規動物実験代替法の公定化である。その試験法検証のための組織を図3に示す。試験法毎にバリデーション、ワーキンググループ、第三者評価の組織を構築し、それらの報告書を受け、行政的な受け入れ評価を行い、公定化に支障のない試験法を行政機関に提案している。残念ながら、JaCVAMは欧米のセンターのような法的な裏付けを持たず、永続的な活動ではない。しかし、ICATMの主要メンバーとして国際的な期待および、その評価は高い。これは、日本人の本分野における活躍への期待が大きいからと認識している。具体的に言えば、試験法の開発・改良、バリデーションへの参画は日本人に向いており、現時点では研究者層は薄くとも、代替法研究の加速を期待させるからを感じている。

3.3 JaCVAMの活動

3Rの国際動向に応えるため、JaCVAMでは、眼刺激性、皮膚刺激性、感作性、光毒性試験などの代替法について、日本独自のバリデーションや第三者評価を実施してきた。これまでJaCVAMが承認し、行政に提案した試験法を表2にまとめた。また、現在関与しているバリデーションを表3に記載した。これらの情報はJaCVAMホームページで逐次更新しており、最新情報を入手してほしい⁷⁵⁾。以下には昨今、大きな進歩がある安全性試験法を紹介する。

1) 腐食性、皮膚刺激性試験

腐食性試験の代替法として、日本製の培養皮膚モデル Vitrolife-Skin の正当性を JaCVAM 評価会議が認証した⁷⁶⁾。

また、皮膚刺激性試験の代替法として ESAC により認証された培養表皮モデル EPISKIN について⁷⁷⁾、JaCVAM 皮膚刺激性評価委員会が ESAC の認証内容を確認し、JaCVAM 評価会議が認証した⁷⁷⁾。一方、日本製の培養表皮モデル LabCyt EPI-MODEL (株式会社 J-TEC) については⁷⁸⁾、2008-2009年に日本動物実験代替法学会

表2 JaCVAM 評価会議によって認証された動物実験代替法

No.	Test Method
1	<i>In vitro</i> skin corrosion testing : Vitrolife-Skin, EpiDerm
2	The Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) Test Method for Identifying Ocular Corrosives and Severe Irritants
3	The Isolated Chicken Eye (ICE) for Identifying Ocular Corrosives and Severe Irritants
4	Skin sensitization assay, LLNA : DA
5	Skin sensitization assay, LLNA : BrdU-ELISA
6	<i>In vitro</i> skin irritation testing : EPISKIN

表3 JaCVAM が実験に参加している国際バリデーション研究

試験法	終了予定期	参加施設	目標
遺伝毒性試験 <i>In vivo</i> コメットアッセイ	2011年秋	14施設(内、日本からは4施設)	OECDテストガイドライン
遺伝毒性試験 <i>In vitro</i> コメットアッセイ	不明	7施設(内、日本からは1施設)	OECDテストガイドライン
発癌性試験スクリーニング Bhas形質転換試験	2010年10月 終了	3施設(すべて国内)	OECDテストガイドライン
内分泌かく乱試験スクリーニング STTA-antagonistアッセイ	2011年3月	3施設(内、日本から2施設)	OECDテストガイドライン
内分泌かく乱試験スクリーニング CClアッセイ	2011年1月	3施設(内、日本から1施設)	OECDテストガイドライン
皮膚刺激性試験 LabCyt EPI-MODEL	2010年12月 終了	3施設(すべて国内)	OECDテストガイドライン
眼刺激性試験 STE法	2010年12月 終了	3施設(すべて国内)	未定
光毒性試験 ROSアッセイ	2011年	未定(すべて国内)	ICHガイドライン
皮膚感作性試験 h-CLAT	2011年	4施設(内、日本から2施設)	EU認証

会で実施されたバリデーションおよび2010年のJaCVAM主導の追加バリデーションにおいて、EPISKINと同程度の予測性を持つことが検証された。LabCyt EPI-MODELについてはOECDガイドラインへの掲載を目指している。

2) 眼刺激性試験

BCOPやICEについても、JaCVAM眼刺激性評価委員会がICCVAMの認証内容を確認し、JaCVAM評価会議が認証した⁵⁰⁾。さらに、1998年に厚生労働科学研究補助金を得て作成された「細胞毒性試験による眼刺激性試験代替法のガイドライン」について^{79,80)}、上記評価委員会にて第三者評価が進行している。また、株式会社花王で開発された細胞毒性試験STE(Short Time Exposure)⁸¹⁾のバリデーションが日本動物実験代替法学会およびJaCVAM主催で実施された。

3) 感作性試験

日本が提案したリンパ節中のATP量の変化を指標としたLLNA-DA法⁸²⁾やBrdUの取り込みを指標としたLLNA-BrdU ELISA法⁸³⁾が、JaCVAM評価会議で認証されるとともに^{84,85)}、2010年にOECDテストガイドラインとなつた^{86,87)}。一方、前述したよう

に、h-CLAT^{58,59} のバリデーション研究を ECVAM とともに実施している。

4) 光毒性試験

活性酸素種 (Reactive oxygen species : ROS) を指標とした光毒性試験が光毒性の予測に有用であるとの報告を受け⁸⁸、日本製薬工業会の支援を受け、バリデーションを実施している。なお、資生堂株式会社にて酵母・赤血球を用いた光毒性試験の組合せ法は⁸⁹⁻⁹¹、JaCVAM 評価会議でバリデーション結果が不十分と判断されている⁹²。

5) 遺伝毒性試験

コメツアッセイについては⁹³、日本環境変異原学会／哺乳類変異原性(MMS)研究会、欧米の研究機関と協力して国際的なバリデーションを進めている。*in vivo* 試験に関しては、最終的なバリデーションの段階にある。*in vitro* 試験に関しては、プロトコルを固めるプレバリデーションの段階にある。

また、イニシエーションに加え、プロモーターも検出できる形質転換試験法 Bhas アッセイについては⁹⁴、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)プロジェクトでデータ化され、OECD にテストガイドラインとしての申請を行っている²³。

6) 内分泌かく乱物質スクリーニング

前述したテストガイドライン STTA 法は⁶¹、化学物質評価研究機構(CERI)によって開発された。現在では、このテストガイドラインにアンタゴニストの評価系も加えるべく、バリデーションを実施している。

また、同様に CERI および大塚製薬株式会社によって開発されたアンドロゲンの検出試験においても、テストガイドライン案を OECD に提出している²³。

7) 急性毒性試験

日本薬局方には、プラスティック容器の品質管理のため、急性毒性試験に代わり、細胞毒性試験を推奨している⁹⁵。さらに、ゴム製品の品質管理のために細胞毒性試験の利用を検討している⁹⁶。

8) 発熱性物質試験

欧州薬局方 (European Pharmacopoeia : EP) に掲載された主にヒト血液を用いる *in vitro* 試験に関しては⁹⁷、バリデーション結果が不十分と、ICCVAM⁹⁸ および JaCVAM 評価会議で判断されている⁹⁹。

4. 終わりに

動物福祉問題イコール、3R である。ただ、実験動物に携わる方々とお話ししていく感じるのは、3R を持ち出せば、とりあえず既得権を確保できる、免罪符という発想である。確かに、獣医師も Refinement の面では福祉的な配慮をされているが、削減や置換の知識やその方策を全くお持ちでないことに愕然とする。上記してきたように、公定な代替法の開発には多額の経費と長い時間が掛かることさえも知らない方が多い。欧米の追随でなく、「動物実験 3R は日本にとって得意芸に近い分野であり、国際的な信用を高め、ビジネスチャンスをつかむ好機である」というように発想を変えて頂きたいものである。欧米の期待を横目で見ながら、手を挙げている時間はない。既存の殻を破るために、皆さんの技術を世界に広めるために、今後も JaCVAM 活動に努めてきたいと考えている。

謝辞

バリデーションを進めるにあたり、日本動物実験代替法学会、厚生労働科学研究からの支援に感謝致します。また、試験法の評価に協力頂きましたすべての JaCVAM 関係者に感謝致します。

[参考文献]

- 1) 動物の愛護及び管理に関する法律 (2010) Available at: http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/amend_law2/law.pdf
- 2) 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛軽減に関する基準 (2006) Available at: http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/nt_h180428_88.html
- 3) 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針 (2006) Available at: http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/guideline_h181031.pdf
- 4) 文部科学省 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針 (2010) Available at: http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/060609_04.htm
- 5) 厚生労働省 厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針 (2010) Available at: <http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/doubutsu/0606sisin.html>
- 6) 農林水産省 農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針 (2010) Available at: http://www.maff.go.jp/www/press/2006/20060601press_2b.pdf
- 7) 日本学術会議 動物実験の適正な実施に向けたガイドライン (2010) Available at: <http://www.sci.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-k16-2.pdf>
- 8) 重茂浩美, “動物実験に関する近年の動向、科学技術動向”, 2006, 10-20.
- 9) 中央環境審議会動物愛護部会 (2010) Available at: <http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14.html>
- 10) 鍵山直子, “動物愛護管理法における3R原則の明文化と実験動物の適正な飼養保管”, 日獸会誌, 2010, 395-398.
- 11) AAALAC International Association (2010) Available at: <http://www.aaalac.org/>
- 12) 佐々木弥生 (2008) Available at: http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsaae/WC6_followup/WC6_Follow_Sasaki.pdf
- 13) 大学法人動物実験施設協議会 (2010) Available at: <http://www.kokudoukyou.org/annai/>
- 14) 日本動物実験協同組合 (2010) Available at: <http://www.labanimal.org/freme.html>
- 15) United Kingdom Protection of Animals Act (2000) Available at: <http://www.veggieglobal.com/protection-of-animals-act-uk.htm#2000>
- 16) Update on the revision of EU lab animal laws (2010) Available at: <http://www.rspca.org.uk/ImageLocator/LocateAsset?asset=document&assetId=1232720902775&mode=prd>
- 17) Commission Staff Working Documents; Time Tables for the phasing-out of animal testing in the framework of the 7th Amendment to the Cosmetics Directive (Council Directive 76/768/EEC); EN, SEC82004)1210 (2004).
- 18) ECH (2008) Available at: http://ec.europa.eu/echa/home_en.html
- 19) COLIPA (2010) Available at: <http://www.colipa.eu/about-colipa-the-european-cosmetic-cosmetics-association.html>
- 20) ECVAM (2010) Available at: <http://ecvam.jrc.ec.europa.eu/>
- 21) T. Hartung, (2006) Available at: <http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsaae/20kai.html>
- 22) JRC (2010) Available at: http://www.vet.uu.nl/nca/userfiles/other/REACH_and_the_need_for_intelligent_testing_strategies.pdf#search='Integrated%20Testing%20Strategies%20REACH'
- 23) OECD (2010) Available at: http://www.oecd.org/document/55/0,3343,en_2649_34377_2349687_1_1_1,1,00.html

- 24) Animal Welfare Act, Available at: http://awic.nal.usda.gov/nal_display/index.php?info_center=3&tax_level=3&tax_subject=182&topic_id=1118&level3_id=6735&level4_id=0&level5_id=0&placement_default=0
- 25) Health Research Extension Act, Available at: <http://grants.nih.gov/grants/oalaw/references/hrea1985.htm>
- 26) ILRA (2010) Available at: <http://dels.nas.edu/ilar/>
- 27) OIE (2010) Available at: http://www.oie.int/eng/bien_etre/en_introduction.htm
- 28) Y. Ohno, *ILAR Journal*, **2002**, 43, s95-98.
- 29) 厚生労働省 (2010) Available at: <http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0814-1.html>
- 30) OECD (2005) OECD Series on testing and assessment Number 34, Guidance document on the validation and international acceptance of new or updated test methods for hazard assessment, *ENJ/JM/MONO* (2005) 14
- 31) ICCVAM (1997) Validation and regulatory acceptance of toxicological test methods: a report of the ad hoc Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods. *NIH Publication No: 97-3981*, 1997, National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)
- 32) ICCVAM (2010) Available at: http://iccvam.niehs.nih.gov/docs/ocutox_docs/EReport/ocu_report.htm
- 33) KoCVAM (2010) Available at: <http://www.nifds.go.kr/nitr/contents/m91100/view.do>
- 34) O. A. Presgrave, *Altern Lab Anim.*, **2008**, 36(6), 705-8.
- 35) ICATM (2010) Available at: <http://iccvam.niehs.nih.gov/about/icatm.htm>
- 36) Alternative Research & Development Foundation (2010) Available at: <http://www.ardf-online.org/>
- 37) CAAT (2010) Available at: <http://caat.jhsph.edu/>
- 38) FRAME (2010) Available at: <http://www.frame.org.uk/>
- 39) NCA (2010) Available at: <http://www.nca-nl.org/>
- 40) NC3R (2010) Available at: <http://www.nc3rs.org.uk/>
- 41) ZEBET (2010) Available at: <http://www.bfr.bund.de/cd/1591>
- 42) EPAA (2010) Available at: http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/index_en.htm
- 43) OECD (2004) Test Guideline NO. 432: *in vitro* 3T3 NRU phototoxicity testing. OECD Guideline for the Testing of Chemicals. Paris, France.
- 44) OECD (2004) Test Guideline No. 430: *In Vitro* Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical Resistance Test (TER), OECD Guideline for the Testing of Chemicals. Paris, France.
- 45) OECD (2004) Test Guideline No. 431: *In Vitro* Skin Corrosion: Human Skin Model Test, OECD Guideline for the Testing of Chemicals. Paris, France.
- 46) OECD (2006) Test Guideline No. 435: *In Vitro* Membrane Barrier Test Method for Skin Corrosion, OECD Guideline for the Testing of Chemicals. Paris, France.
- 47) ECVAM (2007) Statement on the validity of *in-vitro* tests for skin irritation, issued by the ECVAM Scientific Advisory Committee (ESAC26), 27 April 2007. Available at: <http://ecvam.jrc.ec.europa.eu/>
- 48) ECVAM (2008) Statement on the scientific validity of *in-vitro* tests for skin irritation testing, issued by the ECVAM Scientific Advisory Committee (ESAC29), 5 November 2008. Available at: <http://ecvam.jrc.ec.europa.eu/>
- 49) OECD (2010) Test Guideline No. 439: *In Vitro* Skin Irritation Reconstructed Human Epidermis Test Method, OECD Guideline for the Testing of Chemicals. Paris, France.
- 50) ICCVAM (2010) Available at: <http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/ocutox/ocutox.htm>
- 51) ESAC (2009) Statement on the Conclusions of the ICCVAM Retrospective Study on Organotypic *In Vitro* Assays as Screening Tests to Identify Potential Ocular Corrosives and Severe Irritants.
- 52) OECD (2010) Test Guideline No. 437: Bovine Corneal Opacity and Permeability Test Method for Identifying Ocular Corrosives and Severe Irritants, OECD Guideline for the Testing of Chemicals. Paris, France.
- 53) OECD (2010) Test Guideline No. 438: Isolated Chicken Eye Test Method for Identifying Ocular Corrosives and Severe Irritants, OECD Guideline for the Testing of Chemicals. Paris, France.
- 54) ESAC (2009) ESAC statement on the scientific validity of two *in vitro* eye irritation test methods.
- 55) ICCVAM (2010) Available at: <http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/acutetox/acutetox.htm>
- 56) OECD (2010) No 129: Guidance Document on using Cytotoxicity Tests to Estimate Starting Doses for Acute Oral Systemic Toxicity Tests, OECD Guideline for the Testing of Chemicals. Paris, France.
- 57) G. F. Gerberic, J. D. Vassallo, R. E. Bailey, J. G. Chaney, S. W. Morral and J. P. Lepoittevin, *Toxicol. Science*, **2004**, 81, 332-343.
- 58) T. Ashikaga, Y. Yoshida, M. Hirota, K. Yoneyama, H. Itagaki, H. Sakaguchi, M. Miyazawa, Y. Ito, H. Suzuki and Toyoda, *Toxicol in Vitro*, **2006**, 767-773.
- 59) H. Sakaguchi, T. Ashikaga, M. Miyazawa, Y. Yoshida, Y. Ito, K. Yoneyama, M. Hirota, H. Itagaki, H. Toyoda and H. Suzuki, *Toxicol in Vitro*, **2006**, 774-784.
- 60) P. Aeby, T. Ashikaga, S. Bessou-Touya, A. Schepky, F. Gerberick, P. Kern, M. Marrec-Fairley, G. Maxwell, J. M. Ovigne, H. Sakaguchi, K. Reisinger, M. Tailhardat, S. Martinuzzi-Teissier and P. Winkler, *Toxicol in Vitro*, **2010**, 24(6), 1465-73.
- 61) OECD (2009) Test Guideline Test No. 455: The Stably Transfected Human Estrogen Receptor-alpha Transcriptional Activation Assay for Detection of Estrogenic Agonist-Activity of Chemicals, OECD Guideline for the Testing of Chemicals. Paris, France.
- 62) Humane Society International (2010) Available at: <http://www.hsi.org.au/>
- 63) AXLR8 (2010) Available at: <http://www.axlr8.eu/workshops/>
- 64) National Research Council (2007) Toxicity Testing in the 21st century, A vision and a strategy, The National Academies Press, Washington, D.C., USA
- 65) A National Toxicology Program for the 21st century (2010) Available at: <http://ntp.niehs.nih.gov/files/NTPrdmp.pdf>
- 66) ToxCast (2010) Available at: <http://www.epa.gov/ncct/toxcast/summit.html>
- 67) 日本動物実験代替法学会 (2010) Available at: <http://www.asas.or.jp/jsaae/>
- 68) 小島肇夫, *LAB/O21*, **2009**, 38, 17-20.
- 69) Proceedings of 6th World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Sciences, *Altern. Animal Test. EXperiment*, **2008**, 14, Special Issue.
- 70) WC6 フォローアップシンポジウム「3Rsに基づく動物実験の規制と第三者認証」抄録集 (2008).
- 71) 大野泰雄, 国立衛研報, **2004**, 122, 1-10.
- 72) 小島肇夫, 化粧品技術者会誌, **2006**, 40(4), 263-268.
- 73) 小島肇夫, 薬学雑誌, **2008**, 128(5), 747-752.
- 74) 小島肇夫, コスマティックステージ, **2010**, 4(5), 56-61.
- 75) JaCVAM (2010) Available at: <http://jacvam.jp/>
- 76) JaCVAM 提案書 (2008) 腐食性試験代替法: 「3次元培養ヒト皮膚モデル (Vitrolife-skinTM) を用いた腐食性試験」.
- 77) JaCVAM 提案書 (2009) 皮膚刺激性試験代替法: 「ヒト皮膚モデル (三次元皮膚 EPISKIN) を用いた皮膚刺激性試験代替法」.
- 78) M. Katoh, F. Hamajima, T. Ogasawara and K. I. Hata, *Journal of Toxicological Science*, **2009**, 34(3), 327-334.
- 79) Y. Ohno, et al., *Toxicology in Vitro*, **1999**, 13, 73-98.
- 80) 大野泰雄他, *Altern. Animal Test. EXperiment*, **2005**, 10(2), 54-157.
- 81) Y. Takahashi, M. Koike, H. Honda, Y. Ito, H. Sakaguchi, H. Suzuki and N. Nishiyama, (2008) *Toxicology in Vitro*, **2008**, 22, 760-770.
- 82) K. Yamashita, K. Idehara, N. Fukuda, M. Yamagishi and N. Kawada,

Altern. Animal Test. Experiment, **2005**, 11(2), 136-144.

- 83) M. Takeyoshi, K. Yamasaki, Y. Yakabe and I. Kimber, *Toxicol. Lett.*, **2001**, 119, 203-208.
- 84) JaCVAM 提案書(2008)皮膚感作性試験代替法：「皮膚感作性試験代替法(LLNA-DA 法)」
- 85) JaCVAM 提案書(2009)皮膚感作性試験代替法：「皮膚感作性試験代替法(LLNA-BrdU)」
- 86) OECD (2010) Test Guideline Test No. 442A: Skin Sensitization Local Lymph Node Assay: DA, OECD Guideline for the Testing of Chemicals. Paris, France.
- 87) OECD (2010) Test Guideline Test No. Test No. 442B: Skin Sensitization Local Lymph Node Assay: BrdU-ELISA, OECD Guideline for the Testing of Chemicals. Paris, France.
- 88) S. Onoue, N. Igarashi, Y. Yamauchi, S. Yamada and Y. Tsuda, *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, **2008**, 46(1), 187-93.
- 89) M. Sugiyama, H. Itagaki, T. Hariya, N. Murakami and S. Kato, *Altern. Animal Test. Experiment*, **1994**, 2, 183-191.
- 90) M. Sugiyama, H. Itagaki and S. Kato, (1994) *Altern. Animal Test. Experiment*, **1994**, 2, 193-202.
- 91) M. Mori, M. Hoya, M. Sugiyama and H. Itagaki, *Altern. Animal Test. Experiment*, **2003**, 10(1), 1-17.
- 92) JaCVAM 評価報告書(2010)光毒性試験代替法：「酵母光生育阻害試験と赤血球光溶血性試験の組み合わせによる光毒性試験代替法」
- 93) R. R. Tice, E. Agurell, D. Anderson, B. Burlinson, A. Hartmann, H. Kobayashi, Y. Miyamae, E. Rojas, J. C. Ryu, Y. F. Sasaki, *Environ Mol Mutagen.*, **2000**, 35(3), 206-21.
- 94) A. Sakai, C. Suzuki, Y. Masui, A. Kuramashi, K. Takatori and N. Tanaka, *Mutat Res.*, **2007**, 630(1-2), 103-11.
- 95) 柏植英哉, 森 充生, 大庭澄明, 大内 正, 寺田三郎, 五島隆志, 田邊豊重, 山影康次, 田中穂穂, 渡辺美香, 畑上二郎, 大向英夫, 小島 肇, 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス, 2011.
- 96) 厚生省薬務局医療機器開発課監修, “医療用具および医用材料の基礎的な生物学的試験のガイドライン解説”, 薬事日報社, 東京, 1996.
- 97) Bacterial Endotoxin, European Pharmacopoeia 5.0, **2005**, 161-168.
- 98) ICCVAM (2010) Available at: <http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/pyrogen/pyrogen.htm>
- 99) JaCVAM 評価報告書(2010) *in vitro* 発熱性物質試験。

略歴

名前：小島 肇(ペンネーム：小島 肇夫) Hajime Kojima, Ph.D.
 学位：薬学博士
 所属・役職：国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター 薬理部 新規試験法評価室 室長
 藤田保健衛生大学 医学部 客員講師
 連絡先：〒158-8501 東京都世田谷区上用賀1-18-1
 TEL: 03-3700-9874 FAX: 03-3700-1145
 e-mail: h-kojima@nihs.go.jp

生年月日：昭和35年4月9日生（50歳）

略歴：昭和58年 岐阜大学・農学部農芸科学科卒業
 同年 日本メナード化粧品株式会社入社
 昭和59～61年 国立遺伝学研究所・形質遺伝部留学
 平成8年 長崎大学薬学部にて博士号取得
 平成17年 国立医薬品食品衛生研究所 入所

専門：毒性学、変異原性、組織培養

学会活動：
 ・日本動物実験代替法学会 評議員、理事、副会長
 ・日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会 評議員
 ・日本環境変異原学会 評議員
 ・日本トキシコロジー学会
 ・安全性評価研究会
 ・日本動物細胞工学会
 ・Society of Toxicology

国際協力

- ・ESAC (ECVAM: European Center for the Validation of Alternative Methods Scientific Advisory Committee), observer
- ・SACATM (Scientific Advisory Committee on Alternative Toxicological Methods, USA), observer
- ・ICH Center for the Validation Alternative Methods, observer
- ・ICCR Center for the Validation Alternative Methods, observer
- ・OECD Endocrine Disrupter Working Group, non-animal, observer
- ・OECD Test Guideline, National Coordinator

賞罰

- ・日本動物実験代替法学会 1998年論文賞受賞
- ・日本動物実験代替法学会 2000年論文賞受賞
- ・日本動物実験代替法学会 2003年論文賞受賞

香粧品パッチテスト 2007年のまとめ

廣川 景子¹⁾, 亀山 梨奈¹⁾, 中川真実子¹⁾, 井上 智子¹⁾, 安部 正通¹⁾
稻葉弥寿子¹⁾, 山北 高志¹⁾, 森 敏恵²⁾, 鈴木加余子³⁾, 松永佳世子¹⁾

要　旨

[目的] 2007年の香粧品による接触皮膚炎の動向について検討した。

[方法] 2007年に香粧品による接触皮膚炎を疑い、パッチテスト(PT)を行った61例を解析対象とした。PTは患者が持参した香粧品、ジャパニーズスタンダードシリーズ、原因に関連した当科常備のアレルゲンを48時間貼布し、72時間または1週間後にInternational Contact Dermatitis Research Group基準(ICDRG基準)で+以上を陽性とした。

[結果] PTで陽性となり臨床症状と関連性があると診断した症例は10例であった。PTで陽性となった製品は染毛剤、口紅、保湿クリーム、UVクリーム、シャンプーがおのおの2例、ファンデーションが1例であった。

[結論] 2007年は当院において新製品の出現による新たなアレルゲンは認めなかった。

(J Environ Dermatol Cutan Allergol. 4 (2) : 89-98, 2010)

キーワード：接触皮膚炎、パッチテスト、香粧品、ジグリセリルオリゴエステル、ヘアダイ

はじめに

香粧品とは人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗布、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人に対する作用が緩和なものと定義されている（薬事法第2条第3項）。時代の流れに応じて、新しい化学物質を含んださまざまなか粧品が開発されており、香粧品による接触皮膚炎の原因アレルゲンも変遷することが考えられる。

これまで、香粧品による接触皮膚炎の動向を検討するために1992～1994年¹⁾、1995～1998年²⁾、2006年³⁾の当科における香粧品による接触皮膚炎のまとめを報告してきた。今回は、2007年に当科で香粧品による接触皮膚炎を疑い、パッチテスト(PT)を施行した61症例について検討したので報告する。

対象および試験方法

対　象：2007年1月から12月までに当科で香粧品による接触皮膚炎および口唇炎を疑ってPTを施行した患者61例を対象とした。

試　料：

患者が持参した香粧品 シャンプー、リンス、トリートメント、ボディソープは1%水溶液を用い、その他の製品はそのまま貼布した。染毛剤、パーマ液はオープンテストを施行した。

スタンダードアレルゲン、ヘアケア製品・ヘアダイ関連アレルゲンおよび化粧品関連アレルゲン スタンダードアレルゲンはジャパニーズスタンダードシリーズを55例に貼布した（Table 1）。また、ヘアケア製品や香粧品による接触皮膚炎を疑った症例では、それぞれ当科で常備しているヘアケア製品、ヘアダイ関連アレルゲンを8例、香粧品に関連したア

¹⁾ 藤田保健衛生大学皮膚科

〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98

²⁾ 久留米大学皮膚科

³⁾ 刈谷豊田総合病院皮膚科

連絡先：廣川 景子

掲載決定日：2009年8月24日

Table 1 : Japanese standard series

Allergens	Conc./veh.
Cobalt chloride	1% pet
Nickel sulfate	2.5% pet
Potassium dichromate	0.5% pet
Thiuram mix	1% pet
Black rubber mix	0.6% pet
Mercapto mix	2% pet
Caine mix	7% pet
Neomycin sulfate	20% pet
Balsam of Peru	25% pet
Rosin	20% pet
Fragrance mix	8% pet
Dithiocarbamate mix	2% pet
Paraben mix	15% pet
PPD	1% pet
Lanolin alcohol	30% pet
PTBP-FR	1% pet
Ethylenediamine 2HCl	1% pet
Primin	0.01% pet
Urushiol	0.002% pet
Thimerosal	0.05% pet
Ammoniated mercuric chloride	0.05% pet
Formaldehyde	1% aq
Kathon CG	0.01% aq
Gold sodium thiosulfate	0.5% pet

PPD: *p*-phenylenediaminePTBP-FR: *p*-tertiary-butylphenol formaldehyde resin

aq: aqueous solution

pet: petrolatum

レルゲンを 26 例に貼布した (Table 2, 3)。

方法および判定 : Finn chamber® (EPITEST Ltd. Oy. Hyryla Finland) on Scanpor® (Actavis Norway AS) を用いて、患者の背部または上腕内側に試料を 48 時間閉鎖貼布した。ユニット除去 1 時間後に 1 回目の判定 (48 時間判定) を行い、その 24 時間後に 2 回目の判定 (72 時間判定)、1 週間後に 3 回目の判定を行った。判定には ICDRG 基準を用い、72 時間または 1 週間後に + 以上であったものを陽性とした⁴⁾。

結 果

香粧品による接触皮膚炎および口唇炎を疑って PT を施行した患者 61 例のうち、持参香粧品または関連アレルゲンの PT で陽性反応を呈し、臨床症状

Table 2 : Hair-care series

Allergens	Conc./veh.
PPD	1% pet
PTD	1% pet
2,6-Diaminopyridine	1% pet
<i>m</i> -Aminophenol	1% pet
<i>m</i> -Phenylenediamine 2HCL	1% pet
<i>o</i> -Aminophenol	1% pet
<i>p</i> -Aminophenol	1% pet
Picric acid	1% pet
Pyrogallol	1% pet
R-225 (Solvent Red 23)	1% pet
<i>p</i> -Aminoazobenzene	0.25% pet
Ammonium persulfate	2.5% pet
Ammonium thioglycolate	1% pet
Cocamidopropylbetaine	1% alc./aq.
Glycerol monothioglycolate	1% pet
<i>o</i> -Nitro- <i>p</i> -phenylenediamine	1% pet
Resorcinol	1% pet
<i>p</i> -Toluenediamine sulfate	1% pet

PPD: *p*-PhenylenediaminePTD: *p*-Toluenediamine

alc./aq.: alcohol/aqueous solution

との関連があると考えられたのは 10 例であった。

年齢、性別、職業 : 10 例の内訳は男性 1 例、女性 9 例であり、年齢分布は 20 歳から 63 歳で平均 45.5 歳であった。職業は 1 例が理美容師であり、ヘアダイに陽性であった。

アレルゲン PT : 化粧品関連アレルゲンでは、Balsam of Peru, Y-204, Fragrance mix, Lanolin alcohol, Paraben mix に陽性例を認めた。一方、ヘアダイ関連アレルゲンはほぼすべてのヘアダイに含まれており、またヘアダイ接触皮膚炎の患者に貼布したため、その陽性率は他の化粧品関連アレルゲンと比べて高い結果となった。その内訳は、*p*-Aminoazobenzene が 37.5%, *o*-Aminophenol(OAP) が 37.5%, *p*-Aminophenol (PAP) が 37.5%, 次いで *p*-Toluenediamine(PTD), *p*-Phenylenediamine (PPD), *m*-Aminophenol (MAP) がそれぞれ 25% であった (Table 4, 5)。

製品 PT : 陽性反応を呈した 10 例を製品分類別にみると、染毛剤、口紅、保湿クリーム、UV クリーム、シャンプーに陽性反応を呈した症例が 2 例ずつあり、次いでファンデーションが 1 例であった

Table 3 : Cosmetic series

Allergens	Conc./veh.
Salicylic acid ester	1% pet
Benzaldehyde	5% pet
Benzyl alcohol	1% pet
Citronellal	2% pet
Benzylcinnamic acid	5% pet
Eugenol	1% pet
Oil of eucalyptus	2% pet
Oil neroli	2% pet
Oil of laurel	2% pet
Oil cedar	10% pet
Oil of cloves	2% pet
Oil of peppermint	2% pet
Salicylaldehyde	2% pet
Venice turpentine	10% pet
Vanillin	10% pet
Amyl cinnamic aldehyde	1% pet
Coumarine	1% pet
Cinnamic aldehyde	1% pet
Cinnamic alcohol	1% pet
Geraniol	1% pet
Hypericon oil	0.5% pet
Hydroxycitronellal	1% pet
Isoeugenol	1% pet
D-limonene	2% pet
Oil of rose	0.5% pet
Oil of rosemary	0.5% pet
Oil of lemon grass	2% pet
Oak moss absolute	1% pet
Oil of lemon	2% pet
Oil of bergamot	2% pet
Oil of cinnamon	0.5% pet
Lanolin	as is
Y-204 (Solvent Yellow 33)	0.5% pet
Turpentine oil	10% pet
Propylene glycol	5% pet
Jasmine oil	5% pet
YlangYlang oil	5% pet
Sandalwood oil	2% pet
PAN (phenyl-azo-2-naphthol)	0.1% pet
R-202 (Pigment Red 57)	1% pet
R-225 (Solvent Red 23)	1% pet
Ester gum	2% pet

Table 4 : Positive results for cosmetic series

Allergens	Cases (%)
Balsam of Peru	3/55 (5.5%)
Y-204 (Solvent Yellow 33)	1/26 (3.9%)
Fragrance mix	1/55 (1.8%)
Lanolin alcohol	1/55 (1.8%)
Paraben mix	1/55 (1.8%)

Table 5 : Positive results for hair-care series

Allergens	Cases (%)
p-Aminoazobenzene	3/8 (37.5%)
p-Aminophenol	3/8 (37.5%)
o-Aminophenol	3/8 (37.5%)
p-Phenylenediamine	2/8 (25.0%)
p-Toluylenediamine	2/8 (25.0%)
m-Aminophenol	2/8 (25.0%)

Table 6 : Number of patch-test-positive cases for cosmetic products

Products	Cases
Hair dyes	2
Lipsticks	2
Creams	2
Sunscreen creams	2
Shampoos	2
Makeup foundation	1

(Table 6)。このうち 1 例に成分 PT を施行した。

基礎化粧品陽性例 基礎化粧品に陽性反応を呈したのは 5 例であった (Table 7)。このうち、1 種類の保湿液と 2 種類の口紅に陽性であった症例 4 で成分 PT を施行したところ、保湿液と 1 種類の口紅に含まれていたジグリセリルオリゴエステル（以下 DGS と略す）に陽性を呈した。また、症例 4 は化粧品関連アレルゲンの Balsam of Peru と PPD にも陽性であったが、提供された成分には含まれていなかった。

ヘアケア製品陽性例 ヘアケア製品で陽性反応を呈したのは 2 例であった (Table 8)。症例 6 はシャンプーに陽性反応を呈した症例で、過去にヘアダイで接触皮膚炎を起こしたことがあり、持参のシャンプー以外に PPD, PAP, p-Aminoazobenzene に陽性反応を呈した。

Table 7 : Positive reactions to skin-care products

No.	Age	Sex	Lesion	Positive products	Use period	Positive allergens	Remarks
1	33	Female	Face	Sunscreen cream	1 month	-	
2	48	Female	Face	Sunscreen cream	1 month	-	
3	51	Female	Face	Cream	A few times	-	
4	57	Female	Face	Cosmetic essence 2 Lipsticks	1 year	DGS, Neo-Medrol® EE ointment, Gentamycin sulfate, Fradiomycin sulfate, Balsam of Peru, PPD,	Hair dye dermatitis (-)
5	26	Female	Face	Makeup foundation	2 months	-	

DGS: isopalmityl diglyceryl sebacate, PPD: *p*-Phenylenediamine

Table 8 : Positive reactions to hair-care products and hair dyes

No.	Age	Sex	Lesion	Positive products	Use period	Positive allergens
6	58	Female	Head	Shampoos	A few years	PPD, PAP <i>p</i> -Aminoazobenzene
7	26	Female	Face, Neck	Shampoos	6 months	-
8	61	Female	Head	N.T.	Unknown	PPD, PTD PAP, MAP, OAP <i>o</i> -Nitro-phenylenediamine <i>m</i> -Phenylenediamine2HCl <i>p</i> -Toluenediamine sulfate
9	63	Male	Head	N.T.	Unknown	PPD, PAP, <i>p</i> -Aminoazobenzene
10	26	Female	Arms	Hair dyes	1 year	PPD, OAP

PPD: *p*-Phenylenediamine, PTD: *p*-Toluenediamine, PAP: *p*-Aminophenol, MAP: *m*-Aminophenol, OAP: *o*-Aminophenol, N.T.: not tested

ヘアダイによる接触皮膚炎症例　問診、臨床像からヘアダイによる接触皮膚炎と考えられた症例は3例であった (Table 8)。症例8, 9は製品である染毛剤はオープンテストを希望されず、施行できなかった。しかし、それぞれ多数のヘアダイ関連アレルゲンにPT陽性反応を呈し、臨床症状と経過からヘアダイによる接触皮膚炎と診断した。

症例提示

陽性例のうち、代表的な症例を2例呈示する。

症例4：57歳、女性。

主訴：顔面の皮疹。

既往歴：ウルシによる接触皮膚炎。

現病歴：数年前から、上眼瞼を中心とする痒みを

伴う皮疹があり、寛解と増悪を繰り返し、特に季節の変わり目に皮疹が悪化していた。1ヵ月前から口唇、手背に皮疹が出現したため、当科を受診した (Fig. 1)。

現症：眼瞼周囲に紅斑を、口唇およびその周囲に境界明瞭な紅斑、落屑を認めた。

スクリーニングPT：持参香粧品を用いたPTで2種類の口紅と保湿液、ネオメドロール®EE軟膏、硫酸ゲンタマイシン、硫酸ラジオマイシンに陽性反応を認めた (Table 9, Fig. 2)。患者は眼瞼周囲の皮疹に対して、ネオメドロール®EE軟膏を外用しており、本症例は香粧品による接触皮膚炎と外用薬による接触皮膚炎を合併していたと診断した。

成分PT：さらに、原因アレルゲンを確認するべ




Fig. 1 : Clinical features of case 4 with contact dermatitis due to both a lipstick and a moisturizing lotion including DGS.

Table 9 : Screening patch test results

Materials	Conc./veh.	D2	D3	D7
Lipstick A	as sold	++	+	+
Lipstick B	as sold	++	++	++
Moisturizing lotion	as sold	++	++	+?
Neo-Medrol® EE ointment	as sold	-	-	+
Gentamycin sulfate	20% pet.	+	+	++
Neomycin sulfate	20% pet.	+	++	++
Others		-	-	-

(ICDRG)



Lipstick A

Lipstick B

Moisturizing lotion

Fig. 2 : Positive patch test reactions to cosmetics

Table 10 : Patch test results of DGS

Materials	Conc./veh.	D2	D3	D7
DGS	20% pet.	++	++	++
	10% pet.	++	++	++
	5% pet.	++	++	++
	1% pet.	++	++	++
	0.1% pet.	++	++	++
Others		-	-	-

(ICDRG)




Fig. 3 : Positive patch test reactions to DGS present in lipstick B (case 4)

く、2種類の口紅と保湿液の成分PTを施行した。口紅BにDGSが20%，保湿液に3%含まれていたため、最低惹起濃度を検討する目的でDGSについて20%，10%，5%，1%，0.1%の希釀系列を作成し、貼布したが、本例はDGS 0.1% pet.においても陽性反応を呈した（Table 10, Fig. 3）。一方、口紅Aの成分PTはすべて陰性であった。

治療および経過：陽性反応を呈した口紅、保湿液と外用薬の使用を中止したところ、著明に顔面の皮疹は軽快した。

症例9：63歳、男性。

主訴：頭部と手背から前腕にかけての皮疹。

既往歴：特記すべきことなし。

職業：幼稚園のバスの運転手。

現病歴：数年前から、手に紅斑を認めていた。その後、頭部に皮疹が拡大し、近医に通院をしていた。2007年10月下旬に、理髪店で今までと異なる種類の毛染めをしたところ、その数日後から、頭部に痒みを伴う紅斑が出現した。その後さらに皮疹が全身に拡大したため、2007年11月に当科を受診した




Fig. 4 : Clinical features of case 9 with contact dermatitis due to hair dyes

Table 11 : Screening patch test results

Materials	Conc./veh.	D2	D3
PPD	1.0% pet.	+	+
p-Aminophenol	1.0% pet.	+	+
p-Aminoazobenzene	0.25% pet.	+	+

(ICDRG)




Fig. 5 : Positive patch test reactions to hair dye allergens at 72 hr (case 9)

(Fig. 4)。患者は、幼稚園のバスの運転手という職業柄、10年前から月に1、2回理髪店で毛染めをしていた。

現 症：頭部は全体に浸出液と痂皮で覆われ、顔面、頸部は腫脹し、激しい痒みを伴う紅斑、丘疹、水疱を認めた。また、手背から前腕にかけて浮腫性の紅斑、亀裂、痂皮を認めた。

初診時検査所見：入院時、38℃台の発熱、WBC $16.6 \times 10^3/\mu\text{l}$ 、CRP 29.2 mg/dl と炎症反応の上昇を認めた。また、頭部皮疹部の細菌培養で *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes* を検出した。

スクリーニングPT：染毛剤のオープンテストは患者の同意が得られず、施行できなかった。そこで、ヘアダイ関連アレルゲンのPTを貼布したところ、

PPD とその構造類似化合物に陽性を認めた (Table 11, Fig. 5)。

治療と経過：ヘアダイの使用を中止し、ステロイドとセフェム系抗菌薬の点滴、ステロイド薬の外用により皮疹は軽快した。臨床症状と経過、そしてPTにおいて PPD とその類似化合物に陽性を認めたことから、ヘアダイによる接触皮膚炎に細菌感染を合併したと診断した。また、ヘアダイの接触部位だけではなく、全身に散布疹を認め、本症例は、ヘアダイによる接触皮膚炎症候群と考えた。患者は職業柄、毛染めが必要であり、現在はPTにより使用可能と判断したヘアダイを使用し症状の再燃はない。

Table 12 : The variance of patch test results with cosmetic products

Years	Number of patch tests	Number of patients with positive reactions to cosmetic products (proportion)	Number of positive reactions to cosmetic products
1992～1994 ¹⁾	145	69 (47.6%)	87
1995～1997 ²⁾	236	80 (33.9%)	163
2006 ³⁾	56	17 (30.3%)	19
2007	61	10 (16.4%)	16




Fig 6. Reaction-causing products from 1992 to 2007.

考 察

これまで当科では、1997 年に鈴木ら¹⁾、2000 年に鷺見ら²⁾、2008 年に佐野ら³⁾が香粧品による接触皮膚炎についてまとめて報告してきた (Table 12)。

今回の PT 陽性製品の内訳では 10 例中シャンプー、UV クリームがそれぞれ 2 例で最多であった。また、保湿クリーム、保湿液、口紅、ファンデーション、ヘアダイはそれぞれ 1 例であった。今回を含めた 4 回の報告で、口紅、日焼け止め製品は毎回同じ頻度の陽性例を認めている。一方、美容液陽性例は、2006 年に増加しており、美容液の多様化によって今回も増加が予想されたが、2007 年は陽性例を認めなかつた (Fig. 6)。

2007 年は成分 PT を 1 例に施行し、1 種類の口紅 B と保湿液とともに含まれていた DGS が原因アレルゲンであると特定できた。一方、口紅 A はスクリーニング PT で陽性であったにもかかわらず、成分 PT はすべて陰性であった。これは、口紅 A の陽性

反応は口紅 B の近傍に貼布したために起こった excited skin syndrome の可能性、各成分の濃度が薄かった可能性、陰性であった個々の成分が配合されることにより異なる化学物質が生じ、その化学物質が本例の原因アレルゲンであった可能性などが考えられ、今後再検討が必要である。

DGS は安全性が高く、口唇を保護する物質として 1994 年に日本で開発され、現在は口紅以外にクレンジングオイル・ジェル、美容液などにも使用されている。DGS はイソパルミチン酸のエステル (Fig. 7) で、界面活性能が高すぎず、分子量が大きいため皮膚刺激性が少なく、保湿効果に優れた油性原料である⁵⁾。DGS による接触皮膚炎は 1999 年に共同著者である Suzuki ら⁶⁾が第 1 例を報告後、現在までに自験例を含めて 17 例が報告されている。自験例では口紅中の DGS の配合濃度は 20% で、保湿液中の DGS の配合濃度は 3 % であったことから、最低惹起濃度を検討する目的で、濃度を 0.1% ~20% pet. まで作成し貼布したが、0.1% pet. でも