

第2類から第3類へリスクの低い区分に変更となる生薬及び動植物成分
 1. 量的条件なしで、第2類から第3類へ変更する生薬及び動植物成分

No.	告示番号	告示名	変更理由	参考情報
1	5	アンソッコウ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。 香料としても用いられる。	エゴノキ科の安息香樹の樹皮
2	7	イヌザンシヨウ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	イヌザンシヨウ
3	8	イヌザンシヨウ果実。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	イヌザンシヨウの果実
4	16	エゾノレンリソウ	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	マメ科植物エゾノレンリソウの全草
5	18	エンメイソウ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ヒキオコシ
6	23	ガイシ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	カラシナの種子
7	24	カイバ。ただし、外用剤を除く。	海外で食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	タツノオトシゴ
8	25	ガイヨウ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ヨモギの葉
9	27	カゴソウ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。 さらに、Botanical Safety Handbook でクラス1 ^注 である。	シソ科のウツボグサの花序と果穂
10	41	キバン。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	クサカメ等の甲羅
11	42	キョウオウ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ハルウコン

No.	告示名	変更理由	参考情報
12	45 キンギンカ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	スイカズラ科の常緑つる性植物(スイカズラ)の花蕾
13	48 クニン	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ビャクスクの種子
14	56 コウエン	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ミカン科植物(ブシュカン、コウエン等)の果実および花
15	57 ゴウカイ。ただし、外用剤を除く。	海外で食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	オオヤモリの内蔵を除いたもの
16	62 ゴオウ	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	牛の胆石
17	68 コズイシ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	コリアンダー
18	69 コトウイ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	クルミの殻
19	70 コトウニン。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	クルミの殻の中の子房・種仁
20	71 ゴバイシ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ウルシ科ヌル子の葉上の虫こぶ
21	74 コロハ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	フェヌグリーク
22	79 サヨウ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	寄生植物キノモリウム科オシヤグシタケの多肉性の茎
23	80 サンキライ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	サルトリイバラ
24	81 サンシシ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	クチナシの果実
25	83 サンソウニン。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	サネトナツメの種子

No.	告示番号	告示名	変更理由	参考情報
26	84	サンリヨウ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	池や沼などの浅い水中に生えるミクリ科の多年草(ミクリやエゾミクリ、ヒメミクリ)の塊茎、又は沼沢池の水中に生えるカヤツリグサ科の多年草(ウキヤガラ)の塊茎
27	87	シクンシ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	シクンシ科の常緑木本性つる植物の果実
28	95	シャヤジン(沙参)。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ツリガネニンジン(キキョウ科)またはその他近縁植物の根。トトキとも呼ばれる。
29	96	シャヤゼンソウ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	オオバコの全草
30	99	シュロヨウ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	シュロの葉
31	106	シンキク。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	杏仁、小豆、カワラニンジンなどに麴(こうじ)、小麦粉を混ぜ合わせて発酵させたもの
32	111	ズシ	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	豆豉(トウチ)ともいう。黒豆(黒大豆)に塩を加えて煮てから醗酵させたもの
33	127	センタウリウム草。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。 さらに、Botanical Safety Handbook でクラス1 ^{注)} である。	ペニバナセンブリ等
34	136	ソウヒヨウシヨウ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	カマキリの卵鞘
35	137	ゾクダン。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	マツムシソウ科のナバナやトウナバナの根
36	139	ダイウイキヨウ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。 香料としても用いられる。	ダイウイキヨウの果実

No.	告示名	変更理由	参考情報
37	141 タイカ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	対蝦(タイシヨウエビ)
38	145 ダイフウシ	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	イイギリ科の常緑高木の成熟種子
39	149 タラ根皮。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	タラノキの根
40	150 タラ根。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	タラノキの根の皮
41	152 チクジョ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	イネ科のハチククの茎の中間層
42	153 チユ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	バラ科フレモコウの根茎
43	156 ツユクサ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ツユクサ
44	157 テイレキシ	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	アブラナ科の多年草(イヌナズナ等)の種子
45	158 テンジクオウ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	マダケや青皮竹の茎
46	163 トウシンソウ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	イグサ
47	164 冬虫夏草。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	子囊(しのう)菌類(門または亜門)バツカク菌目バツカク菌科の菌類で昆虫から生ずるキノコ(子実体)
48	168 トシヨウジツ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。 香料としても用いられる。	ネズの球果(杜松実)
49	171 ナンバンゲ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。 さらに、Botanical Safety Handbook でクラス1 ^注 である。	とうもろこしの雌花の花柱
50	173 ハクシニン。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。 さらに、Botanical Safety Handbook でクラス1 ^注 である。	コノテガシワの種子

No.	告示 番号	告示名	変更理由	参考情報
51	180	バッカツ	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ユリ科の多年草(サルトリイバラ)
52	183	ヒカイ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ヤマイモ科のつる性多年草(オニドコロなど)の根茎
53	184	ヒハツ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ゴンヨウ科の植物でつる性の常緑木本の果実
54	187	ピヤクゴウ	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	オニユリの鱗茎
55	191	ピヤクレン。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ブドウ科の多年生つる植物(カガミゲサ)
56	192	ピワヨウ	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ピワの葉
57	200	プランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	オオバコの種子
58	201	プランタゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	オオバコの種皮
59	205	ポウコン。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。 さらに、Botanical Safety Handbook でクラス1 ^(注) である。	イネ科の多年草(チガヤ)の根茎
60	208	ホオウ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ガマやヒメガマの花粉
61	210	ポチヨウコウ	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	チヨウジの果実
62	212	ホホバ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	ホホバの種子
63	216	マシニン。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	麻の実
64	217	マツフジ	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	モクレン科の落葉つる性木本(マツブサ)の茎
65	222	モッカ。ただし、外用剤を除く。	食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	バラ科植物のカリンの実(木瓜:モッカ)

No.	告示番号	告示名	変更理由	参考情報
66	223	モッコウ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。さらに、Botanical Safety Handbook でクラス1 ^注 である。	キク科植物モッコウの根
67*	224	モツヤク	外用の場合、その物の毒性は知られていない。内服では、腎臓に対する毒性が知られている。	カンラン科ミルラノキ属の樹脂。
68	232	ヨウバイヒ	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。さらに、Botanical Safety Handbook でクラス1 ^注 である。	ヤマモモ科ヤマモモの樹皮
69	234	ラタニア	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。さらに、Botanical Safety Handbook でクラス1 ^注 である。	マメ科の低木(別名:クラメリア)の根
70	236	リョウキョウ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。さらに、Botanical Safety Handbook でクラス1 ^注 である。	シヨウガ科の多年草、コウリョウキョウの根茎
71	239	レンセンソウ。ただし、外用剤を除く。	有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	シソ科の多年草(レンセンソウ、別名カキドオシ)の全草
72	240	ロクキン。ただし、外用剤を除く。	海外で食経験がある。 有害成分の含有及び、その物の毒性は知られていない。	鹿筋、鹿のアキレス腱

※No.67 モツヤクについては、外用剤に限り第3類とする。

注) Botanical Safety Handbook (American Herbal Products Association) における評価

クラス1 適切に使用する場合、安全に摂取することができるハーブ

クラス2 専門家(医療従事者)による特別な指示がない限り、以下の使用制限が適用されるハーブ

2a: 外用のみ

2b: 妊娠中に使用しない

2c: 授乳期間中に使用しない

2d: 注釈にあるような他の特定の使用制限がある

クラス3 「医療従事者の監督下でのみ適切に使用すること」とレベル表示することが勧告されているハーブ

クラス4 クラス分類のための十分なデータが入り手が入手できないハーブ

2. 配合量に制限を設け、第2類から第3類に変更する生薬及び動植物成分

No.	告示番号	告示名	条件値(g)※	参考情報
1	10	インゲン。ただし、外用剤を除く。	3	キク科カワラヨモギ
2	11	インゲンコウ。ただし、外用剤を除く。	3	キク科カワラヨモギ
3	13	ウヤク。ただし、外用剤を除く。	2	クスノキ科ウヤクの根
4注)	19	オウゴン。ただし、外用剤を除く。	1	シソ科コガネバナの根
5	20	オウバク。ただし、外用剤を除く。	3	ミカン科キハダの樹皮
6	21	オウレン。ただし、外用剤を除く。	1	キンポウゲ科オウレンなどの根をほとんど除いた根茎
7	31	カッコウ。ただし、外用剤を除く。	3	シソ科パチヨリ
8	32	カクコン。ただし、外用剤を除く。	4	マメ科クズの根
9	33	カッセキ。ただし、外用剤を除く。	1.5	滑石(タルク)
10	35	カラセンキュウ。ただし、外用剤は除く。	2.5	セリ科センキュウの根
11	51	ケイガイ	1	シソ科ケイガイ
12	52	ケイガイ木	1	シソ科ケイガイの穂
13	55	ゲンジン。ただし、外用剤を除く。	0.5	ゴマノハグサ科ゴマノハグサ
14	65	ゴシツ。ただし、外用剤を除く。	1.5	ヒユ科ヒナタイノコヅチの根
15	72	ゴボウシ。ただし、外用剤を除く。	1.5	キク科ゴボウの種子

注)

《ワーキンググループでのご意見》

オウゴンについて、医療用漢方の中では、注意を要する生薬の一つであるとの指摘があり条件値を2gから1gにすることとした。

16	94	ジャシヨウシ。ただし、外用剤を除く。	0.6	セリ科オカセリの果実
----	----	--------------------	-----	------------

No.	告示番号	告示名	条件値(g)※	参考情報
17	104	ジリュウ。ただし、外用剤を除く。	1.5	カシヨクツリミミス
18	108	ジンコウ。ただし、外用剤を除く。	1	ジンチヨウゲ科ジンコウノキの樹脂を含む材
19	122	センキユウ。ただし、外用剤を除く。	2.5	セリ科センキユウの根
20	123	ゼンコ。ただし、外用剤を除く。	1.25	セリ科ノダケの根
21	135	ソウジュツ。ただし、外用剤を除く。	2.25	キク科ホソバオケラの根茎
22	138	ソボク。ただし、外用剤を除く。	1	マメ科スオウの木部(芯材)
23	147	タクシャ。ただし、外用剤を除く。	3	オモダカ科サジオモダカの塊茎
24	155	チヨレイ。ただし、外用剤を除く。	2.25	サルノコシカケ科チヨレイマイタケの菌核
25	160	テンマ。ただし、外用剤を除く。	1	ラン科オニノヤガラの塊茎
26	161	テンモンドウ。ただし、外用剤を除く。	1.25	ユリ科クサスギカズラの根
27	165	ドクカツ。ただし、外用剤を除く。	1.5	セリ科シシウドの根茎
28	188	ピヤクシ。ただし、外用剤を除く。	1.6	セリ科ヨロイグサの根
29	189	ピヤクジュツ。ただし、外用剤を除く。	2.25	キク科オケラの根茎
30	195	ブクリヨウ。ただし、外用剤を除く。	4	サルノコシカケ科マツホドの菌核
31	218	マンケイシ。ただし、外用剤を除く。	0.5	クマツヅラ科ハマゴウの果実
32	235	リュウタン。ただし、外用剤を除く。	0.75	リンドウ科リンドウ根

※1日量が条件値以下の場合に第3類とする

3. 製剤として第2類成分の配合量が少ない等の理由により、第2類から第3類に変更する 生薬及び動植物成分

No.	告示 番号	告示名	条件値(g)※	参考情報
1	9	イレイセン	0.15g	サキシマボタンヅルなどの根及び根茎
2	43	キョウカツ。ただし、外用剤を除く。	0.15g	<i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H.T.Changなどの根茎及び根
3	44	キョウニン。ただし、外用剤を除く。	0.2g	ホンアンズ又はアンズの種子
4	61	コウボク。ただし、外用剤を除く。	0.3g	ホウノキなどの樹皮
5	66	ゴシユ。ただし、外用剤を除く。	0.4g	ゴシユなどの果実
6	77	サイコ。ただし、外用剤を除く。	0.7g	ミシマサイコの根
7	78	サイシン。ただし、外用剤を除く。	0.3g	ウスバサイシン又はケイリンサイシンの根及び根茎
8	85	ジオウ。ただし、外用剤を除く。	0.8g	アカヤジオウなどの根又はそれを蒸したものの
9	88	ジコッピ。ただし、外用剤を除く。	0.2g	クコなどの根皮
10	101	シヨウマ。ただし、外用剤を除く。	0.15g	サラシナシヨウマなどの根茎
11	105	シンイ。ただし、外用剤を除く。	0.3g	タムシバ、コブシなどのつぼみ
12	118	セッコウ。ただし、外用剤を除く。	1.5g	天然の含水硫酸カルシウム
13	154	チョウトウコウ。ただし、外用剤を除く。	0.3g	カギカズラなどの通例とげ
14	181	ハンゲ	0.6g	カラスビシヤクのコルク層を除いた塊茎
15	204	ポウイ。ただし、外用剤を除く。	0.5g	オオツツラフジのつる性の茎及び根茎
16	206	ポウフウ。ただし、外用剤を除く。	0.3g	<i>Saposhnikovia divaricata</i> Schischkinの根及び根茎
17	209	ポタンピ。ただし、外用剤を除く。	0.4g	ポタンの根皮
18	221	モクヅウ	0.3g	アケビ又はミツバアケビのつる性の茎
19	237	レンギョウ。ただし、外用剤を除く。	0.3g	レンギョウ又はシナレンギョウの果実

※1日量が条件値以下の場合に第3類とする

第2類から第3類へリスクの低い区分に変更となる 製剤の一覧とその副作用の発生状況

※重篤な副作用については症例表を添付している。(非重篤な副作用については症例表を添付していない。)

注1)非重篤な副作用の症例数は、平成21年6月1日から平成22年5月31日までの期間に受けた副作用について企業から報告があったものを記載してある。

注2)重篤な副作用の症例数は平成16年度から平成21年度までの期間に、PMDAに報告があったものを記載してある。

配合成分一日処方量の区分の標記は研究班での検討結果に基づき以下のように記載する。

- ・検討の結果、区分が現状のままのもの：黒字(第2類)(第3類)
- ・量的条件なしで第2類から第3類へ変更予定のもの：青字(第3類)
- ・量的条件ありで第2類から第3類へ変更予定のもの：赤字(第3類)
- ・製品として配合量が少量のため第2類から第3類へ変更予定のもの：緑色(少条3類)

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用※	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
健胃薬	オウバク(条第3類)3g、ガジュツ(第3類)0.5g、ゲンノショウコ(第3類)1.5g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3000mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、ゲンノショウコ(第3類)1380mg、トウヤク(第3類)30mg	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)0.36g、オウバク(条第3類)3.00g、ニガキ(第3類)0.45g	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)0.36g、オウバク(条第3類)3.00g、ニガキ(第3類)0.45g	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)0.57g、オウバク(条第3類)3g、ゲンチアナ(第3類)0.5g、ゲンノショウコ(第3類)1g、トウヤク(第3類)0.03g	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)1.25g、オウバク(条第3類)3g、ケイヒ(第3類)0.1g、ゲンチアナ(第3類)0.1g、トウヤク(第3類)0.05g、ニンジン(第3類)0.3g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g、ケツメイシ(第3類)0.67g、ゲンノショウコ(第3類)1g、トウヤク(第3類)0.03g、ソウジュツ(条第3類)0.4g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g、リュウタン(条第3類)0.4g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g、ゲンノショウコ(第3類)7.5075g、トウヤク(第3類)0.2997g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.5g、ガジュツ(第3類)0.6g、ゲンノショウコ(第3類)0.6g、トウヤク(第3類)0.016g、ピヤクジュツ(条第3類)0.6g、リュウタン(条第3類)0.15g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g、ケツメイシ(第3類)0.67g、ゲンノショウコ(第3類)1g、トウヤク(第3類)0.03g、ソウジュツ(条第3類)0.4g	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用 [※]	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
健胃薬	オウバク(条第3類)3g、ケツメイシ(第3類)0.67g、ゲンノシヨウコ(第3類)1g、トウヤク(第3類)0.03g、ソウジュツ(条第3類)0.4g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.2g、カンゾウ(第3類)0.5g、ケイヒ(第3類)0.4g、ゲンチアナ(第3類)0.45g、トウヤク(第3類)0.05g、ニンジン(第3類)0.4g、	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)1g、オウバク(条第3類)2.52g、ケイヒ(第3類)0.3g、ゲンチアナ(第3類)0.2g、トウヤク(第3類)0.05g、	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1800mg、カンゾウ(第3類)500mg、ゲンチアナ(第3類)400mg、ゲンノシヨウコ(第3類)1000mg、トウヤク(第3類)50mg、	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)1,000mg、オウバク(条第3類)2,000mg、ケイヒ(第3類)400mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)1,000mg、オウバク(条第3類)2,000mg、ケイヒ(第3類)400mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、トウヤク(第3類)50mg、センブリ(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)0.9g、カンゾウ(第3類)0.6g、ケイヒ(第3類)0.9g、コウジン(第3類)0.1g、トウヤク(第3類)0.9g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.12g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.002g	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)1,000mg、オウバク(条第3類)2,000mg、ケイヒ(第3類)400mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)1,000mg、オウバク(条第3類)2,000mg、ケイヒ(第3類)400mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g	—	0	—	0
健胃薬	リュウタン(条第3類)0.45g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1200mg、ケイヒ(第3類)300mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、ゲンノシヨウコ(第3類)600mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g	—	0	—	0
健胃薬	アロエ(第3類)0.06g、オウゴン(条第3類)0.6g、オウバク(条第3類)1.2g、ガジュツ(第3類)1.2g、カンゾウ(第3類)0.6g、ケイヒ(第3類)0.3g、シヨウキョウ(第3類)0.3g、チヨウジ(第3類)0.09g、ピャクジュツ(条第3類)0.6g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.1g、キジツ(第3類)0.8g、ゲンチアナ(第3類)0.4g、ゲンノシヨウコ(第3類)0.66g、コシヨウ(第3類)0.15g、サンシヨウ(第3類)0.15g、シヨウキョウ(第3類)0.3g、トウヤク(第3類)0.02g、ピャクジュツ(条第3類)0.6g	—	0	—	0
健胃薬	カンゾウ(第3類)0.075g、シヨウキョウ(第3類)0.03g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.075g、ニンジン(第3類)0.1g、ピャクジュツ(条第3類)0.06g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)0.75g、ガジュツ(第3類)0.6g、エンメイソウ(第3類)0.3g、トウヤク(第3類)0.05g、ケイヒ(第3類)0.3g、ボレイ(第3類)1.8g、動物胆(ユウタン等)(第3類)1.333g、カンゾウ(第3類)0.3g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)0.75g、ガジュツ(第3類)0.6g、エンメイソウ(第3類)0.3g、トウヤク(第3類)0.05g、ケイヒ(第3類)0.3g、ボレイ(第3類)1.8g、動物胆(ユウタン等)(第3類)1.333g、カンゾウ(第3類)0.3g	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用※	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
健胃薬	ウイキョウ(第3類)100mg、オウバク(条第3類)900mg、ケイヒ(第3類)800mg、ゲンチアナ(第3類)500mg、ショウキョウ(第3類)100mg、トウヤク(第3類)30mg、チヨウジ(第3類)30mg	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1500mg、ガジュツ(第3類)600mg、トウヤク(第3類)50mg、ケイヒ(第3類)600mg、ニンジン(第3類)300mg、カンゾウ(第3類)300mg、胆汁(第3類)100mg	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.5g、カンゾウ(第3類)0.3g、ケイヒ(第3類)0.55g、ゲンチアナ(第3類)0.4g、ニンジン(第3類)0.45g、	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)800mg、オウバク(条第3類)1000mg、カンゾウ(第3類)300mg、ケイヒ(第3類)300mg、ゲンチアナ(第3類)400mg、ゲンノショウコ(第3類)500mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	ウコン(第3類)270mg、エンメイソウ(第3類)870mg、オウバク(条第3類)900mg、ケイヒ(第3類)250mg、ゲンチアナ(第3類)465mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)3g、ソウジュツ(条第3類)1g、ポレイ(第3類)1g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.8g、センブリ(第3類)0.05g、ニガキ(第3類)0.45g、ポレイ(第3類)1.3g	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)0.56g、オウバク(条第3類)0.67g、オウレン(条第3類)0.15g、ガジュツ(第3類)0.45g、トウヤク(第3類)0.05g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)0.6g、オウレン(条第3類)0.1g、ゲンノショウコ(第3類)2.3g、ショウキョウ(第3類)0.1g、ダイオウ(第3類)0.1g、トウヤク(第3類)0.05g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g、オウレン(条第3類)120mg、ケイヒ(第3類)900mg、トウヤク(第3類)30mg、カンゾウ(第3類)300mg	—	0	—	0
健胃薬	エンメイソウ(第3類)560mg、オウバク(条第3類)670mg、オウレン(条第3類)150mg、ガジュツ(第3類)450mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)900mg、オウバク(条第3類)900mg、オウレン(条第3類)180mg、カンゾウ(第3類)400mg、ケイヒ(第3類)900mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.2g、オウレン(条第3類)0.3g、ケイヒ(第3類)0.48g、ゲンチアナ(第3類)0.3g、ショウキョウ(第3類)0.3g	—	0	—	0
健胃薬	オウレン(条第3類)0.3g、カンゾウ(第3類)0.96g、ケイヒ(第3類)0.1g、ゲンチアナ(第3類)0.6g、コウジン(第3類)0.5g、ソウジュツ(条第3類)0.6g、チヨウジ(第3類)0.09g、ホップ(第3類)0.7g	—	0	—	0
健胃薬	オウレン(条第3類)0.3g、カンゾウ(第3類)0.96g、ケイヒ(第3類)0.1g、ゲンチアナ(第3類)0.6g、コウジン(第3類)0.5g、ソウジュツ(条第3類)0.6g、チヨウジ(第3類)0.09g、ホップ(第3類)0.7g	—	0	—	0
健胃薬	オウレン(条第3類)0.3g、カンゾウ(第3類)0.96g、ケイヒ(第3類)0.1g、ゲンチアナ(第3類)0.6g、コウジン(第3類)0.5g、ソウジュツ(条第3類)0.6g、チヨウジ(第3類)0.09g、ホップ(第3類)0.7g	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)0.9g、オウバク(条第3類)1.2g、オウレン(条第3類)0.45g、炭(第3類)0.399g	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用 [※]	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
健胃薬	オウバク(条第3類)1000mg、オウレン(条第3類)300mg、カンゾウ(第3類)250mg、ケイヒ(第3類)500mg、ゲンチアナ(第3類)400mg、ゲンノシヨウコ(第3類)600mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	ウイキョウ(第3類)200mg、オウレン(第2類)500mg、ケイヒ(第3類)300mg、ゲンチアナ(第3類)200mg、ショウキョウ(第3類)600mg、ソウジュツ(条第3類)1200mg、ニンジン(第3類)600mg、ホップ(第3類)600mg	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)540mg、オウレン(条第3類)630mg、ケイヒ(第3類)1170mg、ショウキョウ(第3類)300mg、チヨウジ(第3類)270mg、ニンジン(第3類)600mg	—	0	—	0
健胃薬	アカメガシワ(第3類)2.5g、ウイキョウ(第3類)1.0g、キジツ(第3類)1.0g、ケイヒ(第3類)3.5g、シユクシヤ(第3類)1.0g、ショウキョウ(第3類)0.8g、ソウジュツ(条第3類)0.5g、チクセツニンジン(第3類)0.2g、チヨウジ(第3類)0.1g、チンピ(第3類)1.0g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.8g、ケイヒ(第3類)0.6g、ゲンノシヨウコ(第3類)5.74g、トウヤク(第3類)0.9g	—	0	—	0
健胃薬	ウイキョウ(第3類)0.05g、オウバク(条第3類)0.60g、ケイヒ(第3類)0.10g、ショウキョウ(第3類)0.05g、トウヤク(第3類)0.05g、チヨウジ(第3類)0.05g、ボレイ(第3類)1.80g、モッコウ(第3類)0.10g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.10g	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)1,000mg、オウバク(条第3類)2,000mg、ケイヒ(第3類)400mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、トウヤク(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)1.2g、カンゾウ(第3類)0.6g、シャクヤク(第3類)0.6g、ニンジン(第3類)0.3g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g、ケイヒ(第3類)0.5g、ゲンチアナ(第3類)0.25g、ゲンノシヨウコ(第3類)1.61g、トウヤク(第3類)0.05g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)0.375g、ガジュツ(第3類)0.3g、エンメイソウ(第3類)0.15g、トウヤク(第3類)0.025g、ケイヒ(第3類)0.15g、ボレイ(第3類)0.9g、動物胆(ユウタン等)(第3類)1.333g、カンゾウ(第3類)0.3g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)2.475g、トウヤク(第3類)0.03g、ソウジュツ(条第3類)0.5g、ゲンノシヨウコ(第3類)1.02g、ケツメイシ(第3類)0.7g	—	0	—	0
健胃薬	オウバク(条第3類)3g、ゲンノシヨウコ(第3類)1.5g、トウヤク(第3類)0.05g、ニンジン(第3類)0.5g、リュウタン(条第3類)0.3g	—	0	—	0
健胃薬	アカメガシワ(第3類)3000mg、オウバク(条第3類)1800mg、ガジュツ(第3類)2700mg	—	0	—	0
健胃薬	ウイキョウ(第3類)450mg、カンゾウ(第3類)300mg、ケイヒ(第3類)795mg、ゲンチアナ(第3類)150mg、ショウキョウ(第3類)150mg、ソウジュツ(条第3類)450mg、ボレイ(第3類)1350mg	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用※	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
健胃薬	オウバク(条第3類)1800mg、ケイヒ(第3類)150mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、ゲンノショウコ(第3類)1800mg、センブリ(第3類)50mg	—	0	—	0
健胃薬	アカメガシワ(第3類)2.5g、アロエ(第3類)0.15g、オウバク(条第3類)0.5g、オウレン(条第3類)0.019965g、ゲンチアナ(第3類)0.3g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.1g	—	0	—	0
健胃薬	アロエ(第3類)140mg、オウバク(条第3類)450mg、オウレン(条第3類)125mg、ゲンチアナ(第3類)250mg、ゲンノショウコ(第3類)5005mg、トウヤク(第3類)45mg、動物胆(ユウタン等)(第3類)105mg	—	0	—	0
健胃薬	アカメガシワ(第3類)2500mg、アロエ(第3類)150mg、オウバク(条第3類)500mg、オウレン(条第3類)19.965mg、ゲンチアナ(第3類)300mg、動物胆(ユウタン等)(第3類)100mg	—	0	—	0
健胃薬	ウイキョウ(第3類)88mg、オウバク(条第3類)190mg、オウレン(条第3類)38mg、カンゾウ(第3類)345mg、ケイヒ(第3類)250mg、サンザシ(第3類)1400mg、ショウキョウ(第3類)86mg、チョウジ油(第3類)3mg、ホップ(第3類)270mg、ボレイ(第3類)1400mg	—	0	—	0
健胃薬	ウイキョウ(第3類)88mg、オウバク(条第3類)190mg、オウレン(条第3類)38mg、カンゾウ(第3類)345mg、ケイヒ(第3類)250mg、サンザシ(第3類)1400mg、ショウキョウ(第3類)86mg、チョウジ油(第3類)3mg、ホップ(第3類)270mg、ボレイ(第3類)1400mg	—	0	—	0
健胃薬	ウソツコ(第3類)550mg、エンメイソウ(第3類)200mg、オウバク(条第3類)200mg、オウレン(条第3類)60mg、ガジュツ(第3類)360mg、カンゾウ(第3類)600mg、キジツ(第3類)240mg、ケイヒ(第3類)240mg、シユクシヤ(第3類)100mg、ソウジュツ(条第3類)100mg、胆汁(第3類)665mg、チンピ(第3類)900mg、ニクズク(第3類)50mg、ニンジン(第3類)30mg、ボレイ(第3類)2.200mg、リョウキョウ(第3類)120mg	—	0	—	0
健胃薬	オウゴン(条第3類)540mg、オウレン(条第3類)630mg、ケイヒ(第3類)1170mg、ショウキョウ(第3類)300mg、チョウジ(第3類)270mg、ニンジン(第3類)600mg	—	0	—	0
その他の循環	カゴソウ(第3類)10g	—	0	—	0
その他の循環	カゴソウ(第3類)10g	—	0	—	0
その他の循環	カゴソウ(第3類)10g	—	0	—	0
その他の循環	カゴソウ(第3類)10g	—	0	—	0
その他の循環	サンキライ(第3類)20g	—	0	—	0
その他の循環	サンキライ(第3類)20g	—	0	—	0
その他の循環	サンキライ(第3類)20g	—	0	—	0
その他の循環	サンキライ(第3類)20g	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第2類)0.2g	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)200mg	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)200mg	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用※	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)200mg	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)200mg	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)200mg	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)200mg	—	0	—	0
強心薬(センソ含有製剤等)	ゴオウ(第3類)2mg、サフラン(第3類)3mg、ジンコウ(条第3類)100mg、シンジュ(第3類)12mg、動物胆(ユウタン等)(第3類)10mg、ニンジン(第3類)250mg、リュウノウ(第3類)30mg、レイヨウカク(第3類)10mg	—	0	—	0
止瀉薬	オウバク(条第3類)2g、ゲンノショウコ(第3類)0.4g、トウヤク(第3類)0.5g	—	0	—	0
止瀉薬	オウバク(条第3類)1.2g、カンゾウ(第3類)0.2g、ケイヒ(第3類)0.45g、ゲンノショウコ(第3類)1.2g、トウヤク(第3類)0.05g	—	0	—	0
止瀉薬	オウゴン(条第3類)0.3g、オウバク(条第3類)0.9g、ケイヒ(第3類)0.5g、ゲンノショウコ(第3類)0.6g、トウヤク(第3類)0.18g、ヨウバイヒ(第3類)0.4g	—	0	—	0
止瀉薬	エンメイソウ(第3類)0.84g、オウバク(条第3類)0.9g、ゲンノショウコ(第3類)0.84g、ゴバイシ(第3類)0.54g、ヨウバイヒ(第3類)0.33g	—	0	—	0
止瀉薬	オウバク(条第3類)1.5g、ゲンノショウコ(第3類)1.0g、トウヤク(第3類)0.3g、ヨウバイヒ(第3類)0.4g、	—	0	—	0
止瀉薬	オウバク(条第3類)1.2g、ゲンノショウコ(第3類)3g、炭(第3類)1.2g	—	0	—	0
止瀉薬	オウバク(条第3類)1.125g、オウレン(条第3類)0.15g、ゲンノショウコ(第3類)1.35g、ゴバイシ(第3類)0.75g、トウヤク(第3類)0.05g	—	0	—	0
止瀉薬	アセンヤク(第3類)500mg、オウバク(条第3類)700mg、オウレン(条第3類)150mg、ゲンチアナ(第3類)500mg、ゲンノショウコ(第3類)600mg、ゴバイシ(第3類)500mg、トウヤク(第3類)500mg	—	0	—	0
止瀉薬	エンメイソウ(第3類)600mg、オウゴン(条第3類)210mg、オウバク(条第3類)600mg、オウレン(条第3類)150mg、ケイヒ(第3類)300mg、シャクヤク(第3類)300mg、トウヤク(第3類)750mg	—	0	—	0
歯肉炎・歯槽膿漏	カミツレ(第3類)1.404mg、モツヤク(第3類)0.738mg、ラタニア(第3類)1.389mg	—	0	—	0
歯肉炎・歯槽膿漏	カミツレ(第3類)2.500mg、モツヤク(第3類)1.240mg、ラタニア(第3類)2.500mg	口内炎	1	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用※	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
歯肉炎・歯槽膿漏	カミツレ(第3類)2.808mg、モツヤク(第3類)1.476mg、ラタニア(第3類)2.778mg	口腔粘膜剥離	1	—	0
歯肉炎・歯槽膿漏	カミツレ(第3類)2.808mg、モツヤク(第3類)1.476mg、ラタニア(第3類)2.778mg	—	0	—	0
歯肉炎・歯槽膿漏	カミツレ(第3類)2.808mg、モツヤク(第3類)1.476mg、ラタニア(第3類)2.778mg	・皮膚炎 ・味覚異常	2	—	0
歯肉炎・歯槽膿漏	カミツレ(第3類)2.808mg、モツヤク(第3類)1.476mg、ラタニア(第3類)2.778mg	・口内炎(2件) ・脈拍異常 ・皮膚炎	4	—	0
小児鎮静薬 (小児五疳薬等)	オウレン(条第3類)30mg、カンゾウ(第3類)30mg、動物胆(ユウタン等)(第3類)6mg、ゴオウ(第3類)5mg、チヨウジ(第3類)4.5mg、ニンジン(第3類)55mg、レイヨウカク(第3類)15mg	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)0.01g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.03g、ニンジン(第3類)3.15g、ロクジョウ(第3類)0.05g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)0.050g、ロクジョウ(第3類)0.300g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ニンジン(第3類)0.6g、ゴオウ(第3類)0.1g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)0.2g、ニンジン(第3類)0.3g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)100mg、ニンジン(第3類)1500mg	そう痒症	1	—	0
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)100mg、ニンジン(第3類)600mg	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)100mg、動物胆(ユウタン等)(第3類)30mg、ニンジン(第3類)467mg	—	0	—	0
生薬主薬製剤	コウジン(第3類)2400mg、ゴオウ(第3類)100mg	発疹	1	—	0
生薬主薬製剤	オウギ(第3類)0.008g、カンゾウ(第3類)0.041g、ケイヒ(第3類)0.069g、サンヤク(第3類)0.065g、ジオウ(少条第3類)0.014g、シャクヤク(第3類)0.014g、センキュウ(条第3類)0.01g、ソウジュツ(条第3類)0.003g、トウキ(第3類)0.014g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.055g、ニンジン(第3類)0.006g、ニンニク(第3類)0.107g、ハンピ(第3類)2.756g、ピャクジュツ(条第3類)0.014g、プクリョウ(条第3類)0.017g	・下痢 ・食欲不振、胃不快感	2	—	0
生薬主薬製剤	オウギ(第3類)0.2g、オウセイ(第3類)0.2g、カンゾウ(第3類)0.1g、キキョウ(第3類)0.1g、ケイヒ(第3類)0.3g、サフラン(第3類)0.1g、サンヤク(第3類)0.5g、ジオウ(少条第3類)0.4g、シャクヤク(第3類)0.2g、ショウキョウ(第3類)0.2g、センキュウ(条第3類)0.1g、チヨウジ(第3類)0.5g、トウキ(第3類)0.1g、ニンジン(第3類)0.2g、プクリョウ(条第3類)0.4g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	オウギ(第3類)0.2g、オウセイ(第3類)0.2g、カンゾウ(第3類)0.1g、キキョウ(第3類)0.1g、ケイヒ(第3類)0.3g、サンヤク(第3類)0.5g、ジオウ(少条第3類)0.4g、シャクヤク(第3類)0.2g、ショウキョウ(第3類)0.2g、センキュウ(条第3類)0.1g、チヨウジ(第3類)0.5g、トウキ(第3類)0.1g、ニンジン(第3類)0.2g、プクリョウ(条第3類)0.4g	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用*	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
生薬主薬製剤	オウギ(第3類)0.2g、加工大蒜(第3類)0.1g、カンゾウ(第3類)0.5g、ケイヒ(第3類)1g、サンヤク(第3類)0.5g、ジオウ(少条第3類)0.5g、シャクヤク(第3類)0.5g、センキュウ(条第3類)0.5g、トウキ(第3類)0.5g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.075g、ニンジン(第3類)3g、ハンピ(第3類)0.18g、ビャクジュツ(条第3類)0.5g、プクリョウ(条第3類)0.15g	胃不快感	1	—	0
生薬主薬製剤	ウナギ(第3類)0.353g、カンゾウ(第3類)0.176g、キキョウ(第3類)0.353g、ケイヒ(第3類)0.353g、サンヤク(第3類)0.495g、ジオウ(少条第3類)0.353g、シャクヤク(第3類)0.176g、シヨウキョウ(第3類)0.176g、センキュウ(条第3類)0.106g、トウキ(第3類)0.106g、ドベッコウ(第3類)0.353g、ニンジン(第3類)0.123g、プクリョウ(条第3類)0.353g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	ゴオウ(第3類)0.01g、ジオウ(少条第3類)0.3g、動物胆(ユウタン等)(第3類)0.016g、ニンジン(第3類)0.3g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	オウギ(第3類)0.4g、オウバク(条第3類)0.2g、ニンニク(第3類)6g、カンゾウ(第3類)0.15g、ケイヒ(第3類)0.3g、ゴオウ(第3類)0.01g、サイコ(少条第3類)0.2g、ジオウ(少条第3類)0.3g、シャクヤク(第3類)0.3g、シヨウキョウ(第3類)0.15g、トウキ(第3類)0.3g、ニンジン(第3類)3.015g、ビャクジュツ(条第3類)0.3g、プクリョウ(条第3類)0.3g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	カンゾウ(第3類)100mg、ケイヒ(第3類)250mg、コウジン(第3類)3000mg、ゴオウ(第3類)10mg、シャクヤク(第3類)300mg、センキュウ(条第3類)180mg、トウキ(第3類)180mg、動物胆(ユウタン等)(第3類)50mg、ポウフウ(少条第3類)180mg、ロクジョウ(第3類)5mg	—	0	—	0
生薬主薬製剤	カッコウ(条第3類)162mg、ケイヒ(第3類)105mg、ゴオウ(第3類)12mg、シヨウキョウ(第3類)105mg、センキュウ(条第3類)158mg、チンピ(第3類)172mg、トウキ(第3類)264mg、ニンジン(第3類)53mg、ビャクシ(条第3類)11mg、ビャクジュツ(条第3類)158mg、ポウフウ(少条第3類)250mg	—	0	—	0
生薬主薬製剤	オンジ(第3類)285mg、コウジン(第3類)3300mg、サフラン(第3類)90mg、ジンコウ(条第3類)10mg、レイヨウカク(第3類)100mg	—	0	—	0
生薬主薬製剤	オウギ(第3類)0.25g、カンゾウ(第3類)0.045g、シコン(第3類)7.5g、ジュウヤク(第3類)1.5g、センキュウ(条第3類)0.225g、トウキ(第3類)0.342g、ニンジン(第3類)3.0g、ヨウイニン(第3類)1.8g	—	0	—	0
生薬主薬製剤	カンゾウ(第3類)100mg、ゴオウ(第3類)100mg、ニンジン(第3類)500mg	・不眠症 ・頭痛、耳鳴、ほてり ・不眠症、悪寒	3	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	モツカ(第3類)6.0g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	オウゴン(条第3類)0.61g、カンゾウ(第3類)0.61g、サイコ(少条第3類)0.61g、シヨウキョウ(第3類)0.131g、ソウジュツ(条第3類)0.61g、タイソウ(第3類)0.754g、ニンジン(第3類)0.61g、ハンゲ(少条第3類)0.551g、プクリョウ(条第3類)1.223g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	インチンコウ(条第3類)3g、ケイヒ(第3類)0.5g、ケツメイシ(第3類)10g、サイコ(少条第3類)0.5g、サンシシ(第3類)1.5g、タクシヤ(条第3類)1g、チヨレイ(条第3類)0.6g、ビャクジュツ(条第3類)0.6g、プクリョウ(条第3類)0.6g	・発赤 ・疼痛	2	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用*	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	ゴミン(第3類)0.190g、サンシユウ(第3類)0.370g、サンヤク(第3類)0.370g、ジオウ(少条第3類)0.750g、タクシヤ(条第3類)0.280g、バクモンドウ(第3類)0.280g、プクリヨウ(条第3類)0.280g、ポタンビ(少条第3類)0.280g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	ジオウ(少条第3類)0.25g、シャクヤク(第3類)0.45g、センキユウ(条第3類)1.5g、トウキ(第3類)1.5g、ピヤクジュツ(条第3類)2g、プクリヨウ(条第3類)2g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	カツコン(条第3類)0.3g、カンゾウ(第3類)0.41g、キキョウ(第3類)0.7g、キジツ(第3類)0.26g、シヨウキョウ(第3類)0.055g、ゼンコ(条第3類)0.5g、シソウ(第3類)0.3g、タイソウ(第3類)0.005g、チクセツニンジン(第3類)0.005g、チンピ(第3類)0.2g、ハンゲ(少条第3類)0.5g、プクリヨウ(条第3類)0.9g、モツコウ(第3類)0.005g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	オウヒ(第3類)0.54g、カンゾウ(第3類)0.54g、キキョウ(第3類)0.54g、ケイガイ(条第3類)0.54g、サイコ(少条第3類)0.54g、シヨウキョウ(第3類)0.54g、センキユウ(条第3類)0.54g、デンブ(第3類)0.6g、ドクカツ(条第3類)0.54g、ハマボウフウ(第3類)0.54g、プクリヨウ(条第3類)0.54g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	オウギ(第3類)0.54g、カンゾウ(第3類)0.42g、ケイヒ(第3類)0.48g、ジオウ(少条第3類)0.6g、シャクヤク(第3類)0.48g、センキユウ(条第3類)0.48g、トウキ(第3類)0.6g、ニンジン(第3類)0.6g、ハチミツ(第3類)0.6g、ピヤクジュツ(条第3類)0.6g、プクリヨウ(条第3類)0.6g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	シャクヤク(第3類)1.5g、シヨウキョウ(第3類)0.6g、ソウジュツ(条第3類)2g、プクリヨウ(条第3類)2.9g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	ケイヒ(第3類)0.823g、ソウジュツ(条第3類)1.076g、タクシヤ(条第3類)2.25g、チコレイ(条第3類)0.823g、プクリヨウ(条第3類)0.823g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	シャクヤク(第3類)1.452g、シヨウキョウ(第3類)0.726g、ソウジュツ(条第3類)1.451g、プクリヨウ(条第3類)1.452g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	シヨウキョウ(第3類)0.325g、ソウジュツ(条第3類)1.207g、チンピ(第3類)1.392g、ニンジン(第3類)0.928g、プクリヨウ(条第3類)1.99g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	カンキョウ(第3類)0.346g、カンゾウ(第3類)0.691g、ケイヒ(第3類)1.401g、チンピ(第3類)0.207g、ニンジン(第3類)0.691g、ピヤクジュツ(条第3類)0.691g、プクリヨウ(条第3類)0.691g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	オウバク(条第3類)0.24g、ヨウバイヒ(第3類)0.0578g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	カンゾウ(第3類)0.9375g、サンソウニン(第3類)24.000g、センキユウ(条第3類)1.875g、チモ(第3類)1.875g、プクリヨウ(条第3類)1.875g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	シャクヤク(第3類)0.9g、センキユウ(条第3類)0.78g、タクシヤ(条第3類)1.2g、デンブ(第3類)0.54g、トウキ(第3類)0.78g、ピヤクジュツ(条第3類)0.9g、プクリヨウ(条第3類)0.9g	—	0	—	0
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	シャクヤク(第3類)2.476g、センキユウ(条第3類)1.468g、ソウジュツ(条第3類)0.388g、タクシヤ(条第3類)0.776g、トウキ(第3類)1.08g、プクリヨウ(条第3類)0.388g	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用※	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
生薬製剤(他の薬効群に属さない製剤)	オウギ(第3類)0.062g、カンゾウ(第3類)0.371g、ケイヒ(第3類)0.804g、シャクヤク(第3類)1.684g、シヨウキョウ(第3類)0.309g、ソウジュツ(条第3類)0.619g、タイソウ(第3類)2.475g、トウキ(第3類)0.062g、ブクリョウ(条第3類)0.619g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)5g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)5g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)5g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)10g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)10g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)10g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	シャゼンソウ(第3類)10g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	アセンヤク(第3類)8.4mg、カンゾウ(第3類)102mg、キキョウ(第3類)84mg、キョウニン(少条第3類)15mg、セネガ(第3類)4.2mg、ニンジン(第3類)84mg	湿疹	1	中等性湿疹 (n233等症)	1
鎮咳去痰薬	アセンヤク(第3類)8.4mg、カンゾウ(第3類)102mg、キキョウ(第3類)84mg、キョウニン(少条第3類)15mg、セネガ(第3類)4.2mg、ニンジン(第3類)84mg	発赤	1	—	0
鎮咳去痰薬	カンゾウ(第3類)50mg、キキョウ(第3類)70mg、キョウニン(少条第3類)5mg、セネガ(第3類)3mg	・蕁麻疹 ・発疹	2	—	0
鎮咳去痰薬	カンゾウ(第3類)50mg、キキョウ(第3類)70mg、キョウニン(少条第3類)5mg、セネガ(第3類)3mg	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	カンゾウ(第3類)428.7mg、キキョウ(第3類)82.2mg、キョウニン(少条第3類)6mg、セネガ(第3類)4.2mg、ニンジン(第3類)84mg	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	カンゾウ(第3類)428.7mg、キキョウ(第3類)82.2mg、キョウニン(少条第3類)6mg、セネガ(第3類)4.2mg、ニンジン(第3類)84mg	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	カンゾウ(第3類)428.7mg、キキョウ(第3類)82.2mg、キョウニン(少条第3類)6mg、セネガ(第3類)4.2mg、ニンジン(第3類)84mg	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	カンゾウ(第3類)0.33g、キキョウ(第3類)2.5g、シャゼンソウ(第3類)1.33g、モツカ(第3類)0.833g	—	0	—	0
鎮咳去痰薬	オウゴン(条第3類)96mg、オウレン(条第3類)30mg、カンゾウ(第3類)34.8mg、ケイヒ(第3類)180mg、シャクヤク(第3類)300mg、センキュウ(条第3類)420mg、ソウジュツ(条第3類)96mg、テクセツニンジン(第3類)18mg、チヨウジ(第3類)96mg、トウキ(第3類)420mg、ブクリョウ(条第3類)49.2mg	—	0	—	0
婦人薬	カンゾウ(第3類)0.9g、ジオウ(少条第3類)0.5g、シャクヤク(第3類)0.9g、センキュウ(条第3類)0.9g、トウキ(第3類)1.8g、ニンジン(第3類)0.3g	—	0	中等性皮膚炎 (n305等症)	1
婦人薬	カンゾウ(第3類)0.9g、ジオウ(少条第3類)0.5g、シャクヤク(第3類)0.9g、センキュウ(条第3類)0.9g、トウキ(第3類)1.8g、ニンジン(第3類)0.3g	・そう痒症、食欲不振、悪心 ・胃不快感	2	—	0
婦人薬	カノコソウ(第3類)50mg、カンゾウ(第3類)30mg、ケイヒ(第3類)20mg、サフラン(第3類)5mg、シャクヤク(第3類)50mg、ジュウヤク(第3類)60mg、トウキ(第3類)60mg、ニンジン(第3類)50mg、ブクリョウ(条第3類)24mg、ポウフウ(少条第3類)60mg、ポタンピ(少条第3類)50mg	—	0	—	0

薬効別	配合成分に関する情報 (各配合成分 一日処方量 区分)	非重篤な副作用		重篤な副作用*	
		副作用名	症例数 ^{注1)}	副作用名	症例数 ^{注2)}
婦人薬	ケイヒ(第3類)100mg、コウカ(第3類)100mg、シャクヤク(第3類)400mg、センキュウ(条第3類)300mg、ソウジュツ(条第3類)200mg、トウキ(第3類)300mg、ニンジン(第3類)300mg、ブクリョウ(条第3類)200mg、ポタンビ(少条第3類)200mg	—	0	—	0
婦人薬	ケイヒ(第3類)400mg、コウカ(第3類)300mg、シャクヤク(第3類)1300mg、ショウキョウ(第3類)300mg、センキュウ(条第3類)1000mg、タクシャ(条第3類)500mg、トウキ(第3類)400mg、ビヤクジュツ(条第3類)500mg、ブクリョウ(条第3類)500mg、ポタンビ(少条第3類)300mg、ボレイ(第3類)500mg	—	0	—	0
婦人薬	カノソウ(第3類)0.24g、カンゾウ(第3類)0.24g、ケイヒ(第3類)0.24g、サフラン(第3類)0.006g、シャクヤク(第3類)0.24g、ショウキョウ(第3類)0.12g、センキュウ(条第3類)0.36g、トウキ(第3類)0.24g、ニンジン(第3類)0.06g、ビヤクジュツ(条第3類)0.24g、ブクリョウ(条第3類)0.24g、モクツウ(少条第3類)0.24g	—	0	—	0
婦人薬	ウコン(第3類)0.16g、カツコウ(条第3類)0.66g、カンゾウ(第3類)0.80g、コショウ(第3類)0.14g、サフラン(第3類)0.08g、シタン(第3類)1.88g、シュクシャ(第3類)0.24g、ニンジン(第3類)0.16g、モッコウ(第3類)0.08g	—	0	—	0
婦人薬	オウギ(第3類)0.563g、カンゾウ(第3類)0.938g、ケイヒ(第3類)0.563g、シャクヤク(第3類)0.75g、ショウキョウ(第3類)0.188g、センキュウ(条第3類)0.788g、タイソウ(第3類)0.563g、タクシャ(条第3類)0.75g、トウキ(第3類)0.75g、ビヤクジュツ(条第3類)1.088g、ブクリョウ(条第3類)1.313g	—	0	—	0
婦人薬	オウギ(第3類)0.061g、カンゾウ(第3類)0.368g、ケイヒ(第3類)0.797g、シャクヤク(第3類)1.225g、ショウキョウ(第3類)0.306g、センキュウ(条第3類)0.882g、ソウジュツ(条第3類)0.613g、タイソウ(第3類)2.451g、タクシャ(条第3類)1.765g、トウキ(第3類)0.943g、ブクリョウ(条第3類)0.613g	—	0	—	0
婦人薬	カンゾウ(条第3類)0.21g、ケイヒ(第3類)0.21g、サフラン(第3類)0.03g、シャクヤク(第3類)0.39g、センキュウ(条第3類)0.39g、トウキ(第3類)0.39g、ニンジン(第3類)0.09g、ブクリョウ(条第3類)0.39g、モッコウ(第3類)0.21g	—	0	—	0
婦人薬	オウゴン(条第3類)1g、シャクヤク(第3類)1g、センキュウ(条第3類)1g、ソウジュツ(条第3類)0.5g、トウキ(第3類)1g、ブクリョウ(条第3類)0.5g	・下痢 ・胃不快感	2	—	0
婦人薬	ケイヒ(第3類)500mg、シャクヤク(第3類)1700mg、ショウキョウ(第3類)500mg、センキュウ(条第3類)1100mg、タクシャ(条第3類)600mg、トウキ(第3類)400mg、ビヤクジュツ(条第3類)600mg、ブクリョウ(条第3類)600mg	悪心、嘔吐	3	—	0
婦人薬	ケイヒ(第3類)375mg、シャクヤク(第3類)1275mg、ショウキョウ(第3類)375mg、センキュウ(条第3類)825mg、タクシャ(条第3類)450mg、トウキ(第3類)300mg、ビヤクジュツ(条第3類)450mg、ブクリョウ(条第3類)450mg	—	0	—	0
その他薬効群	ゴオウ(第3類)100mg、ニンジン(第3類)700mg	—	0	—	0
その他薬効群	ケイヒ(第3類)200mg、コウジン(第3類)1660mg、ゴオウ(第3類)15mg、ローヤルゼリー(第3類)100mg、ロクジョウ(第3類)50mg	—	0	—	0