


【問36】 鼻呼吸（ベースライン）

	n(人)	%
基本的にしていない	40	17.0%
基本的にしている	195	83.0%
合計	235	100.0%


【問37】 口呼吸（ベースライン）

	n(人)	%
基本的にしていない	159	67.7%
基本的にしている	76	32.3%
合計	235	100.0%

【問36】 鼻呼吸（ベースライン）



【問37】 口呼吸（ベースライン）




【問38】 日常生活での開口 (ベースライン)

	n(人)	%
基本的に閉じている	140	59.6%
基本的に開いている	94	40.0%
不明	1	0.4%
合計	235	100.0%


【問39】 口唇を刺激すると口が閉じますか (ベースライン)

	n(人)	%
閉じられる	204	86.8%
閉じようとする	19	8.1%
閉じられない	7	3.0%
まったく閉じようとししない	5	2.1%
合計	235	100.0%

【問38】 日常生活での開口 (ベースライン)




【問39】 口唇を刺激すると口が閉じますか (ベースライン)



【問40】 口腔乾燥感（ベースライン）

	n(人)	%
全くない	96	40.9%
あまりない	26	11.1%
ときどき	30	12.8%
いつも	26	11.1%
聞き取り不可能	57	24.3%
合計	235	100.0%


【問40】 口腔乾燥感（ベースライン）



【問41】 飲み込みにくい感じがありますか。

	n(人)	%
全くない	134	57.0%
あまりない	18	7.7%
ときどき	18	7.7%
いつも	6	2.6%
聞き取り不可能	59	25.1%
合計	235	100.0%


【問41】 飲み込みにくい感じがありますか。



【問42】 経口摂取

	n(人)	%
している	204	86.8%
していない	31	13.2%
合計	235	100.0%


【問42】 経口摂取



【問43】 主食の食内容

	n(人)	%
普通	51	21.7%
軟食	95	40.4%
流動食	57	24.3%
経口摂取していない	32	13.6%
合計	235	100.0%

【問43】 主食の食内容




【問44】 副菜の食内容

	n(人)	%
普通	51	21.7%
軟食・刻み	107	45.5%
流動食	48	20.4%
経口摂取していない	29	12.3%
合計	235	100.0%


【問45】 栄養摂取の手段

	n(人)	%
経口摂取	203	86.4%
PEG（胃ろう）	18	7.7%
NG（経鼻経管栄養）	12	5.1%
IVH（静脈内栄養）	2	.9%
その他の栄養摂取	0	0.0%
合計	235	100.0%

【問44】 副菜の食内容




【問45】 栄養摂取の手段




【問46】 一日の水分量

	n (人)	%
0~99ml	10	4.3%
100~199ml	17	7.2%
200~299ml	13	5.5%
300~399ml	24	10.2%
400~499ml	14	6.0%
500~599ml	28	11.9%
600~699ml	11	4.7%
700~799ml	16	6.8%
800~899ml	14	6.0%
900~999ml	14	6.0%
1000~1099ml	34	14.5%
1100~1199ml	12	5.1%
1200~1299ml	9	3.8%
1300~1399ml	5	2.1%
1400~1499ml	0	0.0%
1500~1599ml	0	0.0%
1600ml以上	4	1.7%
不明	10	4.3%
合計	235	100.0%




【問47】 1週間の日常的口腔ケア実施日数

日数	n (人)	%
0	1	0.4%
7	226	96.2%
14	6	2.6%
21	2	0.9%
合計	235	100.0%



【問47】 1週間の日常的口腔ケア実施日数


有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
235	0	7.27	1.75



-172-


【問46】 一日の水分量

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
225	10	663.36	428.14




【問48】 1日の口腔ケア回数

回数	n(人)	%
0	1	0.4%
1	18	7.7%
2	10	4.3%
3	205	87.2%
4	1	0.4%
合計	235	100.0%




【問49】 歯磨剤の日常的な使用

	n(人)	%
いいえ	188	80.0%
はい	47	20.0%
合計	235	100.0%




【問48】 1日の口腔ケア回数

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
235	0	2.80	.59



【問50】 保湿剤の使用について

	n(人)	%
使用していない	211	89.8%
市販の液状保湿剤	11	4.7%
市販のゲル状保湿剤	13	5.5%
その他	0	0.0%
合計	235	100.0%




対象者全体の記述統計  
介入終了直後（3日以内）




【問23-1】 上顎左側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)  
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	157	66.8%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	59	25.1%
1/3～2/3にみられる	10	4.3%
2/3以上にみられる	9	3.8%
合計	235	100.0%



【問23-2】 上顎左側大白歯部の残渣 (OCI-R)  
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	181	77.0%
1カ所みられる	32	13.6%
2カ所みられる	16	6.8%
3カ所みられる	6	2.6%
合計	235	100.0%




【問24-1】 上顎前歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)  
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	150	63.8%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	65	27.7%
1/3～2/3にみられる	14	6.0%
2/3以上にみられる	6	2.6%
合計	235	100.0%


【問24-2】 上顎前歯部の残渣 (OCI-R)  
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	184	78.3%
1カ所みられる	26	11.1%
2カ所みられる	18	7.7%
3カ所みられる	7	3.0%
合計	235	100.0%

【問24-1】 上顎前歯部の歯垢や汚れ  
(OCI-P) (介入終了後3日以内)




【問24-2】 上顎前歯部の残渣  
(OCI-R) (介入終了後3日以内)




【問25-1】 上顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)  
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	156	66.4%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	65	27.7%
1/3～2/3にみられる	12	5.1%
2/3以上にみられる	2	0.9%
合計	235	100.0%




【問25-2】 上顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R)  
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	187	79.6%
1カ所みられる	29	12.3%
2カ所みられる	13	5.5%
3カ所みられる	6	2.6%
合計	235	100.0%




【問26-1】 下顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)  
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	169	71.9%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	51	21.7%
1/3～2/3にみられる	11	4.7%
2/3以上にみられる	4	1.7%
合計	235	100.0%




【問26-2】 下顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R)  
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	191	81.3%
1カ所みられる	27	11.5%
2カ所みられる	11	4.7%
3カ所みられる	6	2.6%
合計	235	100.0%




【問27-1】 下顎前歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)  
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	139	59.1%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	77	32.8%
1/3～2/3にみられる	16	6.8%
2/3以上にみられる	3	1.3%
合計	235	100.0%



【問27-2】 下顎前歯部の残渣 (OCI-R)  
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	179	76.2%
1カ所みられる	34	14.5%
2カ所みられる	15	6.4%
3カ所みられる	7	3.0%
合計	235	100.0%





【問28-1】 下顎左側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)  
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	157	66.8%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	65	27.7%
1/3～2/3にみられる	8	3.4%
2/3以上にみられる	5	2.1%
合計	235	100.0%

【問28-2】 下顎左側大白歯部の残渣 (OCI-R)  
(介入終了後3日以内)


	n(人)	%
食物残渣はみられない	197	83.8%
1カ所みられる	20	8.5%
2カ所みられる	14	6.0%
3カ所みられる	4	1.7%
合計	235	100.0%



【問31】 口腔乾燥の臨床診断  
(介入終了後3日以内)


	n(人)	%
正常(0度)	75	31.9%
軽度(1度)	96	40.9%
中程度(2度)	43	18.3%
重度(3度)	21	8.9%
測定不可能	0	0.0%
合計	235	100.0%

【問31】 口腔乾燥の臨床診断  
(介入終了後3日以内)



【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法  
(介入終了後3日以内)


(mm)	n(人)	%
0	33	14.0%
1	65	27.7%
2	46	19.6%
3	53	22.6%
4	18	7.7%
5	9	3.8%
6	4	1.7%
7	2	0.9%
8	3	1.3%
9	1	0.4%
10	1	0.4%
合計	235	100.0%



【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (介入終了後3日以内)

【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法  
(介入終了後3日以内)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
235	0	2.19	1.77





【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (介入終了後3日以内)

【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法  
(介入終了後3日以内)

(mm)	n(人)	%
0	9	3.8%
1	43	18.3%
2	24	10.2%
3	22	9.4%
4	19	8.1%
5	20	8.5%
6	15	6.4%
7	14	6.0%
8	8	3.4%
9	8	3.4%
10	10	4.3%
11	4	1.7%
12	8	3.4%
13	5	2.1%
14	4	1.7%
15	8	3.4%
16	3	1.3%
17	2	0.9%
18	2	0.9%
19	1	0.4%
24	1	0.4%
測定不可能	5	2.1%
合計	235	100.0%

【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法  
(介入終了後3日以内)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
230	5	5.65	4.76





【問33-1】 水分計 舌上  
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
0~4.9%	3	1.3%
5.0~9.9%	3	1.3%
10.0~14.9%	7	3.0%
15.0~19.9%	12	5.1%
20.0~24.9%	51	21.7%
25.0~29.9%	117	49.8%
30.0~34.9%	24	10.2%
35.0~39.9%	1	0.4%
測定不可能	16	6.8%
合計	235	100.0%

【問33-1】 水分計 舌上  
(介入終了後3日以内)


有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
219	16	25.34	5.61





【問33-2】 水分計 頬粘膜  
(介入終了後3日以内)


	n(人)	%
0~4.9%	0	0.0%
5.0~9.9%	1	0.4%
10.0~14.9%	6	2.6%
15.0~19.9%	7	3.0%
20.0~24.9%	28	11.9%
25.0~29.9%	138	58.7%
30.0~34.9%	50	21.3%
35.0~39.9%	3	1.3%
測定不可能	2	0.9%
合計	235	100.0%



【問33-2】 水分計 頬粘膜 (介入終了後3日以内)

【問33-2】 水分計 頬粘膜  
(介入終了後3日以内)


有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
233	2	27.39	4.25



【問33-2】 水分計 頬粘膜 (介入終了後3日以内)

【問34-1】 RSST前 回数  
(介入終了後3日以内)


回数	n(人)	%
0	39	16.6%
1	34	14.5%
2	34	14.5%
3	16	6.8%
4	9	3.8%
5	8	3.4%
6	7	3.0%
7	3	1.3%
8	2	0.9%
測定不可能	83	35.3%
合計	235	100.0%



【問34-1】 RSST前 回数 (介入終了後3日以内)

【問34-1】 RSST前 回数  
(介入終了後3日以内)


有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
152	83	2.01	1.95



【問34-1】 RSST前 回数 (介入終了後3日以内)


【問34-2】 RSST前 3回までの積算時間  
(介入終了後3日以内)

(秒)	n(人)	%
10	1	0.4%
12	2	0.9%
13	2	0.9%
14	4	1.7%
15	9	3.8%
16	1	0.4%
17	3	1.3%
18	2	0.9%
19	4	1.7%
20	3	1.3%
21	1	0.4%
22	2	0.9%
25	2	0.9%
26	1	0.4%
28	1	0.4%
29	1	0.4%
30	6	2.6%
3回未満/測定不可	190	80.9%
合計	235	100.0%



【問35-1】 RSST後 回数  
(介入終了後3日以内)

回数	n(人)	%
0	25	10.6%
1	43	18.3%
2	37	15.7%
3	16	6.8%
4	9	3.8%
5	6	2.6%
6	9	3.8%
7	5	2.1%
9	1	0.4%
10	1	0.4%
測定不可能	83	35.3%
合計	235	100.0%





【問35-1】 RSST後 回数  
(介入終了後3日以内)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
152	83	2.23	2.03


【問34-2】 RSST前 3回までの積算時間  
(介入終了後3日以内)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
45	190	19.29	5.97




【問35-2】 RSST後3回までの積算時間  
(介入終了後3日以内)

(秒)	n(人)	%
0	1	0.4%
10	1	0.4%
12	3	1.3%
13	7	3.0%
14	3	1.3%
15	6	2.6%
16	3	1.3%
17	1	0.4%
18	2	0.9%
19	2	0.9%
20	2	0.9%
22	1	0.4%
23	1	0.4%
24	1	0.4%
25	3	1.3%
27	1	0.4%
28	1	0.4%
29	1	0.4%
30	8	3.4%
33	1	0.4%
3回未満/測定不可	186	79.1%
合計	235	100.0%



【問35-2】 RSST後3回までの積算時間 (介入終了後3日以内)




【問35-2】 RSST後3回までの積算時間 (介入終了後3日以内)

【問35-2】 RSST後3回までの積算時間  
(介入終了後3日以内)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
49	186	19.37	7.37

【問36】 鼻呼吸 (介入終了後3日以内)

	n(人)	%
基本的にしていない	27	11.5%
基本的にしている	208	88.5%
合計	235	100.0%




【問37】 口呼吸（介入終了後3日以内）

	n(人)	%
基本的にしている	85	36.2%
基本的にしている	150	63.8%
合計	235	100.0%

【問38】 日常生活での開口  
（介入終了後3日以内）

	n(人)	%
基本的に閉じている	146	62.1%
基本的に開いている	87	37.0%
不明	2	0.9%
合計	235	100.0%

【問37】 口呼吸  
（介入終了後3日以内）



【問38】 日常生活での開口  
（介入終了後3日以内）

