



【問41】 飲み込みにくい感じがありますか。

	n(人)	%
全くない	67	57.8%
あまりない	6	5.2%
ときどき	7	6.0%
いつも	2	1.7%
聞き取り不可能	34	29.3%
合計	116	100.0%



【問42】 経口摂取

	n(人)	%
している	100	86.2%
していない	16	13.8%
合計	116	100.0%




【問43】 主食の食内容

	n(人)	%
普通	29	25.0%
軟食	44	37.9%
流動食	27	23.3%
経口摂取していない	16	13.8%
合計	116	100.0%


【問44】 副菜の食内容

	n(人)	%
普通	31	26.7%
軟食・刻み	45	38.8%
流動食	25	21.6%
経口摂取していない	15	12.9%
合計	116	100.0%

【問43】 主食の食内容




【問44】 副菜の食内容



【問45】 栄養摂取の手段


	n(人)	%
経口摂取	100	86.2%
PEG (胃ろう)	9	7.8%
NG (経鼻経管栄養)	5	4.3%
IVH (静脈内栄養)	2	1.7%
その他の非経口摂取	0	0.0%
合計	116	100.0%

【問45】 栄養摂取の手段




【問46】 一日の水分量

	n(人)	%
0~99ml	6	5.2%
100~199ml	8	6.9%
200~299ml	2	1.7%
300~399ml	12	10.3%
400~499ml	8	6.9%
500~599ml	9	7.8%
600~699ml	6	5.2%
700~799ml	9	7.8%
800~899ml	3	2.6%
900~999ml	7	6.0%
1000~1099ml	21	18.1%
1100~1199ml	5	4.3%
1200~1299ml	6	5.2%
1300~1399ml	2	1.7%
1400~1499ml	0	0.0%
1500~1599ml	0	0.0%
1600ml以上	3	2.6%
不明	9	7.8%
合計	116	100.0%



【問46】 一日の水分量

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
107	9	710.33	478.91




【問47】 1週間の日常的口腔ケア実施日数

日数	n(人)	%
0	1	0.9%
7	115	99.1%
合計	116	100.0%

【問47】 1週間の日常的口腔ケア実施日数

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
116	0	6.94	0.65




【問47】 1週間の日常的口腔ケア実施日数

【問48】 1日の口腔ケア回数

回数	n(人)	%
0	1	0.9%
1	10	8.6%
2	4	3.4%
3	100	86.2%
4	1	0.9%
合計	116	100.0%


【問48】 1日の口腔ケア回数

有効n	欠損値	平均値	標準偏差
116(人)	0	2.78	0.65




【問48】 1日の口腔ケア回数

-250-



【問47】 1週間の日常的口腔ケア実施日数




【問48】 1日の口腔ケア回数

【問49】 歯磨剤の日常的な使用

	n(人)	%
いいえ	96	82.8%
はい	20	17.2%
合計	116	100.0%


【問49】 歯磨剤の日常的な使用



【問50】 保湿剤の使用について

	n(人)	%
使用していない	105	90.5%
市販の液状保湿剤	5	4.3%
市販のゲル状保湿剤	6	5.2%
その他	0	0.0%
合計	116	100.0%


【問50】 保湿剤の使用について



【問23-1】 上顎左側大白歯部の菌垢や汚れ (OCI-P)
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
菌垢や汚れがみられない	85	73.3%
1/3未満に菌垢や汚れの付着がみられる	24	20.7%
1/3～2/3にみられる	4	3.4%
2/3以上にみられる	3	2.6%
合計	116	100.0%

対照群の記述統計
介入終了直後 (3日以内)




【問23-2】 上顎左側大臼歯部の残渣 (OCI-R)
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	92	79.3%
1カ所みられる	16	13.8%
2カ所みられる	7	6.0%
3カ所みられる	1	0.9%
合計	116	100.0%


【問24-1】 上顎前歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	75	64.7%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	31	26.7%
1/3~2/3にみられる	7	6.0%
2/3以上にみられる	3	2.6%
合計	116	100.0%

【問23-2】 上顎左側大臼歯部の残渣
(OCI-R) (介入終了後3日以内)




【問24-1】 上顎前歯部の歯垢や汚れ
(OCI-P) (介入終了後3日以内)




【問24-2】 上顎前歯部の残渣 (OCI-R)
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	93	80.2%
1カ所みられる	13	11.2%
2カ所みられる	8	6.9%
3カ所みられる	2	1.7%
合計	116	100.0%




【問25-1】 上顎右側大白歯部の菌垢や汚れ (OCI-P)
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
菌垢や汚れがみられない	80	69.0%
1/3未満に菌垢や汚れの付着がみられる	33	28.4%
1/3~2/3にみられる	3	2.6%
2/3以上にみられる	0	0.0%
合計	116	100.0%




【問25-2】 上顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	92	79.3%
1カ所みられる	17	14.7%
2カ所みられる	6	5.2%
3カ所みられる	1	0.9%
合計	116	100.0%




【問26-1】 下顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	85	73.3%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	26	22.4%
1/3～2/3にみられる	4	3.4%
2/3以上にみられる	1	0.9%
合計	116	100.0%




【問26-2】 下顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	95	81.9%
1カ所みられる	13	11.2%
2カ所みられる	5	4.3%
3カ所みられる	3	2.6%
合計	116	100.0%




【問27-1】 下顎前歯部の菌垢や汚れ (OCI-P)
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
菌垢や汚れがみられない	72	62.1%
1/3未満に菌垢や汚れの付着がみられる	37	31.9%
1/3~2/3にみられる	6	5.2%
2/3以上にみられる	1	0.9%
合計	116	100.0%




【問27-2】 下顎前歯部の残渣 (OCI-R)
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	88	75.9%
1カ所みられる	19	16.4%
2カ所みられる	6	5.2%
3カ所みられる	3	2.6%
合計	116	100.0%




【問28-1】 下顎左側大白歯部の菌垢や汚れ (OCI-P) (介入終了後3日以内)

	n(人)	%
菌垢や汚れがみられない	82	70.7%
1/3未満に菌垢や汚れの付着がみられる	29	25.0%
1/3~2/3にみられる	4	3.4%
2/3以上にみられる	1	0.9%
合計	116	100.0%




【問28-2】 下顎左側大臼歯部の残渣 (OCI-R)
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	98	84.5%
1カ所みられる	10	8.6%
2カ所みられる	7	6.0%
3カ所みられる	1	0.9%
合計	116	100.0%




【問31】 口腔乾燥の臨床診断
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
正常 (0度)	36	31.0%
軽度 (1度)	53	45.7%
中程度 (2度)	17	14.7%
重度 (3度)	10	8.6%
測定不可能	0	0.0%
合計	116	100.0%



【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法
(介入終了後3日以内)


(mm)	n(人)	%
0	19	16.4%
1	31	26.7%
2	33	28.4%
3	22	19.0%
4	4	3.4%
5	1	0.9%
6	3	2.6%
7	1	0.9%
8	1	0.9%
10	1	0.9%
合計	116	100.0%



【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (介入終了後3日以内)

【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法
(介入終了後3日以内)


有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
116	0	1.96	1.69



【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (介入終了後3日以内)

【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法
(介入終了後3日以内)


(mm)	n(人)	%
0	6	5.2%
1	24	20.7%
2	19	16.4%
3	8	6.9%
4	9	7.8%
5	8	6.9%
6	8	6.9%
7	5	4.3%
8	5	4.3%
9	3	2.6%
10	4	3.4%
11	2	1.7%
12	4	3.4%
14	2	1.7%
15	5	4.3%
16	1	0.9%
17	1	0.9%
測定不可能	2	1.7%
合計	116	100.0%



【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法 (介入終了後3日以内)

【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法
(介入終了後3日以内)


有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
114	2	4.89	4.37



【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法 (介入終了後3日以内)


【問33-1】 水分計 舌上
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
0~4.9%	3	2.6%
5.0~9.9%	2	1.7%
10.0~14.9%	1	0.9%
15.0~19.9%	9	7.8%
20.0~24.9%	26	22.4%
25.0~29.9%	56	48.3%
30.0~34.9%	12	10.3%
35.0~39.9%	0	0.0%
40.0~49.9%	0	0.0%
50.0~54.9%	0	0.0%
55.0~59.9%	0	0.0%
60.0~64.9%	0	0.0%
65.0~69.9%	0	0.0%
70.0~74.9%	0	0.0%
測定不可能	7	6.0%
合計	116	100.0%




【問33-2】 水分計 頬粘膜
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
0~4.9%	0	0.0%
5.0~9.9%	0	0.0%
10.0~14.9%	3	2.6%
15.0~19.9%	3	2.6%
20.0~24.9%	15	12.9%
25.0~29.9%	72	62.1%
30.0~34.9%	21	18.1%
35.0~39.9%	1	.9%
40.0~49.9%	0	0.0%
50.0~54.9%	0	0.0%
55.0~59.9%	0	0.0%
60.0~64.9%	0	0.0%
65.0~69.9%	0	0.0%
70.0~74.9%	0	0.0%
測定不可能	1	0.9%
合計	116	100.0%




【問33-1】 水分計 舌上
(介入終了後3日以内)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
109	7	24.76	6.12




【問33-2】 水分計 頬粘膜
(介入終了後3日以内)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
115	1	27.24	3.95




【問34-1】 RSST前 回数
(介入終了後3日以内)

回数	n(人)	%
0	19	16.4%
1	20	17.2%
2	17	14.7%
3	8	6.9%
4	6	5.2%
5	2	1.7%
6	1	0.9%
7	1	.9%
8	2	1.7%
測定不可能	40	34.5%
合計	116	100.0%




【問34-2】 RSST前 3回までの積算時間
(介入終了後3日以内)

秒	n(人)	%
10	1	0.9%
12	1	0.9%
13	2	1.7%
14	1	0.9%
15	2	1.7%
18	2	1.7%
19	2	1.7%
20	2	1.7%
21	1	0.9%
22	2	1.7%
25	2	1.7%
26	1	0.9%
28	1	0.9%
3回未満/測定不可	96	82.8%
合計	116	100.0%




【問34-1】 RSST前 回数
(介入終了後3日以内)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
76	40	1.86	1.85




【問34-2】 RSST前 3回までの積算時間
(介入終了後3日以内)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
20	96	18.75	5.06




【問35-1】 RSST後 回数
(介入終了後3日以内)

回数	n(人)	%
0	15	12.9%
1	24	20.7%
2	18	15.5%
3	9	7.8%
4	5	4.3%
5	3	2.6%
6	1	0.9%
7	1	0.9%
9	1	0.9%
10	1	0.9%
測定不可能	38	32.8%
合計	116	100.0%




【問35-2】 RSST後3回までの積算時間
(介入終了後3日以内)

秒	n(人)	%
0	1	0.9%
10	1	0.9%
12	2	1.7%
13	2	1.7%
14	1	0.9%
16	1	0.9%
18	1	0.9%
19	2	1.7%
20	1	0.9%
23	1	0.9%
24	1	0.9%
25	2	1.7%
28	1	0.9%
30	5	4.3%
3回未満/測定不可	94	81.0%
合計	116	100.0%




【問35-1】 RSST後 回数
(介入終了後3日以内)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
78	38	1.97	1.95




【問35-2】 RSST後3回までの積算時間
(介入終了後3日以内)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
22	94	20.05	8.23




【問36】 鼻呼吸（介入終了後3日以内）

	n(人)	%
基本的にしている	105	90.5%
基本的にしている	11	9.5%
合計	116	100.0%




【問37】 口呼吸（介入終了後3日以内）

	n(人)	%
基本的にしている	44	37.9%
基本的にしている	72	62.1%
合計	116	100.0%




【問38】 日常生活での開口
(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
基本的に閉じている	73	62.9%
基本的に開いている	42	36.2%
不明	1	0.9%
合計	116	100.0%



【問39】 口唇を刺激すると口が閉じますか
(介入終了後3日以内)


	n(人)	%
閉じられる	90	77.6%
閉じようとする	20	17.2%
閉じられない	1	0.9%
まったく閉じようとしらない	5	4.3%
合計	116	100.0%



【問40】 口腔乾燥感(介入終了後3日以内)

	n(人)	%
全くない	46	39.7%
あまりない	16	13.8%
ときどき	14	12.1%
いつも	12	10.3%
聞き取り不可能	28	24.1%
合計	116	100.0%

【問40】 口腔乾燥感
(介入終了後3日以内)



対照群の記述統計
介入終了後2週間

【問23-1】 上顎左側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(介入終了後2週間)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	86	74.1%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	21	18.1%
1/3～2/3にみられる	6	5.2%
2/3以上にみられる	3	2.6%
無回答	0	0.0%
合計	116	100.0%

【問23-2】 上顎左側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(介入終了後2週間)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	95	81.9%
1カ所みられる	13	11.2%
2カ所みられる	4	3.4%
3カ所みられる	4	3.4%
合計	116	100.0%

