




【問21】 現在歯数

本	n(人)	%
0	34	28.6%
1	3	2.5%
3	3	2.5%
5	3	2.5%
6	5	4.2%
7	8	6.7%
8	8	6.7%
9	4	3.4%
10	2	1.7%
11	2	1.7%
12	1	0.8%
13	5	4.2%
14	7	5.9%
15	1	0.8%
16	4	3.4%
19	4	3.4%
20	2	1.7%
21	3	2.5%
22	4	3.4%
23	2	1.7%
24	1	0.8%
25	1	0.8%
26	3	2.5%
27	1	0.8%
28	7	5.9%
29	1	0.8%
合計	119	100.0%



【問22-1】 左側小臼歯部

	n(人)	%
なし	64	53.8%
あり	54	45.4%
診査不可能	1	0.8%
合計	119	100.0%



【問21】 現在歯数

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
119	0	10.09	9.34


【問22-2】 左側大臼歯部

	n(人)	%
なし	71	59.7%
あり	46	38.7%
診査不可能	2	1.7%
合計	119	100.0%


【問22-3】 右側小臼歯部

	n(人)	%
なし	63	52.9%
あり	56	47.1%
診査不可能	0	0.0%
合計	119	100.0%

【問22-2】 左側大臼歯部




【問22-3】 右側小臼歯部




【問22-4】 右側大白歯部

	n(人)	%
なし	74	62.2%
あり	43	36.1%
診査不可能	2	1.7%
合計	119	100.0%



【問22-5】 前歯部

	n(人)	%
なし	58	48.7%
あり	61	51.3%
診査不可能	0	0.0%
合計	119	100.0%




【問23-1】 上顎左側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	68	57.1%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	31	26.1%
1/3～2/3にみられる	11	9.2%
2/3以上にみられる	9	7.6%
合計	119	100.0%


【問23-2】 上顎左側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	91	76.5%
1カ所みられる	21	17.6%
2カ所みられる	4	3.4%
3カ所みられる	3	2.5%
合計	119	100.0%

【問23-1】 上顎左側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P) (ベースライン)



【問23-2】 上顎左側大白歯部の残渣 (OCI-R) (ベースライン)




【問24-1】 上顎前歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	65	54.6%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	38	31.9%
1/3～2/3にみられる	13	10.9%
2/3以上にみられる	3	2.5%
合計	119	100.0%


【問24-2】 上顎前歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	88	73.9%
1カ所みられる	18	15.1%
2カ所みられる	5	4.2%
3カ所みられる	8	6.7%
合計	119	100.0%

【問24-1】 上顎前歯部の歯垢や汚れ
(OCI-P) (ベースライン)



【問24-2】 上顎前歯部の残渣
(OCI-R) (ベースライン)




【問25-1】 上顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	72	60.5%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	27	22.7%
1/3～2/3にみられる	12	10.1%
2/3以上にみられる	8	6.7%
合計	119	100.0%


【問25-2】 上顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	97	81.5%
1カ所みられる	15	12.6%
2カ所みられる	3	2.5%
3カ所みられる	4	3.4%
合計	119	100.0%

【問25-1】 上顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P) (ベースライン)




【問25-2】 上顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R) (ベースライン)



【問26-1】 下顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	74	62.2%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	24	20.2%
1/3～2/3にみられる	12	10.1%
2/3以上にみられる	9	7.6%
合計	119	100.0%


【問26-1】 下顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P) (ベースライン)



【問26-2】 下顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	97	81.5%
1カ所みられる	17	14.3%
2カ所みられる	3	2.5%
3カ所みられる	2	1.7%
合計	119	100.0%

【問26-2】 下顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R) (ベースライン)




【問27-1】 下顎前歯部の歯垢や汚れ (OCI-P) (ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	53	44.5%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	42	35.3%
1/3～2/3にみられる	19	16.0%
2/3以上にみられる	5	4.2%
合計	119	100.0%


【問27-2】 下顎前歯部の残渣 (OCI-R) (ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	98	82.4%
1カ所みられる	12	10.1%
2カ所みられる	7	5.9%
3カ所みられる	2	1.7%
合計	119	100.0%

【問27-1】 下顎前歯部の歯垢や汚れ (OCI-P) (ベースライン)




【問27-2】 下顎前歯部の残渣 (OCI-R)(ベースライン)




【問28-1】 下顎左側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	76	63.9%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	27	22.7%
1/3～2/3にみられる	10	8.4%
2/3以上にみられる	6	5.0%
合計	119	100.0%



【問28-2】 下顎左側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	102	85.7%
1カ所みられる	14	11.8%
2カ所みられる	1	0.8%
3カ所みられる	2	1.7%
合計	119	100.0%




【問29-1】 上顎：義歯の必要性

	n(人)	%
なし	29	24.4%
部分床義歯が必要	39	32.8%
全部床義歯が必要	51	42.9%
合計	119	100.0%


【問29-2】 上顎：義歯の装着状況

	n(人)	%
義歯必要なし	26	21.8%
未装着	42	35.3%
食事中など一部の時間だけ使用している	12	10.1%
一日中、使用している	39	32.8%
合計	119	100.0%

【問29-1】 上顎：義歯の必要性




【問29-2】 上顎：義歯の装着状況



【問30-1】 下顎：義歯の必要性

	n(人)	%
なし	22	18.5%
部分床義歯が必要	54	45.4%
全部床義歯が必要	43	36.1%
合計	119	100.0%


【問30-1】 下顎：義歯の必要性



【問30-2】 下顎：義歯の装着状況

	n(人)	%
義歯必要なし	22	18.5%
未装着	51	42.9%
食事中など一部の時間だけ使用している	11	9.2%
一日中、使用している	35	29.4%
合計	119	100.0%


【問30-2】 下顎：義歯の装着状況



【問31】 臨床診断 (ベースライン)

	n(人)	%
正常 (0度)	27	22.7%
軽度 (1度)	51	42.9%
中程度 (2度)	27	22.7%
重度 (3度)	14	11.8%
測定不可能	0	0.0%
合計	119	100.0%

【問31】 臨床診断 (ベースライン)




【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (ベースライン)


mm	n(人)	%
0	16	13.4%
1	25	21.0%
2	30	25.2%
3	25	21.0%
4	23	19.3%
合計	119	100.0%

【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
119	0	2.12	1.32




【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (ベースライン)




【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (ベースライン)

【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法
(ベースライン)

mm	n(人)	%
0	5	4.2%
1	14	11.8%
2	17	14.3%
3	10	8.4%
4	16	13.4%
5	4	3.4%
6	12	10.1%
7	7	5.9%
8	4	3.4%
9	3	2.5%
10	7	5.9%
11	3	2.5%
12	3	2.5%
13	4	3.4%
14	3	2.5%
16	1	0.8%
17	2	1.7%
18	2	1.7%
21	1	0.8%
測定不可能	1	0.8%
合計	119	100.0%



【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法 (ベースライン)




【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法 (ベースライン)

【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法
(ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
118	1	5.78	4.66

【問33-1】 水分計 舌上
(ベースライン)


	n(人)	%
0~4.9%	4	3.4%
5.0~9.9%	2	1.7%
10.0~14.9%	1	0.8%
15.0~19.9%	2	1.7%
20.0~24.9%	27	22.7%
25.0~29.9%	45	37.8%
30.0~34.9%	24	20.2%
35.0~39.9%	7	5.9%
40.0~49.9%	0	0.0%
50.0~54.9%	0	0.0%
55.0~59.9%	1	0.8%
60.0~64.9%	0	0.0%
65.0~69.9%	0	0.0%
70.0~74.9%	0	0.0%
測定不可能	6	5.0%
合計	119	100.0%



【問33-1】 水分計 舌上 (ベースライン)

【問33-1】 水分計 舌上 (ベースライン)


有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
113	6	26.38	7.67



【問33-1】 水分計 舌上 (ベースライン)

【問33-2】 水分計 頬粘膜
(ベースライン)


	n(人)	%
0~4.9%	0	0.0%
5.0~9.9%	0	0.0%
10.0~14.9%	0	0.0%
15.0~19.9%	4	3.4%
20.0~24.9%	17	14.3%
25.0~29.9%	50	42.0%
30.0~34.9%	38	31.9%
35.0~39.9%	9	7.6%
40.0~49.9%	0	0.0%
50.0~54.9%	0	0.0%
55.0~59.9%	0	0.0%
60.0~64.9%	0	0.0%
65.0~69.9%	0	0.0%
70.0~74.9%	0	0.0%
測定不可能	1	0.8%
合計	119	100.0%



【問33-2】 水分計 頬粘膜 (ベースライン)

【問34-1】 RSST前 回数
(ベースライン)


回数	n(人)	%
0	14	11.8%
1	13	10.9%
2	19	16.0%
3	5	4.2%
4	4	3.4%
5	5	4.2%
6	7	5.9%
7	4	3.4%
8	1	0.8%
9	1	0.8%
測定不可能	46	38.7%
合計	119	100.0%



【問34-1】 RSST前 回数 (ベースライン)

【問34-1】 RSST前 回数 (ベースライン)


有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
73	46	2.66	2.36



【問34-1】 RSST前 回数 (ベースライン)

【問33-2】 水分計 頬粘膜 (ベースライン)


有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
118	1	28.57	4.31



【問33-2】 水分計 頬粘膜 (ベースライン)


【問34-2】 RSST前 3回までの積算時間
(ベースライン)

秒	n(人)	%
7	1	0.8%
8	1	0.8%
9	1	0.8%
10	1	0.8%
12	2	1.7%
14	5	4.2%
15	1	0.8%
16	3	2.5%
17	3	2.5%
19	3	2.5%
20	2	1.7%
23	1	0.8%
25	1	0.8%
30	2	1.7%
3回未満/測定不可	92	77.3%
合計	119	100.0%



【問35-1】 RSST後 回数
(ベースライン)

回数	n(人)	%
0	8	6.7%
1	19	16.0%
2	19	16.0%
3	7	5.9%
4	3	2.5%
5	3	2.5%
6	8	6.7%
7	7	5.9%
12	1	0.8%
測定不可能	44	37.0%
合計	119	100.0%





【問35-1】 RSST後 回数 (ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
75	44	2.85	2.45


【問34-2】 RSST前 3回までの積算時間
(ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
27	92	16.56	5.75




【問35-2】 RSST後 3回までの積算時間
(ベースライン)

秒	n(人)	%
5	1	0.8%
8	1	0.8%
9	1	0.8%
10	1	0.8%
11	1	0.8%
12	3	2.5%
13	2	1.7%
14	3	2.5%
15	2	1.7%
16	2	1.7%
17	2	1.7%
18	2	1.7%
20	1	0.8%
22	1	0.8%
24	1	0.8%
27	1	0.8%
28	1	0.8%
29	1	0.8%
30	2	1.7%
3回未満/測定不可	90	75.6%
合計	119	100.0%



【問35-2】 RSST後 3回までの積算時間 (ベースライン)




【問35-2】 RSST後 3回までの積算時間 (ベースライン)

【問36】 鼻呼吸 (ベースライン)

	n(人)	%
基本的にしていない	20	16.8%
基本的にしている	99	83.2%
合計	119	100.0%

【問36】 鼻呼吸 (ベースライン)




【問35-2】 RSST後 3回までの積算時間
(ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
29	90	16.86	6.83

【問37】 口呼吸（ベースライン）

	n(人)	%
基本的にしていない	81	68.1%
基本的にしている	38	31.9%
合計	119	100.0%


【問37】 口呼吸（ベースライン）



【問38】 日常生活での開口（ベースライン）


	n(人)	%
基本的に閉じている	68	57.1%
基本的に開いている	50	42.0%
不明	1	0.8%
合計	119	100.0%

【問38】 日常生活での開口（ベースライン）




【問39】 口唇を刺激すると口が閉じますか
(ベースライン)

	n(人)	%
閉じられる	104	87.4%
閉じようとする	13	10.9%
閉じられない	1	.8%
まったく閉じようとしらない	1	0.8%
合計	119	100.0%




【問40】 口腔乾燥感 (ベースライン)

	n(人)	%
全くない	51	42.9%
あまりない	15	12.6%
ときどき	14	11.8%
いつも	16	13.4%
聞き取り不可能	23	19.3%
合計	119	100.0%




【問41】 飲み込みにくい感じがありますか。

	n(人)	%
全くない	67	56.3%
あまりない	12	10.1%
ときどき	11	9.2%
いつも	4	3.4%
聞き取り不可能	25	21.0%
合計	119	100.0%



【問42】 経口摂取

	n(人)	%
している	104	87.4%
していない	15	12.6%
合計	119	100.0%




【問43】 主食の食内容

	n(人)	%
普通	22	18.5%
軟食	51	42.9%
流動食	30	25.2%
経口摂取していない	16	13.4%
合計	119	100.0%

【問44】 副菜の食内容

	n(人)	%
普通	20	16.8%
軟食・刻み	62	52.1%
流動食	23	19.3%
経口摂取していない	14	11.8%
合計	119	100.0%

【問43】 主食の食内容



【問44】 副菜の食内容

