

問 27 心の元気さについておたずねします。過去 1 カ月間についてお答えください。次のそれぞれの質問について、あてはまる欄 1 つに○をつけて下さい。

問 27-ア 神経過敏に感じましたか

	いつも	%	たいてい	%	時々	%	少しだけ	%	まったくない	%	未回答	%	総数
男性 40歳未満	3	1.8	7	4.2	39	23.2	31	18.5	87	51.8	1	0.6	168
40歳以上50歳未満	1	0.8	7	5.5	35	27.6	25	19.7	59	46.5	0	0.0	127
50歳以上60歳未満	3	1.6	7	3.6	39	20.2	59	30.6	84	43.5	1	0.5	193
60歳以上70歳未満	6	1.6	8	2.1	75	19.9	103	27.3	184	48.8	1	0.3	377
70歳以上80歳未満	2	0.7	9	3.3	52	18.8	57	20.7	155	56.2	1	0.4	276
80歳以上	2	2.0	3	3.1	19	19.4	13	13.3	59	60.2	2	2.0	98
総計	17	1.4	41	3.3	259	20.9	288	23.2	628	50.7	6	0.5	1239
女性 40歳未満	15	4.8	11	3.5	73	23.5	78	25.2	133	42.9	0	0.0	310
40歳以上50歳未満	10	5.5	7	3.8	48	26.2	57	31.1	61	33.3	0	0.0	183
50歳以上60歳未満	10	3.5	11	3.8	78	27.3	95	33.2	91	31.8	1	0.3	286
60歳以上70歳未満	13	3.0	23	5.3	94	21.6	126	29.0	178	40.9	1	0.2	435
70歳以上80歳未満	16	4.8	15	4.5	70	21.0	90	26.9	141	42.2	2	0.6	334
80歳以上	2	1.8	1	0.9	14	12.6	19	17.1	74	66.7	1	0.9	111
総計	66	4.0	68	4.1	377	22.7	465	28.0	678	40.9	5	0.3	1659
総計	83	2.9	109	3.8	636	21.9	753	26.0	1306	45.1	11	0.4	2898

【コメント】過去 1 カ月間で、神経過敏に感じたことがまったくない人の割合は全体で 45.1%、男性で 50.7%、女性で 40.9%であった。年齢階級別にみると顕著な傾向がみられなかった。

問 27-イ 絶望的だと感じましたか

	いつも	%	たいてい	%	時々	%	少しだけ	%	まったくない	%	未回答	%	総数
男性 40歳未満	0	0.0	0	0.0	8	4.8	22	13.1	137	81.5	1	0.6	168
40歳以上50歳未満	1	0.8	0	0.0	8	6.3	22	17.3	96	75.6	0	0.0	127
50歳以上60歳未満	1	0.5	3	1.6	11	5.7	15	7.8	162	83.9	1	0.5	193
60歳以上70歳未満	0	0.0	1	0.3	12	3.2	43	11.4	320	84.9	1	0.3	377
70歳以上80歳未満	0	0.0	0	0.0	10	3.6	16	5.8	249	90.2	1	0.4	276
80歳以上	0	0.0	1	1.0	2	2.0	2	2.0	91	92.9	2	2.0	98
総計	2	0.2	5	0.4	51	4.1	120	9.7	1055	85.1	6	0.5	1239
女性 40歳未満	5	1.6	4	1.3	18	5.8	38	12.3	245	79.0	0	0.0	310
40歳以上50歳未満	1	0.5	1	0.5	17	9.3	29	15.8	135	73.8	0	0.0	183
50歳以上60歳未満	1	0.3	2	0.7	24	8.4	49	17.1	209	73.1	1	0.3	286
60歳以上70歳未満	1	0.2	3	0.7	19	4.4	49	11.3	359	82.5	4	0.9	435
70歳以上80歳未満	3	0.9	3	0.9	14	4.2	40	12.0	272	81.4	2	0.6	334
80歳以上	0	0.0	0	0.0	4	3.6	7	6.3	98	88.3	2	1.8	111
総計	11	0.7	13	0.8	96	5.8	212	12.8	1318	79.4	9	0.5	1659
総計	13	0.4	18	0.6	147	5.1	332	11.5	2373	81.9	15	0.5	2898

【コメント】過去 1 カ月間で、絶望的だと感じたことがまったくない人の割合は全体で 81.9%、男性で 85.1%、女性で 79.4%であった。年齢階級別にみると顕著な傾向が見られなかった。

問27-ウ そわそわ、落ち着かなく感じましたか

	いつも	%	たいてい	%	時々	%	少しだけ	%	まったくない	%	未回答	%	総数
男性 40歳未満	0	0.0	5	3.0	18	10.7	49	29.2	95	56.5	1	0.6	168
40歳以上50歳未満	1	0.8	1	0.8	24	18.9	32	25.2	68	53.5	1	0.8	127
50歳以上60歳未満	0	0.0	2	1.0	26	13.5	49	25.4	115	59.6	1	0.5	193
60歳以上70歳未満	0	0.0	2	0.5	23	6.1	96	25.5	255	67.6	1	0.3	377
70歳以上80歳未満	0	0.0	3	1.1	14	5.1	39	14.1	218	79.0	2	0.7	276
80歳以上	0	0.0	1	1.0	6	6.1	6	6.1	84	85.7	1	1.0	98
総計	1	0.1	14	1.1	111	9.0	271	21.9	835	67.4	7	0.6	1239
女性 40歳未満	4	1.3	8	2.6	36	11.6	78	25.2	184	59.4	0	0.0	310
40歳以上50歳未満	4	2.2	1	0.5	23	12.6	55	30.1	100	54.6	0	0.0	183
50歳以上60歳未満	1	0.3	3	1.0	36	12.6	71	24.8	174	60.8	1	0.3	286
60歳以上70歳未満	1	0.2	5	1.1	35	8.0	102	23.4	291	66.9	1	0.2	435
70歳以上80歳未満	3	0.9	3	0.9	31	9.3	73	21.9	222	66.5	2	0.6	334
80歳以上	1	0.9	0	0.0	6	5.4	10	9.0	92	82.9	2	1.8	111
総計	14	0.8	20	1.2	167	10.1	389	23.4	1063	64.1	6	0.4	1659
総計	15	0.5	34	1.2	278	9.6	660	22.8	1898	65.5	13	0.4	2898

【コメント】過去1カ月間で、そわそわ、落ち着かなく感じたことがまったくない人の割合は全体で65.5%、男性で67.4%、女性で64.1%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が増加する傾向がみられた。

問27-エ 気分が沈みこんで、何が起ころしても気が晴れないように感じましたか

	いつも	%	たいてい	%	時々	%	少しだけ	%	まったくない	%	未回答	%	総数
男性 40歳未満	1	0.6	2	1.2	16	9.5	37	22.0	111	66.1	1	0.6	168
40歳以上50歳未満	2	1.6	1	0.8	16	12.6	36	28.3	72	56.7	0	0.0	127
50歳以上60歳未満	0	0.0	1	0.5	20	10.4	56	29.0	115	59.6	1	0.5	193
60歳以上70歳未満	0	0.0	3	0.8	28	7.4	87	23.1	257	68.2	2	0.5	377
70歳以上80歳未満	0	0.0	4	1.4	18	6.5	35	12.7	218	79.0	1	0.4	276
80歳以上	1	1.0	1	1.0	5	5.1	10	10.2	79	80.6	2	2.0	98
総計	4	0.3	12	1.0	103	8.3	261	21.1	852	68.8	7	0.6	1239
女性 40歳未満	5	1.6	8	2.6	41	13.2	87	28.1	169	54.5	0	0.0	310
40歳以上50歳未満	3	1.6	2	1.1	30	16.4	53	29.0	95	51.9	0	0.0	183
50歳以上60歳未満	2	0.7	2	0.7	42	14.7	81	28.3	157	54.9	2	0.7	286
60歳以上70歳未満	2	0.5	5	1.1	32	7.4	121	27.8	273	62.8	2	0.5	435
70歳以上80歳未満	4	1.2	3	0.9	38	11.4	55	16.5	233	69.8	1	0.3	334
80歳以上	0	0.0	0	0.0	9	8.1	13	11.7	87	78.4	2	1.8	111
総計	16	1.0	20	1.2	192	11.6	410	24.7	1014	61.1	7	0.4	1659
総計	20	0.7	32	1.1	295	10.2	671	23.2	1866	64.4	14	0.5	2898

【コメント】過去1カ月間で、気分が沈みこんで、何が起ころしても気が晴れないように感じたことがまったくない人の割合は全体で64.4%、男性で68.8%、女性で61.1%であった。年齢階級別にみると男女とも70歳代、80歳代で増加する傾向がみられた。

問 27-オ 何をするのも骨折りだと感じましたか

	いつも	%	たいてい	%	時々	%	少しだけ	%	まったくない	%	未回答	%	総数
男性 40歳未満	0	0.0	4	2.4	11	6.5	45	26.8	107	63.7	1	0.6	168
40歳以上50歳未満	1	0.8	2	1.6	14	11.0	43	33.9	67	52.8	0	0.0	127
50歳以上60歳未満	2	1.0	1	0.5	19	9.8	54	28.0	116	60.1	1	0.5	193
60歳以上70歳未満	0	0.0	1	0.3	27	7.2	103	27.3	244	64.7	2	0.5	377
70歳以上80歳未満	0	0.0	3	1.1	25	9.1	61	22.1	186	67.4	1	0.4	276
80歳以上	0	0.0	2	2.0	8	8.2	21	21.4	65	66.3	2	2.0	98
総計	3	0.2	13	1.0	104	8.4	327	26.4	785	63.4	7	0.6	1239
女性 40歳未満	4	1.3	3	1.0	40	12.9	88	28.4	175	56.5	0	0.0	310
40歳以上50歳未満	1	0.5	1	0.5	33	18.0	66	36.1	82	44.8	0	0.0	183
50歳以上60歳未満	2	0.7	4	1.4	33	11.5	108	37.8	138	48.3	1	0.3	286
60歳以上70歳未満	3	0.7	6	1.4	38	8.7	113	26.0	274	63.0	1	0.2	435
70歳以上80歳未満	3	0.9	4	1.2	42	12.6	77	23.1	205	61.4	3	0.9	334
80歳以上	3	2.7	1	0.9	7	6.3	23	20.7	75	67.6	2	1.8	111
総計	16	1.0	19	1.1	193	11.6	475	28.6	949	57.2	7	0.4	1659
総計	19	0.7	32	1.1	297	10.2	802	27.7	1734	59.8	14	0.5	2898

【コメント】過去1カ月間で、何をするのも骨折りだと感じたことがまったくない人の割合は全体で59.8%、男性で63.4%、女性で57.2%であった。年齢階級別にみると顕著な傾向が見られなかった。

問 27-カ 自分が価値のない人間だと感じましたか

	いつも	%	たいてい	%	時々	%	少しだけ	%	まったくない	%	未回答	%	総数
男性 40歳未満	1	0.6	3	1.8	9	5.4	20	11.9	134	79.8	1	0.6	168
40歳以上50歳未満	0	0.0	1	0.8	10	7.9	24	18.9	92	72.4	0	0.0	127
50歳以上60歳未満	0	0.0	1	0.5	12	6.2	27	14.0	152	78.8	1	0.5	193
60歳以上70歳未満	2	0.5	1	0.3	29	7.7	66	17.5	278	73.7	1	0.3	377
70歳以上80歳未満	4	1.4	1	0.4	16	5.8	38	13.8	216	78.3	1	0.4	276
80歳以上	0	0.0	1	1.0	6	6.1	14	14.3	75	76.5	2	2.0	98
総計	7	0.6	8	0.6	82	6.6	189	15.3	947	76.4	6	0.5	1239
女性 40歳未満	7	2.3	4	1.3	23	7.4	43	13.9	233	75.2	0	0.0	310
40歳以上50歳未満	2	1.1	2	1.1	22	12.0	35	19.1	122	66.7	0	0.0	183
50歳以上60歳未満	1	0.3	2	0.7	20	7.0	65	22.7	197	68.9	1	0.3	286
60歳以上70歳未満	4	0.9	1	0.2	28	6.4	71	16.3	330	75.9	1	0.2	435
70歳以上80歳未満	9	2.7	5	1.5	28	8.4	49	14.7	242	72.5	1	0.3	334
80歳以上	3	2.7	1	0.9	7	6.3	13	11.7	86	77.5	1	0.9	111
総計	26	1.6	15	0.9	128	7.7	276	16.6	1210	72.9	4	0.2	1659
総計	33	1.1	23	0.8	210	7.2	465	16.0	2157	74.4	10	0.3	2898

【コメント】過去1カ月間で、自分が価値のない人間だと感じたことがまったくない人の割合は全体で74.4%、男性で76.4%、女性で72.9%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢による変化がみられなかった。

問 28 脳卒中の症状について知っているもの全てに○をつけて下さい。

問 28 突然、片方の手足や顔半分の麻痺・しびれが起こる

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	116	69.0	52	31.0	168
	40歳以上50歳未満	93	73.2	34	26.8	127
	50歳以上60歳未満	154	79.8	39	20.2	193
	60歳以上70歳未満	285	75.6	92	24.4	377
	70歳以上80歳未満	198	71.7	78	28.3	276
	80歳以上	54	55.1	44	44.9	98
	総計	900	72.6	339	27.4	1239
女性	40歳未満	240	77.4	70	22.6	310
	40歳以上50歳未満	146	79.8	37	20.2	183
	50歳以上60歳未満	230	80.4	56	19.6	286
	60歳以上70歳未満	338	77.7	97	22.3	435
	70歳以上80歳未満	244	73.1	90	26.9	334
	80歳以上	73	65.8	38	34.2	111
	総計	1271	76.6	388	23.4	1659
総計	2171	74.9	727	25.1	2898	

【コメント】脳卒中の症状についての知識を問う設問において、突然、片方の手足や顔半分の麻痺・しびれが起こると回答した人の割合は、全体で 74.9%、男性で 72.6%、女性で 76.6%であった。年齢階級別にみると、男女とも 50 歳代が最も高く割合が山型に分布する傾向がみられた。

問 28 両手の指先がしびれる

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	54	32.1	114	67.9	168
	40歳以上50歳未満	56	44.1	71	55.9	127
	50歳以上60歳未満	93	48.2	100	51.8	193
	60歳以上70歳未満	182	48.3	195	51.7	377
	70歳以上80歳未満	143	51.8	133	48.2	276
	80歳以上	47	48.0	51	52.0	98
	総計	575	46.4	664	53.6	1239
女性	40歳未満	141	45.5	169	54.5	310
	40歳以上50歳未満	94	51.4	89	48.6	183
	50歳以上60歳未満	152	53.1	134	46.9	286
	60歳以上70歳未満	246	56.6	189	43.4	435
	70歳以上80歳未満	183	54.8	151	45.2	334
	80歳以上	56	50.5	55	49.5	111
	総計	872	52.6	787	47.4	1659
総計	1447	49.9	1451	50.1	2898	

【コメント】脳卒中の症状についての知識を問う設問において、両手の指先がしびれると回答した人の割合は、全体で 49.9%、男性で 46.4%、女性で 52.6%であった。年齢階級別にみると、男女とも顕著な傾向がみられなかった。

問 28 突然、ろれつが回らなくなったり、言葉が出なくなったり、他人の言うことが理解できなくなる

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	112	66.7	56	33.3	168
	40歳以上50歳未満	101	79.5	26	20.5	127
	50歳以上60歳未満	154	79.8	39	20.2	193
	60歳以上70歳未満	288	76.4	89	23.6	377
	70歳以上80歳未満	193	69.9	83	30.1	276
	80歳以上	57	58.2	41	41.8	98
	総計	905	73.0	334	27.0	1239
女性	40歳未満	242	78.1	68	21.9	310
	40歳以上50歳未満	153	83.6	30	16.4	183
	50歳以上60歳未満	233	81.5	53	18.5	286
	60歳以上70歳未満	362	83.2	73	16.8	435
	70歳以上80歳未満	237	71.0	97	29.0	334
	80歳以上	69	62.2	42	37.8	111
	総計	1296	78.1	363	21.9	1659
総計	2201	75.9	697	24.1	2898	

【コメント】脳卒中の症状についての知識を問う設問において、突然、ろれつが回らなくなったり、言葉が出なくなったり、他人の言うことが理解できなくなると回答した人の割合は、全体で 75.9%、男性で 73.0%、女性で 78.1%であった。年齢階級別にみると、40歳未満、80歳以上で回答する割合が低い傾向があった。

問 28 突然、経験したことのない激しい頭痛がする

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	63	37.5	105	62.5	168
	40歳以上50歳未満	64	50.4	63	49.6	127
	50歳以上60歳未満	102	52.8	91	47.2	193
	60歳以上70歳未満	173	45.9	204	54.1	377
	70歳以上80歳未満	117	42.4	159	57.6	276
	80歳以上	39	39.8	59	60.2	98
	総計	558	45.0	681	55.0	1239
女性	40歳未満	174	56.1	136	43.9	310
	40歳以上50歳未満	130	71.0	53	29.0	183
	50歳以上60歳未満	177	61.9	109	38.1	286
	60歳以上70歳未満	242	55.6	193	44.4	435
	70歳以上80歳未満	176	52.7	158	47.3	334
	80歳以上	47	42.3	64	57.7	111
	総計	946	57.0	713	43.0	1659
総計	1504	51.9	1394	48.1	2898	

【コメント】脳卒中の症状についての知識を問う設問において、突然、経験したことのない激しい頭痛がすると回答した人の割合は、全体で 51.9%、男性で 45.0%、女性で 57.0%であった。年齢階級別にみると、男女とも 40歳代、50歳代が高く割合が山型に分布する傾向がみられた。

問 28 突然、鼻血が出る

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	14	8.3	154	91.7	168
	40歳以上50歳未満	4	3.1	123	96.9	127
	50歳以上60歳未満	17	8.8	176	91.2	193
	60歳以上70歳未満	37	9.8	340	90.2	377
	70歳以上80歳未満	29	10.5	247	89.5	276
	80歳以上	18	18.4	80	81.6	98
	総計	119	9.6	1120	90.4	1239
女性	40歳未満	18	5.8	292	94.2	310
	40歳以上50歳未満	18	9.8	165	90.2	183
	50歳以上60歳未満	23	8.0	263	92.0	286
	60歳以上70歳未満	50	11.5	385	88.5	435
	70歳以上80歳未満	55	16.5	279	83.5	334
	80歳以上	20	18.0	91	82.0	111
	総計	184	11.1	1475	88.9	1659
総計	303	10.5	2595	89.5	2898	

【コメント】脳卒中の症状についての知識を問う設問において、突然、鼻血が出ると回答した人の割合は、全体で10.5%、男性で9.6%、女性で11.1%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が増加する傾向がみられた。

問 28 突然、力はあるのに立てなかつたり、歩けなかつたり、フラフラする

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	56	33.3	112	66.7	168
	40歳以上50歳未満	55	43.3	72	56.7	127
	50歳以上60歳未満	87	45.1	106	54.9	193
	60歳以上70歳未満	191	50.7	186	49.3	377
	70歳以上80歳未満	133	48.2	143	51.8	276
	80歳以上	46	46.9	52	53.1	98
	総計	568	45.8	671	54.2	1239
女性	40歳未満	121	39.0	189	61.0	310
	40歳以上50歳未満	92	50.3	91	49.7	183
	50歳以上60歳未満	168	58.7	118	41.3	286
	60歳以上70歳未満	265	60.9	170	39.1	435
	70歳以上80歳未満	191	57.2	143	42.8	334
	80歳以上	61	55.0	50	45.0	111
	総計	898	54.1	761	45.9	1659
総計	1466	50.6	1432	49.4	2898	

【コメント】脳卒中の症状についての知識を問う設問において、突然、力はあるのに立てなかつたり、歩けなかつたり、フラフラすると回答した人の割合は、全体で50.6%、男性で45.8%、女性で54.1%であった。年齢階級別にみると、男女とも40歳代が最も低く、他の年齢階級には年齢による変化がみられなかった。

問 28 急に、発熱する

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	3	1.8	165	98.2	168
	40歳以上50歳未満	3	2.4	124	97.6	127
	50歳以上60歳未満	6	3.1	187	96.9	193
	60歳以上70歳未満	18	4.8	359	95.2	377
	70歳以上80歳未満	24	8.7	252	91.3	276
	80歳以上	9	9.2	89	90.8	98
	総計	63	5.1	1176	94.9	1239
女性	40歳未満	12	3.9	298	96.1	310
	40歳以上50歳未満	11	6.0	172	94.0	183
	50歳以上60歳未満	12	4.2	274	95.8	286
	60歳以上70歳未満	17	3.9	418	96.1	435
	70歳以上80歳未満	39	11.7	295	88.3	334
	80歳以上	15	13.5	96	86.5	111
	総計	106	6.4	1553	93.6	1659
総計	169	5.8	2729	94.2	2898	

【コメント】脳卒中の症状についての知識を問う設問において、急に、発熱すると回答した人の割合は、全体で5.8%、男性で5.1%、女性で6.4%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が増加する傾向がみられた。

問 28 突然、左側の肩が痛くなる

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	5	3.0	163	97.0	168
	40歳以上50歳未満	5	3.9	122	96.1	127
	50歳以上60歳未満	18	9.3	175	90.7	193
	60歳以上70歳未満	31	8.2	346	91.8	377
	70歳以上80歳未満	26	9.4	250	90.6	276
	80歳以上	13	13.3	85	86.7	98
	総計	98	7.9	1141	92.1	1239
女性	40歳未満	15	4.8	295	95.2	310
	40歳以上50歳未満	19	10.4	164	89.6	183
	50歳以上60歳未満	21	7.3	265	92.7	286
	60歳以上70歳未満	53	12.2	382	87.8	435
	70歳以上80歳未満	57	17.1	277	82.9	334
	80歳以上	20	18.0	91	82.0	111
	総計	185	11.2	1474	88.8	1659
総計	283	9.8	2615	90.2	2898	

【コメント】脳卒中の症状についての知識を問う設問において、突然、左側の肩が痛くなると回答した人の割合は、全体で9.8%、男性で7.9%、女性で11.2%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が増加する傾向がみられた。

問 28 突然、息が苦しくなる

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	28	16.7	140	83.3	168
	40歳以上50歳未満	19	15.0	108	85.0	127
	50歳以上60歳未満	51	26.4	142	73.6	193
	60歳以上70歳未満	106	28.1	271	71.9	377
	70歳以上80歳未満	73	26.4	203	73.6	276
	80歳以上	31	31.6	67	68.4	98
	総計	308	24.9	931	75.1	1239
女性	40歳未満	53	17.1	257	82.9	310
	40歳以上50歳未満	40	21.9	143	78.1	183
	50歳以上60歳未満	78	27.3	208	72.7	286
	60歳以上70歳未満	141	32.4	294	67.6	435
	70歳以上80歳未満	117	35.0	217	65.0	334
	80歳以上	34	30.6	77	69.4	111
	総計	463	27.9	1196	72.1	1659
総計	771	26.6	2127	73.4	2898	

【コメント】脳卒中の症状についての知識を問う設問において、突然、息が苦しくなると回答した人の割合は、全体で 26.6%、男性で 24.9%、女性で 27.9%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が増加する傾向がみられた。

問 28 突然、片方の目が見えなくなったり、物が二つに見えたり、視野が半分にかかる

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	43	25.6	125	74.4	168
	40歳以上50歳未満	42	33.1	85	66.9	127
	50歳以上60歳未満	61	31.6	132	68.4	193
	60歳以上70歳未満	120	31.8	257	68.2	377
	70歳以上80歳未満	84	30.4	192	69.6	276
	80歳以上	35	35.7	63	64.3	98
	総計	385	31.1	854	68.9	1239
女性	40歳未満	87	28.1	223	71.9	310
	40歳以上50歳未満	77	42.1	106	57.9	183
	50歳以上60歳未満	103	36.0	183	64.0	286
	60歳以上70歳未満	164	37.7	271	62.3	435
	70歳以上80歳未満	127	38.0	207	62.0	334
	80歳以上	33	29.7	78	70.3	111
	総計	591	35.6	1068	64.4	1659
総計	976	33.7	1922	66.3	2898	

【コメント】脳卒中の症状についての知識を問う設問において、突然、片方の目が見えなくなったり、物が二つに見えたり、視野が半分にかかるると回答した人の割合は、全体で 33.7%、男性で 31.1%、女性で 35.6%であった。年齢階級別にみると、男女とも顕著な傾向が見られなかった。



問 29 心筋梗塞の症状について知っているもの全てに○をつけてください。

問 29 突然胸や背中に強い痛みを感じる

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	101	60.1	67	39.9	168
	40歳以上50歳未満	91	71.7	36	28.3	127
	50歳以上60歳未満	128	66.3	65	33.7	193
	60歳以上70歳未満	246	65.3	131	34.7	377
	70歳以上80歳未満	161	58.3	115	41.7	276
	80歳以上	44	44.9	54	55.1	98
	総計	771	62.2	468	37.8	1239
女性	40歳未満	213	68.7	97	31.3	310
	40歳以上50歳未満	135	73.8	48	26.2	183
	50歳以上60歳未満	210	73.4	76	26.6	286
	60歳以上70歳未満	320	73.6	115	26.4	435
	70歳以上80歳未満	226	67.7	108	32.3	334
	80歳以上	65	58.6	46	41.4	111
	総計	1169	70.5	490	29.5	1659
総計	1940	66.9	958	33.1	2898	

【コメント】心筋梗塞の症状についての知識を問う設問において、突然胸や背中に強い痛みを感じると回答した人の割合は、全体で 66.9%、男性で 62.2%、女性で 70.5%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が減少する傾向がみられた。

問 29 息が苦しくなる

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	96	57.1	72	42.9	168
	40歳以上50歳未満	87	68.5	40	31.5	127
	50歳以上60歳未満	143	74.1	50	25.9	193
	60歳以上70歳未満	260	69.0	117	31.0	377
	70歳以上80歳未満	184	66.7	92	33.3	276
	80歳以上	55	56.1	43	43.9	98
	総計	825	66.6	414	33.4	1239
女性	40歳未満	212	68.4	98	31.6	310
	40歳以上50歳未満	139	76.0	44	24.0	183
	50歳以上60歳未満	223	78.0	63	22.0	286
	60歳以上70歳未満	331	76.1	104	23.9	435
	70歳以上80歳未満	254	76.0	80	24.0	334
	80歳以上	65	58.6	46	41.4	111
	総計	1224	73.8	435	26.2	1659
総計	2049	70.7	849	29.3	2898	

【コメント】心筋梗塞の症状についての知識を問う設問において、息が苦しくなると回答した人の割合は、全体で 70.7%、男性で 66.6%、女性で 73.8%であった。年齢階級別にみると、男女とも 50 歳代が最も高く割合が山型に分布する傾向がみられた。

問 29 激しい頭痛がする

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	17	10.1	151	89.9	168
	40歳以上50歳未満	11	8.7	116	91.3	127
	50歳以上60歳未満	31	16.1	162	83.9	193
	60歳以上70歳未満	67	17.8	310	82.2	377
	70歳以上80歳未満	56	20.3	220	79.7	276
	80歳以上	22	22.4	76	77.6	98
	総計	204	16.5	1035	83.5	1239
女性	40歳未満	48	15.5	262	84.5	310
	40歳以上50歳未満	25	13.7	158	86.3	183
	50歳以上60歳未満	53	18.5	233	81.5	286
	60歳以上70歳未満	94	21.6	341	78.4	435
	70歳以上80歳未満	107	32.0	227	68.0	334
	80歳以上	25	22.5	86	77.5	111
	総計	352	21.2	1307	78.8	1659
総計	556	19.2	2342	80.8	2898	

【コメント】心筋梗塞の症状についての知識を問う設問において、激しい頭痛がすると回答した人の割合は、全体で 19.2%、男性で 16.5%、女性で 21.2%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が増加する傾向がみられた。

問 29 鼻血が出る

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	3	1.8	165	98.2	168
	40歳以上50歳未満	1	0.8	126	99.2	127
	50歳以上60歳未満	4	2.1	189	97.9	193
	60歳以上70歳未満	13	3.4	364	96.6	377
	70歳以上80歳未満	17	6.2	259	93.8	276
	80歳以上	13	13.3	85	86.7	98
	総計	51	4.1	1188	95.9	1239
女性	40歳未満	8	2.6	302	97.4	310
	40歳以上50歳未満	6	3.3	177	96.7	183
	50歳以上60歳未満	5	1.7	281	98.3	286
	60歳以上70歳未満	11	2.5	424	97.5	435
	70歳以上80歳未満	36	10.8	298	89.2	334
	80歳以上	14	12.6	97	87.4	111
	総計	80	4.8	1579	95.2	1659
総計	131	4.5	2767	95.5	2898	

【コメント】心筋梗塞の症状についての知識を問う設問において、鼻血が出ると回答した人の割合は、全体で 4.5%、男性で 4.1%、女性で 4.8%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が増加する傾向がみられた。

問 29 突然、意識を失う

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	87	51.8	81	48.2	168
	40歳以上50歳未満	62	48.8	65	51.2	127
	50歳以上60歳未満	84	43.5	109	56.5	193
	60歳以上70歳未満	177	46.9	200	53.1	377
	70歳以上80歳未満	114	41.3	162	58.7	276
	80歳以上	44	44.9	54	55.1	98
	総計	568	45.8	671	54.2	1239
女性	40歳未満	164	52.9	146	47.1	310
	40歳以上50歳未満	102	55.7	81	44.3	183
	50歳以上60歳未満	137	47.9	149	52.1	286
	60歳以上70歳未満	238	54.7	197	45.3	435
	70歳以上80歳未満	166	49.7	168	50.3	334
	80歳以上	47	42.3	64	57.7	111
	総計	854	51.5	805	48.5	1659
総計	1422	49.1	1476	50.9	2898	

【コメント】心筋梗塞の症状についての知識を問う設問において、突然、意識を失うと回答した人の割合は、全体で 49.1%、男性で 45.8%、女性で 51.5%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が減少する傾向がみられた。

問 30 高血圧の原因として正しいと思うもの全てに○をつけてください。

問 30 肥満

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	145	86.3	23	13.7	168
	40歳以上50歳未満	112	88.2	15	11.8	127
	50歳以上60歳未満	165	85.5	28	14.5	193
	60歳以上70歳未満	294	78.0	83	22.0	377
	70歳以上80歳未満	216	78.3	60	21.7	276
	80歳以上	65	66.3	33	33.7	98
	総計	997	80.5	242	19.5	1239
女性	40歳未満	263	84.8	47	15.2	310
	40歳以上50歳未満	157	85.8	26	14.2	183
	50歳以上60歳未満	256	89.5	30	10.5	286
	60歳以上70歳未満	370	85.1	65	14.9	435
	70歳以上80歳未満	264	79.0	70	21.0	334
	80歳以上	76	68.5	35	31.5	111
	総計	1386	83.5	273	16.5	1659
総計	2383	82.2	515	17.8	2898	

【コメント】肥満は高血圧の原因として正しいと思う人の割合は全体で 82.2%、男性で 80.5%、女性で 83.5%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が減少する傾向がみられた。

問 30 運動不足

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	103	61.3	65	38.7	168
	40歳以上50歳未満	91	71.7	36	28.3	127
	50歳以上60歳未満	144	74.6	49	25.4	193
	60歳以上70歳未満	256	67.9	121	32.1	377
	70歳以上80歳未満	161	58.3	115	41.7	276
	80歳以上	55	56.1	43	43.9	98
	総計	810	65.4	429	34.6	1239
女性	40歳未満	193	62.3	117	37.7	310
	40歳以上50歳未満	126	68.9	57	31.1	183
	50歳以上60歳未満	222	77.6	64	22.4	286
	60歳以上70歳未満	317	72.9	118	27.1	435
	70歳以上80歳未満	232	69.5	102	30.5	334
	80歳以上	70	63.1	41	36.9	111
	総計	1160	69.9	499	30.1	1659
総計	1970	68.0	928	32.0	2898	

【コメント】運動不足は高血圧の原因として正しいと思う人の割合は全体で68.0%、男性で65.4%、女性で69.9%であった。年齢階級別にみると、男女とも50歳代が最も高く割合が山型に分布する傾向がみられた。

問 30 喫煙

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	106	63.1	62	36.9	168
	40歳以上50歳未満	84	66.1	43	33.9	127
	50歳以上60歳未満	140	72.5	53	27.5	193
	60歳以上70歳未満	250	66.3	127	33.7	377
	70歳以上80歳未満	182	65.9	94	34.1	276
	80歳以上	43	43.9	55	56.1	98
	総計	805	65.0	434	35.0	1239
女性	40歳未満	167	53.9	143	46.1	310
	40歳以上50歳未満	112	61.2	71	38.8	183
	50歳以上60歳未満	174	60.8	112	39.2	286
	60歳以上70歳未満	259	59.5	176	40.5	435
	70歳以上80歳未満	196	58.7	138	41.3	334
	80歳以上	53	47.7	58	52.3	111
	総計	961	57.9	698	42.1	1659
総計	1766	60.9	1132	39.1	2898	

【コメント】喫煙は高血圧の原因として正しいと思う人の割合は全体で60.9%、男性で65.0%、女性で57.9%であった。年齢階級別にみると、男性では50歳代、女性では40歳代が高く割合が山型に分布する傾向がみられた。

問 30 塩分の摂りすぎ

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	153	91.1	15	8.9	168
	40歳以上50歳未満	115	90.6	12	9.4	127
	50歳以上60歳未満	171	88.6	22	11.4	193
	60歳以上70歳未満	341	90.5	36	9.5	377
	70歳以上80歳未満	246	89.1	30	10.9	276
	80歳以上	75	76.5	23	23.5	98
	総計	1101	88.9	138	11.1	1239
女性	40歳未満	277	89.4	33	10.6	310
	40歳以上50歳未満	173	94.5	10	5.5	183
	50歳以上60歳未満	268	93.7	18	6.3	286
	60歳以上70歳未満	417	95.9	18	4.1	435
	70歳以上80歳未満	295	88.3	39	11.7	334
	80歳以上	87	78.4	24	21.6	111
	総計	1517	91.4	142	8.6	1659
総計	2618	90.3	280	9.7	2898	

【コメント】塩分の摂りすぎは高血圧の原因として正しいと思う人の割合は全体で 90.3%、男性で 88.9%、女性で 91.4%であった。年齢階級別にみると、男女とも 80 歳を境に減少傾向がみられた。

問 30 野菜や果物の不足

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	66	39.3	102	60.7	168
	40歳以上50歳未満	51	40.2	76	59.8	127
	50歳以上60歳未満	72	37.3	121	62.7	193
	60歳以上70歳未満	168	44.6	209	55.4	377
	70歳以上80歳未満	130	47.1	146	52.9	276
	80歳以上	36	36.7	62	63.3	98
	総計	523	42.2	716	57.8	1239
女性	40歳未満	112	36.1	198	63.9	310
	40歳以上50歳未満	67	36.6	116	63.4	183
	50歳以上60歳未満	111	38.8	175	61.2	286
	60歳以上70歳未満	190	43.7	245	56.3	435
	70歳以上80歳未満	169	50.6	165	49.4	334
	80歳以上	53	47.7	58	52.3	111
	総計	702	42.3	957	57.7	1659
総計	1225	42.3	1673	57.7	2898	

【コメント】野菜や果物の不足は高血圧の原因として正しいと思う人の割合は全体で 42.3%、男性で 42.2%、女性で 42.3%であった。年齢階級別にみると、男女とも 70 歳代が最も高く割合が山型に分布する傾向がみられた。

問 30 お酒の飲み過ぎ

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	97	57.7	71	42.3	168
	40歳以上50歳未満	79	62.2	48	37.8	127
	50歳以上60歳未満	119	61.7	74	38.3	193
	60歳以上70歳未満	233	61.8	144	38.2	377
	70歳以上80歳未満	190	68.8	86	31.2	276
	80歳以上	61	62.2	37	37.8	98
	総計	779	62.9	460	37.1	1239
女性	40歳未満	164	52.9	146	47.1	310
	40歳以上50歳未満	109	59.6	74	40.4	183
	50歳以上60歳未満	171	59.8	115	40.2	286
	60歳以上70歳未満	274	63.0	161	37.0	435
	70歳以上80歳未満	218	65.3	116	34.7	334
	80歳以上	65	58.6	46	41.4	111
	総計	1001	60.3	658	39.7	1659
総計	1780	61.4	1118	38.6	2898	

【コメント】お酒の飲み過ぎは高血圧の原因として正しいと思う人の割合は全体で 61.4%、男性で 62.9%、女性で 60.3%であった。年齢階級別にみると、男女とも 70 歳代が最も高く割合が山型に分布する傾向がみられた。

問 30 睡眠不足

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	58	34.5	110	65.5	168
	40歳以上50歳未満	52	40.9	75	59.1	127
	50歳以上60歳未満	89	46.1	104	53.9	193
	60歳以上70歳未満	153	40.6	224	59.4	377
	70歳以上80歳未満	117	42.4	159	57.6	276
	80歳以上	42	42.9	56	57.1	98
	総計	511	41.2	728	58.8	1239
女性	40歳未満	71	22.9	239	77.1	310
	40歳以上50歳未満	53	29.0	130	71.0	183
	50歳以上60歳未満	116	40.6	170	59.4	286
	60歳以上70歳未満	198	45.5	237	54.5	435
	70歳以上80歳未満	189	56.6	145	43.4	334
	80歳以上	54	48.6	57	51.4	111
	総計	681	41.0	978	59.0	1659
総計	1192	41.1	1706	58.9	2898	

【コメント】睡眠不足は高血圧の原因として正しいと思う人の割合は全体で 41.1%、男性で 41.2%、女性で 41.0%であった。年齢階級別にみると、男性では年齢による変化がみられなかったが、女性では 80 歳までは年齢が上昇するにしたがって割合が増加する傾向がみられた。

問 30 牛乳の飲み過ぎ

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	0	0.0	168	100.0	168
	40歳以上50歳未満	2	1.6	125	98.4	127
	50歳以上60歳未満	3	1.6	190	98.4	193
	60歳以上70歳未満	7	1.9	370	98.1	377
	70歳以上80歳未満	8	2.9	268	97.1	276
	80歳以上	6	6.1	92	93.9	98
	総計	26	2.1	1213	97.9	1239
女性	40歳未満	4	1.3	306	98.7	310
	40歳以上50歳未満	5	2.7	178	97.3	183
	50歳以上60歳未満	3	1.0	283	99.0	286
	60歳以上70歳未満	9	2.1	426	97.9	435
	70歳以上80歳未満	15	4.5	319	95.5	334
	80歳以上	8	7.2	103	92.8	111
	総計	44	2.7	1615	97.3	1659
総計	70	2.4	2828	97.6	2898	

【コメント】牛乳の飲み過ぎは高血圧の原因として正しいと思う人の割合は全体で2.4%、男性で2.1%、女性で2.7%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が増加する傾向がみられた。

問 30 緑茶の飲み過ぎ

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	1	0.6	167	99.4	168
	40歳以上50歳未満	0	0.0	127	100.0	127
	50歳以上60歳未満	4	2.1	189	97.9	193
	60歳以上70歳未満	5	1.3	372	98.7	377
	70歳以上80歳未満	8	2.9	268	97.1	276
	80歳以上	6	6.1	92	93.9	98
	総計	24	1.9	1215	98.1	1239
女性	40歳未満	1	0.3	309	99.7	310
	40歳以上50歳未満	3	1.6	180	98.4	183
	50歳以上60歳未満	2	0.7	284	99.3	286
	60歳以上70歳未満	7	1.6	428	98.4	435
	70歳以上80歳未満	11	3.3	323	96.7	334
	80歳以上	5	4.5	106	95.5	111
	総計	29	1.7	1630	98.3	1659
総計	53	1.8	2845	98.2	2898	

【コメント】緑茶の飲み過ぎは高血圧の原因として正しいと思う人の割合は全体で1.8%、男性で1.9%、女性で1.7%であった。年齢階級別にみると、男女とも70歳代、80歳代で増加傾向がみられた。

問 31 心筋梗塞または脳卒中の原因として正しいと思うもの全てに○をつけてください。

問 31 高血圧

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	147	87.5	21	12.5	168
	40歳以上50歳未満	104	81.9	23	18.1	127
	50歳以上60歳未満	168	87.0	25	13.0	193
	60歳以上70歳未満	314	83.3	63	16.7	377
	70歳以上80歳未満	237	85.9	39	14.1	276
	80歳以上	75	76.5	23	23.5	98
	総計	1045	84.3	194	15.7	1239
女性	40歳未満	269	86.8	41	13.2	310
	40歳以上50歳未満	164	89.6	19	10.4	183
	50歳以上60歳未満	260	90.9	26	9.1	286
	60歳以上70歳未満	386	88.7	49	11.3	435
	70歳以上80歳未満	285	85.3	49	14.7	334
	80歳以上	77	69.4	34	30.6	111
	総計	1441	86.9	218	13.1	1659
総計	2486	85.8	412	14.2	2898	

【コメント】高血圧は心筋梗塞または脳卒中の原因として正しいと思う人の割合は全体で85.8%、男性で84.3%、女性で86.9%であった。年齢階級別にみると、男女とも80歳代で減少傾向がみられた

問 31 高コレステロール

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	126	75.0	42	25.0	168
	40歳以上50歳未満	106	83.5	21	16.5	127
	50歳以上60歳未満	150	77.7	43	22.3	193
	60歳以上70歳未満	274	72.7	103	27.3	377
	70歳以上80歳未満	184	66.7	92	33.3	276
	80歳以上	52	53.1	46	46.9	98
	総計	892	72.0	347	28.0	1239
女性	40歳未満	225	72.6	85	27.4	310
	40歳以上50歳未満	148	80.9	35	19.1	183
	50歳以上60歳未満	229	80.1	57	19.9	286
	60歳以上70歳未満	330	75.9	105	24.1	435
	70歳以上80歳未満	220	65.9	114	34.1	334
	80歳以上	58	52.3	53	47.7	111
	総計	1210	72.9	449	27.1	1659
総計	2102	72.5	796	27.5	2898	

【コメント】高コレステロールは心筋梗塞または脳卒中の原因として正しいと思う人の割合は全体で72.5%、男性で72.0%、女性で72.9%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が減少する傾向がみられた。



問 31 糖尿病

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	70	41.7	98	58.3	168
	40歳以上50歳未満	46	36.2	81	63.8	127
	50歳以上60歳未満	92	47.7	101	52.3	193
	60歳以上70歳未満	180	47.7	197	52.3	377
	70歳以上80歳未満	142	51.4	134	48.6	276
	80歳以上	36	36.7	62	63.3	98
	総計	566	45.7	673	54.3	1239
女性	40歳未満	132	42.6	178	57.4	310
	40歳以上50歳未満	74	40.4	109	59.6	183
	50歳以上60歳未満	134	46.9	152	53.1	286
	60歳以上70歳未満	211	48.5	224	51.5	435
	70歳以上80歳未満	145	43.4	189	56.6	334
	80歳以上	45	40.5	66	59.5	111
	総計	741	44.7	918	55.3	1659
総計	1307	45.1	1591	54.9	2898	

【コメント】糖尿病は心筋梗塞または脳卒中の原因として正しいと思う人の割合は全体で45.1%、男性で45.7%、女性で44.7%であった。年齢階級別にみると顕著な傾向がみられなかった。

問 31 痛風（高尿酸血症）

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	18	10.7	150	89.3	168
	40歳以上50歳未満	15	11.8	112	88.2	127
	50歳以上60歳未満	20	10.4	173	89.6	193
	60歳以上70歳未満	30	8.0	347	92.0	377
	70歳以上80歳未満	42	15.2	234	84.8	276
	80歳以上	19	19.4	79	80.6	98
	総計	144	11.6	1095	88.4	1239
女性	40歳未満	34	11.0	276	89.0	310
	40歳以上50歳未満	26	14.2	157	85.8	183
	50歳以上60歳未満	20	7.0	266	93.0	286
	60歳以上70歳未満	47	10.8	388	89.2	435
	70歳以上80歳未満	47	14.1	287	85.9	334
	80歳以上	14	12.6	97	87.4	111
	総計	188	11.3	1471	88.7	1659
総計	332	11.5	2566	88.5	2898	

【コメント】痛風（高尿酸血症）は心筋梗塞または脳卒中の原因として正しいと思う人の割合は全体で11.5%、男性で11.6%、女性で11.3%であった。年齢階級別にみると男女とも年齢による顕著な傾向がみられなかった。

問 31 肝機能障害（脂肪肝）

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	38	22.6	130	77.4	168
	40歳以上50歳未満	27	21.3	100	78.7	127
	50歳以上60歳未満	36	18.7	157	81.3	193
	60歳以上70歳未満	72	19.1	305	80.9	377
	70歳以上80歳未満	65	23.6	211	76.4	276
	80歳以上	28	28.6	70	71.4	98
	総計	266	21.5	973	78.5	1239
女性	40歳未満	57	18.4	253	81.6	310
	40歳以上50歳未満	40	21.9	143	78.1	183
	50歳以上60歳未満	61	21.3	225	78.7	286
	60歳以上70歳未満	100	23.0	335	77.0	435
	70歳以上80歳未満	91	27.2	243	72.8	334
	80歳以上	31	27.9	80	72.1	111
	総計	380	22.9	1279	77.1	1659
総計	646	22.3	2252	77.7	2898	

【コメント】肝機能障害（脂肪肝）は心筋梗塞または脳卒中の原因として正しいと思う人の割合は全体で 22.3%、男性で 21.5%、女性で 22.9%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が増加する傾向が若干みられた。

問 31 喫煙

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	114	67.9	54	32.1	168
	40歳以上50歳未満	82	64.6	45	35.4	127
	50歳以上60歳未満	127	65.8	66	34.2	193
	60歳以上70歳未満	227	60.2	150	39.8	377
	70歳以上80歳未満	176	63.8	100	36.2	276
	80歳以上	48	49.0	50	51.0	98
	総計	774	62.5	465	37.5	1239
女性	40歳未満	176	56.8	134	43.2	310
	40歳以上50歳未満	111	60.7	72	39.3	183
	50歳以上60歳未満	179	62.6	107	37.4	286
	60歳以上70歳未満	242	55.6	193	44.4	435
	70歳以上80歳未満	170	50.9	164	49.1	334
	80歳以上	43	38.7	68	61.3	111
	総計	921	55.5	738	44.5	1659
総計	1695	58.5	1203	41.5	2898	

【コメント】喫煙は心筋梗塞または脳卒中の原因として正しいと思う人の割合は全体で 58.5%、男性で 62.5%、女性で 55.5%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が減少する傾向がみられた。

問 31 不整脈

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	62	36.9	106	63.1	168
	40歳以上50歳未満	48	37.8	79	62.2	127
	50歳以上60歳未満	99	51.3	94	48.7	193
	60歳以上70歳未満	181	48.0	196	52.0	377
	70歳以上80歳未満	153	55.4	123	44.6	276
	80歳以上	43	43.9	55	56.1	98
	総計	586	47.3	653	52.7	1239
女性	40歳未満	117	37.7	193	62.3	310
	40歳以上50歳未満	88	48.1	95	51.9	183
	50歳以上60歳未満	144	50.3	142	49.7	286
	60歳以上70歳未満	257	59.1	178	40.9	435
	70歳以上80歳未満	202	60.5	132	39.5	334
	80歳以上	47	42.3	64	57.7	111
	総計	855	51.5	804	48.5	1659
総計	1441	49.7	1457	50.3	2898	

【コメント】不整脈は心筋梗塞または脳卒中の原因として正しいと思う人の割合は全体で49.7%、男性で47.3%、女性で51.5%であった。年齢階級別にみると、男女とも80歳までは年齢が上昇するにしたがって割合が増加する傾向がみられた。

問 31 腎障害（蛋白尿）

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	14	8.3	154	91.7	168
	40歳以上50歳未満	9	7.1	118	92.9	127
	50歳以上60歳未満	17	8.8	176	91.2	193
	60歳以上70歳未満	29	7.7	348	92.3	377
	70歳以上80歳未満	39	14.1	237	85.9	276
	80歳以上	11	11.2	87	88.8	98
	総計	119	9.6	1120	90.4	1239
女性	40歳未満	25	8.1	285	91.9	310
	40歳以上50歳未満	18	9.8	165	90.2	183
	50歳以上60歳未満	21	7.3	265	92.7	286
	60歳以上70歳未満	44	10.1	391	89.9	435
	70歳以上80歳未満	55	16.5	279	83.5	334
	80歳以上	16	14.4	95	85.6	111
	総計	179	10.8	1480	89.2	1659
総計	298	10.3	2600	89.7	2898	

【コメント】腎障害（蛋白尿）は心筋梗塞または脳卒中の原因として正しいと思う人の割合は全体で10.3%、男性で9.6%、女性で10.8%であった。年齢階級別にみると、男女とも年齢が上昇するにしたがって割合が増加する傾向がみられた。

問 31 貧血

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	5	3.0	163	97.0	168
	40歳以上50歳未満	3	2.4	124	97.6	127
	50歳以上60歳未満	11	5.7	182	94.3	193
	60歳以上70歳未満	31	8.2	346	91.8	377
	70歳以上80歳未満	47	17.0	229	83.0	276
	80歳以上	18	18.4	80	81.6	98
	総計	115	9.3	1124	90.7	1239
女性	40歳未満	9	2.9	301	97.1	310
	40歳以上50歳未満	10	5.5	173	94.5	183
	50歳以上60歳未満	16	5.6	270	94.4	286
	60歳以上70歳未満	34	7.8	401	92.2	435
	70歳以上80歳未満	66	19.8	268	80.2	334
	80歳以上	17	15.3	94	84.7	111
	総計	152	9.2	1507	90.8	1659
総計	267	9.2	2631	90.8	2898	

【コメント】貧血は心筋梗塞または脳卒中の原因として正しいと思う人の割合は全体で9.2%、男性で9.3%、女性で9.2%であった。年齢階級別にみると、男女とも70歳代を境に増加傾向が見られた。

問 31 HDL コレステロール（善玉コレステロール）低値

		回答あり	%	回答なし	%	総数
男性	40歳未満	52	31.0	116	69.0	168
	40歳以上50歳未満	51	40.2	76	59.8	127
	50歳以上60歳未満	88	45.6	105	54.4	193
	60歳以上70歳未満	126	33.4	251	66.6	377
	70歳以上80歳未満	99	35.9	177	64.1	276
	80歳以上	33	33.7	65	66.3	98
	総計	449	36.2	790	63.8	1239
女性	40歳未満	93	30.0	217	70.0	310
	40歳以上50歳未満	62	33.9	121	66.1	183
	50歳以上60歳未満	142	49.7	144	50.3	286
	60歳以上70歳未満	197	45.3	238	54.7	435
	70歳以上80歳未満	133	39.8	201	60.2	334
	80歳以上	41	36.9	70	63.1	111
	総計	668	40.3	991	59.7	1659
総計	1117	38.5	1781	61.5	2898	

【コメント】HDL コレステロール（善玉コレステロール）低値は心筋梗塞または脳卒中の原因として正しいと思う人の割合は全体で38.5%、男性で36.2%、女性で40.3%であった。年齢階級別にみると、男性では40歳代、50歳代が高く、女性では50歳代、60歳代が高く割合が山型に分布する傾向がみられた。