

表 1-3 主要栄養素摂取量別の血清総コレステロール平均値(別添 3-表 3)

	男性				女性			
	第一分位	第二分位	第三分位	第四分位	第一分位	第二分位	第三分位	第四分位
総たんぱく質	196.8	199.9	197.8	201.6	207.3	206.1	207.0	211.0
動物性たんぱく質	196.8	199.0	199.4	201.5	207.5	207.0	206.0	210.2
植物性たんぱく質	197.4	200.5	200.4	199.2	207.4	207.1	206.2	210.1
総脂肪	193.1	198.1	201.6	202.9	209.5	207.6	207.2	205.1
動物性脂肪	195.2	199.2	199.8	202.4	207.5	208.9	209.0	204.0
植物性脂肪	196.2	198.0	201.2	201.8	208.5	207.9	206.2	207.3
コレステロール	196.9	198.3	199.0	202.6	210.7	207.8	205.6	204.9
飽和脂肪酸	192.5	199.1	202.2	202.4	208.1	208.7	207.5	205.4
不飽和脂肪酸	193.1	200.3	200.6	202.1	209.7	207.6	207.8	204.1
一価脂肪酸	192.9	200.2	201.3	201.9	209.7	208.9	206.7	203.7
炭水化物	196.0	202.5	197.9	200.3	207.9	206.6	208.1	207.4

単位：mg/dl

表 1-4 食品群摂取量別*の血清総コレステロール平均値(別添 3-表 4)

	男性				女性			
	第一分位	第二分位	第三分位	第四分位	第一分位	第二分位	第三分位	第四分位
総量	196.9	198.3	199.1	201.5	205.6	206.7	206.9	212.7
動物摂取食品	195.8	199.8	199.8	201.7	207.4	204.8	206.3	211.5
植物摂取食品	197.6	198.4	200.5	200.2	205.8	206.1	207.7	212.2
穀物	197.3	200.4	200.8	198.9	210.3	208.0	203.9	205.1
うち米類	200.2	203.0	198.3	198.6	209.3	208.2	207.0	202.8
うち小麦類	195.2	200.0	201.5	201.9	207.5	208.3	207.1	207.0
いも類	196.3	202.4	199.0	200.4	207.7	204.2	208.1	209.7
砂糖類	196.9	199.6	201.0	200.5	209.1	205.8	206.0	209.0
油脂類	196.2	198.5	203.3	200.0	209.8	207.5	207.0	205.3
豆類	203.9	197.0	197.6	200.1	206.4	205.7	208.5	209.3
大豆・大豆製品	204.3	196.8	197.4	200.0	206.9	205.3	208.3	209.3
果物類	199.4	199.8	200.1	199.0	201.4	201.8	211.3	212.1
野菜*	198.5	199.8	201.4	198.5	205.7	206.9	207.2	210.1
魚介類	198.2	197.7	201.1	200.4	205.7	205.8	208.2	211.0
うち生魚	196.5	200.4	201.6	199.8	206.3	204.2	207.9	212.2
肉類	196.0	200.7	200.5	200.8	208.9	208.5	208.5	202.7
乳類	197.7	201.5	200.1	201.0	206.5	204.3	205.4	211.7

単位：mg/dl

*野菜はその他の野菜(44-51)と緑黄色野菜(39-43)の合計で算出した。

表 1-5 BMI と食生活習慣 (別添 3-表 5)

		痩せ	標準	肥満
		(BMI<18.5kg/m ²)	(18.5≤BMI<25 kg/m ²)	(25 kg/m ² ≤BMI)
一日				
エネルギー	(kcal)	1880	1982	2043
水分	(g)	934.0	998.1	1035.8
たんぱく質	(g)	76.9	79.8	82.8
総脂肪	(g)	52.9	55.7	56.1
炭水化物	(g)	258.9	272.8	284.1
灰分	(g)	22.0	22.8	23.8
カルシウム	(mg)	512	558	567
鉄	(mg)	11.5	11.9	12.4
ビタミンA	(IU)	2772	2747	2899
ビタミンB1	(mg)	1.14	1.21	1.21
ビタミンB2	(mg)	1.33	1.41	1.43
ビタミンC	(mg)	125.3	137.9	143.7
ビタミンD	(IU)	114.9	122.5	132.4
朝食				
エネルギー	(kcal)	397.6	428.2	452.4
水分	(g)	187.5	206.1	212.5
たんぱく質	(g)	15.6	16.8	18.0
総脂肪	(g)	11.0	11.6	12.0
炭水化物	(g)	58.8	64.1	67.9
昼食				
エネルギー	(kcal)	595.3	616.3	626.8
水分	(g)	220.3	228.5	244.0
たんぱく質	(g)	23.4	24.0	24.4
総脂肪	(g)	16.2	16.7	16.7
炭水化物	(g)	86.4	90.0	92.0
夕食				
エネルギー	(kcal)	777.8	805.4	829.1
水分	(g)	451.7	477.3	485.2
たんぱく質	(g)	35.7	36.4	37.8
総脂肪	(g)	23.3	24.5	24.7
炭水化物	(g)	93.7	94.9	99.5
健康意識あり	(%)	77	80	80
きちんとした食事あり	(%)	68	70	68
外食多い	(%)	14	13	12

表 1-6 ヘモグロビン値と主要栄養素摂取の関連(別添 3-表 6)

	ヘモグロビン値 男性			ヘモグロビン値 女性		
	第一分位	第二分位	第三分位	第一分位	第二分位	第三分位
エネルギー (kcal)	2067	2246	2279	1812	1841	1807
水分 (g)	1062.4	1132.3	1146.4	903.9	957.0	970.3
たんぱく質 (g)	84.5	90.0	90.1	73.5	75.5	75.8
灰分 (g)	24.2	25.9	24.9	21.9	22.5	22.6
カルシウム (mg)	606	604	580	558	586	573
鉄 (mg)	12.8	13.3	13.1	11.4	11.8	11.8
ビタミンA (IU)	2,862	2,680	2,963	2,654	2,903	2,571
ビタミンB1 (mg)	1.24	1.30	1.30	1.12	1.21	1.17
ビタミンB2 (mg)	1.46	1.55	1.53	1.33	1.39	1.39
ビタミンC (mg)	156.4	142.6	140.4	140.8	151.9	151.3
ビタミンD (IU)	152.9	142.0	140.5	111.4	126.6	130.3

表 1-7 赤血球数と主要栄養素摂取の関連(別添 3-表 7)

		赤血球数 男性			赤血球数 女性		
		第一分位	第二分位	第三分位	第一分位	第二分位	第三分位
エネルギー	(kcal)	2153	2238	2286	1822	1825	1821
水分	(g)	1112.6	1159.9	1129.9	921.7	936.9	940.6
たんぱく質	(g)	86.2	90.1	90.2	74.2	74.6	74.9
灰分	(g)	25.3	25.5	24.8	22.2	22.2	22.1
カルシウム	(mg)	584	611	578	573	568	569
鉄	(mg)	13.0	13.3	13.1	11.6	11.7	11.5
ビタミンA	(IU)	2,631	2,828	2,991	2,630	2,933	2,615
ビタミンB1	(mg)	1.25	1.27	1.32	1.12	1.13	1.32
ビタミンB2	(mg)	1.49	1.50	1.54	1.34	1.38	1.36
ビタミンC	(mg)	146.7	145.5	139.8	143.5	147.9	148.7
ビタミンD	(IU)	146.9	142.3	140.4	114.4	120.5	128.1

表 1-8 白血球数と主要栄養素摂取の関連(別添 3-表 8、循環器基礎別添 3-表 8)

		白血球数 男性			白血球数 女性		
		第一分位	第二分位	第三分位	第一分位	第二分位	第三分位
エネルギー	(kcal)	2241	2225	2277	1833	1824	1806
水分	(g)	1166.9	1121.5	1123.3	937.6	942.1	906.9
たんぱく質	(g)	88.9	89.1	90.2	74.9	74.8	73.5
灰分	(g)	25.6	25.0	24.8	22.6	22.4	21.4
カルシウム	(mg)	621	592	562	591	574	535
鉄	(mg)	13.3	13.2	12.9	11.8	11.6	11.3
ビタミンA	(IU)	2,982	3,070	2,682	2,803	2,719	2,681
ビタミンB1	(mg)	1.29	1.27	1.32	1.14	1.20	1.13
ビタミンB2	(mg)	1.54	1.52	1.52	1.38	1.36	1.33
ビタミンC	(mg)	146.6	147.5	135.9	151.2	146.3	138.6
ビタミンD	(IU)	134.1	138.4	150.2	122.9	117.9	115.2

表 1-9 BUN と主要栄養素摂取の関連(別添 3-表 9、循環器基礎別添 3-表 9)

	BUN 男性			BUN 女性		
	第一分位	第二分位	第三分位	第一分位	第二分位	第三分位
エネルギー (kcal)	2209	2297	2248	1828	1827	1810
水分 (g)	1074.8	1142.9	1174.4	896.9	921.9	979.3
たんぱく質 (g)	85.0	91.1	91.9	72.0	74.4	77.4
灰分 (g)	23.7	25.3	26.0	21.4	22.4	22.9
カルシウム (mg)	524	590	637	524	576	617
鉄 (mg)	12.1	13.4	13.6	11.0	11.8	12.1
ビタミンA (IU)	2,544	2,967	3,085	2,598	2,738	2,906
ビタミンB1 (mg)	1.24	1.32	1.31	1.13	1.12	1.23
ビタミンB2 (mg)	1.44	1.54	1.58	1.30	1.36	1.42
ビタミンC (mg)	126.3	139.1	158.0	134.9	148.5	156.8
ビタミンD (IU)	126.9	140.2	157.1	106.0	117.5	136.4

表 1-10 食習慣と循環器危険因子との関連(別添 3-表 11、循環器基礎別添 3-表 11)

		高血圧	脂質異常症	耐糖能異常	肥満
食習慣を考えている	はい	80.6	82.9	86.4	80.4
	いいえ	19.4	17.1	13.6	19.6
きちんとした食事をとっている	はい	68.8	67.6	76.3	68.0
	いいえ	31.2	32.4	23.7	32.0
外食の有無(一日1回以上)	有	7.8	8.7	5.9	12.3
	無	92.2	91.3	94.1	87.7
朝食の有無	有	94.3	92.0	91.5	90.4
	無	5.7	8.0	8.5	9.6
昼食の有無	有	75.7	70.7	84.7	67.0
	無	24.3	29.3	15.3	33.0
夕食の有無	有	94.3	94.9	96.6	91.7
	無	5.7	5.1	3.4	8.3

単位：%

表 1-11 食生活の意識と行動との関連(別添 3-表 13、循環器基礎別添 3-表 13)

		食塩摂取量	野菜摂取量	果物摂取量	脂肪摂取量	コレステロール 摂取量	エネルギー 摂取量	運動量	BMI
		(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(kcal)	(歩数)	(kg/m ²)
(1) 食塩を控えている	はい	13.1	311.5	142.7	54.2	352.3	1942	7,302	23.2
	いいえ	13.3	282.5	106.5	57.5	381.8	2052	7,835	22.9
(2) 野菜を多くとるようにしている	はい	13.2	309.4	136.9	55.0	358.3	1965	7,441	23.1
	いいえ	12.9	259.7	95.9	56.8	383.1	2056	7,739	22.9
(3) 果物を多くとるようにしている	はい	13.5	315.8	163.1	54.4	358.1	1981	7,308	23.1
	いいえ	12.8	286.1	93.4	56.5	366.9	1978	7,692	23.0
(4) 脂肪の多い食べ物を控えている	はい	13.2	311.3	142.8	53.8	351.1	1938	7,327	23.2
	いいえ	13.2	282.0	104.5	58.7	386.1	2068	7,827	22.8
(5) コレステロールの多い食べ物を控えている	はい	13.2	312.8	143.7	53.4	349.6	1933	7,369	23.2
	いいえ	13.1	286.2	112.4	58.0	380.2	2044	7,653	22.8
(6) 食べ過ぎないようにしている	はい	13.1	306.3	134.6	54.0	354.4	1940	7,367	23.1
	いいえ	13.4	291.0	120.4	58.9	383.2	2087	7,806	23.0
(7) できるだけ体を動かすようにしている	はい	13.3	311.2	138.4	54.9	361.1	1982	7,766	23.1
	いいえ	12.8	279.3	112.1	56.2	363.9	1969	6,743	22.9
(8) 体重を減らすようにしている	はい	13.2	311.2	137.3	54.8	355.9	1936	7,512	24.3
	いいえ	13.2	294.3	125.2	55.8	367.6	2015	7,454	22.0
(9) アルコールを控えている	はい	13.5	311.8	128.4	55.9	368.2	2022	7,457	23.3
	いいえ	13.7	295.4	96.6	59.5	391.4	2168	8,177	23.0
	もともと飲まない	12.7	300.5	150.3	52.7	342.7	1855	7,098	23.0
(10) タバコを減らしている	はい	13.4	295.4	103.8	55.6	368.9	2035	7,266	22.8
	いいえ	13.3	281.5	77.6	60.4	398.1	2146	7,759	23.1
	もともと吸わない	13.1	308.9	150.2	53.7	350.6	1920	7,421	23.1
(11) タバコを止めたいと思っている	はい	13.3	288.5	94.1	57.4	381.5	2053	7,443	22.8
	いいえ	13.4	283.1	81.0	59.8	394.8	2148	7,734	23.1
	もともと吸わない	13.1	308.8	149.8	53.8	350.5	1921	7,423	23.1

資料 16-2

2000年循環器疾患基礎調査 集計表

表 2-1 地域別の高血圧の認知、治療率(別添 3-表 3)

地域区分	年齢階級	認知率	治療率	コントロール率 (140/90mmHg未満)
北海道地方	30～39	.	.	.
	40～49	70.0	50.0	30.0
	50～59	66.7	29.2	20.8
	60～69	65.4	42.3	30.8
	70歳以上	90.2	68.3	43.9
東北地方	30～39	100.0	.	.
	40～49	39.3	17.9	7.1
	50～59	62.3	47.8	29.0
	60～69	66.7	56.8	39.5
	70歳以上	68.2	61.7	41.1
関東地方 1	30～39	100.0	29.4	11.8
	40～49	76.5	23.5	17.6
	50～59	82.1	36.6	19.6
	60～69	70.1	46.6	29.3
	70歳以上	99.2	65.6	40.6
関東地方 2	30～39	40.0	20.0	20.0
	40～49	70.0	33.3	16.7
	50～59	75.9	44.4	37.0
	60～69	67.0	59.6	45.7
	70歳以上	71.4	62.6	38.5
北陸地方	30～39	42.9	.	.
	40～49	33.3	.	.
	50～59	54.5	27.3	22.7
	60～69	57.1	42.9	25.7
	70歳以上	100.0	59.1	45.5
東海地方	30～39	75.0	8.3	.
	40～49	67.9	21.4	17.9
	50～59	63.3	32.2	17.8
	60～69	64.6	49.0	32.3
	70歳以上	77.7	65.2	49.1
近畿地方 1	30～39	100.0	8.3	8.3
	40～49	100.0	28.0	8.0
	50～59	74.7	37.3	26.7
	60～69	77.5	50.0	31.4
	70歳以上	87.0	63.0	41.3
近畿地方 2	30～39	33.3	.	.
	40～49	100.0	.	.
	50～59	100.0	66.7	27.8
	60～69	27.8	16.7	16.7
	70歳以上	82.4	70.6	47.1
中国地方	30～39	88.9	11.1	11.1
	40～49	84.6	23.1	7.7
	50～59	78.7	44.7	27.7
	60～69	88.1	54.8	35.7
	70歳以上	82.4	56.9	35.3
四国地方	30～39	100.0	.	.
	40～49	57.1	14.3	7.1
	50～59	63.2	42.1	34.2
	60～69	65.9	52.3	27.3
	70歳以上	71.4	65.3	46.9
北九州地方	30～39	33.3	33.3	33.3
	40～49	70.6	29.4	29.4
	50～59	83.9	45.2	22.6
	60～69	50.9	30.2	20.8
	70歳以上	83.6	62.3	47.5
南九州地方	30～39	66.7	.	.
	40～49	77.8	5.6	.
	50～59	76.9	42.3	19.2
	60～69	55.4	44.6	26.8
	70歳以上	75.4	55.7	37.7

表 2-2 都市部、郡部別の高血圧の認知、治療率(別添 3-表 4)

地域区分	年齢階級	認知率	治療率	コントロール率 (140/90mmHg未満)
都市部地域	30～39	97.6	14.6	7.3
	40～49	90.5	27.4	13.7
	50～59	82.1	36.7	21.7
	60～69	69.0	47.0	31.3
	70歳以上	81.5	62.4	40.8
郡部地域	30～39	62.5	10.4	8.3
	40～49	59.7	18.9	12.6
	50～59	67.5	42.1	27.0
	60～69	64.6	49.4	32.4
	70歳以上	81.9	63.4	43.6

(%)

表 2-3 高コレステロール血症の認知、治療率(別添 3-表 6)

年齢階級	認知率	治療率
30～39	4.7	-
40～49	10.9	1.8
50～59	18.1	4.7
60～69	20.5	8.2
70歳以上	21.7	12.4

(%)

表 2-4 糖尿病(血糖値高値)の認知、治療率(別添 3-表 7)

年齢階級	認知率	治療率
30～39	12.0	1.3
40～49	25.1	3.8
50～59	33.2	10.0
60～69	36.0	14.6
70歳以上	38.5	19.2

(%)

表 2-5 γ GTP と主要栄養素摂取の関連(別添 3-表 10)

	γ GTP 男性			γ GTP 女性		
	第一分位	第二分位	第三分位	第一分位	第二分位	第三分位
エネルギー (kcal)	2,137	2,226	2,294	1,822	1,818	1,830
水分 (g)	985.4	1109.7	1183.0	902.7	948.6	976.4
たんぱく質 (g)	85.0	89.0	90.9	73.9	74.5	76.0
灰分 (g)	23.5	25.2	25.3	21.9	22.3	22.8
カルシウム (mg)	603	603	575	564	577	574
鉄 (mg)	12.6	13.2	13.2	11.5	11.7	11.8
ビタミンA (IU)	2,724	2,883	2,921	2,633	2,769	2,981
ビタミンB1 (mg)	1.28	1.31	1.29	1.18	1.14	1.14
ビタミンB2 (mg)	1.46	1.53	1.54	1.34	1.39	1.37
ビタミンC (mg)	145.3	147.2	138.7	144.2	150.4	145.0
ビタミンD (IU)	139.0	143.5	142.7	118.6	118.7	122.0

表 2-6 尿酸値と食品群摂取量の関連(別添 3-表 12、栄養別添 3-表 12)

	尿酸値 (男性)			尿酸値 (女性)		
	第一分位	第二分位	第三分位	第一分位	第二分位	第三分位
動物摂取食品	331.8	345.8	341.4	314.2	305.8	296.5
植物摂取食品	1280.3	1274.8	1304.4	1014.5	1061.5	1040.0
穀物	281.7	307.6	300.5	235.7	231.4	219.2
うち米類	193.1	213.5	205.8	144.9	147.4	140.8
うち小麦類	87.0	92.7	93.2	88.6	82.5	76.6
いも類	74.3	76.4	66.6	65.1	66.9	70.4
砂糖類	11.1	11.2	10.4	10.2	10.8	9.9
菓子類	17.2	16.2	14.9	27.4	26.7	24.7
油脂類	14.6	16.2	16.8	15.8	13.8	13.6
豆類	90.0	84.6	88.6	74.6	80.1	82.4
大豆・大豆製品	87.1	82.6	85.8	71.8	77.0	78.7
果物類	139.8	124.2	123.0	143.6	163.5	160.2
野菜*	342.4	323.5	315.4	296.1	317.8	300.4
魚介類	112.5	123.5	124.3	91.9	101.4	103.2
うち生魚	73.5	77.5	81.8	55.3	63.7	69.4
肉類	73.6	76.5	78.3	64.9	57.4	57.1
アルコール	194.9	173.7	229.5	40.5	39.7	56.5
ビール	131.8	114.6	156.4	31.1	28.8	45.9

単位：g

* 野菜はその他の野菜と緑黄色野菜の合計で算出した。

表 2-7 BMI カテゴリと生活習慣(別添 3-表 14)

		痩せ (BMI<18.5kg/m ²)	標準 (18.5≤BMI<25 kg/m ²)	肥満 (25 kg/m ² ≤BMI)
男性	喫煙者割合 (%)	10.0	38.0	34.0
	飲酒者割合 (%)	7.0	43.0	45.0
	運動習慣あり (%)	5.0	26.0	26.0
	運動量 (平均歩数)	8209	8133	7177
	飲酒者の飲酒量(合×年)*1	55.2	51.1	52.9
	喫煙者の喫煙量(本×年)*2	655.8	649.6	658.6
女性	喫煙者割合 全体 (%)	5.0	9.0	8.0
	飲酒者割合 全体 (%)	4.0	8.0	6.0
	運動習慣あり (%)	9.0	26.0	25.0
	運動量 (平均歩数)	6670	7447	6520
	飲酒者の飲酒量(合×年)*1	23.7	22.5	25.9
	喫煙者の喫煙量(本×年)*2	313.3	275.2	333.1

*1 飲酒者(現在および過去)における、1日あたり平均飲酒量(合)×飲酒期間(年)

*2 喫煙者(現在および過去)における、1日あたり平均喫煙量(本数)×喫煙期間(年)

表 2-8 血圧カテゴリ別のミネソタコード所見頻度(別添 3-表 16)

	男性			女性		
	正常血圧	前高血圧	高血圧	正常血圧	前高血圧	高血圧
	2206人	473人	1030人	2647人	581人	1148人
1-0	6.9	20.7	16.9	16.2	23.4	22.0
1-1~3	1.4	4.2	7.9	1.7	3.8	6.3
1-1~2	0.5	1.7	2.3	0.4	0.5	2.2
1-1	0.2	0.4	1.4	0.1	0.2	0.3
1-1-L 前側壁	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1
1-1-1 下壁	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2
1-1-A 前壁	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.2
1-2	0.3	1.3	1.1	0.3	0.3	1.9
1-2-L 前側壁	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.3
1-2-1 下壁	0.2	0.8	0.3	0.1	0.0	1.3
1-2-A 前壁	0.0	0.4	0.6	0.2	0.3	0.3
1-3	1.0	2.5	5.6	1.3	3.3	4.1
1-3-L 前側壁	0.5	0.6	3.3	0.8	1.4	1.4
1-3-1 下壁	0.3	1.3	1.9	0.5	1.9	2.3
1-3-A 前壁	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(データレイアウトでは1-2-A)						
2-1~5	1.6	6.3	4.8	1.5	2.9	3.1
2-1	0.6	4.0	3.9	0.4	2.1	2.4
2-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2-3	1.0	2.1	0.7	1.1	0.9	0.5
2-4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1
2-5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
3-1~4	4.4	13.1	25.4	2.2	7.9	15.2
3-1+3	4.2	13.1	25.2	2.0	7.7	14.7
3-1	2.8	7.4	17.3	1.1	4.5	9.9
3-2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4
3-3	1.4	5.7	8.0	0.9	3.3	4.8
3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4-1~4	0.4	2.3	5.9	0.5	3.4	8.8
4-1~3	0.3	1.9	5.3	0.5	3.3	7.4
4-1+2	0.2	1.3	4.3	0.4	2.8	4.9
4-1	0.1	0.6	1.7	0.1	0.5	0.6
4-1-1 前壁	0.0	0.6	1.0	0.0	0.3	0.4
4-1-1 下壁	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
4-1-A 前壁	0.1	0.4	1.4	0.1	0.5	0.4
4-2	0.1	0.6	3.6	0.3	2.6	4.5
4-2-L 前側壁	0.1	0.6	2.6	0.2	1.5	2.9
4-2-1 下壁	0.0	0.2	0.7	0.1	0.2	1.0
4-2-A 前壁	0.0	0.2	1.6	0.2	1.4	2.4
4-3	0.0	0.6	1.7	0.1	1.4	3.4
4-3-L 前側壁	0.0	0.2	1.3	0.0	1.0	2.3
4-3-1 下壁	0.0	0.4	0.4	0.0	0.5	0.7
4-3-A 前壁	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.9
4-4	0.1	0.6	1.0	0.0	0.2	1.7
4-4-L 前側壁	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4
4-4-1 下壁	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
4-4-A 前壁	0.1	0.4	0.9	0.0	0.2	1.4

単位:%

(表 2-8 続き)

	男性			女性		
	正常血圧	前高血圧	高血圧	正常血圧	前高血圧	高血圧
	2206人	473人	1030人	2647人	581人	1148人
5-1~5	1.7	7.4	15.6	3.6	15.0	22.6
5-1~4	1.1	4.0	10.7	2.3	9.8	15.4
5-1~3	0.9	3.4	8.2	1.9	7.9	13.2
5-1+2	0.6	2.1	5.2	1.3	4.6	6.3
5-1	0.2	0.6	0.6	0.0	0.3	0.3
5-1-L 前側壁	0.0	0.4	0.3	0.0	0.2	0.2
5-1-1 下壁	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-1-A 前壁	0.2	0.6	0.6	0.0	0.3	0.3
5-2	0.6	1.9	5.2	1.3	4.5	6.3
5-2-L 前側壁	0.4	0.8	2.9	0.1	1.2	2.1
5-2-1 下壁	0.1	0.6	1.6	0.1	0.5	1.0
5-2-A 前壁	0.3	1.5	3.7	1.1	3.6	4.7
5-3	0.2	1.7	4.3	0.7	4.5	8.3
5-3-L 前側壁	0.2	1.3	3.2	0.2	3.8	6.1
5-3-1 下壁	0.0	0.8	1.0	0.3	0.5	1.8
5-3-A 前壁	0.0	0.6	1.2	0.5	1.2	3.0
5-4	0.3	0.6	3.1	0.5	2.1	3.5
5-4-L 前側壁	0.1	0.4	1.5	0.2	0.7	1.4
5-4-1 下壁	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3
5-4-A 前壁	0.1	0.2	1.9	0.4	1.9	2.4
5-5	0.7	4.4	6.9	1.5	6.2	9.5
5-5-L 前側壁	0.4	2.3	3.6	0.4	2.4	4.0
5-5-1 下壁	0.2	1.3	1.1	0.3	0.2	1.6
5-5-A 前壁	0.4	2.7	4.2	1.2	5.2	7.0
6-1~8	0.6	2.3	3.3	1.0	1.5	1.0
6-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6-2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0
6-3	0.4	2.3	3.0	0.5	0.5	0.8
6-4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0
6-5	0.1	0.0	0.2	0.5	0.7	0.3
6-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6-8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7-1~8	3.9	11.0	11.2	2.9	7.6	7.3
7-1+2+4	0.9	4.0	3.7	0.6	2.1	2.5
7-1	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3	0.4
7-2	0.9	3.2	3.2	0.6	1.7	2.1
7-3	1.0	2.3	3.7	0.8	2.6	1.9
7-4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
7-5	1.8	4.2	3.1	1.5	2.8	2.8
7-6	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
7-7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1
7-8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0

単位:%

(表 2-8 続き)

	男性			女性		
	正常血圧	前高血圧	高血圧	正常血圧	前高血圧	高血圧
	2206人	473人	1030人	2647人	581人	1148人
8-1	0.4	2.1	3.2	0.7	1.2	2.4
8-1-1	0.1	0.8	1.5	0.2	1.0	1.1
8-1-2	0.2	0.8	1.3	0.2	0.2	0.7
8-1-3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.3
8-1-4	0.0	0.2	0.3	0.3	0.0	0.3
8-1-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-2-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-2-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-2-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-3	0.3	0.8	1.5	0.3	0.9	0.8
8-3-1	0.2	0.8	1.4	0.2	0.9	0.8
8-3-2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
8-3-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-3-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-4	0.1	0.4	0.2	0.1	0.0	0.2
8-4-1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
8-4-2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2
8-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-5-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-5-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-6-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-6-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-6-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-6-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8-7	0.1	0.0	0.9	0.2	0.9	1.4
8-8	1.3	2.5	2.2	0.8	1.0	1.0
8-9	1.9	4.4	6.6	2.8	5.9	6.3
9-1	0.2	0.2	0.8	0.8	0.7	1.0
9-2	3.7	6.3	7.4	0.2	0.7	0.5
9-2-L 前側壁	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9-2-1 下壁	0.4	1.3	0.2	0.0	0.0	0.1
9-2-A 前壁	3.5	5.1	7.3	0.2	0.7	0.4
9-3	0.0	0.0	1.0	0.2	0.2	0.3
9-3-1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1
9-3-2	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.2
9-4	15.9	47.8	51.1	29.0	53.9	51.4
9-4-1	13.3	39.5	40.1	26.3	48.2	44.4
9-4-2	2.6	8.2	11.0	2.7	5.7	7.0
9-5	2.7	5.7	6.8	0.5	1.0	0.4
9-6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.3
9-7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9-8	1.1	4.0	3.6	2.4	2.8	4.7

単位:%

資料17 報道発表