

<HIV業務経験・単純集計>

表43 陽性告知の経験

	度数	%
ある	190	19.2
ない	732	73.8
無回答	70	7.1
合計	992	100.0

表44 検査前相談の時間

	度数	%
5分未満	19	2.1
5～9分	189	21.0
10～19分	551	61.3
20分以上	110	12.2
無回答	30	3.3
合計	899	100.0

表46 陽性告知の時間

	度数	%
20分未満	7	3.7
20～39分	62	32.6
40～59分	26	13.7
60分以上	84	44.2
無回答	11	5.8
合計	190	100.0

表47 検査前相談に含む内容(複数回答) n=899

	度数	%
受検動機	824	91.7
検査時期	886	98.6
ウィンドウ	787	87.5
感染リスク行為	772	85.9
受検者感染経路特定	357	39.7
予防方法	595	66.2
結果意味	544	60.5
HIVとAIDS	602	67.0
陽性者治療福祉	231	25.7
本人リスク行為	306	34.0
受検者リスク変容抵抗感	94	10.5
受検者予防自信	95	10.6
その他	13	1.4

表49 陽性告知に含む内容(複数回答) n=190

	度数	%
受検動機	46	24.2
検査時期	40	21.1
ウィンドウ	34	17.9
感染リスク行為	72	37.9
受検者感染経路特定	86	45.3
予防方法	62	32.6
結果意味	163	85.8
HIVとAIDS	155	81.6
陽性者治療福祉	186	97.9
本人リスク行為	82	43.2
受検者リスク変容抵抗感	37	19.5
受検者予防自信	34	17.9
その他	57	30.0

表45 陰性告知の時間

	度数	%
5分未満	65	7.7
5～9分	269	32.0
10～19分	425	50.6
20分以上	61	7.3
無回答	20	2.4
合計	840	100.0

表48 陰性告知に含む内容(複数回答) n=840

	度数	%
受検動機	186	22.1
検査時期	307	36.5
ウィンドウ	337	40.1
感染リスク行為	410	48.8
受検者感染経路特定	115	13.7
予防方法	693	82.5
結果意味	741	88.2
HIVとAIDS	302	36.0
陽性者治療福祉	84	10.0
本人リスク行為	461	54.9
受検者リスク変容抵抗感	201	23.9
受検者予防自信	302	36.0
その他	23	2.7

< HIV業務経験・単純集計 >

表50 検査前相談への抵抗感

	度数	%
とても抵抗がある	12	1.2
少し抵抗がある	169	17.0
あまり抵抗がない	506	51.0
全く抵抗がない	291	29.3
無回答	14	1.4
合計	992	100.0

表52 陽性告知への抵抗感

	度数	%
とても抵抗がある	460	46.4
少し抵抗がある	287	28.9
あまり抵抗がない	141	14.2
全く抵抗がない	48	4.8
無回答	56	5.6
合計	992	100.0

表53 性パートナーの性別について

	度数	%
たずねる	408	41.1
たずねない	487	49.1
無回答	97	9.8
合計	992	100.0

表54 性パートナーの性別について聞く理由
(複数回答)n=408

	度数	%
予防行動を明確にするため	286	70.1
用紙に記入されているから	110	27.0
不安な受検者は自ら話すから	139	34.1
その他	29	7.1

表56 予防的支援ができて自信

	度数	%
できている	21	2.1
まあまあできている	479	48.3
あまりできていない	413	41.6
全然できていない	30	3.0
その他	3	0.3
無回答	46	4.6
合計	992	100.0

表51 陰性告知への抵抗感

	度数	%
とても抵抗がある	18	1.8
少し抵抗がある	117	11.8
あまり抵抗がない	528	53.2
全く抵抗がない	303	30.5
無回答	26	2.6
合計	992	100.0

表55 性パートナーの性別について聞かない理由
(複数回答)n=487

	度数	%
リスク行為に注目すれば聞く必要な	250	51.3
自治体として聞かない方針	52	10.7
受検者が話さないから	147	30.2
その他	80	16.4

表57 HIV/AIDS関連業務の重要度

	度数	%
重要度は高い	438	44.2
重要度は低い	78	7.9
どちらとも言えない	454	45.8
無回答	22	2.2
合計	992	100.0

<HIV業務経験・単純集計>

表58 担当のHIV検査業務について改善すべき点

(複数回答)n=992

	度数	%
検査日程・時間	449	45.3
予約方法	56	5.6
受付窓口での対応	154	15.5
検査方法	101	10.2
結果告知方法	238	24.0
検査場所の設備	378	38.1
相談場所の設備	475	47.9
スタッフの数不足	189	19.1
広報の仕方	373	37.6
その他	64	6.5
特になし	65	6.6

表59 HIV検査業務における悩み(複数回答) n=992

	度数	%
話したがない受検者への対応	240	24.2
頻回受検者への対応	532	53.6
感染不安が高い人への対応	364	36.7
攻撃的な反応の受検者への対応	136	13.7
自分の知識不足	390	39.3
外国人への対応	313	31.6
その他	62	6.3
特になし	69	7.0

表60 HIV検査業務で困った時の解決方法

(複数回答)n=992

	度数	%
同僚の保健師に相談	861	86.8
上司に相談	627	63.2
専門機関に相談	372	37.5
本やインターネットで調べる	769	77.5
何もしない	3	0.3
その他	26	2.6

表61 HIV検査業務上あればよい媒体(複数回答) n=992

	度数	%
説明者用ガイドライン	732	73.8
説明に使う教材	571	57.6
ニーズに応じたガイドライン	631	63.6
パンフレット	587	59.2
動画教材	382	38.5
何もない	13	1.3
その他	21	2.1

表62 属性とHIV業務に対する苦手意識<保健師>

	HIV業務に対する苦手意識			χ^2 検定 p
	苦手である	苦手でない	合計	
年齢**				
40歳未満	396 59.9%	265 40.1%	661 100.0%	0.000
40歳以上	392 48.4%	418 51.6%	810 100.0%	
性別*				
女	797 54.3%	672 45.7%	1,469 100.0%	0.014
男	7 29.2%	17 70.8%	24 100.0%	
保健師経験年数**				
20年未満	427 58.9%	298 41.1%	725 100.0%	0.000
20年以上	384 49.0%	399 51.0%	783 100.0%	
普段の業務でのインターネット使用頻度**				
毎日使用する	495 50.6%	484 49.4%	979 100.0%	0.003
週に2~3日使用する	229 59.2%	158 40.8%	387 100.0%	
週に1回程度使用する	80 63.5%	46 36.5%	126 100.0%	
全く使わない	5 41.7%	7 58.3%	12 100.0%	
【現在担当する業務】				
母子保健**				
担当している	345 60.4%	226 39.6%	571 100.0%	0.000
担当していない	466 49.7%	471 50.3%	937 100.0%	
精神保健*				
担当している	205 59.1%	142 40.9%	347 100.0%	0.027
担当していない	606 52.2%	555 47.8%	1,161 100.0%	

表62 属性とHIV業務に対する苦手意識<保健師>

	HIV業務に対する苦手意識			χ^2 検定 <i>p</i>
	苦手である	苦手でない	合計	
難病				
担当している	217 57.3%	162 42.7%	379 100.0%	0.122
担当していない	594 52.6%	535 47.4%	1,129 100.0%	
HIV/AIDS**				
担当している	148 44.7%	183 55.3%	331 100.0%	0.000
担当していない	663 56.3%	514 43.7%	1,177 100.0%	
結核				
担当している	192 54.1%	163 45.9%	355 100.0%	0.903
担当していない	619 53.7%	534 46.3%	1,153 100.0%	
HIV/AIDS・結核以外の感染症				
担当している	154 49.0%	160 51.0%	314 100.0%	0.065
担当していない	657 55.0%	537 45.0%	1,194 100.0%	
がん・生活習慣病				
担当している	175 55.0%	143 45.0%	318 100.0%	0.658
担当していない	636 53.4%	554 46.6%	1,190 100.0%	
児童相談関係				
担当している	55 57.3%	41 42.7%	96 100.0%	0.526
担当していない	756 53.5%	656 46.5%	1,412 100.0%	
高齢者保健関係				
担当している	129 60.0%	86 40.0%	215 100.0%	0.055
担当していない	682 52.7%	611 47.3%	1,293 100.0%	
地区担当として、全業務に携わっている**				
担当している	173 62.9%	102 37.1%	275 100.0%	0.001
担当していない	638 51.7%	595 48.3%	1,233 100.0%	

表62 属性とHIV業務に対する苦手意識<保健師>

	HIV業務に対する苦手意識		合計	χ^2 検定 p
	苦手である	苦手でない		
【現在の業務で、接する頻度が高い年齢層】				
乳幼児(0歳～5歳)**				
接する頻度が高い	417 59.4%	285 40.6%	702 100.0%	0.000
接する頻度が低い	394 48.9%	412 51.1%	806 100.0%	
児童(6歳～11歳)**				
接する頻度が高い	28 36.4%	49 63.6%	77 100.0%	0.002
接する頻度が低い	783 54.7%	684 45.3%	1,431 100.0%	
中学・高校・大学生(12歳～21歳)**				
接する頻度が高い	35 37.2%	59 62.8%	94 100.0%	0.001
接する頻度が低い	776 54.9%	638 45.1%	1,414 100.0%	
成人男性(20歳～64歳)**				
接する頻度が高い	298 47.0%	336 53.0%	634 100.0%	0.000
接する頻度が低い	513 58.7%	361 41.3%	874 100.0%	
成人女性(20歳～64歳)*				
接する頻度が高い	419 51.2%	400 48.8%	819 100.0%	0.029
接する頻度が低い	392 56.9%	297 43.1%	689 100.0%	
高齢者(65歳以上)				
接する頻度が高い	418 52.7%	375 47.3%	793 100.0%	0.408
接する頻度が低い	393 55.0%	322 45.0%	715 100.0%	

表63 性相談経験とHIV業務に対する苦手意識<保健師>

	HIV業務に対する苦手意識			χ^2 検定 <i>p</i>
	苦手である	苦手でない	合計	
性に関する相談をうけた経験がある**				
はい	689	630	1,319	0.000
	52.2%	47.8%	100.0%	
いいえ	90	37	127	100.0%
	70.9%	29.1%	100.0%	
性に関する相談への対応する気持ち**				
積極的に対応したい	74	143	217	0.000
	34.1%	65.9%	100.0%	
職務として対応したい	644	529	1,173	100.0%
	54.9%	45.1%	100.0%	
対応したくない、関わりたくない	75	7	82	100.0%
	91.5%	8.5%	100.0%	
同性愛者への対応の経験がある**				
はい	290	455	745	0.000
	38.9%	61.1%	100.0%	
いいえ	151	55	206	100.0%
	73.3%	26.7%	100.0%	
わからない	369	186	555	100.0%
	66.5%	33.5%	100.0%	
周囲に同性愛の友人・知人がいる**				
はい	77	107	184	0.000
	41.8%	58.2%	100.0%	
いいえ	517	380	897	100.0%
	57.6%	42.4%	100.0%	
わからない	214	210	424	100.0%
	50.5%	49.5%	100.0%	
HIV陽性者へ対応の経験がある**				
はい	174	319	493	0.000
	35.3%	64.7%	100.0%	
いいえ	192	112	304	100.0%
	63.2%	36.8%	100.0%	
わからない	443	265	708	100.0%
	62.6%	37.4%	100.0%	

表64 セクシュアリティ・HIVの意識・知識とHIV業務に対する苦手意識<保健師>

	HIV業務に対する苦手意識			χ^2 検定 p
	苦手である	苦手でない	合計	
一般的な性意識の合計点**				
低い(28点未満)	383	410	793	0.000
	48.3%	51.7%	100.0%	
高い(28点以上)	423	285	708	0.000
	59.7%	40.3%	100.0%	
【同性愛・性同一性障害に関する知識】				
同性愛は精神的な病気のひとつだと思う**				
そう思う	29	22	51	0.000
	56.9%	43.1%	100.0%	
そう思わない(正答)	680	638	1,318	0.000
	51.6%	48.4%	100.0%	
わからない	94	33	127	0.000
	74.0%	26.0%	100.0%	
男性同性愛者(ゲイ)の多くは女性的な言葉やしぐさ(おネエ)であるように思う**				
そう思う	83	49	132	0.000
	62.9%	37.1%	100.0%	
そう思わない(正答)	537	573	1,110	0.000
	48.8%	51.6%	100.0%	
わからない	185	72	257	0.000
	72.0%	28.0%	100.0%	
女性同性愛者(レズビアン)の多くは、男性的な言葉やしぐさであるように思う**				
そう思う	46	26	72	0.000
	63.9%	36.1%	100.0%	
そう思わない(正答)	555	580	1,135	0.000
	48.9%	51.1%	100.0%	
わからない	204	87	291	0.000
	70.1%	29.9%	100.0%	
同性愛者になるか異性愛者になるか、本人の希望によって選択できると思う**				
そう思う	420	333	753	0.000
	55.8%	44.2%	100.0%	
そう思わない(正答)	234	273	507	0.000
	46.2%	53.8%	100.0%	
わからない	151	85	236	0.000
	64.0%	36.0%	100.0%	

表64 セクシュアリティ・HIVの意識・知識とHIV業務に対する苦手意識<保健師>

	HIV業務に対する苦手意識		合計	χ^2 検定 p
	苦手である	苦手でない		
同性愛者は治療や努力で異性愛者に変えることができると思う**				
そう思う	14	10	24	0.000
	58.3%	41.7%	100.0%	
そう思わない(正答)	583	570	1,153	
	50.6%	49.4%	100.0%	
わからない	208	113	321	0.000
	64.8%	65.2%	100.0%	
性同一性障害と同性愛の区別がよくわからない**				
そう思う	180	77	257	0.000
	70.0%	30.0%	100.0%	
そう思わない	484	532	1,016	
	47.6%	52.4%	100.0%	
わからない	138	79	217	0.000
	63.6%	36.4%	100.0%	
男性同士で性行為をする人をMSMという**				
そう思う(正答)	209	313	522	0.000
	40.0%	60.0%	100.0%	
そう思わない	37	55	92	
	40.2%	59.8%	100.0%	
わからない	553	319	872	0.000
	63.4%	36.6%	100.0%	
性的指向とは、同性愛なのか、異性愛なのか、両性愛なのかを表す言葉である**				
そう思う(正答)	174	233	407	0.000
	42.8%	57.2%	100.0%	
そう思わない	271	281	552	
	49.1%	50.9%	100.0%	
わからない	355	175	530	0.000
	67.0%	33.0%	100.0%	
同性愛・性同一性障害知識得点**				
低い	584	317	901	0.000
	64.8%	35.2%	100.0%	
高い	222	377	599	
	37.1%	62.9%	100.0%	

表64 セクシュアリティ・HIVの意識・知識とHIV業務に対する苦手意識<保健師>

	HIV業務に対する苦手意識			χ^2 検定 <i>p</i>
	苦手である	苦手でない	合計	
【同性愛・性同一性障害に関する意識】				
世の中の多くの人は同性愛に偏見を持っている				
そう思う	646	564	1,210	0.131
	53.4%	46.6%	100.0%	
そう思わない	49	54	103	
	47.6%	52.4%	100.0%	
わからない	110	75	185	100.0%
	59.5%	40.5%	100.0%	
世の中の多くの人は性同一性障害に偏見を持っている*				
そう思う	533	482	1,015	0.013
	52.5%	47.5%	100.0%	
そう思わない	102	103	205	
	49.8%	50.2%	100.0%	
わからない	171	107	278	100.0%
	61.5%	38.5%	100.0%	
上司が同性愛者だと抵抗を感じる**				
そう思う	149	64	213	0.000
	70.0%	30.0%	100.0%	
そう思わない	382	483	865	
	44.2%	55.8%	100.0%	
わからない	275	147	422	100.0%
	65.2%	34.8%	100.0%	
担当の相手が同性愛者だと抵抗を感じる**				
そう思う	110	42	152	0.000
	72.4%	27.6%	100.0%	
そう思わない	527	574	1,101	
	47.9%	52.1%	100.0%	
わからない	167	77	244	100.0%
	68.4%	31.6%	100.0%	
正直、同性愛は理解できない**				
そう思う	167	66	233	0.000
	71.7%	28.3%	100.0%	
そう思わない	390	478	868	
	44.9%	55.1%	100.0%	
わからない	248	149	397	100.0%
	62.5%	37.5%	100.0%	
正直、性同一性障害は理解できない**				
そう思う	114	39	153	0.000
	74.5%	25.5%	100.0%	
そう思わない	468	531	999	
	46.8%	53.2%	100.0%	
わからない	224	122	346	100.0%
	64.7%	35.3%	100.0%	

表64 セクシュアリティ・HIVの意識・知識とHIV業務に対する苦手意識<保健師>

	HIV業務に対する苦手意識		合計	χ^2 検定 p
	苦手である	苦手でない		
【HIV知識】				
性感染症にかかっているとHIVに感染しやすい**				
正しい(正答)	544 48.9%	568 51.1%	1,112 100.0%	0.000
間違っている	159 64.4%	88 35.6%	247 100.0%	
わからない	97 71.9%	38 28.1%	135 100.0%	
コンドームを使わないオーラルセックスで性感染症に感染する可能性がある**				
正しい(正答)	755 52.9%	671 47.1%	1,426 100.0%	0.003
間違っている	21 53.8%	18 46.2%	39 100.0%	
わからない	28 82.4%	6 17.6%	34 100.0%	
コンドームを使わないアナルセックスでHIVに感染する可能性がある**				
正しい(正答)	765 52.8%	683 47.2%	1,448 100.0%	0.001
間違っている	6 60.0%	4 40.0%	10 100.0%	
わからない	32 84.2%	6 15.8%	38 100.0%	
A型肝炎はワクチンで予防することができる**				
正しい(正答)	266 49.8%	268 50.2%	534 100.0%	0.002
間違っている	369 53.2%	325 46.8%	694 100.0%	
わからない	164 63.1%	96 36.9%	260 100.0%	
日本国籍新規HIV感染者の約7割が男性同性間性的接触による感染である**				
正しい(正答)	397 48.5%	421 51.5%	818 100.0%	0.000
間違っている	172 53.4%	150 46.6%	322 100.0%	
わからない	231 65.8%	120 34.2%	351 100.0%	
HIV知識の合計点**				
低い(0~3点)	404 61.1%	257 38.9%	661 100.0%	0.000
高い(4~5点)	400 47.7%	438 52.3%	838 100.0%	

表65 教育・研修経験およびニーズとHIV業務に対する苦手意識<保健師>

	HIV業務に対する苦手意識			χ^2 検定 p
	苦手である	苦手でない	合計	
養成機関**				
専門学校・養成所	512	497	1,009	0.003
	50.7%	49.3%	100.0%	
4年制大学	259	168	427	
	60.7%	39.3%	100.0%	
その他	34	29	63	
	54.0%	46.0%	100.0%	
養成課程でセクシュアリティに関する研修を受けた**				
はい	85	99	184	0.001
	46.2%	53.8%	100.0%	
いいえ	466	433	899	
	51.8%	48.2%	100.0%	
覚えていない	254	164	418	
	60.8%	39.2%	100.0%	
保健師なってセクシュアリティに関する研修を受けた**				
はい	246	374	620	0.000
	39.7%	60.3%	100.0%	
いいえ	491	273	764	
	64.3%	35.7%	100.0%	
覚えていない	65	49	114	
	57.0%	43.0%	100.0%	
養成課程でHIV/AIDSに関する研修を受けた*				
はい	440	336	776	0.014
	56.7%	43.3%	100.0%	
いいえ	227	244	471	
	48.2%	51.8%	100.0%	
覚えていない	134	115	249	
	53.8%	46.2%	100.0%	
保健師になってHIV/AIDSに関する研修を受けた**				
はい	554	598	1,152	0.000
	48.1%	51.9%	100.0%	
いいえ	203	82	285	
	71.2%	28.8%	100.0%	
覚えていない	43	13	56	
	76.8%	23.2%	100.0%	
自分のHIV/AIDS知識レベルの認識**				
知識なし	442	141	583	0.000
	75.8%	24.2%	100.0%	
知識あり	356	554	910	
	39.1%	60.9%	100.0%	

表66 HIV業務経験とHIV業務に対する苦手意識<保健師>

	HIV業務に対する苦手意識			χ^2 検定 <i>p</i>
	苦手である	苦手でない	合計	
HIV/AIDS関連業務の経験がある**				
はい	500 47.3%	557 52.7%	1,057 100.0%	0.000
いいえ	307 69.9%	132 30.1%	439 100.0%	
HIV検査に携わった年数**				
5年未満	231 48.1%	249 51.9%	480 100.0%	0.008
5年以上	142 39.0%	222 61.0%	364 100.0%	
携わったHIV検査の種類*				
通常検査のみ	279 47.3%	311 52.7%	590 100.0%	0.028
即日検査のみ	69 49.3%	71 50.7%	140 100.0%	
通常検査と即日検査の両方	81 37.5%	135 62.5%	216 100.0%	
受検者が記入する用紙				
ある(あった)	377 45.1%	458 54.9%	835 100.0%	0.649
ない(なかった)	34 42.5%	46 57.5%	80 100.0%	
検査前相談の時間*				
10分未満	104 51.2%	99 48.8%	203 100.0%	0.010
10分以上	267 41.0%	384 59.0%	651 100.0%	
陰性告知の時間*				
10分未満	156 47.7%	171 52.3%	327 100.0%	0.034
10分以上	192 40.2%	286 59.8%	478 100.0%	

表66 HIV業務経験とHIV業務に対する苦手意識<保健師>

	HIV業務に対する苦手意識			χ^2 検定 p
	苦手である	苦手でない	合計	
陽性告知時間				
45分未満	20	60	80	0.843
	25.0%	75.0%	100.0%	
45分以上	25	70	95	
	26.3%	73.7%	100.0%	
検査前相談への抵抗感**				
抵抗あり	145	36	181	0.000
	80.1%	19.9%	100.0%	
抵抗なし	289	491	780	
	37.1%	62.9%	100.0%	
陰性告知への抵抗感**				
抵抗あり	104	30	134	0.000
	77.6%	22.4%	100.0%	
抵抗なし	325	490	815	
	39.9%	60.1%	100.0%	
陽性告知への抵抗感**				
抵抗あり	389	346	735	0.000
	52.9%	47.1%	100.0%	
抵抗なし	30	154	184	
	16.3%	83.7%	100.0%	
性感染不安を持つ受検者に性パートナーの性別を尋ねる**				
はい	154	246	400	0.001
	38.5%	61.5%	100.0%	
いいえ	240	241	481	
	49.9%	50.1%	100.0%	
予防的支援ができています**				
できている	168	322	490	0.000
	34.3%	65.7%	100.0%	
できていない	250	187	437	
	57.2%	42.8%	100.0%	
HIV/AIDS業務の重要度の認識**				
重要度は高い	167	263	430	0.002
	38.8%	61.2%	100.0%	
重要度は低い	42	35	77	
	54.5%	45.5%	100.0%	
どちらともいえない	220	227	447	
	49.2%	50.8%	100.0%	

表67 属性とHIV感染予防支援の自信<保健師>

	予防的支援		合計	χ^2 検定 <i>p</i>
	できている	できていない		
年齢*				
40歳未満	149 47.8%	163 52.2%	312 100.0%	0.031
40歳以上	337 55.2%	273 44.8%	610 100.0%	
性別				
女	487 52.8%	436 47.2%	923 100.0%	0.391
男	9 64.3%	5 35.7%	14 100.0%	
保健師経験年数*				
20年未満	182 48.0%	197 52.0%	379 100.0%	0.013
20年以上	318 56.3%	247 43.7%	565 100.0%	
普段の業務でのインターネット使用頻度*				
毎日使用する	355 55.0%	290 45.0%	645 100.0%	0.015
週に2~3日使用する	103 46.8%	117 53.2%	220 100.0%	
週に1回程度使用する	40 58.0%	29 42.0%	69 100.0%	
全く使わない	1 12.5%	7 87.5%	8 100.0%	

表68 性相談とHIV感染予防支援の自信<保健師>

	予防的支援		合計	χ^2 検定 p
	できている	できていない		
性に関する相談を受けた経験がある				
はい	474 53.3%	415 46.7%	889 100.0%	0.263
いいえ	4 36.4%	7 63.6%	11 100.0%	
性に関する相談へ対応する気持ち**				
積極的に対応したい	103 68.2%	48 31.8%	151 100.0%	0.000
職務として対応したい	378 50.8%	366 49.2%	744 100.0%	
対応したくない、関わりたくない	9 29.0%	22 71.0%	31 100.0%	
同性愛者へ対応の経験がある*				
はい	351 56.5%	270 43.5%	621 100.0%	0.008
いいえ	35 45.5%	42 54.5%	77 100.0%	
わからない	111 45.9%	131 54.1%	242 100.0%	
周囲に同性愛の友人・知人がいる*				
はい	65 63.7%	37 36.3%	102 100.0%	0.029
いいえ	293 52.9%	261 47.1%	554 100.0%	
わからない	137 48.4%	146 51.6%	283 100.0%	
HIV/AIDS業務の苦手意識**				
とても苦手である	11 28.9%	27 71.1%	38 100.0%	0.000
少し苦手である	157 41.3%	223 58.7%	380 100.0%	
あまり苦手でない	258 59.7%	174 40.3%	432 100.0%	
全く苦手でない	64 83.1%	13 16.9%	77 100.0%	
HIV陽性者へ対応の経験がある*				
はい	237 57.1%	178 42.9%	415 100.0%	0.039
いいえ	99 52.9%	88 47.1%	187 100.0%	
わからない	162 47.8%	177 52.2%	339 100.0%	

表69 性HIV知識意識とHIV感染予防支援の自信<保健師>

	予防的支援		合計	χ^2 検定 <i>p</i>
	できている	できていない		
一般的な性意識の合計点				
低い(28点未満)	278 55.4%	224 44.6%	502 100.0%	0.086
高い(28点以上)	218 49.8%	220 50.2%	438 100.0%	
【同性愛・性同一性障害に関する知識】				
同性愛は精神的な病気のひとつだと思う**				
そう思う	9 33.3%	18 66.7%	27 100.0%	0.001
そう思わない(正答)	459 54.8%	379 45.2%	838 100.0%	
わからない	26 36.1%	46 63.9%	72 100.0%	
男性同性愛者(ゲイ)の多くは女性的な言葉やしぐさ(おネエ)であるように思う*				
そう思う	37 44.0%	47 56.0%	84 100.0%	0.020
そう思わない(正答)	402 55.2%	326 44.8%	728 100.0%	
わからない	57 44.5%	71 55.5%	128 100.0%	
女性同性愛者(レズビアン)の多くは、男性的な言葉やしぐさであるように思う				
そう思う	18 41.9%	25 58.1%	43 100.0%	0.229
そう思わない(正答)	401 54.0%	342 46.0%	743 100.0%	
わからない	76 50.0%	76 50.0%	100 100.0%	
同性愛者になるか異性愛者になるか、本人の希望によって選択できると思う				
そう思う	234 52.5%	212 47.5%	446 100.0%	0.372
そう思わない(正答)	192 54.9%	158 45.1%	350 100.0%	
わからない	67 47.9%	73 52.1%	140 100.0%	
同性愛者は治療や努力で異性愛者に変えることができると思う				
そう思う	9 69.2%	4 30.8%	13 100.0%	0.488
そう思わない(正答)	392 52.5%	354 47.5%	746 100.0%	
わからない	95 52.5%	86 47.5%	181 100.0%	

表69 性HIV知識意識とHIV感染予防支援の自信<保健師>

	予防的支援		合計	χ^2 検定 p
	できている	できていない		
性同一性障害と同性愛の区別がよくわからない**				
そう思う	56 40.3%	83 59.7%	139 100.0%	0.003
そう思わない	373 55.8%	296 44.2%	669 100.0%	
わからない	63 50.0%	63 50.0%	126 100.0%	
男性同士で性行為をする人をMSMという*				
そう思う(正答)	256 57.3%	191 42.7%	447 100.0%	0.015
そう思わない	36 57.1%	27 42.9%	63 100.0%	
わからない	203 47.8%	222 52.2%	425 100.0%	
性的指向とは、同性愛なのか、異性愛なのか、両性愛なのかを表す言葉である				
そう思う(正答)	181 56.4%	140 43.6%	321 100.0%	0.216
そう思わない	179 52.2%	164 47.8%	343 100.0%	
わからない	133 49.3%	137 50.7%	270 100.0%	
同性愛・性同一性障害知識の合計点**				
低い	223 46.5%	257 53.5%	480 100.0%	0.000
高い	273 59.3%	187 40.7%	460 100.0%	

表69 性HIV知識意識とHIV感染予防支援の自信<保健師>

	予防的支援		合計	χ^2 検定 p
	できている	できていない		
【同性愛・性同一性障害に関する意識】				
世の中の多くの人は同性愛に偏見を持っている				
そう思う	404 52.3%	368 47.7%	772 100.0%	0.802
そう思わない	35 55.6%	28 44.4%	63 100.0%	
わからない	56 54.9%	46 45.1%	102 100.0%	
世の中の多くの人は性同一性障害に偏見を持っている				
そう思う	349 52.3%	318 47.7%	667 100.0%	0.624
そう思わない	67 56.8%	51 43.2%	118 100.0%	
わからない	78 51.3%	74 48.7%	152 100.0%	
上司が同性愛者だと抵抗を感じる				
そう思う	49 45.8%	58 54.2%	107 100.0%	0.088
そう思わない	317 55.5%	254 44.5%	571 100.0%	
わからない	130 49.6%	132 50.4%	262 100.0%	
担当の相手が同性愛者だと抵抗を感じる				
そう思う	38 44.7%	47 55.3%	85 100.0%	0.289
そう思わない	383 53.4%	334 46.6%	717 100.0%	
わからない	74 54.4%	62 45.6%	136 100.0%	
正直、同性愛は理解できない**				
そう思う	56 42.4%	76 57.6%	132 100.0%	0.007
そう思わない	322 56.5%	248 43.5%	570 100.0%	
わからない	117 49.4%	120 50.6%	237 100.0%	
正直、性同一性障害は理解できない*				
そう思う	36 40.9%	52 59.1%	88 100.0%	0.013
そう思わない	361 55.6%	288 44.4%	649 100.0%	
わからない	97 48.3%	104 51.7%	201 100.0%	

表69 性HIV知識意識とHIV感染予防支援の自信<保健師>

	予防的支援		合計	χ^2 検定 <i>p</i>
	できている	できていない		
【HIV知識】				
性感染症にかかっているとHIVに感染しやすい				
正しい(正答)	439 53.7%	378 46.3%	817 100.0%	0.415
間違っている	39 46.4%	45 53.6%	84 100.0%	
わからない	18 50.0%	18 50.0%	36 100.0%	
コンドームを使わないオーラルセックスで性感染症に感染する可能性がある				
正しい(正答)	481 52.6%	434 47.4%	915 100.0%	0.654
間違っている	9 60.0%	6 40.0%	15 100.0%	
わからない	7 63.6%	4 36.4%	11 100.0%	
コンドームを使わないアナルセックスでHIVに感染する可能性がある				
正しい(正答)	490 52.5%	443 47.5%	933 100.0%	0.131
間違っている	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	
わからない	5 83.3%	1 16.7%	6 100.0%	
A型肝炎はワクチンで予防することができる				
正しい(正答)	182 52.8%	163 47.2%	345 100.0%	0.128
間違っている	245 55.2%	199 44.8%	444 100.0%	
わからない	65 45.5%	7 54.5%	143 100.0%	
日本国籍新規HIV感染者の約7割が男性同性間性的接触による感染である				
正しい(正答)	309 54.5%	258 45.5%	567 100.0%	0.383
間違っている	101 51.3%	96 48.7%	197 100.0%	
わからない	83 48.8%	87 51.2%	170 100.0%	
HIV知識の合計点				
低い(0~3点)	165 51.6%	155 48.4%	320 100.0%	0.580
高い(4~5点)	332 53.5%	289 46.5%	621 100.0%	