

No. 23 清暑益気湯

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	清暑益気丸	清暑益気湯	清暑益気湯
処方	人参 36g	人参 3-3.5	人参 6g
	黄芪 (蜜炙) 150g	黄耆 3	黄耆 12g
	炒白朮 360g	白朮 3~3.5 (蒼朮も可)	白朮 6g
	蒼朮 (米泔炙) 144g		
	麦冬 72g	麦門冬 3-3.5	麦門冬 12g
	泽泻 60g		
	醋五味子 36g	五味子 1-2	五味子 3g
	当归 48g	当歸 3	当歸 6g
	黄柏 60g	黄柏 1-2	黄柏 3g
	葛根 348g		
	陈皮 72g	陳皮 2-3	陳皮 3g
	醋青皮 72g		
	六神曲 (麩炒) 84g		
	升麻 60g		
	甘草 120g	甘草 1-2	炙甘草 3g
製法	以上十五味, 粉碎成細粉, 過篩, 混勻。毎 100g 粉末加煉蜜 120~130g 制成大蜜丸, 即得。		
用法	姜湯或温開水送服。一次 1 丸, 一日 2 次。	湯	水煎服。
効能・主治	祛暑利湿, 補氣生津。 用于中暑受熱, 氣津兩傷, 症見頭暈身熱、四肢倦怠、自汗心煩、咽干口渴。	体力虚弱で、疲れやすく、食欲不振、ときに口渴などがあるものの次の諸症: 暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢、夏痩せ、全身倦怠、慢性疾患による体力低下・食欲不振	益氣生津・清熱。 氣津兩傷の全身倦怠・無力感・口渴・熱感・脈が数で無力などの症候。
注意	忌食辛辣油膩之品。		
掲載頁	1132	144	189
その他		原典: 医学六要	

No. 24 川芎茶調散

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	川芎茶調散	川芎茶調散	川芎茶調散
処方	川芎 120g,	川芎 3	川芎 6g
	白芷 60g	白芷 2	白芷 3g
	羌活 60g	羌活 2	羌活 3g
	細辛 30g		
	防风 45g	防風 2	防風 2g
	荆芥 120g	荆芥 2	荆芥 6g,
	薄荷 240g	薄荷葉 2	薄荷 12g
	甘草 60g	甘草 1.5	甘草 3g
		細茶 1.5	
	香附子 3-4	香附子 6g	
製法	以上八味, 粉碎成細粉, 過篩, 混勻, 即得。		
用法	飯後清茶沖服。一次 3~6g, 一日 2 次。	湯	細末にし 1 回 6g ずつ細茶で服用する。水煎服用してもよい。
効能・主治	疏風止痛。 用于外感風邪所致的頭痛, 或有惡寒、發熱、鼻塞。	体力に関わらず使用でき, 頭痛があるものの次の諸症: かげ, 血の道症*, 頭痛	祛風齒痛。 頭風。頭痛・偏頭痛が反復して長期間治癒せず、感冒や情緒変動などによって誘発される。
注意	孕婦慎服。		
掲載頁	473	149	396
その他		*血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。 原典: 太平惠民和劑局方	

No. 25 蘇子降気湯

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剤名	蘇子降気丸	蘇子降気湯	蘇子降気湯
処方	炒紫蘇子 145g	紫蘇子 3~5 (蘇葉可)	蘇子 9g
	厚朴 145g	厚朴 2~3	厚朴 6g
	前胡 145g	前胡 2~3	前胡 6g
	甘草 145g	甘草 1~2	炙甘草 5g
	姜半夏 145g	半夏 3~5	半夏 9g
		生姜 0.5~1 又は乾姜 0.5~1	
	陈皮 145g	陳皮 2~3	
	沉香 102g		
	当归 102g	当帰 2.5~3	当帰 6g
		桂皮 2~3	肉桂 2g
	大棗 1~2		
製法	以上八味、除炒紫蘇子外、其余厚朴等七味粉碎成細粉、再与炒紫蘇子配研、过篩、混勻;用生姜 36g、大棗 73g 煎汁泛丸、低温干燥、即得。		
用法	口服:每次 6 克、每日 1~2 次。	湯	生姜 3g、大棗 1g、蘇葉 2g と水煎服用する。
効能・主治	降気化痰、温腎納気。 用于上盛下虚、气逆痰壅所致的咳嗽喘息、胸隔痞塞。	体力虚弱で、足冷えや顔ののぼせがあり、息苦しさのあるものの次の諸症: 慢性気管支炎、気管支ぜんそく	降気平喘・温化寒痰。 上実下虚(寒痰壅肺・腎陽不足) 呼吸困難・喘鳴・稀薄な痰・呼吸促迫・咳嗽・胸がつまって苦しい。腰や膝がだるく無力・舌苔が白滑あるいは白膩など。
注意	陰虚、舌紅无苔者忌服。		
掲載頁	741	152	345
その他		原典:太平惠民和剂局方	

No. 26 知柏地黄丸

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	知柏地黄丸	知柏地黄丸	知柏地黄丸
処方	知母 40g	知母 3 (3)	知母 6g
	黄柏 40g	黄柏 3 (3)	黄柏 6g
	熟地黄 160g,	地黄 5 (5-8)	熟地黄 24g
	山茱萸(制) 80g	山茱萸 3 (3-4)	山茱萸 12g
	牡丹皮 60g	牡丹皮 3 (3)	牡丹皮 9g
	山药 80g	山薬 3 (3-4)	山薬 12g
	茯苓 60g	茯苓 3 (3)	茯苓 9g
	泽泻 60g	沢瀉 3 (3)	沢瀉 9g
		左側の数字は湯, 右側の( )内の数字は散	六味地黄丸 [熟地黄, 山茱萸, 山薬, 沢瀉, 茯苓, 牡丹皮] に知母, 黄柏。
製法	以上八味, 粉碎成细粉, 过筛, 混匀。每100g粉末用炼蜜35~50g加适量的水泛丸, 干燥, 制成水蜜丸;或加炼蜜80~110g 制成小蜜丸或大蜜丸, 即得。		
用法	口服。水蜜丸一次6g, 小蜜丸一次9g, 大蜜丸一次1丸, 一日2次。	(1) 散: 1回2g, 1日3回 (2) 湯	記載無し
効能・主治	滋阴降火。 用于阴虚火旺, 潮热盗汗, 口干咽痛, 耳鸣遗精, 小便短赤。	体力中等度以下で, 疲れやすく胃腸障害がなく, 口渴があるものの次の諸症: 顔や四肢のほてり, 排尿困難, 頻尿, むくみ	滋陰降火。 陰虚火旺による骨蒸潮熱・煩躁・盗汗・遺精・尺脈が浮で有力などの症候。
注意			
掲載頁	820	19	248
その他		追補 原典: 医宗金鑑 出典: 景岳全書	別名: 知柏八味丸

No. 27 二陳湯

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	二陳丸	二陳湯	二陳湯
処方	陈皮 250g	陳皮 3.5~4	陳皮 9g
	半夏(制) 250g	半夏 5~7	半夏 9g
	茯苓 150g	茯苓 3.5~5	茯苓 6g
	甘草 75g	甘草 1~2	炙甘草 3g
		生姜 1~1.5 (ヒネショウガを使用する場合 2~3)	
製法	以上四味, 粉碎成細粉, 過篩, 混勻。另取生姜 50g, 搗碎, 加水適量, 压榨取汁, 与上述粉末泛丸, 干燥, 即得。		
用法	口服。一次 9~15g, 一日 2 次。	湯	生姜 3g・烏梅 1 個とともに水煎服する。近代では、生姜・烏梅を用いないことが多い。
効能・主治	燥湿化痰, 理气和胃。 用于痰湿停滞導致的咳嗽痰多、胸脘脹悶、恶心嘔吐。	体力中等度で, 悪心, 嘔吐があるものの次の諸症: 悪心, 嘔吐, 胃部不快感, 慢性胃炎, 二日酔。	燥湿化痰・理気和中 湿痰 咳嗽・白色で多量の痰・胸が痞えて苦しい・悪心・嘔吐・肢体が重だるい・めまい・動悸・舌苔は白滑あるいは白膩・脈は滑など。
注意			
掲載頁	413	182	485
その他		原典: 太平惠民和劑局方	

No. 28 人参湯（理中丸）

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	理中丸（党参理中丸）	人参湯（理中丸）	理中丸
処方	党参 75g		
		人参 3	人参 6g
	⊕白朮 75g	白朮 3（蒼朮も可）	白朮 9g
	⊖甘草 75g	甘草 3	⊖甘草 6g
	炮姜 50g	乾姜 2-3	乾姜 6g
製法	以上四味，粉碎成細粉，過篩，混勻。 每 100g 粉末加煉蜜 110~120g 制成 大蜜丸，即得。		
用法	口服，一次 1 丸，一日 2 次。小兒酌 減。	(1) 散：1 回 2-3g，1 日 3 回 (2) 湯	水煎服。蜜丸にし 1 日 2~3 回 9g ずつ服用してもよい。
効能・ 主治	温中散寒，健胃。 用于脾胃虚寒，呕吐泄泻，胸满腹痛， 消化不良。	体力虚弱で，疲れやすくて手足 などが冷えやすいものの次の 諸症：胃腸虚弱，下痢，嘔吐， 胃痛，腹痛，急・慢性胃炎	温中散寒・補気健脾・温陽摂 血。 (1) 中焦虚寒 食欲不振・口渇がない・泥状~ 水様便・嘔吐・腹の鈍痛があり 温めたりおさえると軽減する・ 四肢の冷え・舌質は淡白で胖 大・舌苔は白滑・脈は沈遅で無 力など。 (2) 寒邪直中 急激な持続性の腹痛・腹部の 冷え・嘔吐・下痢あるいは便秘・ 腹鳴・四肢の冷え・舌質は淡~ 青・舌苔は白滑・脈は沈緊で遅 など。 (3) 陽虚不摂血 鼻出血・血便・不正性器出血な どがみられ，顔色が白い・息ざ れ・元気がない・脈が細あるい は虚大無力などをともなう。
注意	忌食生冷油膩，不宜消化的食物。		
掲載頁	1063	185	192
その他		原典：傷寒論，金匱要略	別名：理中湯・人参湯

No. 29 人参養榮湯

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	人参養榮丸	人参養榮湯	人参養榮湯
処方	人参 100g	人参 3	人参 6g
	⓪土白朮 (土炒) 100g	白朮 4(蒼朮も可)	白朮 9g
	茯苓 75g	茯苓 4	茯苓 9g
	甘草 (蜜炙) 100g	甘草 1~1.5	炙甘草 3g
	当归 100g	当帰 4	当帰 9g
	熟地黄 75g	地黄 4	熟地黄 12g
	白芍 (麩炒) 100g	芍薬 2~4	白芍 9g
	黄芪 (蜜炙) 100g	黄耆 1.5~2.5	黄耆 15g
	陈皮 100g	陳皮(橘皮も可) 2~2.5	陳皮 6g
	远志(制) 50g	遠志 1~2	遠志 5g
	肉桂 100g	桂皮 2~2.5	肉桂 3g
	五味子 (酒蒸) 75g	五味子 1~1.5	五味子 6g
			生姜 3g
			大棗 2g
製法	以上十二味、粉碎成細粉、過篩、混勻。另取生姜 50g、大棗 100g、分次加水煎煮至味盡、濾過、濾液濃縮至相對密度為 1.25(80℃)的清膏。每 100g 粉末加煉蜜 35~50g 與生姜、大棗液、泛丸、乾燥、製成水蜜丸；或加煉蜜 90~100g 與生姜、大棗液拌勻、製成大蜜丸、即得。		
用法	口服。水蜜丸一次 6g、大蜜丸一次 1 丸、一日 1~2 次。	湯	水煎服。
効能・主治	温補気血。 用于心脾不足、気血兩亏、形瘦神疲、食少便澆、病后虛弱。	体力虛弱なもの次の諸症：病後・術後などの体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血。	益氣養血・寧心安神・止咳化痰。 氣血兩虚で、不眠・動悸・不安などの心神不寧の症候や。慢性の咳嗽・呼吸困難・息ぎれなど肺氣不降の症候をとともうもの。
注意			
掲載頁	438	186	242
その他		原典：太平惠民和劑局方	

No. 30 半夏白朮天麻湯

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	半夏天麻丸	半夏白朮天麻湯	半夏白朮天麻湯
処方	法半夏 360g	半夏 3	半夏 7.5g
	天麻 180g	天麻 2	天麻 3.5g
	炙黄芩 360g	黄耆 1.5~2	黄耆 3.5g
	人参 30g	人参 1.5~2	人参 3.5g
	苍朮 (米泔炙) 36g		蒼朮 3.5g
	炒白朮 80g	白朮 1.5~3	白朮 5g
	茯苓 126g	茯苓 3	茯苓 3.5g
	陈皮 360g	陳皮 3	陳皮 7.5g
	泽泻 36g	沢瀉 1.5~2	沢瀉 3.5g
	六神曲 (麩炒) 69g	神麴 1.5~2	神麴 5g
	炒麦芽 39g	麦芽 1.5~2	麦芽 7.5g
	黄柏 54g	黄柏 1	黄柏 1.5g
		生姜 0.5~2 (ヒネショウガを使用する場合 2~4)	
	乾姜 0.5~1	乾姜 2g	
	神麴のない場合も可, 蒼朮 2~3を加えても可		
製法	以上十二味, 粉碎成細粉, 過篩, 混勻。取生姜, 榨汁(毎100g粉末用生姜3g), 药渣加水煎煮, 煎液濾過, 与汁合并, 泛丸, 干燥, 即得。		
用法	口服。一次6g, 一日2~3次。	湯	水煎服。
効能・主治	健脾祛湿, 化痰息风。 用于脾虚湿盛、痰浊内阻所致的眩晕、头痛、如蒙如裹、胸院满闷。	体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症: 頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症(副鼻腔炎)	化痰熄風・健脾祛湿。 風痰上擾 めまい・頭痛・悪心・嘔吐・胸苦しい・舌苔は白膩・脈は弦滑など。
注意	忌食生冷油膩。		
掲載頁	663	194	506
その他		原典:脾胃論 出典:万病回春	出典:脾胃論



No. 31 防風通聖散

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	防风通聖丸	防風通聖散	防風通聖散
処方	防风 50g	防風 1.2-1.5	防風 1.5g
	荊芥穗 25g	荊芥 1.2- 1.5	荊芥 1.5g
	薄荷 50g	薄荷葉 1.2-1.5	薄荷 1.5g
	麻黄 50g	麻黄 1.2-1.5	麻黄 1.5g
	大黄 50g	大黄 1.5	大黄 1.5g
	芒硝 50g	芒硝 1.5	芒硝 1.5g
	梔子 25g	山梔子 1.2- 1.5	山梔子 1.5g
	滑石 300g	滑石 3	滑石 9g
	桔梗 100g	桔梗 2	桔梗 3g
	石膏 100g	石膏 2	石膏 3g
	川芎 50g	川芎 1.2- 1.5	川芎 1.5g
	当归 50g	当帰 1.2- 1.5	当帰 1.5g
	白芍 50g	芍薬 1.2- 1.5	白芍 1.5g
	黄芩 100g	黄芩 2	黄芩 3g
	連翹 50g	連翹 1.2- 1.5	連翹 1.5g
	甘草 200g	甘草 2	甘草 6g
	白朮(炒) 25g	白朮 2	白朮 1.5g
		生姜 0.3-0.5(ヒネシヨウガを使用する場合 1.2- 1.5)	
	白朮のない場合も可		
製法	以上十七味, 滑石粉碎成極細粉, 其余防风等十六味粉碎成細粉, 過篩, 混勻, 用水制丸, 干燥, 用滑石粉包衣, 打光, 干燥, 即得。或以上十七味, 粉碎成細粉, 過篩, 混勻, 用水制丸, 干燥, 即得。		
用法	口服。一次 6g, 一日 2 次。	原則として湯 (1) 散:1 回 2g, 1 日 3 回 (2) 湯	粉末 1 回 6g を生姜 2g と水煎温服する。生姜 2g と水煎服用してもよい。
効能・主治	解表通里, 清熱解毒。 用于外寒内熱, 表里俱實, 惡寒壯熱, 頭痛咽干, 小便短赤, 大便秘結, 癰癤初起, 風疹濕瘡。	体力充実して, 腹部に皮下脂肪が多く, 便秘がちなものの次の諸症: 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘, 蓄膿症(副鼻腔炎), 湿疹・皮膚炎, ふきでもの(にきび), 肥満症	疏風解表・瀉熱通便。 風熱壅盛・表裏俱實。惡寒・発熱・目の充血・鼻閉・口が苦い・口乾・咽痛・胸苦しい・咳嗽・粘稠な痰・尿が濃く少量・便秘・舌質が紅・舌苔が黄厚・脈が浮滑で数など。
注意	孕妇慎用。		
掲載頁	719	211	217
その他		原典:宣明論, 中風門	

No. 32 補中益気湯

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	補中益気丸	補中益気湯	補中益気湯
処方	⊕黄芩 200g	黄耆 3~4.5	黄耆 15~30g
	党参 60g,		
		人参 3~4	人参 9
	⊕甘草 100g	甘草 1~2	⊕甘草 6g
	⊕炒白朮 60g	白朮 3~4 (蒼朮も可)	白朮 9g
	当帰 60g,	当帰 3	当帰 9g
	升麻 60g	升麻 0.5~2	升麻 3g
	柴胡 60g	柴胡 1~2	柴胡 3g
	陈皮 60g	陳皮 2~3	陳皮 6g
	大棗 1.5~3		
	生姜 0.5		
製法	以上八味、粉碎成細粉、過篩、混勻。 另取生姜 20g、大棗 40g 加水煎煮二次、濾過、濾液濃縮。每 100g 粉末加煉蜜 100~120g 及生姜和大棗的濃縮煎液制成小蜜丸；或每 100g 粉末加煉蜜 100~120g 制成大蜜丸、即得。		
用法	口服。小蜜丸一次比、大蜜丸一次 1 丸、一日 2~3 次。	湯	水煎服。丸剤にし 1 日 2~3 回 9~15g ずつ湯で服用してもよい。
効能・主治	補中益気、昇陽挙陷。 用于脾胃虚弱、中气下陷所致的泄泻、脱肛、阴挺、症见体倦乏力、食少腹胀、便溏久泻、胆门下坠或脱肛、子宫脱垂。	体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらさが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒。	補中益気・昇陽挙陷・甘温除大熱。 (1) 気虚下陷 元気がない・疲れやすい・動くとき息ぎれがする。四肢がだるく無力・物を言うのがおっくう・立ちくらみ・頭痛・めまい・下腹部の下墜感・脱肛・子宮下垂・慢性の下痢・尿失禁・排尿困難・不正性器出血・皮下出血・舌質は淡・脈は沈細で無力など。 (2) 気虚発熱 発熱・身体の熱感・自汗・悪風・頭痛・口渇があり熱い飲物を欲する・物を言うのがおっくう・息ぎれ・元気がない・脈は浮大で無力・舌質は淡など。
注意			
掲載頁	780	213	
その他		原典：弁惑論(李東垣) 内傷門 出典：脾胃論	

No. 33 麻子仁丸

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	麻仁丸	麻子仁丸	麻子仁丸
処方	火麻仁 200g	麻子仁 4~5	麻子仁 500g
	苦杏仁 100g	杏仁 2~2.5	杏仁 250g
	大黄 200g	大黄 3.5~4	大黄 500g
	枳实 (炒) 200g	枳実 2	枳実 250g
	姜厚朴 100g	厚朴 2~2.5	厚朴 250g
	炒白芍 200g	芍薬 2	白芍 250g
		甘草 1.5を加えても可	
製法	以上六味, 除火麻仁、苦杏仁外, 其余大黄等四味粉碎成细粉, 再与火麻仁、苦杏仁掺研成细粉, 过筛, 混匀。每100g粉末加炼蜜30~40g与适量的水制丸, 干燥, 制成水蜜丸或加炼蜜90~110g制成小蜜丸或大蜜丸, 即得。		
用法	口服, 水蜜丸一次6g, 小蜜丸一次9g, 大蜜丸一次1丸, 一日1~2次。	(1) 散:1回2~3g、1日1~3回 (2) 湯	粉末を蜜丸にし、1日1~2回9gずつ湯で服用する。約1/100量を煎剤にしてもよい。
効能・主治	润肠通便。 用于肠热津亏所致的便秘, 症见大便干结难下、腹部胀满不舒; 习惯性便秘见上述证候者。	体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なもの次の諸症: 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症。	潤腸通便・泄熱行気。 腸胃燥熱・脾約便秘。便秘・便が硬く兔糞状・頻尿・口唇の乾燥・舌質が紅・舌苔が黄で乾燥・脈が細やや数など。
注意			
掲載頁	1093	217	80
その他		原典: 傷寒論	別名: 麻仁丸・脾約麻仁丸・脾約丸

No. 34 竜胆瀉肝湯

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	竜胆瀉肝丸	竜胆瀉肝湯	竜胆瀉肝湯
処方	竜胆 120g	竜胆 1~1.5	竜胆草 6g
	柴胡 120g		柴胡 6g
	黄芩 60g	黄芩 3	黄芩 9g
	梔子 (炒) 60g	山梔子 1~1.5	山梔子 9g
	澤瀉 120g	沢瀉 3	沢瀉 12g
	木通 60g	木通 5	木通 9g
	Ⓢ塩車前子 60g	車前子 3	車前子 9g
	Ⓢ酒当帰 60g	当帰 5	当帰 3g
	地黄 120g	地黄 5	Ⓢ生地黄 9g
	Ⓢ炙甘草 60g	甘草 1~1.5	Ⓢ生甘草 6g
製法	以上十味、粉碎成細粉、過篩、混勻、用水泛丸、乾燥、即得。		
用法	口服。一次3~6g、一日2次。	湯	水煎服。丸剤にして1日2回6~9gずつ服用してもよい。
効能・主治	清肝胆、利湿熱。 用于肝胆湿熱、頭暈目赤、耳鳴耳聾、耳腫疼痛、脇痛口苦、尿赤澀痛、湿熱帶下。	体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症：排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ(おりもの)、頻尿	清瀉肝胆実火・清泄下焦湿熱。 (1) 肝胆実火 いらいら・怒りっぽい・はげしい持続性の頭痛・めまい感・目の充血・眼痛・耳鳴・耳痛・突発性難聴・口が苦い・胸脇痛・舌の尖辺が紅・舌苔が黄・脈が弦数で有力など。 (2) 下焦湿熱 排尿痛・排尿困難・尿の混濁・残尿感・陰部の搔痒・腫脹・発汗・悪臭のある黄色帯下、インポテンツなど。舌苔は黄膩・脈は滑。
注意	孕妇慎用。		
掲載頁	636	224	141
その他		原典：蘭室秘蔵 出典：薛氏十六種	

No. 35 六味丸(六味地黄丸)

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剤名	六味地黄丸	六味丸(六味地黄丸)	六味地黄丸
処方	熟地黄 160g	地黄 5~6/4~8	熟地黄 24g
	酒萸肉 80g	山茱萸 3/3~4	山茱萸 12g
	牡丹皮 60g	牡丹皮 3/3	牡丹皮 9g
	山药 80g	山薬 3/3~4	山薬 12g
	茯苓 60g	茯苓 3/3	茯苓 9g
	泽泻 60g	沢瀉 3/3	沢瀉 9g
		左側の数字は湯/右側は散	
製法	以上六味、粉碎成細粉、過篩、混勻。每100g粉末加煉蜜35~50g与适量的水、制丸、干燥、制成水蜜丸;或加煉蜜80~110g制成小蜜丸或大蜜丸、即得。		
用法	口服。水蜜丸一次6g, 小蜜丸一次9g, 大蜜丸一次1丸, 一日2次。	(1) 散:1回2g, 1日3回 (2) 湯	粉末を蜜丸にし、1日3回3~9gずつ空腹時に湯で服用する。水煎服用してもよい。
効能・主治	滋陰補腎。 用于腎陰亏损, 头晕耳鳴, 腰膝酸軟, 骨蒸潮熱, 盜汗遺精, 消渴。	体力中等度以下で、疲れやすく尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渴があるものの次の諸症:排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、かゆみ、夜尿症、しびれ。	滋陰補腎・瀉火。 腎陰虚・火旺。腰や膝がだるく無力・頭のふらつき・めまい感・耳鳴・聴力減退・盜汗・遺精・消渴・身体の熱感・手のひら足のうらのほてり・歯の動揺・踵部痛・尿の淋瀝あるいは失禁・舌質が紅絳・少苔・脈が細数など、あるいは小児の発音不良。
注意			
掲載頁	597	229	245
その他		原典:小児直訣	

(附) No. 36 五虎湯

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	五虎散	五虎湯	五虎湯
処方	当归 350g		
	红花 350g		
	防风 350g		
	制天南星 350g		
	白芷 240g		
		麻黄 4	麻黄 6g
		杏仁 4	杏仁 9g
		甘草 2	炙甘草 6g
		石膏 10	石膏 18g
		桑白皮 1~3	桑白皮 6g
		麻杏甘石湯の処方(麻黄, 杏仁, 石膏, 炙甘草)に桑白皮。	
製法	以上五味, 粉碎成細粉, 过篩, 混勻, 即得。		
用法	温黄酒或温开水送服, 一次 6g, 一日 2 次。	湯	水煎服。
効能・主治	活血散瘀, 消肿止痛。 用于跌打损伤, 瘀血肿痛。	体力中等度以上で, せきが強く くでるものの次の諸症: せき、気管支ぜんそく、気管 支炎、小児ぜんそく、感冒、痔 の痛み。	清肺壯熱・止咳平喘。 肺熱の喘咳。
注意	孕妇慎用。		
掲載頁	533	78	44
その他		原典: 万病回春	

## (附) No. 37 柴胡疎肝湯

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	柴胡舒肝丸	柴胡疎肝湯	柴胡疎肝散
処方	茯苓 100g		
	麩炒枳壳 50g	枳実 2-3	枳殼 4.5g
	豆蔻 40g		
	酒白芍 50g	芍薬 3-4	白芍 4.5g
	甘草 50g	甘草 2-3	炙甘草 1.5g
	醋香附 75g	香附子 3-4	香附子 4.5g
	陈皮 50g		陳皮 6g
	桔梗 50g		
	姜厚朴 50g		
	炒山楂 50g		
	防风 50g		
	六神曲(炒) 50g		
	柴胡 75g	柴胡 4-6	柴胡 6g
	黄芩 50g		
	薄荷 50g		
	紫苏梗 75g		
	木香 25g		
	炒槟榔 75g		
	醋三棱 50g		
	酒大黄 50g		
	青皮(炒) 50g	青皮 2	
	当归 50g		
	姜半夏 75g		
	乌药 50g		
	醋莪术 50g		
		川芎 3	川芎 4.5g
製法	以上二十五味, 混合, 粉碎成细粉, 过筛, 混匀。每 100g 粉末加炼蜜 180~190g 制成大蜜丸, 即得。		
用法	口服, 一次 1 丸, 一日 2 次。	湯	水煎服。
効能・主治	舒肝理气, 消胀止痛。 用于肝气不舒, 胸胁痞闷, 食滞不清, 呕吐酸水。	体力中等度で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに頭痛や肩背がこわばるものの次の諸症: 腹痛, 側胸部痛, 神経痛	疏肝行気・和血止痛。 肝気鬱結・気血瘀滞による胸脇痛・往来寒熱など。 肝気が鬱結し疏泄が停滞して気血が渋滞したために、胸脇痛・寒熱往来などをきたしている。四逆散の枳実に加えて疏解行気・和血止痛の公節・陳皮・枳殼・川芎を加え、緩和の炙甘草の量を減じ、肝気の疏泄と行気止痛の効能をつよめている。
注意			
掲載頁	993	9	110
その他		追補 原典: 医学統旨	出典: 景岳全書

## (附) No. 38 附子理中湯

	中国薬典	一般用漢方処方	中医臨床
方剂名	桂附理中丸	附子理中湯	附子理中丸
処方	肉桂 30g		
	附片 30g	加工ブシ 0.5-1	炮附子
	党参 90g		
		人参 3	人参
	白朮 (炒) 90g	白朮 3 (蒼朮も可)	白朮
	炮姜 90g	乾姜 2-3	炮姜
	炙甘草 90g	甘草 2-3	炙甘草
製法	以上六味, 粉碎成細粉, 過篩, 混勻。 每100g粉末加煉蜜40~50g和适量的水制丸, 干燥, 制成水蜜丸; 或每100g粉末加煉蜜120~140g制成小蜜丸或大蜜丸, 即得。		
用法	用姜湯或温开水送服, 一次1丸, 一日2次。	湯	等量の細末を蜜丸にし、1回3gを水煎して食前に温服する。
効能・主治	补肾助阳, 温中健脾。 用于肾阳衰弱, 脾胃虚寒, 脘腹冷痛, 呕吐泄泻, 四肢厥冷。	体力虚弱で, 手足の冷えが強く, 疲れやすいものの次の諸症: 胃腸虚弱, 下痢, 嘔吐, 胃痛, 腹痛, 急・慢性胃炎	温陽散寒・益気健脾。 脾胃虚寒・感受風冷による胃痛・下痢・嘔吐・腓腹筋けいれんなどの症候。
注意	孕妇慎用。		
掲載頁	982	26	195
その他		追補 原典: 太平惠民和剂局方	別名: 附子人参湯 出典: 閻氏小児方論



## (附録1)

## 『第16改正日本薬局方』収載生薬等

No.	生薬等名	No.	生薬等名
101	チクセツニンジン	○	151 ユウタン
102	チモ	○	152 ヨクイニン
103	チョウジ	○	153 リュウガンニク
104	チョウトウコウ	○	154 リュウコツ
105	チョレイ	○	155 リュウタン
106	チンピ	○	156 リョウキョウ
107	テンマ	○	157 レンギョウ
108	テンモンドウ	○	158 レンニク
109	トウガシ	○	159 ロジン
110	トウガラシ	○	160 ロートコン
111	トウキ	○	161 ローヤルゼリー
112	トウニン	○	1 アセンヤク末
113	トウヒ		2 アヘン・トコン散
114	ドクカツ	○	3 アマチャ末
115	トコン		4 アラビアゴム末
116	トチュウ	○	5 アロエ末
117	トラガント		6 アンモニア・ウイキョウ精
118	ニガキ	○	7 ウイキョウ末
119	ニクズク	○	8 ウイキョウ油
120	ニンジン	○	9 ウコン末
121	ニンドウ	○	10 ウワウルシ流エキス
122	パイモ	○	11 エイジツ末
123	パクモンドウ	○	12 エンゴサク末
124	ハチミツ	○	13 オウゴン末
125	ハッカ	○	14 オウバク末
126	ハマボウフウ	○	15 パップ用複方オウバク散
127	ハンゲ	○	16 オウバク・タンナルビン・ビスマス散
128	ビャクゴウ	○	17 オウレン末
129	ビャクシ	○	18 黄連解毒湯エキス
130	ビャクジュツ	○	19 オンジ末
131	ビワヨウ	○	20 葛根湯エキス
132	ビンロウジ	○	21 カノコソウ末
133	ブクリョウ	○	22 加味逍遥散エキス
134	ブシ	○	23 カンゾウ末
135	ベラドンナコン		24 カンゾウエキス
136	ヘンズ	○	25 カンゾウ粗エキス
137	ボウイ	○	26 カンテン末
138	ボウコン	○	27 キキョウ末
139	ボウフウ	○	28 キキョウ流エキス
140	ボクソク		29 キョウニン水
141	ボタンピ	○	30 クジン末
142	ホミカ	○	31 苦味チンキ
143	ボレイ	○	32 桂枝茯苓丸エキス
144	マオウ	○	33 ケイヒ末
145	マクリ		34 ケイヒ油
146	マシニン	○	35 ゲンチアナ末
147	モクツウ	○	36 ゲンチアナ・重曹散
148	モッコウ	○	37 ゲンノショウコ末
149	ヤクチ	○	38 コウブシ末
150	ヤクモソウ	○	39 コウボク末

## (附録1)

## 『第16改正日本薬局方』収載生薬等

No.	生薬等名	No.	生薬等名
40	牛車腎気丸エキス	78	トウガラシチンキ
41	コロンボ末	79	トウガラシ・アリチル酸精
42	コンズランゴ流エキス	80	トウキ末
43	柴胡桂枝湯エキス	81	トウニン末
44	柴朴湯エキス	82	トウヒシロップ
45	柴苓湯エキス	83	トウヒチンキ
46	サンキライ末	84	トコン末
47	サンシシ末	85	トコンシロップ
48	サンショウ末	86	トラガント末
49	サンヤク末	87	ニガキ末
50	シャクヤク末	88	ニンジン末
51	芍薬甘草湯エキス	89	麦門冬湯エキス
52	十全大補湯エキス	90	八味地黄丸エキス
53	苦味重曹水	91	ハッカ水
54	シュクシャ末	92	ハッカ油
55	ショウキョウ末	93	半夏厚朴湯
56	小柴胡湯エキス	94	ビャクジュツ末
57	小青竜湯エキス	95	ブクリョウ末
58	真武湯エキス	96	ブシ末
59	焼セッコウ	97	ベラドンナエキス
60	セネガ末	98	ボタンピ末
61	セネガシロップ	99	補中益気湯エキス
62	センキュウ末	100	ホミカエキス
63	センナ末	101	ホミカエキス散
64	センブリ末	102	ホミカチンキ
65	センブリ・重曹散	103	ボレイ末
66	ソウジュツ末	104	ヨクイニン末
67	ダイオウ末	105	六君子湯エキス
68	複方ダイオウ・センナ散	106	リュウコツ末
69	大黄甘草湯エキス	107	リュウタン末
70	無コウイ大建中湯	108	苓桂朮甘湯エキス
71	タクシャ末	109	ロートエキス
72	チクセツニンジン末	110	ロートエキス散
73	チョウジ末	111	ロートエキス・アネスタミン散
74	チョウジ油	112	ロートエキス・カーボン散
75	釣藤散エキス	113	複方ロートエキス・ジアスターゼ散
76	チヨレイ末	114	ロートエキス・タンニン坐剤
77	トウガラシ末	115	ロートエキス・パパペリン・アネスタミン散

生薬名

アロエ

芦荟

Luhui

別名 ロカイ

慣用名 老芦荟

英語名 Aloe

ラテン名 Aloe

学名 Aloe ferox Miller 又はこれと Aloe africana Miller 又は Aloe spicata Baker との雑種

Aloe

库拉索芦荟 Aloe barbadensis Miller

植物科名 Liliaceae / ユリ科

部位 葉から得た液汁を乾燥したもの

百合科

叶的汁液浓缩干燥物

定量 本品は定量するとき、換算した生薬の乾燥物に対し、バルバロイン4.0%以上を含む。

本品按干燥品计算, 含芦荟苷 [Barbaloin(Aloin)] (C<sub>21</sub>H<sub>22</sub>O<sub>9</sub>) 不得少于 18.0%。

乾燥減量 12.0%以下。

灰分 2.0%以下。

酸不溶性灰分

エキス含量 水製エキス 40.0%以上。

精油含量

性味与归经

苦，寒。归肝、胃、大肠经。

功能与主治

泻下通便, 清肝泻火, 殺虫疗疳。用于热结便秘, 惊痫抽搐, 小儿疳积; 外治癬疮。

用法与用量

2~5g, 宜人丸散。外用适量, 研末敷患处。

注意

孕妇慎用。

掲載頁備考

1447

151

<p>生薬名 <b>アンソッコウ</b> 安息香</p> <p>別名</p>	<p>安息香 Anxixiang</p> <p>慣用名</p>				
<p>英語名 Benzoin</p>					
<p>ラテン名 Benzoinum</p> <p>学名 <i>Styrax benzoin</i> Dryander 又はその他同属植物</p>	<p>Benzoinum</p> <p>白花树 <i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib ex Hart.</p>				
<p>植物科名 <i>Styracaceae</i> / エゴノキ科</p> <p>部位 樹脂</p>	<p>安息香科</p> <p>干燥树脂</p>				
<p>定量</p>	<p>本品含总香脂酸以苯甲酸 [benzoic acid] (C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>) 计, 不得少于27.0%。</p>				
<p>乾燥減量</p> <p>灰分 2.0%以下.</p> <p>酸不溶性灰分 1.0%以下.</p> <p>エキス含量</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="616 1194 1054 1316"> <p>辛、苦、平。归心、脾经。</p> </td> <td data-bbox="1054 1194 1478 1316"> <p>性味与归经</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 1316 1054 1537"> <p>开窍清神, 行气活血, 止痛。用于中风痰厥, 气郁暴厥, 中恶昏迷, 心腹疼痛, 产后血晕, 小儿惊风。</p> </td> <td data-bbox="1054 1316 1478 1537"> <p>功能与主治</p> </td> </tr> </table>	<p>辛、苦、平。归心、脾经。</p>	<p>性味与归经</p>	<p>开窍清神, 行气活血, 止痛。用于中风痰厥, 气郁暴厥, 中恶昏迷, 心腹疼痛, 产后血晕, 小儿惊风。</p>	<p>功能与主治</p>
<p>辛、苦、平。归心、脾经。</p>	<p>性味与归经</p>				
<p>开窍清神, 行气活血, 止痛。用于中风痰厥, 气郁暴厥, 中恶昏迷, 心腹疼痛, 产后血晕, 小儿惊风。</p>	<p>功能与主治</p>				
<p>精油含量</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="616 1537 1054 1647"> <p>0.6~1.5g, 多入丸散用。</p> </td> <td data-bbox="1054 1537 1478 1647"> <p>用法与用量</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 1647 1054 1780"></td> <td data-bbox="1054 1647 1478 1780"> <p>注意</p> </td> </tr> </table>	<p>0.6~1.5g, 多入丸散用。</p>	<p>用法与用量</p>		<p>注意</p>
<p>0.6~1.5g, 多入丸散用。</p>	<p>用法与用量</p>				
	<p>注意</p>				
<p>掲載頁 1449</p> <p>備考</p>	<p>138</p>				