

紅参				局方
日本	Ginseng Radix Rubra	ウコギ科 Araliaceae	<i>Panax ginseng</i> C. A. Meyer ( <i>Panax schinseng</i> Nees) オタネニンジン ギンセノシドRg1 (C <sub>42</sub> H <sub>72</sub> O <sub>14</sub> : 801.01) 0.10%以上, ギンセノシドRb1 (C <sub>54</sub> H <sub>92</sub> O <sub>23</sub> : 1109.29) 0.20%以上	根(蒸後に乾燥)
韓国	Ginseng Radix Rubra	Araliaceae	<i>Panax ginseng</i> C. A. Meyer ギンセノシドRg1 (C <sub>42</sub> H <sub>72</sub> O <sub>14</sub> : 801.01) 0.10%以上, ギンセノシドRb1 (C <sub>54</sub> H <sub>92</sub> O <sub>23</sub> : 1109.29) 0.20%以上	根(蒸後に乾燥)
中国	Ginseng Radix et Rhizoma Rubra	Araliaceae	<i>Panax ginseng</i> C. A. Meyer ギンセノシドRg1(C <sub>42</sub> H <sub>72</sub> O <sub>14</sub> )及びギンセノシドRe(C <sub>48</sub> H <sub>82</sub> O <sub>18</sub> )を合わせて0.25%以上, ギンセノシドRb1 (C <sub>54</sub> H <sub>92</sub> O <sub>23</sub> ) 0.20%以上	根, 根茎(蒸後に乾燥)

紅参(こうじん) Red Ginseng

帰経: 肺・脾・心, 性: 微温, 味: 甘・微苦, 神農本草経: 上品

薬能: 大補元氣, 復脈固脱, 益氣摂血. 体虚欲脱, 肢冷脈微, 氣不摂血, 崩漏下血, 心力衰, 心原性ショックに用いる.

香附子				局方
日本	Cyperi Rhizoma	カヤツリグサ科 Cyperaceae	<i>Cyperus rotundus</i> Linné ハマスゲ	根茎
韓国	Cyperi Rhizoma	Cyperaceae	<i>Cyperus rotundus</i> Linné	根茎
中国 (香附)	Cyperi Rhizoma	Cyperaceae	<i>Cyperus rotundus</i> Linné	根茎

香附子(こうぶし) Nutgrass Tuber

帰経: 肝・三焦, 性: 平, 味: 辛・微苦

薬能: 行氣解郁, 調經止痛. 肝郁氣滯, 胸脇, 腹(胃)脹痛, 消化不良, 胸胃痞悶, 寒疝腹痛, 乳房脹痛, 月經不調, 經閉痛經に応用する.

香附子含有方剤: 香蘇散, 香砂六君子湯, 滋陰至宝湯, 柴胡疎肝湯, 女神散, 川芎茶調散, 竹筴温胆湯, 二朮湯, 分消湯, 実脾飲, 芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減, 折衝飲

粳米				局方
日本	Oryzae Fructus	イネ科 Gramineae	<i>Oryza sativa</i> Linné イネ	穎果
韓国	Oryzae Semen	Gramineae	<i>Oryza sativa</i> Linné	種子 (剥外果皮)
中国 (稻芽)	Oryzae Fructus Germinatus	Gramineae	<i>Oryza sativa</i> Linné	種子

粳米(こうべい) Brown Rice

帰経: 脾・胃, 性: 平, 味: 甘

薬能: 補中益氣, 健脾和胃, 除煩渴, 止瀉痢

粳米含有方剤: 解急蜀椒湯, 竹葉石膏湯, 桃花湯, 白虎加桂枝湯, 白虎加入参湯, 白虎湯, 麦門冬湯, 附子粳米湯

厚朴				局方
日本	Magnoliae Cortex	モクレン科 Magnoliaceae	<i>Magnolia obovata</i> Thunberg ( <i>Magnolia hypoleuca</i> Siebold et Zuccarini) ホオノキ <i>Magnolia officinalis</i> Rehder et Wilson <i>Magnolia officinalis</i> Rehder et Wilson var. <i>biloba</i> Rehder et Wilson マグノロール 0.8%以上	樹皮
韓国	Magnoliae Cortex	Magnoliaceae	<i>Magnolia obovata</i> Thunberg <i>Magnolia officinalis</i> Rehder et Wilson <i>Magnolia officinalis</i> Rehder et Wilson var. <i>biloba</i> Rehder et Wilson マグノロール(C <sub>18</sub> H <sub>18</sub> O <sub>2</sub> : 266.33) 0.8%以上	幹皮
中国	Magnoliae officinalis Cortex	Magnoliaceae	<i>Magnolia officinalis</i> Rehder et Wilson <i>Magnolia officinalis</i> Rehder et Wilson var. <i>biloba</i> Rehder et Wilson マグノロール(C <sub>18</sub> H <sub>18</sub> O <sub>2</sub> )及びホーノキオール (C <sub>18</sub> H <sub>18</sub> O <sub>2</sub> )を合わせて1.0%以上	幹皮・根皮・枝皮

厚朴(こうぼく) Magnolia Bark, Officinal Magnolia Bark

帰経: 脾・胃・肺・大腸, 性: 温, 味: 苦・辛, 神農本草経: 中品

薬能: 燥湿消痰, 下気除満. 湿滯傷中, 胃痞吐瀉, 食積氣滯, 腹脹便秘, 痰飲喘咳に用いる.

薬徴: 胸腹脹満を主治する也. 傍ら腹痛を治す.

厚朴含有方剤: 胃苓湯, 九味檳榔湯, 桂枝加厚朴杏子湯, 五積散, 厚朴三物湯, 厚朴七物湯, 厚朴生姜半夏甘草人参湯, 柴朴湯, 潤腸湯, 小承氣湯, 神祕湯, 千金内托散, 大承氣湯, 通導散, 当帰湯, 半夏厚朴湯, 分消湯, 実脾飲, 平胃散, 麻子仁丸, 茯苓飲合半夏厚朴湯, 藿香正氣散

藁本

局方外

日本	Ligustici Rhizoma	セリ科 Umbelliferae	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. コウホン	根茎・根
韓国	Angelicae Tenuissimae Radix	Umbelliferae	<i>Ligusticum tenuissimum</i> Kitagawa <i>Ligusticum sinense</i> Oliv. <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitagawa	根茎・根
中国	Ligustici Rhizoma et Radix	Umbelliferae	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitagawa フェルラ酸(C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub> ) 0.050%以上	根茎・根

藁本(こうほん) Jehol ligusticum Rhizome  
 帰経:膀胱, 性:温, 味:辛, 神農本草経:中品  
 薬能:祛風散寒, 止痛  
 藁本含有方剂:黄連消毒湯

牛膝

局方

日本	Achyranthis Radix	ヒユ科 Amaranthaceae	<i>Achyranthes fauriei</i> Leveillé et Vaniot ヒナタイノコズチ <i>Achyranthes bidentata</i> Blume	根
韓国	Achyranthis Radix	Amaranthaceae	<i>Achyranthes japonica</i> Nakai <i>Achyranthes bidentata</i> Blume	根
中国 (川牛膝)	Cyathulae Radix	Amaranthaceae	<i>Cyathula officinalis</i> Kuan シアステロン(C <sub>29</sub> H <sub>44</sub> O <sub>8</sub> ) 0.030%以上	根

牛膝(ごしつ) Achyranthes Root  
 帰経:肝・腎, 性:平, 味:懐牛膝;苦・酸 川牛膝;甘・微苦, 神農本草経:上品  
 薬能:補肝腎, 強筋骨, 逐瘀通經, 引血下行. 腰膝酸痛, 筋骨無力, 経閉癥瘕, 肝陽眩暈に用いる.  
 牛膝含有方剂:牛車腎気丸, 疎経活血湯, 大防風湯, 痿證方, 補陰湯, 芎藭調血飲第一加減

呉茱萸

局方

日本	Euodiae Fructus	ミカン科 Rutaceae	<i>Euodia rutaecarpa</i> Hooker filius et Thomson ( <i>Evodia rutaecarpa</i> Bentham) ゴシユユ <i>Euodia officinalis</i> Dode ( <i>Evodia officinalis</i> Dode) <i>Euodia bodinieri</i> Dode ( <i>Evodia bodinieri</i> Dode)	果実
韓国	Evodiae Fructus	Rutaceae	<i>Evodia rutaecarpa</i> Bentham <i>Evodia rutaecarpa</i> Bentham var. <i>officinalis</i> Huang <i>Evodia rutaecarpa</i> Bentham var. <i>bodinieri</i> Huang ジアミン(C <sub>19</sub> H <sub>21</sub> N <sub>3</sub> O : 307.39)及びビルテカルピン(C <sub>18</sub> H <sub>13</sub> N <sub>3</sub> O : 287.32)を合わせて0.1%以上	未熟果実
中国	Evodiae Fructus	Rutaceae	<i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Bentham <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Bentham var. <i>officinalis</i> (Dode) Huang <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Bentham var. <i>bodinieri</i> (Dode) Huang エボジアミン(C <sub>19</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O)及びビルテカルピン(C <sub>18</sub> H <sub>13</sub> N <sub>3</sub> O)を合わせて0.15%以上, リモニン(C <sub>26</sub> H <sub>30</sub> O <sub>8</sub> ) 1.0%以上	未熟果実

呉茱萸(ごしゅゆ) Evodia Fruit  
 帰経:肝・胃・脾・腎, 性:大熱, 味:辛・苦, 神農本草経:中品  
 薬能:散寒止痛, 降逆止嘔, 助陽止瀉. 厥陰頭痛, 寒疝腹痛, 寒湿脚氣, 経行腹痛, 腹(胃)脹痛, 嘔吐吞酸, 五更泄瀉に用いる.  
 薬徴:嘔して胸満するを主治する也。  
 呉茱萸含有方剂:延年半夏湯, 温経湯, 呉茱萸湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 変製心気飲

牛蒡子

局方

日本	Arctii Fructus	キク科 Compositae	<i>Arctium lappa</i> Linné ゴボウ	果実
韓国	Arctii Fructus	Compositae	<i>Arctium lappa</i> Linné	成熟果実
中国	Arctii Semen	Compositae	<i>Arctium lappa</i> Linné アルクチン(C <sub>27</sub> H <sub>34</sub> O <sub>11</sub> ) 5.0%以上	成熟果実

牛蒡子(ごぼうし) Great Burdock Achene  
 帰経:肺・胃, 性:寒, 味:辛・苦  
 薬能:疏散風熱, 宣肺透疹, 解毒利咽. 風熱感冒, 咳嗽痰多, 麻疹, 風疹, 咽喉腫痛, 流行性耳下腺炎, 丹毒, 癰腫瘡毒に用いる.  
 牛蒡子含有方剂:消風散

胡麻

局方

日本	Sesami Semen	ゴマ科 Pedaliaceae	<i>Sesamum indicum</i> Linné ゴマ	種子
韓国	Sesami Semen	Pedaliaceae	<i>Sesamum indicum</i> Linné	種子
中国 (黑芝麻)	Sesami Semen Nigrum	Pedaliaceae	<i>Sesamum indicum</i> Linné	成熟種子

胡麻(ごま) Sesame  
 帰経:肺・脾・肝・腎, 性:平, 味:甘, 神農本草経:上品  
 薬能:補肝腎, 益精血, 潤腸燥. 頭暈眼花, 耳鳴耳聾, 鬚髮早白, 病後脱髮, 腸燥便秘に用いる.  
 胡麻含有方剂:消風散

五味子

局方

日本	Schisandrae Fructus	モクレン科 Magnoliaceae	<i>Schisandra chinensis</i> Baillon チョウセンゴミシ	果実
韓国	Schisandrae Fructus	Schisandraceae	<i>Schisandra chinensis</i> Baillon シザンドリン(C <sub>24</sub> H <sub>32</sub> O <sub>7</sub> : 432.51), ゴミシンA(C <sub>23</sub> H <sub>28</sub> O <sub>7</sub> : 416.46)及びゴ ミシンN(C <sub>23</sub> H <sub>28</sub> O <sub>6</sub> : 400.47)を合わせて0.7%以上	成熟果実
中国	Schisandrae Fructus Chinensis	Magnoliaceae	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baillon シザンドリン(C <sub>24</sub> H <sub>32</sub> O <sub>7</sub> ) 0.40%以上	成熟果実

五味子(ごみし) Schisandra Fruit

帰経:肺・腎, 性:温, 味:酸, 神農本草経:上品

薬能:収斂固澁, 益気生津, 補腎寧心. 久嗽虚喘, 梦遺滑精, 遺尿尿頻, 久瀉不止, 自汗, 盗汗, 津傷口渴, 短気脉虚, 内熱消渴, 心悸失眠に応用する.

薬徴:咳して, 冒する者を主治す.

五味子含有方剂:射干麻黄湯, 小青竜湯, 小青竜湯加石膏, 人参養栄湯, 清暑益気湯, 清熱補気湯, 清熱補血湯, 清肺湯, 苓甘姜味辛夏仁湯, 苓桂味甘湯, 生脈散

柴胡

局方

日本	Bupleuri Radix	セリ科 Umbelliferae	<i>Bupleurum falcatum</i> Linné ミシマサイコ 総サポニン(サイコサポニンa, サイコサポニンd) 0.35%以上	根
韓国 (柴胡)	Bupleuri Radix	Umbelliferae	<i>Bupleurum falcatum</i> Linné 変種 サイコサポニンa(C <sub>42</sub> H <sub>68</sub> O <sub>13</sub> : 780.97)として0.3%以上	根
(銀柴胡)	Asiasari Radix	Caryophyllaceae	<i>Stellaria dichotoma</i> Linné var. <i>lanceolata</i> Bge <i>Gypsophila oldhamiana</i> Mique	根
中国	Bupleuri Radix	Umbelliferae	<i>Bupleurum chinense</i> DC <i>Bupleurum scorzoniferifolium</i> Willd. サイコサポニンa(C <sub>42</sub> H <sub>68</sub> O <sub>13</sub> )及びサイコサポニンd(C <sub>42</sub> H <sub>68</sub> O <sub>13</sub> )を合わせて0.30%以上	根

柴胡(さいこ) Bupleurum Root

帰経:心包・肝・三焦・胆, 性:微寒, 味:苦, 神農本草経:上品

薬能:疏散退熱, 舒肝, 升陽, 感冒発熱, 寒熱往来, マリア, 胸脇脹痛, 月経不調, 子宮脱垂, 脱肛に用いる.

薬徴:胸脇苦満を主治する也. 傍ら往来感熱, 腹中の痛, 脇下の痞こうを治す.

柴胡含有方剂:延年半夏湯, 乙字湯, 加味帰脾湯, 加味逍遙散, 荊芥連翹湯, 四逆散, 香砂六君子湯, 滋陰至宝湯, 柴陷湯, 柴胡加竜骨牡蛎湯, 柴胡加芒硝湯, 柴胡桂枝乾姜湯, 柴胡桂枝湯, 柴胡清肝湯, 柴胡疎肝湯, 柴朴湯, 柴苓湯, 柴芍六君子湯, 十味敗毒湯, 小柴胡湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 神秘湯, 清熱補血湯, 大柴胡湯, 竹茹温胆湯, 補中益気湯, 抑肝散, 抑肝散加陳皮半夏

細辛

局方

日本	Asiasari Radix	ウマノズクサ科 Aristolochiaceae	<i>Asiasarum sieboldii</i> F. Maekawa ウスバサイシン <i>Asiasarum heterotropoides</i> F. Maekawa var. <i>mandshuricum</i> F. Maekawa ケイリンサイシン	根・根茎
韓国	Asiasari Radix et Rhizoma	Aristolochiaceae	<i>Asiasarum heterotropoides</i> F. Maekawa var. <i>mandshuricum</i> F. Maekawa	根・根茎
中国	Asari Radix et Rhizoma	Aristolochiaceae	<i>Asiasarum heterotropoides</i> F. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag. <i>Asiasarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai <i>Asiasarum sieboldii</i> Miq. アリストロキア酸(C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> O <sub>3</sub> N) 0.001%以下, アサリン(C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> O <sub>3</sub> )	根・根茎

細辛(さいしん) Asiasarum Root, Manchurian Wildginger

帰経:辛・肺・肝・腎, 性:温, 味:辛, 神農本草経:上品

薬能:去風散寒, 通竅止痛, 温肺化飲, 風寒感冒, 頭痛, 牙痛, 鼻塞鼻淵, 風湿痺痛, 痰飲喘咳に応用する.

薬徴:宿飲, 停水を主治する也. 故に心気心下に在りて咳満し, 或いは上逆し, 或いは胸痛するを治す.

細辛含有方剂:桂姜棗草黄附湯, 射干麻黄湯, 小青竜湯, 小青竜湯加石膏, 大黄附子湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 当帰四逆湯, 麻黄附子細辛湯, 立効散, 苓甘姜味辛夏仁湯, 芍甘黄辛附湯

細茶

日本	Camelliae Folium	ツバキ科 Theaceae	<i>Camellia sinensis</i> O. Kuntze チャ	嫩葉(若葉)
韓国		Theaceae	<i>Camellia sinensis</i> O. Kuntze	嫩葉・嫩芽
中国 (茶葉)		Theaceae	<i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Ktze.	嫩葉・嫩芽

細茶(さいちゃ) Tea Leaf

帰経:心・肺・肝・腎・脾・胃, 性:涼, 味:苦・甘

薬能:清頭目, 除煩渴, 化痰, 消食, 利尿, 解毒

細茶含有方剂:川芎茶調散, 滋腎明目湯, 折衝飲

サフラン

局方

日本	Crocus	アヤメ科 Iridaceae	<i>Crocus sativus</i> Linné サフラン	柱頭
韓国 (蕃紅花)	Crocus	Iridaceae	<i>Crocus sativus</i> Linné	柱頭
中国 (西紅花)	Croci Stigma	Iridaceae	<i>Crocus sativus</i> Linné クロシンI(C <sub>44</sub> H <sub>64</sub> O <sub>24</sub> )及びクロシンII(C <sub>38</sub> H <sub>54</sub> O <sub>19</sub> )を合わせて10.0%以上	柱頭

サフラン(さふらん) Saffron

性:寒, 味:甘

薬能:活血化癥, 涼血解毒, 解郁安神. 経閉癥瘕, 産後瘀阻, 温毒発斑, 憂鬱痞悶, 驚悸発狂に用いる.

山帰来

局方

日本	Smilacis Rhizoma	ユリ科 Liliaceae	<i>Smilax glabra</i> Roxburgh サルトリイバラ	塊茎
韓国 (土茯苓)	Smilacis Rhizoma	Liliaceae	<i>Smilax china</i> Linné <i>Smilax glabra</i> Roxburgh	根
中国 (土茯苓)	Smilacis Glabrae Rhizoma	Liliaceae	<i>Smilax glabra</i> Roxburgh アスチルビン(C <sub>21</sub> H <sub>22</sub> O <sub>11</sub> ) 0.45%以上	根茎

山帰来(さんきらい) Smilax Rhizome

帰経:肝・胃, 性:平, 味:甘・淡

薬能:除湿, 解毒, 通利關節. 湿熱淋濁, 帯下, 腫脹, 瘰癧, 疥癬, 梅毒及水銀中毒による肢体拘攣, 筋骨疼痛に用いる.

山帰来含有方剂:香川解毒散

山楂子 (=山査子)

局方

日本	Crataegi Fructus	バラ科 Rosaceae	<i>Crataegus cuneata</i> Siebold et Zuccarini サンザシ <i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge var. <i>major</i> N. E. Brown オオミサンザシ	偽果
韓国 (山楂)	Crataegi Fructus	Rosaceae	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge 変種	果実
中国 (山楂)	Crataegi Fructus	Rosaceae	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge var. <i>major</i> N.E.Br. <i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge クエン酸(C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub> ) 5.0%以上	成熟果実

山楂子(さんざし) Crataegus Fruit

帰経:脾・胃・肝, 性:微温, 味:酸・甘

薬能:消食健胃, 行気散瘀. 肉食積滞, 胃脹満, 瀉痢腹痛, 瘀血経閉, 産後瘀阻, 心腹刺痛, 疝気疼痛, 高血圧症に用いる.

山楂子含有方剂:啓脾湯

山梔子

局方

日本	Gardeniae Fructus	アカネ科 Rubiaceae	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis クチナシ ゲニポシド 3.0%以上	果実
韓国 (梔子)	Gardeniae Fructus	Rubiaceae	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	成熟果実
中国 (梔子)	Gardeniae Fructus	Rubiaceae	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis ゲニポシド(C <sub>17</sub> H <sub>24</sub> O <sub>10</sub> ) 1.8%以上	成熟果実

山梔子(さんしし) Gardenia Fruit, Cape Jasmine Fruit

帰経:心・肝・肺・腎, 性:寒, 味:苦, 神農本草経:中品

薬能:瀉火除煩, 清熱利尿, 涼血解毒. 熱病心煩, 黄疸尿赤, 血淋渋痛, 血熱吐衄, 目赤腫痛, 火毒瘡瘍に応用する. 挫傷痛に外用する.

薬徴:心煩を主治する也. 傍ら発黄を治す.

山梔子含有方剂:黄連解毒湯, 温清飲, 加味帰脾湯, 加味逍遙散, 荊芥連翹湯, 五淋散, 柴胡清肝湯, 辛夷清肺湯, 清上防風湯, 清肺湯, 防風通聖散, 竜胆瀉肝湯, 梔子乾姜湯, 梔子柏皮湯, 梔子豉湯, 茵陳蒿湯

山茱萸

局方

日本	Corni Fructus	ミズキ科 Cornaceae	<i>Cornus officinalis</i> Siebold et Zuccarini サンシュユ ログニン 0.4%以上	偽果果肉
韓国	Corni Fructus	Cornaceae	<i>Cornus officinalis</i> Siebold et Zuccarini ログニン(C <sub>17</sub> H <sub>26</sub> O <sub>10</sub> : 390.38) 0.5%以上	成熟果肉(除種子)
中国	Corni Fructus	Cornaceae	<i>Cornus officinalis</i> Siebold et Zuccarini ログニン 0.6%以上	成熟果肉

山茱萸(さんしゅゆ) Cornus Fruit, Dogwood Fruit

帰経:肝・腎, 性:微温, 味:酸・渋, 神農本草経:中品

薬能:補益肝腎, 渋精固脱. 眩暈耳鳴, 腰膝酸痛, 陽痿遺精, 遺尿尿頻, 崩漏帯下, 大汗虚脱, 内熱消渴に用いる.

山茱萸含有方剂:牛車腎気丸, 八味地黄丸, 六味丸

山椒				局方
日本	Zanthoxyli Fructus	ミカン科 Rutaceae	<i>Zanthoxylum piperitum</i> De Candolle サンシヨウ	成熟果皮
韓国	Zanthoxyli Fructus	Rutaceae	<i>Zanthoxylum piperitum</i> De Candolle <i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zuccarini <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maximowicz	成熟果皮
中国 (花椒)	Zanthoxyli Pericarpium	Rutaceae	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zuccarini <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maximowicz	成熟果皮

山椒(さんしょう) *Zanthoxylum Peel*  
 帰経:脾・胃・肺・腎, 性:大熱・有毒, 味:辛, 神農本草経:下品  
 薬能:温中, 止痛, 殺虫  
 山椒含有方剂:解急蜀椒湯, 大建中湯, 当帰湯

酸棗仁				局方
日本	Zizyphi Semen	クロウメモドキ科 Rhamnaceae	<i>Zizyphus jujuba</i> Miller var. <i>spinosa</i> Hu ex H. F. Chou サネブトナツメ	種子
韓国	Zizyphi Semen	Rhamnaceae	<i>Zizyphus jujuba</i> Miller var. <i>spinosa</i> Hu ex H. F. Chou	成熟種子
中国	Zizyphi Spinosa Semen	Rhamnaceae	<i>Zizyphus jujuba</i> Miller var. <i>spinosa</i> (Bunge) Hu ex H. F. Chou ジユジュボシドA(C <sub>58</sub> H <sub>94</sub> O <sub>26</sub> ) 0.030%以上, スピノシン(C <sub>28</sub> H <sub>32</sub> O <sub>15</sub> ) 0.080%	成熟種子

酸棗仁(さんそうにん) *Zizyphus Seed*  
 帰経:心・脾・肝・胆, 性:平, 味:甘・酸, 神農本草経:上品  
 薬能:補肝, 寧心, 斂汗, 生津. 虚煩不眠, 驚悸多夢, 体虚多汗, 津傷口渴に用いる.  
 薬徴:胸膈煩躁し, 眠ること能わざるを主治する也.  
 酸棗仁含有方剂:加味温胆湯, 加味帰脾湯, 帰脾湯, 酸棗仁湯

山薬				局方
日本	Dioscoreae Rhizoma	ヤマノイモ科 Dioscoreaceae	<i>Dioscorea japonica</i> Thunberg ヤマノイモ <i>Dioscorea batatas</i> Decaisne ナガイモ	根茎(除周皮・担根体)
韓国	Dioscoreae Rhizoma	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea batatas</i> Decaisne <i>Dioscorea japonica</i> Thunberg	根茎
中国	Dioscoreae Rhizoma	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea opposita</i> Thunberg	根茎

山薬(さんやく) (=薯蕷) *Dioscorea Rhizome, Common Yam Rhizome*  
 帰経:脾・肺, 性:微温, 味:甘, 神農本草経:上品  
 薬能:補脾養胃, 生津益肺, 補腎澁精. 脾虚食少, 久瀉不止, 肺虚喘咳, 腎虚遺精, 帶下, 尿频, 虚熱消渴に用いる.  
 山薬含有方剂:牛車腎気丸, 啓脾湯, 参苓白朮散, 八味地黄丸, 六味丸

地黄				局方
日本	Rehmanniae Radix	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae	<i>Rehmannia glutinosa</i> Liboschitz var. <i>purpurea</i> Makino アカヤジオウ <i>Rehmannia glutinosa</i> Liboschitz カイケイジオウ	根
韓国 (地黄)	Rehmanniae Radix	Scrophulariaceae	<i>Rehmannia glutinosa</i> Liboschitz ex Steudel	根
(生地黄)	Rehmanniae Radix	Scrophulariaceae	<i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertner) Liboschitz ex Steudel	新鮮根
中国	Rehmanniae Radix	Scrophulariaceae	<i>Rehmannia glutinosa</i> Liboschitz カタルポール(C <sub>15</sub> H <sub>22</sub> O <sub>10</sub> ) 0.20%以上, アクテオシド(C <sub>29</sub> H <sub>36</sub> O <sub>15</sub> ) 0.020%	塊根

地黄(じおう) (=乾地黄) *Rehmannia Root, Chinese Foxglove Root*  
 帰経:心・肝・腎, 性:寒, 味:甘・苦, 神農本草経:上品  
 薬能:清熱涼血, 養陰, 生津. 熱病舌絳煩渴, 陰虚内熱, 骨蒸勞熱, 内熱消渴, 吐血, 衄血, 癍斑癍疹に用いる. (生地黄)  
 薬徴:血証及び水病を主るなり.  
 地黄含有方剂:黄土湯, 加味温胆湯, 牛車腎気丸, 荊芥連翹湯, 五淋散, 三物黄芩湯, 四物湯, 滋陰降火湯, 七物降下湯, 柴胡清肝湯, 十全大補湯, 潤腸湯, 消風散, 人參養榮湯, 疎経活血湯, 大防風湯, 猪苓湯合四物湯, 当帰飲子, 八味地黄丸, 竜胆瀉肝湯, 六味丸, 炙甘草湯, 痿證方, 芎帰調血飲, 芎帰膠艾湯, 補陰湯

紫苑				局方外
日本	Asteris Radix et Rhizoma	キク科 Compositae	<i>Aster tataricus</i> Linné fil. シオン	根・根茎
韓国	Asteris Radix	Compositae	<i>Aster tataricus</i> Linné fil.	根
中国	Asteris Radix et Rhizoma	Compositae	<i>Aster tataricus</i> Linné fil. シオン(C <sub>30</sub> H <sub>50</sub> O) 0.15%以上	根・根茎

紫苑(しおん) *Tatarian Aster Root*  
 帰経:肺, 性:温, 味:辛・苦, 神農本草経:中品  
 薬能:潤肺下気, 消痰止咳. 痰多喘咳, 新久咳嗽, 勞嗽咳血に応用する.  
 紫苑含有方剂:射干麻黄湯

## 地骨皮

局方

日本	Lycii Cortex	ナス科 Solanaceae	<i>Lycium chinense</i> Miller クコ <i>Lycium barbarum</i> Linné	根皮
韓国	Lycii Cortex	Solanaceae	<i>Lycium chinense</i> Miller <i>Lycium barbarum</i> Linné	根皮
中国	Lycii Cortex	Solanaceae	<i>Lycium chinense</i> Miller <i>Lycium barbarum</i> Linné	根皮

地骨皮(じこっぴ) Chinese Wolfberry Root-bark

帰経:肺・腎, 性:寒, 味:甘・淡, 神農本草経:上品

薬能:涼血除蒸, 清肺降火. 陰虛潮熱, 骨蒸盜汗, 肺熱咳嗽, 咯血, 衄血, 内熱消渴に用いる.

地骨皮含有方剂:滋陰至宝湯, 清心蓮子飲

## 紫根

局方

日本	Lithospermi Radix	ムラサキ科 Boraginaceae	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zuccarini ムラサキ	根
韓国	Lithospermi Radix	Boraginaceae	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zuccarini <i>Arnebia euchroma</i> Johnston <i>Arnebia guttata</i> Bunge	根
中国 (紫草)	Arnebiae Radix	Boraginaceae	<i>Arnebia euchroma</i> (Royle) Johnston. <i>Arnebia guttata</i> Bunge ヒドロキシナフトキノン色素であるシコニン(C <sub>16</sub> H <sub>16</sub> O <sub>3</sub> ) 0.80%以上, β, β'-ジメチルアクリルアルカンニン(C <sub>21</sub> H <sub>22</sub> O <sub>6</sub> ) 0.30%以上	根

紫根(しこん) lithospermum Root

帰経:心・肝, 性:寒, 味:甘・鹹, 神農本草経:中品

薬能:涼血解毒, 透疹

紫根含有方剂:紫根牡蛎湯

## 蒺藜子

局方

日本	Tribuli Fructus	ハマビシ科 Zygophyllaceae	<i>Tribulus terrestris</i> Linné ハマビシ	果実
韓国	Tribuli Fructus	Zygophyllaceae	<i>Tribulus terrestris</i> Linné	成熟果実
中国 (蒺藜)	Tribuli Fructus	Zygophyllaceae	<i>Tribulus terrestris</i> Linné	成熟果実

蒺藜子(しつりし) Tribulus Fruit

帰経:肝, 性:微温, 味:辛・苦, 神農本草経:上品

薬能:平肝解郁, 活血去風, 明目, 止痒. 頭痛眩暈, 胸脇脹痛, 乳閉乳癰, 目赤翳障, 風疹搔痒に用いる.

蒺藜子含有方剂:当帰飲子

## 柿蒂

局方外

日本	Kaki Calyx	カキノキ科 Ebenaceae	<i>Diospyros kaki</i> Thunberg カキノキ	花萼
韓国	Kaki Calyx	Ebenaceae	<i>Diospyros kaki</i> Thunberg	果蒂
中国	Kaki Calyx	Ebenaceae	<i>Diospyros kaki</i> Thunberg	宿萼

柿蒂(してい) Prsimmon Calyx

帰経:胃, 性:平, 味:苦

薬能:降逆下気. 吃逆に用いる.

柿蒂含有方剂:柿蒂湯

## 炙甘草

日本	Glycyrrhizae Radix Preparata	マメ科 Leguminosae	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fischer ウラルカンゾウ	根・根茎
韓国	Glycyrrhizae Radix Preparata	Leguminosae	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fischer <i>Glycyrrhiza glabra</i> Linné <i>Glycyrrhiza inflata</i> Batal	根・根茎
中国	Glycyrrhizae Radix et Rhizoma Preparata Cum Melle	Leguminosae	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fischer <i>Glycyrrhiza inflata</i> Batal <i>Glycyrrhiza glabra</i> Linné リクイリチゲニン(C <sub>21</sub> H <sub>22</sub> O <sub>9</sub> ) 0.5%以上, グリチルリチン酸(C <sub>42</sub> H <sub>62</sub> O <sub>16</sub> )	根・根茎

炙甘草(しゃかんぞう) Prepared Licorice Root

帰経:十二経, 性:平, 味:甘

薬能:補脾益気, 清熱解毒, 潤肺止咳

炙甘草含有方剂:炙甘草湯

## 赤小豆

日本	Phaseoli Semen	マメ科 Leguminosae	<i>Phaseolus calcaratus</i> Roxburgh ツルアズキ <i>Phaseolus angularis</i> Wight アカマメ	成熟種子
韓国	Phaseoli Angularis Semen	Leguminosae	<i>Phaseolus angularis</i> Wight † <i>Phaseolus calcaratus</i> Roxburgh	種子
中国	Vignae Semen	Leguminosae	<i>Vigna umbeuata</i> Ohwi et Ohashi <i>Vigna angularis</i> Ohwi et Ohashi	成熟種子

赤小豆(しゃくしょうず) Azuki Bean

帰経:心・小腸, 性:平, 味:甘・酸, 神農本草経:中品

薬能:利水消腫, 解毒排膿. 水腫脹満, 脚気浮腫, 黄疸尿赤, 風湿熱痺, 癰腫瘡毒, 腸癰腹痛に用いる.

赤小豆含有方剤:麻黄連軛赤小豆湯

## 芍薬

局方

日本	Paeoniae Radix	ポタン科 Paeoniaceae	<i>Paeonia lactiflora</i> Pallas シヤクヤク ペオニフロリン(C <sub>23</sub> H <sub>28</sub> O <sub>11</sub> : 480.46) 2.0%以上	根(除外皮)
韓国 (芍薬)	Paeoniae Radix	Paeoniaceae	<i>Paeonia lactiflora</i> Pallas 同属近縁植物 アルビフロリン(C <sub>23</sub> H <sub>28</sub> O <sub>11</sub> : 480.46)及びペオニフロリン(C <sub>23</sub> H <sub>28</sub> O <sub>11</sub> : 480.46)を合わせて2.3%以上	根
(赤芍薬)	Paeoniae Radix Rubra	Paeoniaceae	<i>Paeonia obovata</i> Maximowicz	根
中国 (白芍)	Paeoniae Radix Alba	Paeoniaceae	<i>Paeonia lactiflora</i> Pallas ペオニフロリン(C <sub>23</sub> H <sub>28</sub> O <sub>11</sub> ) 1.6%以上	根
(赤芍)	Paeoniae Radix Rubra	Paeoniaceae	<i>Paeonia lactiflora</i> Pallas <i>Paeonia veitchii</i> Lynch ペオニフロリン(C <sub>23</sub> H <sub>28</sub> O <sub>11</sub> ) 1.8%以上	根

芍薬(しゃくやく) Peony Root

帰経:肝, 性:微寒, 味:酸・苦, 神農本草経:中品

薬能:白芍:平肝止痛, 養血調経, 斂陰止汗. 頭痛眩暈, 脇痛, 腹痛, 四肢攣痛, 血虚萎黄, 月経不順, 自汗, 盗汗に用いる.

薬徴:結実して, 拘攣するを主治する也. 傍ら腹痛, 頭痛, 身体不仁, 疼痛, 腹痛, 咳逆, 下痢, 膿腫を治す.

芍薬含有方剤:胃苓湯, 烏頭桂枝湯, 烏頭湯, 黄連阿膠湯, 黄耆桂枝五物湯, 黄耆建中湯, 黄芩加半夏生姜湯, 黄芩湯, 温経湯, 温清飲, 加味逍遙散, 葛根加朮附湯, 葛根湯, 葛根湯加川芎辛夷, 帰耆建中湯, 桂枝加黄耆湯, 桂枝加葛根湯, 桂枝加桂湯, 桂枝加厚朴杏子湯, 桂枝加附子湯, 桂枝加竜骨牡蠣湯, 桂枝加苓朮附湯, 桂枝加朮附湯, 桂枝加芍薬大黃湯, 桂枝加芍薬湯, 桂枝去桂加茯苓白朮湯, 桂枝湯, 桂枝二越婢一湯, 桂枝麻黄各半湯, 桂枝芍薬知母湯, 桂枝茯苓丸, 桂枝茯苓丸加薏苡仁, 荊芥連翹湯, 五積散, 五淋散, 香砂六君子湯, 四逆散, 四物湯, 滋陰降火湯, 滋陰至宝湯, 七物降下湯, 柴胡桂枝湯, 柴胡清肝湯, 柴胡疎肝湯, 柴芍六君子湯, 十全大補湯, 升麻葛根湯, 小建中湯, 小青竜湯, 小青竜湯加石膏, 小続命湯, 逍遙散, 真武湯, 人蔘養榮湯, 清熱補氣湯, 清熱補血湯, 疎経活血湯, 大柴胡湯, 大防風湯, 猪苓湯合四物湯, 当帰飲子, 当帰建中湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 当帰四逆湯, 当帰湯, 当帰芍薬散, 排膿散, 排膿散及湯, 附子湯, 分心気飲, 防風通聖散, 麻子仁丸, 痿證方, 芍甘黄辛附湯, 芍薬甘草湯, 芍薬甘草附子湯, 栝呂桂枝湯, 芍帰膠艾湯, 芍帰調血飲第一加減, 薏苡仁湯, 補陰湯, 奔豚湯

## 車前子

局方

日本	Plantaginis Semen	オオバコ科 Plantaginaceae	<i>Plantago asiatica</i> Linné オオバコ	種子
韓国	Plantaginis Semen	Plantaginaceae	<i>Plantago asiatica</i> Linné <i>Plantago depressa</i> Willdenow	種子
中国	Plantaginis Semen	Plantaginaceae	<i>Plantago asiatica</i> Linné <i>Plantago depressa</i> Willdenow ゲニボシジン酸(C <sub>16</sub> H <sub>22</sub> O <sub>10</sub> ) 0.50%以上, アクテオシド(C <sub>29</sub> H <sub>36</sub> O <sub>15</sub> ) 0.40%	成熟種子

車前子(しゃぜんし) Plantago Seed (日), Plantain Seed (中)

帰経:肝・腎・小腸・肺, 性:寒, 味:甘, 神農本草経:上品

薬能:清熱利尿, 滲湿通淋, 明目, 去痰. 水腫脹満, 熱淋渋痛, 暑泄瀉, 目赤腫痛, 痰熱咳嗽に用いる.

車前子含有方剤:牛車腎気丸, 五淋散, 清心蓮子飲, 竜胆瀉肝湯

## 重薬 (=十薬)

局方

日本	Houttuyniae Herba	ドクダミ科 Saururaceae	<i>Houttuynia cordata</i> Thunberg ドクダミ	花期地上部
韓国 (魚腥草)	Houttuyniae Herba	Saururaceae	<i>Houttuynia cordata</i> Thunberg	地上部
中国 (魚腥草)	Houttuyniae Herba	Saururaceae	<i>Houttuynia cordata</i> Thunberg	地上部

重薬(じゅうやく) Houttuynia Herb

帰経:肺・腎・膀胱, 性:微寒, 味:辛

薬能:清熱解毒

重薬含有方剤:五物解毒湯

熟地黄

(局方中 地黄)

日本	Radix Rehmanniae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae	<i>Rehmannia glutinosa</i> Liboschitz var. <i>purpurea</i> Makino アカヤジオウ <i>Rehmannia glutinosa</i> Liboschitz カイケイジオウ	根(蒸後乾燥)
韓国	Rehmanniae Radix Preparata	Scrophulariaceae	<i>Rehmannia glutinosa</i> Liboschitz ex Steudel 5-ヒドロキシメチル-2-フルアルデヒド(C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub> : 126.11) 0.1%以上	根を酒蒸
中国	Radix Rehmanniae Preparata	Scrophulariaceae	<i>Rehmannia glutinosa</i> Liboschitz アクトエオシド(C <sub>29</sub> H <sub>36</sub> O <sub>13</sub> ) 0.020%以上	塊根(炮製加工)

熟地黄(じゅくじおう) Prepared Rehmannia Root

帰経:心・肝・腎, 性:微温, 味:甘, 神農本草経:上品

薬能:滋陰補血, 益精填髓, 肝腎陰虚, 腰膝酸軟, 骨蒸潮熱, 盗汗遺精, 内熱消渴, 血虚萎黄, 心悸, 一種のノイローゼ, 月経不調, 崩漏下血, 眩暈, 耳鳴, 鬚髮早白に用いる。

熟地黄含有方剂:温清飲, 芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減, 四物湯, 十全大補湯, 潤腸湯, 清熱補血湯, 大防風湯, 補陰湯, 痿証方, 補陰湯

縮砂

局方

日本	Amomi Semen	ショウガ科 Zingiberaceae	<i>Amomum xanthioides</i> Wallich シュクシヤ	種子塊
韓国 (砂仁)	Amomi Fructus	Zingiberaceae	<i>Amomum villosum</i> Loureiro var. <i>xanthioides</i> T. L. Wu et Senjen <i>Amomum villosum</i> Loureiro	成熟果実
中国 (砂仁)	Amomi Fructus	Zingiberaceae	<i>Amomum villosum</i> Loureiro <i>Amomum villosum</i> Loureiro var. <i>xanthioides</i> T. L. Wu et Senjen <i>Amomum longiligulare</i> T. L. Wu 酢酸ボルニル(C <sub>12</sub> H <sub>20</sub> O <sub>2</sub> ) 0.90%以上	成熟果実

縮砂(しゅくしゃ) Amomum Seed

帰経:脾・胃・腎, 性:温, 味:辛

薬能:化湿開胃, 温脾止瀉, 理気安胎. 湿濁中阻, 胃痞不飢, 脾胃虚寒, 嘔吐泄瀉, 妊娠悪阻, 胎動不安に用いる。

縮砂含有方剂:安中散, 香砂六君子湯, 参苓白朮散, 分消湯, 実脾飲

生姜 (乾生姜)

局方

日本	Zingiberis Rhizoma	ショウガ科 Zingiberaceae	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe ショウガ	根茎
韓国	Zingiberis Rhizoma Recens	Zingiberaceae	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	新鮮根茎
中国	Zingiberis Rhizoma Recens	Zingiberaceae	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe 6-ジングロール(C <sub>17</sub> H <sub>26</sub> O <sub>4</sub> ) 0.050%以上	新鮮根茎

生姜(しょうきょう) Ginger

帰経:肺・脾・胃, 性:微温, 味:辛

薬能:解表散寒, 温中止嘔, 化痰止咳. 風寒感冒, 胃寒嘔吐, 寒痰咳嗽に応用する。

生姜含有方剂:温胆湯, 越婢加半夏湯, 越婢加朮湯, 越婢湯, 延年半夏湯, 黄耆桂枝五物湯, 黄耆建中湯, 黄芩加半夏生姜湯, 温経湯, 加味温胆湯, 加味帰脾湯, 加味逍遙散, 葛根加朮附湯, 葛根湯, 葛根湯加川芎辛夷, 帰耆建中湯, 帰脾湯, 橘皮竹筴湯, 橘皮湯, 橘皮枳実生姜湯, 九味檳榔湯, 桂枝加黄耆湯, 桂枝加葛根湯, 桂枝加桂湯, 桂枝加厚朴杏子湯, 桂枝加附子湯, 桂枝加竜骨牡蠣湯, 桂枝加芍朮附湯, 桂枝加朮附湯, 桂枝加芍薬大黃湯, 桂枝加芍薬湯, 桂枝去桂加茯苓白朮湯, 桂枝去芍薬加蜀漆龍骨牡蠣湯, 桂枝去芍薬湯, 桂枝湯, 桂枝二越婢一湯, 桂枝麻黄各半湯, 桂枝芍薬知母湯, 桂姜棗草黄附湯, 呉茱萸湯, 厚朴七物湯, 厚朴生姜半夏甘草人参湯, 香蘇散, 香砂六君子湯, 参蘇飲, 四君子湯, 柴陷湯, 柴胡加竜骨牡蠣湯, 柴胡加芒硝湯, 柴胡桂枝湯, 柴胡湯, 柴苓湯, 柴芍六君子湯, 射干麻黄湯, 柿蒂湯, 十味敗毒湯, 升麻葛根湯, 小建中湯, 小柴胡湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 小続命湯, 小半夏加茯苓湯, 逍遙散, 真武湯, 清肺湯, 生姜瀉心湯, 旋覆花代赭石湯, 疎経活血湯, 増損木防己湯, 大柴胡湯, 大青竜湯, 大防風湯, 烏薬順気散, 釣藤散, 当帰建中湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 二朮湯, 排膿散及湯, 排膿湯, 半夏厚朴湯, 半夏白朮天麻湯, 分消湯, 実脾飲, 分心気飲, 補中益気湯, 防風通聖散, 防己黄耆湯, 麻黄連軹赤小豆湯, 六君子湯, 炙甘草湯, 茯苓飲, 茯苓飲合半夏厚朴湯, 茯苓沢瀉湯, 栝呂桂枝湯, 奔豚湯

小麦

日本	Tritici Semen	イネ科 Gramineae	<i>Triticum aestivum</i> Linné コムギ	種子
韓国	Tritici Levis Semen	Gramineae	<i>Triticum aestivum</i> Linné	種子(水に浮いたもの)
中国	Tritici Fructus Levis	Gramineae	<i>Triticum aestivum</i> Linné	成熟果実

小麦(しょうぼく) Wheat Seed

帰経:心・肝, 性:涼, 味:甘

薬能:養心除煩, 利小便. 臟燥証悲傷欲, 熱淋, 小便不利に用いる。

小麦含有方剂:甘麦大棗湯



升麻			局方
日本	Cimicifugae Rhizoma	キンポウゲ科 Ranunculaceae	<i>Cimicifuga simplex</i> Wormskjold サラシナシヨウマ <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maximowicz <i>Cimicifuga foetida</i> Linné シヨウマ <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Komarov 根茎
韓国	Cimicifugae Rhizoma	Ranunculaceae	<i>Cimicifuga heracleifolia</i> Komarov <i>Cimicifuga simplex</i> Wormskjold <i>Cimicifuga dahurica</i> Maximowicz <i>Cimicifuga foetida</i> Linné 根茎
中国	Cimicifugae Rhizoma	Ranunculaceae	<i>Cimicifuga heracleifolia</i> Komarov <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maximowicz <i>Cimicifuga foetida</i> Linné イソフェルラ酸(C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub> ) 0.10%以上 根茎

升麻(しょうま) Chinese Bugbane Rhizome

帰経:肺・脾・大腸・胃, 性:微寒, 味:甘・辛, 神農本草経:上品

薬能:発表透疹, 清熱解毒, 升举陽気. 風熱頭痛, 歯痛, 口瘡, 咽喉腫痛, 麻疹不透, 陽毒発斑, 脱肛, 子宮脱垂に応用する.

升麻含有方剂:乙字湯, 升麻葛根湯, 辛夷清肺湯, 清熱補氣湯, 補中益氣湯, 立効散

白河附子

(局方中 附子3)

日本	Aconiti Rhizoma	キンポウゲ科 Ranunculaceae	<i>Aconitum carmichaeli</i> Debeaux カラトリカブト	側根
韓国	記載なし			
中国	記載なし			

白河附子(しらかわぶし) Processed Aconite Root

帰経:心・脾・腎, 性:大熱・有毒, 味:大辛

薬能:回陽救逆, 補火助陽, 逐風寒湿邪. 亡陽虚脱, 肢冷脉微, 陽萎, 宮冷, 心腹冷痛, 虚寒吐瀉, 陰寒水腫, 陽虚外感, 寒湿痺痛に応用する.

薬徴:(附子)水を逐うことを主る也. 故によく悪寒, 身体四肢及び骨節の疼痛, 或いは沈重, 或いは不仁, 或いはケツ冷を治し, 而して傍ら腹痛, 失精, 下痢を治す.

辛夷			局方
日本	Magnoliae Flos	モクレン科 Magnoliaceae	<i>Magnolia salicifolia</i> Maximowicz タムシバ <i>Magnolia kobus</i> De Candolle コブシ <i>Magnolia biondii</i> Pampanini <i>Magnolia sprengeri</i> Pampanini <i>Magnolia denudata</i> Desrousseaux ハクモクレン 花蕾
韓国	Magnoliae Flos	Magnoliaceae	<i>Magnolia denudata</i> Desrousseaux 同属近縁植物 花蕾
中国	Magnoliae Flos	Magnoliaceae	<i>Magnolia biondii</i> Pampanini <i>Magnolia denudata</i> Desrousseaux <i>Magnolia sprengeri</i> Pampanini マグノリン(C <sub>23</sub> H <sub>28</sub> O <sub>7</sub> ) 0.40%以上 花蕾

辛夷(しんい) Biond Magnolia Flower

帰経:肺・胃, 性:平, 味:辛, 神農本草経:上品

薬能:散風寒, 通鼻竅. 風寒頭痛, 鼻塞, 鼻淵, 鼻流濁涕に用いる.

辛夷含有方剂:葛根湯加川芎辛夷, 辛夷清肺湯

神麴			
日本	Massa Medicata Fermentat		小麦粉・フスマ・薬物(赤小豆・杏仁・青蒿・青耳子など)を混和し、発酵させたもの
韓国	Massa Medicata Fermentata		小麦粉・麴・赤小豆・杏仁・青蒿・青耳子・辣蓼を混和して発酵させたもの
中国	記載なし		

神麴(しんぎく) Malted Rice

帰経:脾・胃, 性:温, 味:辛・甘

薬能:消食和胃. 腹(胃)脹満少食, 腸鳴泄瀉に用いる.

神麴含有方剂:辛夷清肺湯

秦艽

日本	Gentianae Macrophyllae Radix	リンドウ科 Gentianaceae	<i>Gentiana macrophylla</i> Pall. ジンギョウ	根
韓国	Gentianae Macrophyllae Radix	Gentianaceae	<i>Gentiana macrophylla</i> Pallas <i>Gentiana straminea</i> Maxim <i>Gentiana crassicaulis</i> Duthie ex Burk <i>Gentiana dahurica</i> Fisch.	根
中国	Gentianae Macrophyllae Radix	Gentianaceae	<i>Gentiana macrophylla</i> Pallas <i>Gentiana straminea</i> Maximowicz <i>Gentiana crassicaulis</i> Duthie ex Burk <i>Gentiana dahurica</i> Fisch. ゲンチオピクロシド(C <sub>16</sub> H <sub>20</sub> O <sub>9</sub> )及びロガニン酸(C <sub>16</sub> H <sub>24</sub> O <sub>10</sub> )を合わせて 2.5%以上	根

秦艽(じんぎょう) Large-Leaf Gentian Root

帰経:胃・肝・胆, 性:平, 味:苦・辛, 神農本草経:中品

薬能:去瘀止痛, 活血通経, 清心除煩, 月経不調, 経閉痛経, 癥瘕積聚, 胸腹刺痛, 熱痺疼痛, 瘡瘍腫痛, 心煩不眠, 肝脾腫大, 心絞痛に用いる。

秦艽含有方剤:独活寄生湯

青皮

日本	Citri Reticulatae Viride	ミカン科 Rutaceae	<i>Citrus reticulata</i> Blanco カンキツ	未成熟果皮
韓国	Citrii Unshiu Immaturi Pericarpium	Rutaceae	<i>Citrus unshiu</i> Markovich <i>Citrus reticulata</i> Blanco	未成熟果皮
中国	Citrii Reticulatae Pericarpium Viride	Rutaceae	<i>Citrus reticulata</i> Blanco その他栽培変種 ヘスペリジン(C <sub>28</sub> H <sub>34</sub> O <sub>13</sub> ) 5.0%以上	未成熟果皮

青皮(せいひ) Green Tangerine Peel

帰経:肝・胆, 性:温, 味:苦・辛

薬能:疏肝破気, 消積化滯. 胸脇脹満, 疝気, 乳核, 乳癰, 食積腹痛に用いる。

薬徴:(橘皮)吃逆を主治する也。傍ら胸痺, 停痰を治す。

青皮含有方剤:柴胡疎肝湯, 分心気飲

石膏

局方

日本	Gypsum Fibrosum		天然の含水硫酸カルシウム (CaSO <sub>4</sub> ・2H <sub>2</sub> O)	
韓国	記載なし			
中国	Gypsum Fibrosum		含水硫酸カルシウム (CaSO <sub>4</sub> ・2H <sub>2</sub> O)	

石膏(せつこう) Gypsum

帰経:肺・胃, 性:大寒, 味:甘・辛, 神農本草経:中品

薬能:清熱瀉火, 除煩止渴. 外感熱病, 高熱煩渴, 肺熱喘咳, 胃火亢盛, 頭痛, 歯痛に用いる。

薬徴:煩渴を主治する也。傍ら譫語, 煩躁, 頭痛, 喘を治す。

石膏含有方剤:越婢加半夏湯, 越婢加朮湯, 越婢湯, 桔梗石膏, 桂枝二越婢一湯, 五虎湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 小青竜湯加石膏, 消風散, 辛夷清肺湯, 増損木防已湯, 統命湯, 大青竜湯, 竹葉石膏湯, 釣藤散, 白虎加桂枝湯, 白虎加人參湯, 白虎湯, 防風通聖散, 麻杏甘石湯, 木防已湯

川芎

局方

日本	Cnidii Rhizoma	セリ科 Umbelliferae	<i>Cnidium officinale</i> Makino センキョウ	根茎
韓国	Cnidii Rhizoma	Umbelliferae	<i>Cnidium officinale</i> Makino <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.	根茎(蒸)
中国	Chuanxiong Rhizoma	Umbelliferae	<i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. フェルラ酸(C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub> ) 0.10%以上	根茎

川芎(せんきゅう) Cnidium Rhizome

帰経:肝・胆・心包, 性:温, 味:辛, 神農本草経:上品

薬能:活血行気, 去風止痛. 月経不調, 経閉痛経, 癥瘕腹痛, 胸脇刺痛, 打撲腫痛, 頭痛, 風湿痺痛に用いる。

川芎含有方剤:温経湯, 温清飲, 葛根湯加川芎辛夷, 荊芥連翹湯, 五積散, 酸棗仁湯, 四物湯, 治打撲一方, 治頭瘡一方, 七物降下湯, 柴胡清肝湯, 柴胡疎肝湯, 十全大補湯, 十味敗毒湯, 女神散, 小統命湯, 清上防風湯, 清熱補血湯, 千金内托散, 川芎茶調散, 疎経活血湯, 統命湯, 大防風湯, 猪苓湯合四物湯, 烏薬順気散, 当帰飲子, 当帰芍薬散, 防風通聖散, 抑肝散, 抑肝散加陳皮半夏, 芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減, 芎帰膠艾湯, 折衝飲, 奔豚湯

前胡				局方
日本	Peucedani Radix	セリ科 Umbelliferae	<i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn. シロバナゼンコ <i>Angelica decursiva</i> Franchet et Savatier (= <i>Peucedanum decursivum</i> Maximowicz) ノダケ	根
韓国	Peucedani Radix	Umbelliferae	<i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn. <i>Angelica decursiva</i> Franchet et Savatier (= <i>Peucedanum decursivum</i> Maximowicz)	根
中国	Peucedani Radix	Umbelliferae	<i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn プラエルプトリンA(C <sub>21</sub> H <sub>22</sub> O <sub>7</sub> ) 0.90%以上, プラエルプトリンB(C <sub>24</sub> H <sub>26</sub> O <sub>7</sub> ) 0.24%以上	根

前胡(ぜんこ) Peucedanum Root

帰経:肺, 性:微寒, 味:苦・辛

薬能:散風清熱, 降気化痰. 風熱咳嗽痰多, 痰熱喘満, 痰黄稠に用いる.

前胡含有方剂:参蘇飲, 蘇子降気湯

川骨				局方
日本	Nupharis Rhizoma	スイレン科 Nymphaeaceae	<i>Nuphar japonicum</i> De Candolle コウホネ	根茎
韓国	Nupharis	Nymphaeaceae	<i>Nuphar japonicum</i> De Candolle	
中国	記載なし			

川骨(せんこつ) Nuphar Rhizome

帰経:脾, 性:寒, 味:甘

薬能:補虚, 健胃, 調経

川骨含有方剂:治打撲一方

蟬退				局方外
日本	Cicadae Periostracum	セミ科 Cicadidae	<i>Cryptotympana pustulata</i> Fabricius クマゼミ	蛹の抜け殻
韓国	Cicadidae Periostracum	Cicadidae	<i>Cryptotympana pustulata</i> Fabricius	脱落皮殻
中国 (蟬蛻)	Cicadae Periostracum	Cicadidae	<i>Cryptotympana pustulata</i> Fabricius	脱落皮殻

蟬退(せんたい) Cicada Molting

帰経:肺・肝, 性:寒, 味:鹹・甘

薬能:散風除熱, 利咽, 透疹, 退翳, 解痙. 風熱感冒, 咽痛, 音哑, 麻疹不透, 風疹搔痒, 目赤翳障, 驚風, 筋肉のひきつり, 破傷風に用いる.

蟬退含有方剂:消風散

蒼朮				局方
日本	Atractylodes Lanceae Rhizoma	キク科 Compositae	<i>Atractylodes lancea</i> De Candolle ホソバオケラ <i>Atractylodes chinensis</i> Koidzumi それらの雑種	根茎
韓国	Atractylodes Rhizoma	Compositae	<i>Atractylodes lancea</i> De Candolle <i>Atractylodes chinensis</i> Koidzumi	根茎
中国	Atractylodes Rhizoma	Compositae	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) De Candolle <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidzumi アトラクチロジン(C <sub>13</sub> H <sub>10</sub> O) 0.30%以上	根茎

蒼朮(そうじゅつ) Atractylodes Lanceae Rhizome

帰経:脾・胃, 性:温, 味:苦・辛, 神農本草経:上品

薬能:燥湿健脾, 去風散寒, 明目. 腹(胃)脹満, 泄瀉, 水腫, 脚気, 歩行困難, 風湿痺痛, 風寒感冒, 夜盲に用いる.

薬徴:(朮)水を利するを主る也. 故によく小便の自利, 不利を治し, 傍ら身の煩疼, 痰飲, 失精, 眩冒, 下痢, 喜唾を治す.

蒼朮含有方剂:治頭瘡一方, 消風散, 疎経活血湯, 二朮湯, 半夏白朮天麻湯, 分消湯, 実脾飲, 平胃散

桑白皮				局方
日本	Mori Cortex	クワ科 Moraceae	<i>Morus alba</i> Linné マグワ	根皮
韓国	Mori Cortex	Moraceae	<i>Morus alba</i> Linné	根皮
中国	Mori Cortex	Moraceae	<i>Morus alba</i> Linné	根皮

桑白皮(そうはくひ) Mulberry Bark, White Mulberry Root-bark

帰経:肺, 性:寒, 味:甘・辛, 神農本草経:中品

薬能:瀉肺平喘, 利水消腫. 肺熱喘咳, 水腫脹満尿少, 面目肌膚浮腫に用いる.

桑白皮含有方剂:五虎湯, 清肺湯, 増損木防己湯, 分心気飲, 芫製心気飲, 麻黄連軹赤小豆湯

蘇木				局方
日本	Sappan Lignum	マメ科 Leguminosae	<i>Caesalpinia sappan</i> Linné スオウ	心材
韓国	Caesalpiniae Lignum	Leguminosae	<i>Caesalpinia sappan</i> Linné	心材
中国	Sappan Lignum	Leguminosae	<i>Caesalpinia sappan</i> Linné ブラジリン(C <sub>16</sub> H <sub>14</sub> O <sub>5</sub> ) 0.50%以上, (±)プロトサッパニンB(C <sub>16</sub> H <sub>16</sub> O <sub>5</sub> ) 0.50%以上	心材

蘇木(そぼく) Sappan Wood  
 帰経:心・肝・脾, 性:平, 味:甘・鹹  
 薬能:行血去瘀, 消腫止痛, 経閉痛経, 産後瘀阻, 胸腹刺痛, 外傷腫痛に用いる。  
 蘇木含有方剤:通導散

蘇子 (=紫蘇子)				局方
日本	Perillae Fructus	シソ科 Labiatae	<i>Perilla frutescens</i> Britton var. <i>acuta</i> Kudo シソ <i>Perilla frutescens</i> Britton var. <i>crispa</i> Decaisne チリメンジソ	種子
韓国	Perillae Fructus	Labiatae	<i>Perilla frutescens</i> L. Britton var. <i>acuta</i> (Thunb.) Kudo <i>Perilla frutescens</i> Britton var. <i>crispa</i> Decne.	果実
中国	Perillae Fructus	Labiatae	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton ロスマリン酸(C <sub>18</sub> H <sub>16</sub> O <sub>8</sub> ) 0.25%以上	成熟果実

蘇子(そし) Perilla Seed  
 帰経:肺, 性:温, 味:辛  
 薬能:下気定喘, 止咳消痰, 寛胸解鬱  
 蘇子含有方剤:蘇子降気湯, 増損木防己湯, 変製心気飲

蘇葉 (=紫蘇葉)				局方
日本	Perillae Herba	シソ科 Labiatae	<i>Perilla frutescens</i> Britton var. <i>acuta</i> Kudo シソ <i>Perilla frutescens</i> Britton var. <i>crispa</i> Decaisne チリメンジソ ペリラルアルデヒド 0.08%以上	葉・枝先
韓国 (紫蘇葉)	Perillae Folium	Labiatae	<i>Perilla frutescens</i> Britton var. <i>acuta</i> Kudo <i>Perilla frutescens</i> Britton var. <i>crispa</i> Decaisne	葉・枝先
中国 (紫蘇葉)	Perillae Folium	Labiatae	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton	葉

蘇葉(そよう) Perilla Leaf  
 帰経:肺・脾, 性:温, 味:辛  
 薬能:解表散寒, 行気 and 胃. 風寒感冒, 咳嗽嘔悪, 妊娠嘔吐, 魚蟹中毒に用いる。  
 蘇葉含有方剤:九味檳榔湯, 香蘇散, 參蘇飲, 柴朴湯, 神秘湯, 半夏厚朴湯, 分心気飲, 茯苓飲合半夏厚朴湯

大黄				局方
日本	Rhei Rhizoma	タデ科 Polygonaceae	<i>Rheum palmatum</i> Linné <i>Rheum tanguticum</i> Maximowicz <i>Rheum officinale</i> Baillon <i>Rheum coreanum</i> Nakai それらの種間雑種 センノシドA(C <sub>42</sub> H <sub>38</sub> O <sub>20</sub> : 862.74) 0.25%以上	根茎
韓国 (大黄)	Rhei Radix Et Rhizoma	Polygonaceae	<i>Rheum palmatum</i> Linné <i>Rheum tanguticum</i> Maximowicz ex Balf. <i>Rheum officinale</i> Baillon センノシドA(C <sub>42</sub> H <sub>38</sub> O <sub>20</sub> : 862.74) 0.25%以上	根茎
(酒大黄)	Rhei Rhizoma Preparata Cum Vinum	Polygonaceae	<i>Rheum undulatum</i> Linné	根茎
(醋大黄)	Rhei Rhizoma Preparata Cum Acetum	Polygonaceae	<i>Rheum undulatum</i> Linné	根茎
中国	Rhei Radix et Rhizoma	Polygonaceae	<i>Rheum palmatum</i> Linné <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. <i>Rheum officinale</i> Baillon アロエエモジン(C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ), レイン(C <sub>15</sub> H <sub>8</sub> O <sub>6</sub> ), エモジン(C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ), クリソファンオール(C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub> )及びフィシオン(C <sub>16</sub> H <sub>12</sub> O <sub>5</sub> )を合わせて1.50%以上	根・根茎

大黄(だいおう) Rhubarb  
 帰経:脾・胃・大腸・心包・肝, 性:寒, 味:苦, 神農本草経:下品  
 薬能:瀉熱通腸, 涼血解毒, 逐瘀通経. 実熱便秘, 積滯腹痛, 瀉痢不爽, 湿熱黄疸, 血熱吐衄, 目赤, 咽腫, 腸癰腹痛, 癰腫疔瘡, 瘀血経閉, 打撲損傷, やけど, 上消化道出血に応用。  
 薬徴:結毒を通利するを主る也。故に能く胸満, 腹満, 腹痛, 及び便閉, 小便不利を治し, 傍ら発黄, 瘀血, 腫膿を治す。  
 大黄含有方剤:乙字湯, 温脾湯, 橘皮大黄朴硝湯, 九味檳榔湯, 厚朴三物湯, 厚朴七物湯, 三黄瀉心湯, 治打撲一方, 治頭瘡一方, 柴胡加竜骨牡蛎湯, 潤腸湯, 女神散, 小承気湯, 大黄黄連瀉心湯, 大黄牡丹皮湯, 大黄甘草湯, 大黄附子湯, 大柴胡湯, 大承気湯, 調胃承気湯, 通導散, 桃核承気湯, 附子瀉心湯, 防風通聖散, 麻子仁丸, 芍甘黄辛附湯, 茵陳蒿湯

大棗

局方

日本	Zizyphi Fructus	クロウメモドキ科 Rhamnaceae	<i>Zizyphus jujuba</i> Miller var. <i>inermis</i> Rehder ナツメ	果実
韓国	Zizyphi Fructus	Rhamnaceae	<i>Zizyphus jujuba</i> Miller var. <i>inermis</i> Rehder <i>Zizyphus jujuba</i> Miller var. <i>hoonensis</i> T. B. Lee	成熟果実
中国	Jujubae Fructus	Rhamnaceae	<i>Zizyphus jujuba</i> Mill.	成熟果実

大棗(たいそう) Jujube

帰経:脾, 性:温, 味:甘, 神農本草経:上品

薬能:補中益気, 養血安神. 脾虚食少, 乏力便溏, 婦人臍躁に用いる.

薬徴:牽引強急を主治する也. 傍ら咳嗽, 奔豚, 煩躁, 身疼, 脇痛, 腹中の痛を治す.

大棗含有方剂:胃苓湯, 烏頭桂枝湯, 温胆湯, 越婢加半夏湯, 越婢加朮湯, 越婢湯, 黄連湯, 黄耆桂枝五物湯, 黄耆建中湯, 黄芩加半夏生姜湯, 黄芩湯, 加味温胆湯, 加味帰脾湯, 解急蜀椒湯, 葛根加朮附湯, 葛根湯, 葛根湯加川芎辛夷, 甘草瀉心湯, 甘麦大棗湯, 帰耆建中湯, 帰脾湯, 橘皮竹茹湯, 啓脾湯, 桂枝加黄耆湯, 桂枝加葛根湯, 桂枝加桂湯, 桂枝加厚朴杏子湯, 桂枝加附子湯, 桂枝加竜骨牡蠣湯, 桂枝加芍朮附湯, 桂枝加朮附湯, 桂枝加芍薬大黄湯, 桂枝加芍薬湯, 桂枝去桂加茯苓白朮湯, 桂枝去芍薬加蜀漆龍骨牡蠣湯, 桂枝去芍薬湯, 桂枝湯, 桂枝二越婢一湯, 桂枝麻黄各半湯, 桂枝棗草黄附湯, 呉茱萸湯, 厚朴七物湯, 香砂六君子湯, 参蘇飲, 四君子湯, 柴陷湯, 柴胡加竜骨牡蠣湯, 柴胡加芒硝湯, 柴胡桂枝湯, 柴朴湯, 柴苓湯, 柴芍六君子湯, 射干麻黄湯, 小建中湯, 小柴胡湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 清肺湯, 生姜瀉心湯, 旋覆花代赭石湯, 蘇子降気湯, 大柴胡湯, 大青竜湯, 大防風湯, 竹茹温胆湯, 当帰建中湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 当帰四逆湯, 排膿散及湯, 排膿湯, 麦門冬湯, 半夏瀉心湯, 附子粳米湯, 分心気飲, 平胃散, 補中益気湯, 防己黄耆湯, 麻黄連軀赤小豆湯, 苓桂甘棗湯, 六君子湯, 炙甘草湯, 栝呂桂枝湯, 芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減

大腹皮

日本	Arecae Pericarpium	ヤシ科 Palmae	<i>Areca catechu</i> Linné ビンロウヤシ	成熟果皮
韓国	Arecae Pericarpium	Palmae	<i>Areca catechu</i> Linné	未成熟果皮
中国	Arecae Pericarpium	Palmae	<i>Areca catechu</i> Linné	果皮

大腹皮(だいふくひ) Areca Husk, Areca Peel

帰経:脾・胃・大腸・小腸, 性:微温, 味:辛

薬能:下気寛中, 行水消腫. 湿阻気滯, 腹(胃)脹悶, 大便不爽, 水腫脹満, 脚気浮腫, 小便不利に用いる.

大腹皮含有方剂:分消湯, 実脾飲, 分心気飲, 藿香正気散

沢瀉

局方

日本	Alismatis Rhizoma	オモダカ科 Alismataceae	<i>Alisma orientale</i> Juzepczuk サジオモダカ	塊茎
韓国	Alismatis Rhizoma	Alismataceae	<i>Alisma orientale</i> Juzepczuk	塊茎(除鬚, 除周皮)
中国	Alismatis Rhizoma	Alismataceae	<i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juzepczuk アリゾールBアセタート(C <sub>32</sub> H <sub>50</sub> O <sub>5</sub> ) 0.050%以上	塊茎

沢瀉(たくしゃ) Oriental Waterplantain Rhizome

帰経:腎・膀胱, 性:寒, 味:甘, 神農本草経:上品

薬能:利小便, 清湿熱. 小便不利, 水腫脹満, 泄瀉尿少, 痰飲眩暈, 熱淋澀痛, 高血脂症に用いる.

薬徴:小便自利, 冒眩を主治する也. 傍ら渴を治す.

沢瀉含有方剂:胃苓湯, 牛車腎気丸, 啓脾湯, 五淋散, 五苓散, 柴苓湯, 沢瀉湯, 猪苓湯合四物湯, 四苓湯, 当帰芍薬散, 八味地黄丸, 半夏白朮天麻湯, 竜胆瀉肝湯, 六味丸, 茯苓沢瀉湯

竹茹

局方外

日本	Bambusae Caulis, Phyllostachysis	イネ科 Gramineae	<i>Phyllostachys nigra</i> Munro var. <i>henonis</i> Stapf ex Rendle ハチク	第二層皮
韓国	Bambusae Caulis in Taeniam	Gramineae	<i>Phyllostachys nigra</i> Munro var. <i>henonis</i> Stapf <i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold et Zuccarini	中間層皮
中国	Bambusae Caulis in Taenias	Gramineae	<i>Bambusa tuldooides</i> Munro <i>Sinocalamus beecheyanus</i> (Munro) McClure var. <i>pubescens</i> P. F. Li <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf et	中間層皮

竹茹(ちくじょ) Bamboo Shavings

帰経:肺・胃, 性:微寒, 味:甘

薬能:清熱, 化痰, 止嘔

竹茹含有方剂:温胆湯, 加味温胆湯, 橘皮竹茹湯, 清肺湯, 竹茹温胆湯

## 知母

## 局方

日本	Anemarrhenae Rhizoma	ユリ科 Liliaceae	<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge ハナスゲ	根茎
韓国	Anemarrhenae Rhizoma	Liliaceae	<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge	根茎
中国	Anemarrhenae Rhizoma	Liliaceae	<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge マンギフェリン(C <sub>19</sub> H <sub>18</sub> O <sub>11</sub> ) 0.70%以上, チモサポニンBⅡ(C <sub>45</sub> H <sub>76</sub> O <sub>19</sub> ) 3.0%以上	根茎

知母(ちも) Common Anemarrhena Rhizome

帰経:肺・胃・腎, 性:寒, 味:苦, 神農本草経:中品

薬能:清熱瀉火, 生津潤燥. 外感熱病, 高熱煩渴, 肺熱燥咳, 骨蒸潮熱, 内熱消渴, 腸燥便秘に用する.

知母含有方剤:桂枝芍薬知母湯, 酸棗仁湯, 滋陰降火湯, 滋陰至宝湯, 消風散, 辛夷清肺湯, 清熱補血湯, 白虎加桂枝湯, 白虎加人参湯, 白虎湯, 痿證方, 補陰湯

## 丁子 (=丁香)

## 局方

日本	Caryophylli Flos	フトモモ科 Myrtaceae	<i>Syzygium aromaticum</i> Merrill et Perry ( <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg) チョウジ	花蕾
韓国 (丁香)	Syzygii Flos	Myrtaceae	<i>Syzygium aromaticum</i> Merrill et Perry	花蕾
中国 (丁香)	Caryophylli Flos	Myrtaceae	<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb. オイゲノール(C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub> ) 11.0%以上	花蕾

丁子(ちょうじ) Clove Flower

帰経:肺・胃・脾・腎, 性:温, 味:辛

薬能:温中降逆, 補腎助陽. 脾胃虚寒, しゃっくり, 嘔吐, 食少吐瀉, 心腹冷痛, 腎虚陽痿に用いる.

丁子含有方剤:柿蒂湯, 治打撲一方, 女神散

## 釣藤鈎 (=釣藤鈎)

## 局方

日本	Uncariae Uncis cum Ramulus	アカネ科 Rubiaceae	<i>Uncaria rhynchophylla</i> Miquel カギカズラ <i>Uncaria sinensis</i> Haviland <i>Uncaria macrophylla</i> Wallich 総アルカロイド(リンコフィリン及びヒルスチン) 0.03%以上	鈎棘
韓国 (鈎藤)	Uncariae Ramulus et	Rubiaceae	<i>Uncaria sinensis</i> (Oli.) Havil 同属近縁植物	鈎茎枝
中国 (鈎藤)	Uncariae Ramulus cum Uncis	Rubiaceae	<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil. <i>Uncaria macrophylla</i> Wall. <i>Uncaria hirsuta</i> Havil. <i>Uncaria sinensis</i> (Oli.) Havil. <i>Uncaria sessilifructus</i> Roxb.	鈎茎枝

釣藤鈎(ちょうとう) Gambir Plant, Morning Star

帰経:肝・心包, 性:微寒, 味:甘

薬能:清熱平肝, 息風定驚. 頭痛眩暈, 感冒挟驚, 驚癇, 筋肉のひきつり, 妊娠子癇に用する, 高血圧症に用いる.

釣藤鈎含有方剤:七物降下湯, 釣藤散, 抑肝散, 抑肝散加陳皮半夏

## 猪苓

## 局方

日本	Polyporus	サルノコシカケ科 Polyporaceae	<i>Polyporus umbellatus</i> Fries チョレイマイタケ	菌核
韓国	Polyporus	Polyporaceae	<i>Polyporus umbellatus</i> Fries	菌核
中国	Polyporus	Polyporaceae	<i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries エルゴステロール(C <sub>28</sub> H <sub>44</sub> O) 0.070%以上	菌核

猪苓(ちよれい) Polyporus Sclerotium

帰経:脾・胃・肝・胆, 性:寒, 味:甘, 神農本草経:中品

薬能:利水滲湿. 小便不利, 水腫, 泄瀉, 淋濁, 帯下に応用する.

薬徴:渴して, 小便せざるを主治する也.

猪苓含有方剤:胃苓湯, 五苓散, 柴苓湯, 四苓湯, 猪苓湯, 猪苓湯合四物湯, 分清湯, 実脾飲, 茵陳五苓散

## 沈香

## 局方

日本	Aquilariae Lignum	ジンチョウゲ科 Thymelaeaceae	<i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg ジンコウ	樹脂含有木材
韓国	Aquilariae	Thymelaeaceae	<i>Aquilaria agallocha</i> Roxburgh	樹脂含有木材
中国	Aquilariae Lignum	Thymelaeaceae	<i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg	樹脂含有木材

沈香(じんこう) Aquilaria Wood, Aloeswood

帰経:脾・胃・腎, 性:微温, 味:辛・苦

薬能:行気止痛, 温中止嘔, 納気平喘. 胸腹脹悶疼痛, 胃寒嘔吐, しゃっくり, 腎虚気逆喘急に用いる.

沈香含有方剤:加減小柴胡湯

陳皮

局方

日本	Aurantii Nobilis Pericarpium	ミカン科 Rutaceae	<i>Citrus unshiu</i> Markowicz ウンシュウミカン <i>Citrus reticulata</i> Blanco ヘスペリジン 4.0%以上	成熟果皮
韓国	Citri Unshii Pericarpium	Rutaceae	<i>Citrus unshiu</i> Markowicz <i>Citrus reticulata</i> Blanco ヘスペリジン(C <sub>28</sub> H <sub>34</sub> O <sub>15</sub> ) 4.0%以上	成熟果皮
中国	Citri Reticulatae Pericarpium	Rutaceae	<i>Citrus reticulata</i> Blanco 栽培変種 ヘスペリジン(C <sub>28</sub> H <sub>34</sub> O <sub>15</sub> ) 3.5%以上	成熟果皮

陳皮(ちんぴ) Dried Tangerine Peel (Citrus Unshiu Peel)

帰経:肺・脾, 性:温, 味:辛・苦, 神農本草経:上品

薬能:理気健脾, 燥湿化痰, 胸胃脹満, 食少吐瀉, 咳嗽痰多に用いる。

薬徴:(橘皮)吃逆を主治する也。傍ら胸痺, 停痰を治す。

陳皮含有方剂:胃苓湯, 温胆湯, 加味温胆湯, 啓脾湯, 香蘇散, 香砂六君子湯, 參蘇飲, 滋陰降火湯, 滋陰至宝湯, 柴芍六君子湯, 神秘湯, 人參養榮湯, 清暑益氣湯, 清肺湯, 疎経活血湯, 蘇子降氣湯, 竹筴温胆湯, 烏藥順氣散, 通導散, 釣藤散, 二陳湯, 二朮湯, 半夏白朮天麻湯, 分消湯, 実脾飲, 分心氣飲, 平胃散, 補中益氣湯, 抑肝散加陳皮半夏, 六君子湯, 芎歸調血飲, 芎歸調血飲第一加減, 藿香正氣散, 補陰湯

天南星

局方外

日本	Arisaematis Tuber	サトイモ科 Araceae	<i>Arisaema consanguineum</i> Schott テンナンショウ	塊茎
韓国	Arisaematis Rhizoma	Araceae	<i>Arisaema amurense</i> Maximowicz <i>Arisaema erubescens</i> Schott <i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	塊茎(除周皮)
中国	Arisaematis Rhizoma	Araceae	<i>Arisaema erubescens</i> (Wall.) Schott <i>Arisaema heterophyllum</i> Bl. <i>Arisaema amurense</i> Maximowicz アピゲニン(C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) 0.050%以上	塊茎

天南星(てんなんしょう) Arisaema Rhizome

帰経:肺・肝・脾, 性:温 微温 微温, 味:微辛(製南星)辛・苦(胆南星)辛・苦(生南星), 神農本草経:下品

薬能:燥湿化痰, 去風止癩, 散結消腫. 頑痰咳嗽, 風痰眩暈, 中風痰壅, 口眼歪斜, 半身不遂, 癰癩, 驚風, 破傷風に応用する. 生を癰腫, 蛇虫咬傷に外用する. 有毒.

天南星含有方剂:二朮湯

天麻

局方

日本	Gastrodiae Tuber	ラン科 Orchidaceae	<i>Gastrodia elata</i> Blume オニノヤガラ	塊茎
韓国	Gastrodiae Rhizoma	Orchidaceae	<i>Gastrodia elata</i> Blume	塊茎
中国	Gastrodiae Rhizoma	Orchidaceae	<i>Gastrodia elata</i> Blume ガストロジン(C <sub>13</sub> H <sub>18</sub> O <sub>7</sub> ) 0.20%以上	塊茎

天麻(てんま) Tall Gastrodia Tuber

帰経:肝, 性:微温, 味:甘, 神農本草経:上品

薬能:平肝, 息風, 止癩, 頭痛, 眩暈, 肢体麻木, 小兒驚風, 癰癩, 筋肉のひきつり, 破傷風症に用いる。

天麻含有方剂:半夏白朮天麻湯

天門冬

局方

日本	Asparagi Tuber	ユリ科 Liliaceae	<i>Asparagus cochinchinensis</i> Merrill クサスギカズラ	根(除コルク化外層部)
韓国	Asparagi Tuber	Liliaceae	<i>Asparagus cochinchinensis</i> Merrill	塊根(除周皮)
中国(天冬)	Asparagi Radix	Liliaceae	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merrill	塊根

天門冬(てんもんど) Cochinchinese Asparagus Root

帰経:肺・腎, 性:大寒, 味:甘・苦, 神農本草経:上品

薬能:養陰潤燥, 清肺生津. 肺燥干咳, 頓咳痰粘, 咽干口渴, 腸燥便秘に用いる。

天門冬含有方剂:滋陰降火湯, 清肺湯

冬瓜子

局方

日本	Benincasae Semen	ウリ科 Cucurbitaceae	<i>Benincasa cerifera</i> Savi トウガン <i>Benincasa cerifera</i> Savi forma <i>emarginata</i> K. Kimura et Sugiyama	種子
韓国	Benincasae	Cucurbitaceae	<i>Benincasa cerifera</i> Savi	種子
中国(冬瓜仁)	Benincasae Semen	Cucurbitaceae	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.	成熟種子

冬瓜子(とうがし) Benincasa Seed

帰経:肺・胃・大腸・小腸, 性:寒, 味:甘, 神農本草経:上品

薬能:清熱化痰, 消癰, 排膿, 利湿. 痰熱咳嗽, 肺癰, 咳吐膿血, 腸癰, 闌尾炎, 淋濁, 白帯に用いる。

冬瓜子含有方剂:大黃牡丹皮湯, 腸癰湯

当帰

局方

日本	Angelicae Radix	セリ科 Umbelliferae	<i>Angelica acutiloba</i> Kitagawa トウキ <i>Angelica acutiloba</i> Kitagawa var. <i>sugiyamae</i> Hikino ホツカイトウキ	根
韓国	Angelicae Gigantis Radix	Umbelliferae	<i>Angelica gigas</i> Nakai ノダケニン(C <sub>20</sub> H <sub>24</sub> O <sub>9</sub> : 408.40)及びデクルシノール(デクルシン(C <sub>19</sub> H <sub>20</sub> O <sub>5</sub> : 328.36), デクルシノールアンゼレート(C <sub>19</sub> H <sub>20</sub> O <sub>5</sub> : 328.36))を合わせて6.0%以上	根
中国	Angelicae Sinensis Radix	Umbelliferae	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels フェルラ酸(C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub> ) 0.050%以上	根

当帰(とうき) Japanese Angelica Root

帰経:心・肝・脾, 性:温, 味:甘・辛, 神農本草経:中品

薬能:補血活血, 調経止痛, 潤腸通便. 血虚萎黄, 眩暈心悸, 月経不調, 経閉痛経, 虚寒腹痛, 腸燥便秘, 風湿痺痛, 打撲損傷, 癰疽瘡瘍に応用する.

当帰含有方剂:乙字湯, 温経湯, 温清飲, 加味帰脾湯, 加味逍遙散, 帰耆建中湯, 帰脾湯, 荊芥連翹湯, 五積散, 五淋散, 四物湯, 滋陰降火湯, 滋陰至宝湯, 七物降下湯, 柴胡清肝湯, 十全大補湯, 潤腸湯, 女神散, 消風散, 逍遙散, 人參養榮湯, 清暑益氣湯, 清熱補氣湯, 清熱補血湯, 清肺湯, 千金内托散, 疎経活血湯, 蘇子降気湯, 続命湯, 大防風湯, 猪苓湯合四物湯, 通導散, 当帰飲子, 当帰建中湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 当帰四逆湯, 当帰湯, 当帰芍薬散, 補中益氣湯, 防風通聖散, 抑肝散, 抑肝散加陳皮半夏, 竜胆瀉肝湯, 痿證方, 芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減, 芎帰膠艾湯, 薏苡仁湯, 補陰湯, 奔豚湯

桃仁

局方

日本	Persicae Semen	バラ科 Rosaceae	<i>Prunus persica</i> Batsch モモ <i>Prunus persica</i> Batsch var. <i> davidiana</i> Maximowicz アミグダリン 1.2%以上	種子
韓国	Persicae Semen	Rosaceae	<i>Prunus persica</i> Batsch <i>Prunus davidiana</i> Franchet アミグダリン(C <sub>20</sub> H <sub>27</sub> NO <sub>11</sub> : 457.43) 0.5%以上	成熟種子
中国	Persicae Semen	Rosaceae	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch. アミグダリン(C <sub>20</sub> H <sub>27</sub> NO <sub>11</sub> ) 2.0%以上	成熟種子

桃仁(とうにん) Peach Kernel

帰経:心・肝・大腸, 性:平, 味:苦・甘, 神農本草経:下品

薬能:活血去瘀, 潤腸通便. 経閉, 痛経, 癥瘕痞塊, 打撲損傷, 腸燥便秘に応用する.

桃仁含有方剂:桂枝茯苓丸, 桂枝茯苓丸加薏苡仁, 潤腸湯, 疎経活血湯, 大黃牡丹皮湯, 腸癰湯, 桃核承気湯, 芎帰調血飲第一加減

独活

局方

日本	Araliae Cordatae Rhizoma	ウコギ科 Araliaceae	<i>Aralia cordata</i> Thunberg ウド	根茎
韓国	Araliae Continentalis Radix	Araliaceae	<i>Aralia continentalis</i> Kitagawa	根
中国	Angelicae Pubescentis Radix	Umbelliferae	<i>Angelica pubescens</i> Maximowicz f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan オストール(C <sub>15</sub> H <sub>16</sub> O <sub>3</sub> ) 0.50%以上, コルンピアナジン(C <sub>19</sub> H <sub>20</sub> O <sub>5</sub> ) 0.080%	根

独活(どっかつ) Araria Rhizome

帰経:腎・膀胱, 性:微温, 味:辛・苦, 神農本草経:上品

薬能:去風除湿, 通痺止痛. 風寒湿痺, 腰膝疼痛, 少陰伏風頭痛に用いる.

独活含有方剂:十味敗毒湯

杜仲

局方

日本	Eucommiae Cortex	トチュウ科 Eucommiaceae	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliver トチュウ	樹皮
韓国	Eucommiae Cortex	Eucommiaceae	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliver	幹皮(除周)
中国	Eucommiae Cortex	Eucommiaceae	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliver ピノレンノールジグルコシド(C <sub>32</sub> H <sub>42</sub> O <sub>16</sub> ) 0.10%以上	樹皮

杜仲(とちゅう) Eucommia Bark

帰経:肝・腎, 性:温, 味:甘・微辛, 神農本草経:上品

薬能:補肝腎, 強筋骨, 安胎. 腎虚腰痛, 筋骨無力, 妊娠漏血, 胎動不安, 高血圧症に用いる.

杜仲含有方剂:大防風湯, 痿證方, 補陰湯

土別甲 (=土鼈甲)

局方外

日本		スッポン科 Trionychidae	<i>Amyda japonica</i> Tem. et Schl. スッポン <i>Amyda sinensis</i> Wieg シナスッポン	背甲
韓国	Amydae Carapax	Trionychidae	<i>Amyda maakii</i> Brandt	背甲
中国 (鼈甲)	Trionycis Carapax	Trionychidae	<i>Trionyx sinensis</i> Wiegmann	背甲

土鼈甲(どべっこう) Soft-Shell Turtle

帰経:肝・脾・腎, 性:寒, 味:鹹, 神農本草経:中品

薬能:滋陰潜陽, 軟堅散結, 破瘀通経

土鼈甲含有方剂:延年半夏湯



人参

局方

日本	Ginseng Radix	ウコギ科 Araliaceae	<i>Panax ginseng</i> C. A. Meyer ( <i>Panax schinseng</i> Nees) オタネニンジン ギンセノシドRg1 (C <sub>42</sub> H <sub>72</sub> O <sub>14</sub> : 801.01) 0.10%以上, ギンセノシドRb1 (C <sub>54</sub> H <sub>92</sub> O <sub>23</sub> : 1109.29) 0.20%以上	根(除細根)
韓国	Ginseng Radix	Araliaceae	<i>Panax ginseng</i> C. A. Meyer ギンセノシドRg1 (C <sub>42</sub> H <sub>72</sub> O <sub>14</sub> : 801.01) 0.10%以上, ギンセノシドRb1 (C <sub>54</sub> H <sub>92</sub> O <sub>23</sub> : 1109.29) 0.20%以上	根
中国	Ginseng Radix et Rhizoma	Araliaceae	<i>Panax ginseng</i> C. A. Meyer ギンセノシドRg1(C <sub>42</sub> H <sub>72</sub> O <sub>14</sub> )及びギンセノシドRe(C <sub>48</sub> H <sub>82</sub> O <sub>18</sub> )を合わせて 0.30%以上, ギンセノシドRb1 (C <sub>54</sub> H <sub>92</sub> O <sub>23</sub> ) 0.20%以上	根・根茎

人参(にんじん) Ginseng Root

帰経:肺・脾, 性:微温, 味:甘・微苦, 神農本草経:上品

薬能:大補元氣, 復脈固脱, 補脾益肺, 生津, 安神薬. 体虚欲脱, 肢冷脈微, 脾虚少食, 肺虚喘咳, 津傷口渴, 内熱消渴, 久病弱失眠, 陽痿宮冷及び心力(機能)衰, 心原性ショックに応用.

薬徴:心下の痞堅, 痞硬, 支結を主治する也. 傍ら不食, 嘔吐, 喜唾, 心痛, 腹痛, 煩悸を治す.

人参含有方剂:延年半夏湯, 黄連湯, 温経湯, 温脾湯, 加味温胆湯, 加味帰脾湯, 解急蜀椒湯, 乾姜黄連黄芩人参湯, 乾姜人参半夏丸, 甘草瀉心湯, 帰脾湯, 橘皮竹筴湯, 啓脾湯, 桂枝加芍薬大黄湯, 桂枝人参湯, 呉茱萸湯, 厚朴生姜半夏甘草人参湯, 香砂六君子湯, 参蘇飲, 四逆加入参湯, 四君子湯, 柴陷湯, 柴胡加竜骨牡蛎湯, 柴胡加芒硝湯, 柴胡桂枝湯, 柴朴湯, 柴苓湯, 柴芍六君子湯, 十全大補湯, 女神散, 小柴胡湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 小續命湯, 人参湯, 人参養榮湯, 参苓白朮散, 清暑益気湯, 清心蓮子飲, 清熱補気湯, 生姜瀉心湯, 千金内托散, 旋覆花代赭石湯, 増損木防已湯, 續命湯, 大建中湯, 大半夏湯, 大防風湯, 竹葉石膏湯, 竹筴温胆湯, 釣藤散, 当帰湯, 白虎加入参湯, 麦門冬湯, 半夏白朮天麻湯, 半夏瀉心湯, 附子湯, 附子理中湯, 補中益気湯, 木防已去石膏加茯苓芒硝湯, 木防已湯, 六君子湯, 炙甘草湯, 茯苓飲, 茯苓飲合半夏厚朴湯, 茯苓四逆湯, 生脈散, 補陰湯

忍冬

局方

日本	Lonicerae Folium Cum Caulis	スイカズラ科 Caprifoliaceae	<i>Lonicera japonica</i> Thunberg スイカズラ	葉・茎
韓国	Lonicerae Folium et Caulis	Caprifoliaceae	<i>Lonicera japonica</i> Thunberg	葉・茎
中国 (忍冬藤)	Lonicerae Japonicae Caulis	Caprifoliaceae	<i>Lonicera japonica</i> Thunberg クロロゲン酸(C <sub>16</sub> H <sub>18</sub> O <sub>9</sub> ) 0.10%以上, ログニン(C <sub>17</sub> H <sub>26</sub> O <sub>10</sub> ) 0.10%以上	茎枝

忍冬(にんどう) Lonicera Leaf and Stem

帰経:心・肺, 性:寒, 味:甘

薬能:清熱解毒, 疏風通絡. 温病発熱, 熱毒血痢, 癰腫瘡瘍, 風湿熱痺, 關節紅腫熱痛に用いる.

忍冬含有方剂:治頭瘡一方

貝母

局方

日本	Fritillariae Bulbus	ユリ科 Liliaceae	<i>Fritillaria verticillata</i> Willdenow var. <i>thunbergii</i> Baker アミガサユリ	鱗茎
韓国 (浙貝母)	Fritillariae Thunbergii	Liliaceae	<i>Fritillaria thunbergii</i> Miquel	鱗茎(除芯芽)
(川貝母)	Bulbus Fritillariae Cirrhosae	Liliaceae	<i>Fritillaria cirrhosa</i> D. Don <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsia <i>Fritillaria przewalskii</i> Maximowicz <i>Fritillaria delavayi</i> Franchet	鱗茎
中国 (川貝母)	Fritillariae Cirrhosae Bulbs	Liliaceae	<i>Fritillaria cirrhosa</i> D. Don <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsia <i>Fritillaria przewalskii</i> Maxim. <i>Fritillaria delavayi</i> Franch <i>Fritillaria taipaiensis</i> P. Y. Li <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsia var. <i>wabuensis</i> (S. Y. Tang et S. C. Yue) Z. D. Liu, S. Wang et S. C. Chen 総アルカロイド(インペリアリン(C <sub>27</sub> H <sub>43</sub> NO <sub>3</sub> )を含む) 0.050%以上	鱗茎
(平貝母)	Fritillariae Ussuriensis Bulbus	Liliaceae	<i>Fritillaria ussuriensis</i> Maxim. 総アルカロイド(ベルチシノン(C <sub>27</sub> H <sub>43</sub> NO <sub>3</sub> )を含む) 0.050%以上	鱗茎

貝母(ばいも) Thunberg Fritillary Bulb, Fritillary Bulb

帰経:心・肺, 性:微寒, 味:甘・微苦, 神農本草経:中品

薬能:清熱散結, 化痰止咳. 風熱犯肺, 痰火咳嗽, 肺癰, 乳癰, 瘰癧, 瘡毒に用いる.

薬徴:胸膈の鬱結, 痰飲を主治す

貝母含有方剂:滋陰至宝湯, 清肺湯

麦芽

日本	Hordei Fructus Germinatus	イネ科 Gramineae	<i>Hordeum vulgare</i> Linné オオムギ	発芽種子
韓国	Hordei Fructus Germinatus	Gramineae	<i>Hordeum vulgare</i> Linné	発芽種子
中国	Hordei Fructus Germinatus	Gramineae	<i>Hordeum vulgare</i> Linné	成熟果実

麦芽(ばくが) Barley Sprouts, Malt Hordei Fructus  
 帰経:脾・胃, 性:平(又は温), 味:甘(又は鹹), 神農本草経:  
 薬能:行気消食, 健脾開胃, 退乳消脹. 食積不消, 腹(胃)脹痛, 脾虚食少, 乳汁郁積, 乳房脹痛, 婦女断乳に用いる.  
 麦芽含有方剂:半夏白朮天麻湯

麦門冬

局方

日本	Ophiopogonis Tuber	ユリ科 Liliaceae	<i>Ophiopogon japonicus</i> Ker-Gawler ジャノヒゲ	根膨大部
韓国	Liriois Tuber	Liliaceae	<i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang <i>Ophiopogon japonicus</i> Ker-Gawler	根膨大部
中国(麦冬)	Ophiopogonis Radix	Liliaceae	<i>Ophiogon japonicus</i> (L. f) KerGawl.	塊根

麦門冬(ばくもんどう) Ophiopogon Tuber, Creeping Lilyturf Tuber  
 帰経:心・肺・胃, 性:微寒, 味:甘・微苦, 神農本草経:上品  
 薬能:養陰生津, 潤肺清心. 肺燥干咳, 虚癆咳嗽, 津傷口渴, 心煩失眠, 内熱消渴, 腸燥便秘, 咽白喉に應用する.  
 麦門冬含有方剂:滋陰降火湯, 滋陰至宝湯, 辛夷清肺湯, 清暑益氣湯, 清心蓮子飲, 清熱補氣湯, 清熱補血湯, 清肺湯, 竹葉石膏湯, 竹筴温胆湯, 釣藤散, 麦門冬湯, 炙甘草湯, 生脈散

薄荷

局方

日本	Menthae Herba	シソ科 Labiatae	<i>Mentha arvensis</i> Linné var. <i>piperascens</i> Malinvaud ハッカ	地上部
韓国	Menthae Herba	Labiatae	<i>Mentha arvensis</i> Linné var. <i>piperascens</i> Malinvaud ex Holmes	地上部
中国	Menthae Haplocalycis Herba	Labiatae	<i>Mentha haplocalyx</i> Briq.	地上部

薄荷(はっか) Mentha Herb  
 帰経:肺・肝, 性:涼, 味:辛  
 薬能:宣散風熱. 清頭目, 透疹. 風熱感冒, 風温初起, 頭痛, 目赤, 喉痺, 口瘡, 風疹, 麻疹, 胸脇脹悶に用いる.  
 薄荷含有方剂:加味逍遙散, 荊芥連翹湯, 滋陰至宝湯, 柴胡清肝湯, 逍遙散, 清上防風湯, 川芎茶調散, 防風通聖散, 折衝飲

半夏

局方

日本	Pinelliae Tuber	サトイモ科 Araceae	<i>Pinellia ternata</i> Breitenbach カラスビシャク	塊茎(除コルク層)
韓国	Pinelliae Tuber	Araceae	<i>Pinellia ternata</i> Breitenbach	塊茎(除周)
中国	Pinelliae Rhizoma	Araceae	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. コハク酸(C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub> ) 0.25%以上	塊茎

半夏(はんげ) Pinellia Tuber  
 帰経:脾・胃, 性:温・有毒, 味:辛, 神農本草経:下品  
 薬能:燥湿化痰, 降逆止嘔, 消痞散結. 痰多咳嗽, 痰飲眩暈, 風痰眩暈, 痰厥頭痛, 嘔吐反胃, 胸胃痞悶, 梅核気症に應用し, 癰腫痰核に外用する.  
 薬徴:痰飲, 嘔吐を主治する也. 傍ら心痛, 逆満, 咽中の痛, 咳, 悸, 腹中雷鳴を治す.  
 半夏含有方剂:温胆湯, 越婢加半夏湯, 延年半夏湯, 黄連湯, 黄芩加半夏生姜湯, 温経湯, 加味温胆湯, 解急蜀椒湯, 乾姜人參半夏丸, 甘草瀉心湯, 五積散, 厚朴生姜半夏甘草人參湯, 香砂六君子湯, 參蘇飲, 柴陷湯, 柴胡加竜骨牡蛎湯, 柴胡加芒硝湯, 柴胡桂枝湯, 柴朴湯, 柴苓湯, 柴芍六君子湯, 射干麻黄湯, 小陷胸湯, 小柴胡湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 小青竜湯, 小青竜湯加石膏, 小半夏加茯苓湯, 生姜瀉心湯, 旋覆花代赭石湯, 蘇子降気湯, 大柴胡湯, 大半夏湯, 竹葉石膏湯, 竹筴温胆湯, 釣藤散, 当帰湯, 二陳湯, 二朮湯, 麦門冬湯, 半夏厚朴湯, 半夏白朮天麻湯, 半夏瀉心湯, 附子粳米湯, 分心気飲, 変製心気飲, 抑肝散加陳皮半夏, 苓甘姜味辛夏仁湯, 六君子湯, 茯苓飲合半夏厚朴湯, 藿香正気散, 奔豚湯

百合

局方

日本	Lilii Bulbus	ユリ科 Liliaceae	<i>Lilium lancifolium</i> Thunberg オニユリ <i>Lilium brownii</i> F. E. Brown var. <i>colchesteri</i> Wilson ハカタユリ <i>Lilium brownii</i> F. E. Brown <i>Lilium pumilum</i> De Candolle	鱗片葉
韓国	Lilii Bulbus	Liliaceae	<i>Lilium lancifolium</i> Thunberg <i>Lilium brownii</i> F. E. Brown var. <i>viridulum</i> Baker <i>Lilium pumilum</i> DC.	鱗茎
中国	Lilii Bulbus	Liliaceae	<i>Lilium lancifolium</i> Thunberg <i>Lilium brownii</i> F. E. Brown var. <i>viridulum</i> Baker <i>Lilium pumilum</i> DC.	肉質鱗葉

百合(びやくごう) Lilium Bulb  
 帰経:心・肺, 性:微寒・潤, 味:甘・苦, 神農本草経:中品  
 薬能:養陰潤肺, 清心安神. 陰虚久咳, 痰中帶血, 虚煩驚悸, 失眠多夢, 精神恍惚に應用する.  
 百合含有方剂:辛夷清肺湯

白芷				局方
日本	Angelicae Dahuricae Radix	セリ科 Umbelliferae	<i>Angelica dahurica</i> Bentham et Hooker filius ex Franchet et Savatier ヨロイグサ	根
韓国	Angelicae Dahuricae Radix	Umbelliferae	<i>Angelica dahurica</i> Bentham et Hooker f. <i>Angelica dahurica</i> Bentham et Hooker f. var. <i>formosana</i> Shan et Yuan	根
中国	Angelicae Dahuricae Radix	Umbelliferae	<i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et Yuan インペラトリン(C16H14O4) 0.080%以上	根

白芷(びやくし) *Angelica Dahurica* Root  
 帰経:肺・胃, 性:温, 味:辛, 神農本草経:中品  
 薬能:散風除湿, 通竅止痛, 消腫排膿, 感冒頭痛, 眉稜骨痛, 鼻塞, 鼻淵, 歯痛, 白帶, 瘡瘍腫痛に用いる。  
 白芷含有方剤:荊芥連翹湯, 五積散, 清上防風湯, 千金内托散, 川芎茶調散, 疎経活血湯, 烏藥順氣散, 藿香正気散, 折衝飲

白朮				局方
日本	<i>Atractylodes Rhizoma</i>	キク科 Compositae	<i>Atractylodes japonica</i> Koidzumi ex Kitamura オケラ (和白朮) <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidzumi ( <i>Atractylodes ovata</i> De Candolle) オオバナオケラ (唐白朮)	根茎
韓国	<i>Atractylodes Rhizoma Alba</i>	Compositae	<i>Atractylodes japonica</i> Koidzumi <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidzumi	根茎
中国	<i>Atractylodes Macrocephalae Rhizoma</i>	Compositae	<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidzumi	根茎

白朮(びやくじゆつ) *Atractylodes Rhizome* (日本)  
 帰経:脾・胃, 性:温, 味:甘・微苦, 神農本草経:上品  
 薬能:健脾益氣, 燥湿利水, 止汗, 安胎, 脾虚食少, 腹脹泄瀉, 痰飲眩悸, 水腫, 自汗, 胎動不安に應用する。  
 薬徴:水を利するを主る也。故によく小便の自利, 不利を治し, 傍ら身の煩疼, 痰飲, 失精, 眩冒, 下痢, 喜唾を治す。  
 白朮含有方剤:越婢加朮湯, 加味帰脾湯, 帰脾湯, 玉屏風散, 芎帰調血飲第一加減, 桂枝加朮附湯, 桂枝去桂加茯苓白朮湯, 滋陰降火湯, 參苓白朮散, 清暑益氣湯, 二朮湯, 半夏白朮天麻湯, 附子湯, 分消湯, 実脾飲, 麻黄加朮湯, 枳朮湯, 薏苡仁湯, 藿香正気散

枇杷葉				局方
日本	<i>Eriobotryae Folium</i>	バラ科 Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i> Lindley ビワ	葉
韓国	<i>Eriobotryae Folium</i>	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i> Lindley	葉
中国 (枇杷葉)	<i>Eriobotryae Folium</i>	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindley オレアノール酸(C <sub>30</sub> H <sub>48</sub> O <sub>3</sub> )及びウルソール酸(C <sub>30</sub> H <sub>48</sub> O <sub>3</sub> )を合わせて0.70%以上	葉

枇杷葉(びわよう) *Loquat Leaf*  
 帰経:肺・胃, 性:平, 味:苦  
 薬能:清肺止咳, 降逆止嘔, 肺熱咳嗽, 氣逆喘急, 胃熱嘔逆, 煩熱口渴に用いる。  
 枇杷葉含有方剤:辛夷清肺湯

檳榔子				局方
日本	<i>Arecae Semen</i>	ヤシ科 Palmae	<i>Areca catechu</i> Linné ビンロウ	種子
韓国	<i>Arecae Semen</i>	Palmae	<i>Areca catechu</i> Linné	成熟種子
中国 (檳榔)	<i>Arecae Semen</i>	Palmae	<i>Areca catechu</i> Linné アレコリン(C <sub>8</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>2</sub> ) 0.20%以上	成熟種子

檳榔子(びんろうじ) *Areca Nut, Betel Nut*  
 帰経:胃・大腸, 性:温, 味:辛・苦, 神農本草経:中品  
 薬能:殺虫消積, 降気, 行水, 条虫, 蛔虫, 姜片虫病, 虫積腹痛, 積滯瀉痢, 裏急後重, 水腫脚気, マラリアに用いる。  
 檳榔子含有方剤:女神散, 変製心気飲

茯苓

局方

日本	Poria	サルノコシカケ科 Polyporaceae	<i>Wolfiporia cocos</i> Ryvarden et Gilbertson ( <i>Poria cocos</i> Wolf) マツホド	菌核
韓国	Poria Sclerotium	Polyporaceae	<i>Poria cocos</i> Wolf	菌核
中国	Poria	Polyporaceae	<i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf	菌核

茯苓(ぶくりょう) Poria Sclerotium, Indian Bread

帰経:心・肺・脾・胃・腎, 性:平, 味:甘, 神農本草経:上品

薬能:利水滲湿, 健脾寧心. 水腫尿少, 痰飲眩悸, 脾虚食少, 便溏泄瀉, 心神不安, 驚悸失眠に応用する.

薬徴:悸, 及び肉●筋惕を主治する也。傍ら小便不利, 頭眩, 煩燥を治す。

茯苓含有方剂:胃苓湯, 温胆湯, 加味温胆湯, 加味帰脾湯, 加味逍遙散, 帰脾湯, 牛車腎気丸, 啓脾湯, 桂枝加苓朮附湯, 桂枝去桂加茯苓白朮湯, 桂枝茯苓丸, 桂枝茯苓丸加薏苡仁, 五積散, 五淋散, 五苓散, 香砂六君子湯, 参蘇飲, 酸棗仁湯, 四君子湯, 四苓湯, 滋陰至宝湯, 柴胡加竜骨牡蛎湯, 柴朴湯, 柴苓湯, 柴芍六君子湯, 十全大補湯, 十味敗毒湯, 小半夏加茯苓湯, 逍遙散, 真武湯, 参苓白朮散, 人参養栄湯, 清心蓮子飲, 清熱補氣湯, 清肺湯, 疎経活血湯, 竹筴温胆湯, 猪苓湯, 猪苓湯合四物湯, 釣藤散, 当帰芍薬散, 二陳湯, 二朮湯, 八味地黄丸, 半夏厚朴湯, 半夏白朮天麻湯, 附子湯, 分消湯, 実脾飲, 分心気飲, 変製心気飲, 防己茯苓湯, 木防己去石膏加茯苓芒硝湯, 抑肝散, 抑肝散加陳皮半夏, 苓甘姜味辛夏仁湯, 苓桂甘棗湯, 苓桂味甘湯, 苓桂朮甘湯, 苓姜朮甘湯, 六君子湯, 六味丸, 茵陳五苓散, 茯苓杏仁甘草湯, 茯苓飲, 茯苓飲合半夏厚朴湯, 茯苓四逆湯, 茯苓沢瀉湯, 芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減, 藿香正気散, 補陰湯

附子 (=加工ブシ)

局方

日本	Processi Aconiti Radix	キンボウゲ科 Ranunculaceae	<i>Aconitum carmichaeli</i> Debeaux ハナトリカブト <i>Aconitum japonicum</i> Thunberg オクトリカブト ①高圧蒸気処理 総アルカロイド(ベンゾイルアコニン C <sub>32</sub> H <sub>45</sub> NO <sub>10</sub> : 603.70) 0.7~1.5% ②食塩・岩塩・塩化カルシウム水溶液に浸漬後, 加熱又は高圧蒸気処理 総アルカロイド(C <sub>32</sub> H <sub>45</sub> NO <sub>10</sub> : 603.70) 0.1~0.6% ③食塩水溶液に浸漬後, 水酸化カルシウム塗布 総アルカロイド(C <sub>32</sub> H <sub>45</sub> NO <sub>10</sub> : 603.70) 0.5~0.9%	塊根(加工)
韓国	Aconiti Lateralis Radix Preparata	Ranunculaceae	<i>Aconitum carmichaeli</i> Debeaux ①塩附子, ②製附子, ③炮附子	子根(加工)
中国	Aconiti Lateralis Radix Preparata	Ranunculaceae	<i>Aconitum carmichaeli</i> Debeaux ベンゾイルメサコニン(C <sub>31</sub> H <sub>43</sub> NO <sub>10</sub> ), ベンゾイルアコニン(C <sub>32</sub> H <sub>45</sub> NO <sub>10</sub> )及びベンゾイルヒパコニン(C <sub>31</sub> H <sub>43</sub> NO <sub>9</sub> )を合わせて0.010%以上	子根(加工)

附子(ぶし) Processed Aconite Root

帰経:心・脾・腎, 性:大熱, 有毒, 味:大辛, 神農本草経:下品

薬能:回陽救逆, 補火助陽, 逐風寒湿邪. 亡陽虚脱, 肢冷脉微, 陽萎, 宮冷, 心腹冷痛, 虚寒吐瀉, 陰寒水腫, 陽虚外感, 寒湿痺痛に応用する.

薬徴:水を逐うことを主る也。故によく悪寒, 身体四肢及び骨節の疼痛, 或いは沈重, 或いは不仁, 或いはケツ冷を治し, 而して傍ら腹痛, 失精, 下痢を治す。

附子含有方剂:黄土湯, 温脾湯, 解急蜀椒湯, 葛根加朮附湯, 甘草附子湯, 牛車腎気丸, 桂枝加附子湯, 桂枝加苓朮附湯, 桂枝加朮附湯, 桂枝芍薬知母湯, 桂枝茯苓丸, 四逆加人参湯, 四逆湯, 小続命湯, 真武湯, 大黃附子湯, 大防風湯, 通脈四逆加猪胆汁湯, 通脈四逆湯, 白通加猪胆汁湯, 白通湯, 八味地黄丸, 附子湯, 附子理中湯, 附子瀉心湯, 附子粳米湯, 麻黄附子甘草湯, 麻黄附子細辛湯, 芍甘黄辛附湯, 芍薬甘草附子湯, 茯苓四逆湯, 薏苡附子敗醬散

扁豆

局方

日本	Dolichi Semen	マメ科 Leguminosae	<i>Dolichos lablab</i> Linné フジマメ	種子
韓国 (白扁豆)	Dolichoris Semen	Leguminosae	<i>Dolichos lablab</i> Linné	成熟種子
中国 (白扁豆)	Lablab Semen Album	Leguminosae	<i>Dolichos lablab</i> Linné	成熟種子

扁豆(へんず) Dolichos Seed

帰経:脾・胃, 性:微温, 味:甘

薬能:消暑化湿, 和中健脾

扁豆含有方剂:参苓白朮散