

防已				局方
日本	<i>Sinomeni Caulis et Rhizoma</i>	ツヅラフジ科 Menispermaceae	<i>Sinomenium acutum</i> Rehder et Wilson オオツヅラフジ	つる性茎・根茎
韓国	<i>Sinomeni Caulis et Rhizoma</i>	Menispermaceae	<i>Sinomenium acutum</i> Rehder et Wilson	茎・根茎
中国	<i>Stephaniae Tetrandrae Radix</i>	Menispermaceae	<i>Stephania tetrandra</i> S. Moore テトランドリン( $C_{38}H_{42}N_2O_6$ )及びフアンギノリン( $C_{37}H_{40}N_2O_6$ )を合わせて1.6%以上	根

防已 (ぼうい) *Sinomenium Stem*

帰経:膀胱・肺, 性:寒, 味:苦・辛, 神農本草經:中品

薬能:去風湿, 通經絡, 利小便. 風濕痺痛, 関節腫脹, 麻痺そう痒に用いる.

薬徴:水を治することを主る也。

防已含有方剤:疎経活血湯, 増損木防已湯, 防已茯苓湯, 防已黃耆湯, 木防已去石膏加茯苓芒硝湯, 木防已湯

茅根				局方
日本	<i>Imperatae Rhizoma</i>	イネ科 Gramineae	<i>Imperata cylindrica</i> Beauvois チガヤ	根茎(除細根・除鱗片)
韓国	<i>Imperatae Rhizoma</i>	Gramineae	<i>Imperata cylindrica</i> Beauvois var. <i>koenigii</i> Durand et Schinz ex A. Camus	根茎(除細根・除鱗片)
中国 (白茅根)	<i>Imperatae Rhizoma</i>	Gramineae	<i>Imperata cylindrica</i> Beauv. var. <i>maior</i> (Nees) C.E. Hubb.	根茎

茅根 (ぼうこん) *Imperata Rhizome*

帰経:肺・胃, 性:寒, 味:甘, 神農本草經:中品

薬能:清熱生津, 涼血止血

茅根含有方剤:茅根湯

芒硝				局方
日本	<i>Natrii Sulfus</i>		硫酸ナトリウム	鉱物
韓国	<i>Natrii Sulfas</i>		硫酸塩鉱物 硫酸ナトリウム( $Na_2SO_4$ : 142.04)を99.0%以上	鉱物
中国	<i>Natrii Sulfas</i>		硫酸塩類鉱物芒硝族芒硝(主に含水硫酸ナトリウム( $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ )を含む)(結晶体)	鉱物

芒硝 (ぼうしょう) *Sodium Sulfate Decahydrate*

帰経:胃・大腸・三焦, 性:寒, 味:鹹・苦

薬能:瀉熱通便, 潤燥軟堅, 清火消腫. 実熱便秘, 大便燥結, 積滯腹痛, 腸癰腫痛に応用し, 乳癰, 痔瘡腫痛に外用する.

薬徴:堅をやわらぐことを主る也。

芒硝含有方剤:橘皮大黃朴硝湯, 柴胡加芒硝湯, 大黃牡丹皮湯, 大承氣湯, 調胃承氣湯, 通導散, 桃核承氣湯, 防風通聖散, 木防已去石膏加茯苓芒硝湯

防風				局方
日本	<i>Saposhnikoviae Radix</i>	セリ科 Umbelliferae	<i>Saposhnikovia divaricata</i> Schischkin ボウフウ	根・根茎
韓国	<i>Saposhnikoviae Radix</i>	Umbelliferae	<i>Saposhnikovia divaricata</i> Schischkin	根
中国	<i>Saposhnikoviae Radix</i>	Umbelliferae	<i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischkin prim-O-グルコシルシミフギン( $C_{22}H_{28}O_{11}$ )及び4'-O-グルコシル-5-O-メチルビサミノール( $C_{22}H_{28}O_{10}$ )を合わせて0.24%以上	根

防風 (ぼうふう) *Saposhnikovia Root*

帰経:膀胱・肝・脾, 性:微温, 味:辛・甘, 神農本草經:上品

薬能:解表去風, 勝湿, 止痙. 感冒頭痛, 風濕痺痛, 風疹そう痒, 破傷風に用いる.

防風含有方剤:桂枝芍藥知母湯, 荆芥連翹湯, 玉屏風散, 治頭瘡一方, 十味敗毒湯, 小繞命湯, 消風散, 清上防風湯, 千金內托散, 川芎茶調散, 疏經活血湯, 大防風湯, 釣藤散, 当帰飲子, 防風通聖散, 立効散, 折衝飲

炮附子				(局方中 附子 1)
日本	<i>Aconiti Rhizoma</i>	キンポウゲ科 Ranunculaceae	<i>Aconitum carmichaeli</i> Debeaux カラトリカブト	側根
韓国	記載なし			
中国	記載なし			

炮附子 (ぼうぶし) Processed aconite root

帰経:心・脾・腎, 性:大熱, 有毒, 味:大辛, 神農本草經:下品

薬能:回陽救逆, 補火助陽, 逐風寒湿邪. 亡陽虚脱, 肢冷脉微, 陽萎, 宮冷, 心腹冷痛, 虚寒吐瀉, 陰寒水腫, 陽虛外感, 寒湿痺痛に応用する.

薬徴:(附子)水を逐うことを主る也。故によく悪寒, 身体四肢及び骨筋の疼痛, 或いは沈重, 或いは不仁, 或いはケツ冷を治し, 而して傍ら腹痛, 失精, 下痢を治す。

樺樹				局方
日本	Quercus Cortex	ブナ科 Fagaceae	<i>Quercus acutissima</i> Carruthers クヌギ <i>Quercus serrata</i> Murray コナラ <i>Quercus mongolica</i> var. <i>crispula</i> ミズナラ <i>Quercus variabilis</i> Blume アベマキ	樹皮
韓国	記載なし			
中国	記載なし			

樺樹(ぼくそく) Quercus Bark

帰経: 性:平, 味:辛

薬能:收斂, 止痢, 破瘀血

樺樹含有方剤: 治打撲一方

牡丹皮				局方
日本	Moutan Cortex	ボタン科 Paeoniaceae	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews ( <i>Paeonia moutan</i> Sims) ボタン ペオノール 1.0%以上	根皮
韓国	Moutan Cortex	Paeoniaceae	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews ペオノール( $C_9H_{10}O_3$ ;166.17) 1.0%以上	根皮
中国	Moutan Cortex	Ranunculaceae	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. ペオノール( $C_9H_{10}O_3$ ) 1.2%以上	根皮

牡丹皮(ぼたんび) Moutan Bark, Tree Peony Bark

帰経:心・肝・腎, 性:微寒, 味:苦・辛, 神農本草經:中品

薬能:清熱涼血, 活血化瘀, 温毒癰斑, 吐血衄血, 夜熱早涼, 無汗骨蒸, 経閉痛経, 癰腫瘍毒, 打撲傷痛に応用する。

牡丹皮含有方剤: 温経湯, 加味逍遙散, 牛車腎氣丸, 桂枝茯苓丸, 桂枝茯苓丸加薏苡仁, 逍遙散, 清熱補血湯, 大黃牡丹皮湯, 腸癰湯, 八味地黃丸, 六味丸, 萱帰調血飲, 萱帰調血飲第一加減

牡蛎				局方
日本	Ostreae Testa	イタボガキ科 Ostreidae	<i>Ostrea gigas</i> Thunberg カキ	貝殻
韓国	Ostreae Testa	Ostreidae	<i>Ostrea gigas</i> Thunberg <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse <i>Ostrea rivularis</i> Gould	貝殻
中国	Ostreae Concha	Ostreidae	<i>Ostrea gigas</i> Thunberg <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse <i>Ostrea rivularis</i> Gould 炭酸カルシウム( $CaCO_3$ ) 94.0%以上	貝殻

牡蛎(ぼれい) Oyster Shell

帰経:肝・胆・腎, 性:微寒, 味:鹹・淡, 神農本草經:上品

薬能:重鎮安神, 潛陽補陰, 軟堅散結, 収斂固淡, 驚悸失眠, 眩暈耳鳴, 瘰癧痰核, 癰瘕痞塊, 自汗盜汗, 遺精崩帶, 胃痛吞酸に用いられる。

薬徴:胸腹の動を主治する也。傍ら驚狂, 煩躁を治す。

牡蛎含有方剤: 安中散, 桂枝加竜骨牡蠣湯, 桂枝甘草龍骨牡蠣湯, 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯, 柴胡加竜骨牡蠣湯, 柴胡桂枝乾姜湯

麻黄				局方
日本	Ephedrae Herba	マオウ科 Ephedraceae	<i>Ephedra sinica</i> Stapf シナマオウ <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Meyer <i>Ephedra equisetina</i> Bunge 総アルカロイド(エフェドリン( $C_{10}H_{15}NO$ : 165.23)及びプソイドエフェドリン( $C_{10}H_{15}NO$ : 165.23) 0.7%以上	地上茎
韓国	Ephedrae Herba	Ephedraceae	<i>Ephedra sinica</i> Stapf <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Meyer <i>Ephedra equisetina</i> Bunge 総アルカロイド(エフェドリン( $C_{10}H_{15}NO$ : 165.23)及びプソイドエフェドリン( $C_{10}H_{15}NO$ : 165.23))として0.7%以上	緑色若枝
中国	Ephedrae Herba	Ephedraceae	<i>Ephedra sinica</i> Stapf <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Meyer <i>Ephedra equisetina</i> Bunge 塩酸エフェドリン( $C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$ )及び塩酸プソイドエフェドリン( $C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$ )を合わせて0.80%以上	草質茎

麻黄 (まおう) Ephedra Herb, Ephedra, Joint fir

帰経: 肺・膀胱, 性: 温, 味: 辛・微苦, 神農本草經: 中品

薬能: 発汗散寒, 宣肺平喘, 利水消腫. 風寒感冒, 胸悶喘咳, 風水浮腫, 気管支哮喘に応用する.

薬徴: 咳, 水気, を主治する也. 傍ら悪風, 悪寒, 無汗, 身疼, 骨折痛, 一身黃腫を治す.

麻黄含有方剤: 烏頭湯, 越婢加半夏湯, 越婢加朮湯, 越婢湯, 葛根加朮附湯, 葛根湯, 葛根湯加川芎辛夷, 甘草麻黄湯, 桂枝二越婢一湯, 桂枝麻黄各半湯, 桂枝芍藥知母湯, 桂姜棗草黃附湯, 五虎湯, 五積散, 射干麻黃湯, 小青竜湯, 小青竜湯加石膏, 小繞命湯, 神秘湯, 繩命湯, 大青竜湯, 烏藥順氣散, 防風通聖散, 麻杏甘石湯, 麻杏薏甘湯, 麻黃加朮湯, 麻黃湯, 麻黃附子甘草湯, 麻黃附子細辛湯, 麻黃連翫赤小豆湯, 薏苡仁湯

麻子仁 (=火麻仁)

麻子仁 (=火麻仁)				局方
日本	Cannabis Fructus	アサ科 Cannabinaceae	<i>Cannabis sativa</i> Linné アサ	果実
韓国 (麻仁)	Cannabis Semen	Cannabinaceae	<i>Cannabis sativa</i> Linné	種子
中国 (火麻仁)	Cannabis Semen	Moraceae	<i>Cannabis sativa</i> Linné	種子

麻子仁 (ましにん) Hemp Seed, Cannabis Seed

帰経: 脾・胃・大腸, 性: 平, 味: 甘, 神農本草經: 上品

薬能: 潤燥滑腸通便. 血虛津虧, 腸燥便秘に用いる.

麻子仁含有方剤: 潤腸湯, 麻子仁丸, 炙甘草湯

蔓荊子

蔓荊子				局方外
日本	Viticis Fructus	クマツヅラ科 Verbenaceae	<i>Vitex rotundifolia</i> Linné fil. ハマゴウ <i>Vitex trifolia</i> Linné ミツバハマゴウ	果実
韓国	Viticis Fructus	Verbenaceae	<i>Vitex rotundifolia</i> Linné fil. <i>Vitex trifolia</i> Linné	成熟果実
中国	Viticis Fructus	Verbenaceae	<i>Vitex trifolia</i> Linné var. <i>simplicifolia</i> Cham. カスチシン( $C_{19}H_{18}O_8$ )を0.03%以上	果実

蔓荊子 (まんけいし) Vitex Fruit

帰経: 肝・膀胱・肺, 性: 微寒, 味: 苦・辛, 神農本草經: 上品

薬能: 疏散風熱, 清利頭目. 風熱感冒頭痛, 酸の腫れ・痛み, 目赤多涙, 目暗不明, 頭暈目眩に用いる.

蔓荊子含有方剤: 益氣聰明湯

木通

木通				局方
日本	Akebiae Caulis	アケビ科 Lardizabalaceae	<i>Akebia quinata</i> Decaisne アケビ <i>Akebia trifoliata</i> Koidzumi ミツバアケビ	蔓性茎
韓国	Akebiae Caulis	Lardizabalaceae	<i>Akebia quinata</i> Decaisne	木質茎
中国	Akebiae Caulis	Lardizabalaceae	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne. <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd. カルセオラリオシドB( $C_{15}H_{10}O_6$ )を0.20%以上	藤茎

木通 (もくつう) Akebia Stem

帰経: 心・肺・小腸・膀胱, 性: 寒, 味: 苦, 神農本草經: 中品

薬能: 利水通淋, 滌心火, 通血脉, 通乳. 淋病, 口舌生瘡, 痛痛, 產後乳少に用いる.

木通含有方剤: 五淋散, 消風散, 通導散, 当帰四逆加吳茱萸生姜湯, 当帰四逆湯, 分心氣飲, 變製心氣飲, 竜胆瀉肝湯

木瓜				局方外
日本	Chaenomelis Fructus	バラ科 Rosaceae	<i>Chaenomeles sinensis</i> Koehne カリン	偽果
韓国	Chaenomelis Fructus	Rosaceae	<i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne	成熟果実
中国	Chaenomelis Fructus	Rosaceae	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai オレアノール酸( $C_{30}H_{48}O_3$ )及びウルソール酸( $C_{30}H_{48}O_3$ )を合わせて0.50%以上	成熟果実

木瓜 (もつか) Chaenomeles fruit, Chinese quince fruit

帰經:肝・脾, 性:温, 味:酸

藥能:平肝舒筋, 和胃化湿. 湿痺拘攣, 腰膝關節酸重疼痛, 吐瀉転筋, 脚氣水腫に用いる.

木瓜含有方剤:加減胃苓湯

木香				局方
日本	Saussureae Radix	キク科 Compositae	<i>Saussurea lappa</i> Clarke インドモッコウ	根
韓国	Aucklandiae	Compositae	<i>Aucklandia lappa</i> Decne.	根
中国	Aucklandiae Radix	Compositae	<i>Aucklandia lappa</i> Decne. コスツノリド( $C_{15}H_{20}O_2$ )及びデヒドロコスツスラクトン( $C_{15}H_{18}O_2$ )を1.8%以	根

木香 (もっこう) Saussurea Root

帰經:脾・大腸, 性:温, 味:辛・苦, 神農本草經:上品

藥能:行氣止痛, 健脾消食. 胸胃脹痛, 瘓癧後重, 食積不消, 不思飲食に用いる.

木香含有方剤:加味帰脾湯, 歸脾湯, 九味欖榔湯, 參蘇飲, 女神散, 分消湯, 實脾飲, 芎歸調血飲第一加減

益智				局方
日本	Alpiniae Fructus	ショウガ科 Zingiberaceae	<i>Alpinia oxyphylla</i> Miquel	果実
韓国	Alpiniae Oxyphyllae Fructus	Zingiberaceae	<i>Alpinia oxyphylla</i> Miquel	果実
中国	Alpiniae Oxyphyllae Fructus	Zingiberaceae	<i>Alpinia oxyphylla</i> Miquel	成熟果実

益智 (やくち) Bitter Cardamon

帰經:脾・腎, 性:温, 味:辛, 神農本草經:

藥能:溫脾開胃, 溫腎固精縮尿

益智含有方剤:益智飲

益母草				局方
日本	Leonuri Herba	シソ科 Labiatae	<i>Leonurus japonicus</i> Houttuyn メハジキ <i>Leonurus sibiricus</i> Linné	花期地上部
韓国	Leonuri Herba	Labiatae	<i>Leonurus japonicus</i> Houttuyn	開花前・開花期地上部
中国	Leonuri Herba	Labiatae	<i>Leonurus heterophyllus</i> Sweet 塩酸スタキドリン( $C_7H_{13}NO_2 \cdot HCl$ )を0.50%以上, レオヌリン( $C_{14}H_{21}O_5N_3 \cdot HCl$ )を0.050%以上	地上部

益母草 (やくもそう) Leonurus Herb

帰經:心・肝, 性:微寒, 味:辛・微苦, 神農本草經:上品

藥能:活血調經, 利尿消腫. 月經不調; 痛經, 経閉, 惡露不尽, 水腫尿少, 急性腎炎の水腫に用いる.

益母草含有方剤:芎歸調血飲, 芎歸調血飲第一加減

## 薏苡仁

局方

日本	Coicis Semen	イネ科 Gramineae	<i>Coix lacryma-jobi</i> Linné var. <i>ma-yuen</i> Stapf ハトムギ	種子(除種皮)
韓国	Coicis Semen	Gramineae	<i>Coix lacryma-jobi</i> Linné var. <i>ma-yuen</i> Stapf	成熟種子(除種皮)
中国	Coicis Semen	Gramineae	<i>Coix lacryma-jobi</i> Linné var. <i>ma-yuan</i> (Romen.) Stapf トリオレイン( $C_{57}H_{104}O_6$ )を0.50%以上	成熟種子

薏苡仁(よくいにん) Coix Seed

帰経:脾・胃・肺, 性:微寒, 味:甘・淡, 神農本草經:上品

薬能:健脾滲湿, 除痺止瀉, 清熱排膿. 水腫, 脚氣, 小便不利, 湿痺拘攣, 脾虛泄瀉, 肺癰, 腸癰, 扁平疣に用いる.

薬徵:浮腫を主治する也。

薏苡仁含有方剤:桂枝茯苓丸加薏苡仁, 参苓白朮散, 腸癰湯, 麻杏薏甘湯, 薏苡仁湯, 薏苡附子敗醤散

## 龍眼肉

局方

日本	Longan Arillus	ムクロジ科 Sapindaceae	<i>Euphoria longana</i> Lamarck リュウガン	仮種皮
韓国	Longan Arillus	Sapindaceae	<i>Dimocarpus longan</i> Loureiro	仮種皮(果肉)
中国	Longan Arillus	Sapindaceae	<i>Dimocarpus longan</i> Loureiro	仮種皮

龍眼肉(りゅうがんにく) Longan Aril

帰経:心・脾, 性:温, 味:甘, 神農本草經:上品

薬能:補益心脾, 養血安神. 気血不足, 心悸, 一種のノイローゼ, 健忘失眠, 血虛萎黃に用いる.

龍眼肉含有方剤:加味帰脾湯, 歸脾湯

## 龍骨

局方

日本	Fossilia Ossis Mastodi		大型哺乳動物の化石化した骨(主に炭酸カルシウム)	
韓国	Fossilia Ossis Mastodi		大型哺乳動物の化石化した骨(主に炭酸カルシウム)	
中国	Fossilia Ossis Mastodi		象・犀・三趾馬等の哺乳動物の化石化した骨	

龍骨(りゅうこつ) Longgu

帰経:心・肝・腎, 性:平, 味:甘・淡, 神農本草經:上品

薬能:平肝潜陽, 鎮静安神, 収斂固渙. 肝陰不足, 虛陽浮越, 神志不安, 驚癇, 癲狂, 遺精, 带下, 虚汗, 崩漏, 久瀉久痢, 吐血, 便血に用いる.

薬徵:臍下の動を主治する也。傍ら煩驚, 失精を治す。

龍骨含有方剤:桂枝加龍骨牡蠣湯, 桂枝甘草龍骨牡蠣湯, 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯, 柴胡加龍骨牡蠣湯

## 龍胆

局方

日本	Gentianae Scabrae Radix	リンドウ科 Gentianaceae	<i>Gentiana scabra</i> Bunge トウリンドウ <i>Gentiana mansurica</i> Kitagawa <i>Gentiana triflora</i> Pallas	根・根茎
韓国 (草龍膽)	Gentianae scabrae Radix et Rhizoma	Gentianaceae	<i>Gentiana scabra</i> Bunge <i>Gentiana triflora</i> Pallas <i>Gentiana mansurica</i> Kitagawa	根・根茎
中国	Gentianae Radix et Rhizoma	Gentianaceae	<i>Gentiana mansurica</i> Kitag. <i>Gentiana scabra</i> Bge. <i>Gentiana triflora</i> Pall. <i>Gentiana rigescens</i> Franch ゲンチオピクロシド( $C_{16}H_{20}O_9$ )を3.0%以上	根・根茎

龍胆(りゅうたん) Japanese Gentian

帰経:肝・胆のう, 性:寒, 味:苦, 神農本草經:上品

薬能:清熱燥湿, 滌肝胆火. 湿熱黃疸, 陰腫陰痒, 带下, 強中, 湿疹搔痒, 目赤, 耳聾, 脇痛, 口苦, 驚風, 筋肉のひきつりに用いる.

龍胆含有方剤:疎經活血湯, 立効散, 龍胆瀉肝湯

## 良姜

局方

日本	Alpiniae Officinari	ショウガ科 Zingiberaceae	<i>Alpinia officinarum</i> Hance リョウキョウ	根茎
韓国 (高良姜)	Alpiniae Officinari	Zingiberaceae	<i>Alpinia officinarum</i> Hance	根茎
中国 (高良姜)	Alpiniae Officinarum Rhizoma	Zingiberaceae	<i>Alpinia officinarum</i> Hance ガランギン( $C_{15}H_{10}O_5$ )を0.70%以上	根茎

良姜(りょうきょう) Alpinia Rhizome

帰経:脾・胃, 性:熱, 味:辛

薬能:温胃散寒, 消食止痛. 腹(胃)冷痛, 胃寒嘔吐, げっぷに用いる.

良姜含有方剤:安中散

連翹				局方
日本	Forsythiae Fructus	モクセイ科 Oleaceae	<i>Forsythia suspensa</i> Vahl レンギョウ <i>Forsythia viridissima</i> Lindley シナレンギョウ	果実
韓国	Forsythiae Fructus	Oleaceae	<i>Forsythia viridissima</i> Lindley <i>Forsythia suspensa</i> Vahl	果実 (未成熟=青 翹, 正成熟=老 翹)
中国	Forsythiae Fructus	Oleaceae	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl フィリリン( $C_{27}H_{34}O_{11}$ )を0.15%以上, ホルシチアンド( $C_{29}H_{36}O_{15}$ )を0.25%	果実

連翹(れんぎょう) *Forsythia* Fruit, Weeping Golden Bell

帰經:心・胆, 性:微寒, 味:苦, 神農本草經:下品

藥能:清熱解毒, 消腫散結, 癰疽, 瘰癧, 乳癰, 丹毒, 風熱感冒, 温病初起, 温熱入營, 高熱煩渴, 神昏發斑, 热淋尿閉に用いる.

連翹含有方剤:荊芥連翹湯, 治頭瘡一方, 柴胡清肝湯, 清上防風湯, 防風通聖散, 麻黃連轺赤小豆湯

蓮肉				局方
日本	Nelumbis Semen	スイレン科 Nymphaeaceae	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertner ハス	内果皮付着 種子
韓国 (蓮子肉)	Nelumbis Semen	Nymphaeaceae	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertner	種子(除種)
中国 (蓮子)	Nelumbis Semen	Nymphaeaceae	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertner	成熟種子

蓮肉(れんにく) *Nelumbo* Seed

帰經:脾・胃, 性:平, 味:甘, 神農本草經:上品

藥能:補脾止瀉, 益腎消精, 養心安神. 脾虛久瀉, 遺精帶下, 心悸失眠に用いる.

蓮肉含有方剤:啓脾湯, 參苓白朮散, 清心蓮子飲

## 非頻用生薬

甘茶

局方

日本	Hydrangeae Dulcis Folium	Saxifragaceae	<i>Hydrangea macrophylla</i> Seringe var. <i>thunbergii</i> Makino アマチャヤ	葉・枝先
韓国	Hydrangeae Folium Dulcis	Saxifragaceae	<i>Hydrangea macrophylla</i> Seringe var. <i>thunbergii</i> Makino	葉・枝先
中国	記載なし			

アロエ (=ロカイ)

局方

日本	Aloe	Liliaceae	<i>Aloe ferox</i> Miller <i>Aloe ferox</i> Millerと <i>Aloe africana</i> Millerの雑種 <i>Aloe ferox</i> Millerと <i>Aloe spicata</i> Bakerの雑種	
韓国	Aloe	Liliaceae	<i>Aloe ferox</i> Miller <i>Aloe africana</i> Miller <i>Aloe spicata</i> Baker その雑種	
中国	Aloe	Liliaceae	<i>Aloe barbadensis</i> Miller アロインA(バルバロイン $C_{21}H_{22}O_9$ ) 18.0%以上を含む	

安息香

局方

日本	Benzoinum	Styracaceae	<i>Styrax benzoin</i> Dryander 同属植物	樹脂
韓国	Benzoinum	Styracaceae	<i>Styrax benzoin</i> Dryander 同属植物	樹脂
中国	Benzoinum	Styracaceae	<i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib ex Hart.	樹脂

首実

局方

日本	Rosae Fructus	Rosaceae	<i>Rosa multiflora</i> Thunberg ノイバラ	偽果・果実
韓国	Rosae Fructus	Rosaceae	<i>Rosa multiflora</i> Thunberg	果実
中国 (金櫻子)	Rosae Laevigatae Fructus	Rosaceae	<i>Rosa laevigata</i> Michx.	成熟果実

槐花

局方外

日本	Sophorae Flos	Leguminosae	<i>Sophora japonica</i> Linné エンジュ	花蕾
韓国	Sophorae Flos	Leguminosae	<i>Sophora japonica</i> Linné	花蕾
中国	Sophorae Flos	Leguminosae	<i>Sophora japonica</i> Linné フラバノン(ルチン( $C_{27}H_{30}O_16$ )を含む) 8.0%以上	花・花蕾

吉草根

局方

日本	Valerianae Radix	Valerianaceae	<i>Valeriana fauriei</i> Briquet カノコソウ	根・根茎
韓国	Valerianae Radix	Valerianaceae	<i>Valeriana fauriei</i> Briquet 同属近縁植物	根・根茎
中国 (蜘蛛香)	Valerianae Jatamansi Rhizoma et Radix	Valerianaceae	<i>Valeriana jatamansi</i> Jones	根・根茎

カミツレ

局方

日本	Chamomillae	Compositae	<i>Matricaria Chamomilla</i> Linné カミツレ	頭花
韓国	記載なし			
中国	記載なし			

寒天

局方

日本	Agar	Gelidiaceae Rhodophyta	<i>Gelidium elegans</i> Kuetzing マクサ(テングサ) 同属植物 諸種紅藻類	粘液(凍結乾燥)
韓国	Agar	Gelidiaceae Rhodophyta	<i>Gelidium amansii</i> Lamouroux 同属植物 諸種紅藻類	粘液(凍結乾燥)
中国	記載なし			

欬冬花 (=款冬花)

日本	Farfarae Flos	Compositae	<i>Tussilago farfara</i> フキタンポポ	花蕾
韓国	Farfarae Flos	Compositae	<i>Tussilago farfara</i> Linné	花蕾
中国	Farfarae Flos	Compositae	<i>Tussilago farfara</i> Linné ツシラゴン( $C_{23}H_{34}O_5$ ) 0.070%以上	花蕾

## 銀杏葉

日本	Ginkgo Folium	イチョウ科 Ginkgoaceae	<i>Ginkgo biloba</i> Linné イチョウ	葉
韓国	Ginkgo Folium	Ginkgoaceae	<i>Ginkgo biloba</i> Linné	葉
中国	Ginkgo Folium	Ginkgoaceae	<i>Ginkgo biloba</i> Linné フラボノールグリコシド 0.04%以上 テルペノラクトン(ジンコライドA, B, C及びビロバリド) 0.25%以上	葉

## 枸杞葉

局方外

日本	Lycii Folium	Solanaceae	<i>Lycium chinensis</i> Mill. クコ	葉
韓国	記載なし			
中国	記載なし			

## 玄草 (=ゲンノショウコ)

局方

日本	Geranii Herba	Gentianaceae	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold et Zuccarini ゲンノショウコ	地上部
韓国	Geranii Herba	Gentianaceae	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold et Zuccarini 同属近縁植物	花期地上部
中国 (老鶴草)	Geranii Herba	Gentianaceae	<i>Erodium stephanianum</i> Willd. <i>Geranium wilfordii</i> Maxim. <i>Geranium carolinianum</i> L.	地上部

## 牛黃

局方

日本	Bezoar Bovis	Bovidae	<i>Bos taurus</i> Linne var. <i>domesticus</i> Gmelin ウシ	胆囊結石
韓国	Bovis Calculus	Bovidae	<i>Bos taurus</i> Linne var. <i>domesticus</i> Gmelin 胆汁酸・結合型ビリルビン( $C_{33}H_{36}N_4O_6$ :584.65) 20.0%以上	胆囊結石
中国	Bovis Calculus	Bovidae	<i>Bos taurus domesticus</i> Gmelin 胆汁酸( $C_{24}H_{40}O_5$ :584.65) 4.0%以上 結合型ビリルビン( $C_{33}H_{36}N_4O_6$ ) 35.0%以上	胆囊結石

## 五加皮

日本	Acanthopanax Cortex	ウコギ科 Araliaceae	<i>Acanthopanax gracilistylus</i> W. W. Smith ウコギ	根皮
韓国	Acanthopanax Cortex	Araliaceae	<i>Acanthopanax sessiliflorum</i> Seeman 同属植物	根皮・幹皮
中国	Acanthopanax Cortex	Araliaceae	<i>Acanthopanax gracilistylus</i> W. W. Smith	根皮

## 藁本

局方外

日本	Ligustici Rhizoma	Umbeliferae	<i>Ligusticum sinensis</i> Oliver 近縁植物	根・根茎
韓国	Angelicae Tenuissimae Radix	Umbeliferae	<i>Angelica tenuissima</i> Nakai (= <i>Ligusticum tenuissimum</i> Kitagawa) <i>Ligusticum sinense</i> Oliv. <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitagawa	根・根茎
中国	Ligustici Rhizoma et Radix	Umbeliferae	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv. <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitagawa	根・根茎

## 山豆根

局方外

日本	Sophorae Subprostratae Radix	Leguminosae	<i>Sophora subprostrata</i> Chun et T. Chen	根・根茎
韓国	Sophorae Tonkinensis	Leguminosae	<i>Sophora tonkinensis</i> Gapnep	根・根茎
中国	Sophorae Tonkinensis Radix et Rhizoma		<i>Sophora tonkinensis</i> Gagnep	根・根茎

## 刺五加

局方

日本	Eleutherococci Senticosi	Araliaceae	<i>Eleutherococcus senticosus</i> Maximowicz ( <i>Acanthopanax senticosus</i> (Ruprecht et Maximowicz) Harms) エゾウコギ	根茎
韓国	Acanthopanax Senticosi Radix et Rhizoma	Araliaceae	<i>Acanthopanax senticosus</i> Harms	根・根茎
中国	Acanthopanax Senticosi Radix et Rhizoma Seu Caulis	Araliaceae	<i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. Et Maxim.) Harms シリンギン( $C_{17}H_{24}O_9$ ) 0.050%以上	根・根茎

## 蛇床子

局方

日本	Cnidii Monnieris Fructus	セリ科 Umbelliferae	<i>Cnidium monnierii</i> Cusson	果実
韓国	Cnidi Fructus	Umbelliferae	<i>Cnidium monnierii</i> (L.) Cuss <i>Torilis japonica</i> Decandolle	果実
中国	Cnidi Fructus	Umbelliferae	<i>Cnidium monnierii</i> (L.) Cuss	成熟果実

## 沙参

局方外

日本	Adenophorae Radix	Campanulaceae	<i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunberg) Fischer セイヨウシャジン <i>Adenophora stricta</i> Miquel <i>Adenophora triphylla</i> A. DC. subsp. <i>aperticampanulata</i> Kitamura	根
韓国	Adenophorae Radix	Campanulaceae	<i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i> Hara	根
中国	Adenophorae Radix	Campanulaceae	<i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunberg) Fischer <i>Adenophora stricta</i> Miquel	根

## 車前草

局方外

日本	Plantaginis Herba	才オバコ科 Plantaginaceae	<i>Plantago asiatica</i> Linné 才オバコ	全草(花期)
韓国	Plantaginis Herba	Plantaginaceae	<i>Plantago asiatica</i> Linné	全草
中国	Plantaginis Herba	Plantaginaceae	<i>Plantago asiatica</i> Linné <i>Plantago depressa</i> Willd. プランタマジヨシド( $C_{29}H_{36}O_{16}$ ) 0.10%以上	全草

## 小豆蔻

局方

日本	Cardamomi Fructus	Zingiberaceae	<i>Elettaria cardamomum</i> Maton	果実
韓国	Amomi Fructus Rotundus	Zingiberaceae	<i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep. <i>Amomum compactum</i> Solander ex Maton	果実
中国	Amomi Fructus Rotundus	Zingiberaceae	<i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep. <i>Amomum compactum</i> Solander ex Maton シネオール( $C_{10}H_{18}O$ ) 3.0%以上	成熟果実

## 地竜

局方

日本	Lumbricus	Megascolecidae	<i>Pheretima aspergillum</i> Perrier 近縁動物	内部を除いたもの
韓国	Lumbricus	Lumbricidae Megascolecidae	<i>Pericaeta communis</i> Gate et Hatai <i>Allolobophora caliginosa</i> var. <i>trapezoides</i> Anton <i>Pheretima aspergillum</i> E. Perrier	全体
中国	Pheretima	Megascolecidae	<i>Pheretima aspergillum</i> (E. Perrier) <i>Pheretima vulgaris</i> Che <i>Pheretima guillelmi</i> Michaelsen <i>Pheretima pectinifera</i> Michaelsen	全体

## 石菖根

局方外

日本	Acori Gramineri Rhizoma	Araceae	<i>Acorus gramineus</i> Solander セキショウ	根茎
韓国 (石菖蒲)	Acori Gramineri Rhizoma	Araceae	<i>Acorus gramineus</i> Solander	根茎
中国	Acori Tararinowii Rhizoma	Araceae	<i>Acorus tararinowii</i> Schott	根茎

## 蟾酥

局方

日本	Bufonis Venenum	Bufonidae	<i>Bufo bufo gargarizans</i> Cantor <i>Bufo melanostictus</i> Schneider プロステロイド 5.8%以上	毒腺分泌物
韓国	Bufonis Venenum	Bufonidae	<i>Bufo bufo gargarizans</i> Cantor <i>Bufo melanostictus</i> Schneider プロステロイド 5.8%以上	毒腺分泌物
中国	Bufonis Venenum	Bufonidae	<i>Bufo bufo gargarizans</i> Cantor <i>Bufo melanostictus</i> Schneider シノブファギン( $C_{26}H_{34}O_6$ )及びレシブホゲニン( $C_{24}H_{32}O_4$ ) 6.0%以上	毒腺分泌物

## センナ

局方

日本	Sennae Folium	Leguminosae	<i>Cassia angustifolia</i> Vahl チンネベリーセンナ <i>Cassia acutifolia</i> Delile アレキサンドリアセンナ	小葉
韓国	Sennae Folium	Leguminosae	<i>Cassia angustifolia</i> Vahl <i>Cassia acutifolia</i> Delile	小葉
中国 (番瀉葉)	Sennae Folium	Leguminosae	<i>Cassia angustifolia</i> Vahl <i>Cassia acutifolia</i> Delile	小葉

## センナ実

局方外

日本	Sennae Fructus	Leguminosae	<i>Cassia angustifolia</i> Vahl <i>Cassia acutifolia</i> Delile 総アントラキノン配糖体(センノシドA( $C_{42}H_{38}O_{20}$ ) : 862.75) 2.2%以上	果実
韓国	記載なし			
中国	記載なし			

## 草豆蔻

日本	Alpiniae Katsumadaii Semen	Zingiberaceae	<i>Alpinia katsumadai</i> Hayata	成熟種子塊
韓国	Alpiniae Katsumadaii Semen	Zingiberaceae	<i>Alpinia katsumadai</i> Hayata	種子(除皮)
中国	Alpiniae Katsumadaii Semen	Zingiberaceae	<i>Alpinia katsumadai</i> Hayata アルピネチン( $C_{16}H_{14}O_4$ )、ピノセンブリン( $C_{15}H_{12}O_4$ )及びカルダモニン( $C_{16}H_{14}O_4$ ) 1.35%以上 アルヌストン( $C_{19}H_{18}O$ ) 0.50%以上	成熟種子(除皮)

## 葱白

日本	Allii Radix	Liliaceae	<i>Allium fistulosum</i> Linné	偽莖
韓国	Allii Radix	Liliaceae	<i>Allium fistulosum</i> Linné	鱗莖(新鮮)
中国	Bulbus Allii Fistulosi	Liliaceae	<i>Allium fistulosum</i> Linné	鱗莖

## 澤蘭

日本	Lycopi Herba	シソ科 Labiatae	<i>Lycopus lucidus</i> Turczaininov シロネ	全草
韓国	Lycopi Herba	Labiatae	<i>Lycopus lucidus</i> Turczaininov	開花前地上
中国	Lycopi Herba	Labiatae	<i>Lycopus lucidus</i> Turczaininov var. <i>hirtus</i> Regel	地上部

## タラ根皮

日本	Araliae Cortex	Araliaceae	<i>Aralia elata</i> Seemann	根皮
韓国	Araliae Cortex Lignum seu Radicis	Araliaceae	<i>Aralia elata</i> Seemann	総木皮
中国	記載なし			

## 丹参

日本	Salviae Miltiorrhizae	Labiatae	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge	根
韓国	Salviae Miltiorrhizae	Labiatae	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge	根
中国	Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma	Labiatae	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge タンシノンⅡA( $C_{19}H_{18}O_3$ ) 0.20%以上 サルビアノール酸B( $C_{36}H_{30}O_{16}$ ) 3.0%以上	根・根茎

## 燈心草

日本	Junci Caulis Medulla	イグサ科 Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> Linné var. <i>decipiens</i> Buchenau イ	茎の髓・全草
韓国	Juncus Medulla	Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> Linné	幹
中国	Juncus Medulla	Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> Linné	鱗茎髓

## センブリ (=当薬)

局方

日本	Swertiae Herba	Gentianaceae	<i>Swertia japonica</i> Makino センブリ スウェルチアマリン( $C_{15}H_{22}O_{10}$ : 374.34) 2.0%以上	全草(開花期)
韓国	Swertiae Herba	Gentianaceae	<i>Swertia japonica</i> Makino スウェルチアマリン( $C_{15}H_{22}O_{10}$ : 374.34) 2.0%以上	全草
中国	Swertiae Herba	Gentianaceae	<i>Swertia pseudochinensis</i> Hara スウェロシド( $C_{16}H_{22}O_9$ ) 0.070%以上 スウェルチアマリン( $C_{16}H_{22}O_{10}$ ) 3.5%以上	全草

## 竹節人参

局方

日本	Panacis Japonici Rhizoma	Araliaceae	<i>Panax japonicus</i> C. A. Meyer トチバニンジン	根茎
韓国	Panacis Japonici Rhizoma	Araliaceae	<i>Panax japonicus</i> C. A. Meyer	根茎
中国 (竹節参)	Panacis Japonici Rhizoma	Araliaceae	<i>Panax japonicus</i> C. A. Meyer	根茎

トウガラシ (=番椒)				局方
日本	Capsici Fructus	Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> Linné トウガラシ 総カプサイシン((E)-カプサイシン及びジヒドロカプサイシン) 0.10%以上	果実
韓国 (苦椒)	Capsici Fructus	Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> Linné	果実
中国 (辣椒)	Capsici Fructus	Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> Linné カプサイシン( $C_{18}H_{27}NO_3$ )及びジヒドロカプサイシン( $C_{18}H_{29}NO_3$ ) 0.16%	成熟果実
橙皮				局方
日本	Aurantii Pericarpium	Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> Linné <i>Citrus aurantium</i> Linné var. <i>daidai</i> Makino ダイダイ	成熟果皮
韓国	Aurantii Pericarpium	Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> Linné subsp. <i>Amara</i> Engler	成熟果皮
中国	記載なし			
吐根				局方
日本	Ipecacuanhae Radix	Rubiaceae	<i>Cephaelis ipecacuanha</i> A. Richard <i>Cephaelis acuminata</i> Karsten 総アルカロイド(エメチン及びセファエリン) 2.0%以上	根・根茎
韓国	Ipecacuanhae Radix et Rhizoma	Rubiaceae	<i>Cephaelis ipecacuanha</i> (Brotero) A. Richard <i>Cephaelis acuminata</i> Karsten 総アルカロイド(エメチン( $C_{29}H_{40}N_2O_4$ :480.64)及びセファエリン( $C_{28}H_{38}N_2O_4$ :466.61)) 2.0%以上	根・根茎
中国	Ipecacuanhae radix	Rubiaceae	<i>Cephaelis ipecacuanha</i>	根
南天実				局方外
日本	Nandinae Fructus	Berberidaceae	<i>Nandina domestica</i> Thunberg forma <i>leucocarpa</i> Makino シロナンテン <i>Nandina domestica</i> Thunberg ナンテン	果実
韓国	記載なし			
中国	記載なし			
苦木				局方
日本	Picrasmae	Simaroubaceae	<i>Picrasma quassiodoides</i> Bennet ニガキ	木部
韓国	Picrasmae	Simaroubaceae	<i>Picrasma quassiodoides</i> Bennet	木部
中国	Picrasmae Ramulus et	Simaroubaceae	<i>Picrasma quassiodoides</i> (D. Don) Bennet	枝・葉
肉豆蔻				局方
日本	Myristicae	Myristicaceae	<i>Myristica fragrans</i> Houttuyn ニクズク	種子
韓国	Myristicae	Myristicaceae	<i>Myristica fragrans</i> Houttuyn	成熟種子
中国	Myristicae Semen	Myristicaceae	<i>Myristica fragrans</i> Houttuyn デヒドロジソイオイグノール( $C_{20}H_{22}O_4$ ) 0.10%以上	種子
韭菜子				局方
日本	Allii Tuberosi Semen	Liliaceae	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ニラ	種子
韓国	Allii Tuberosi Semen	Liliaceae	<i>Allium tuberosum</i> Rottler	種子
中国	Allii Tuberosi Semen	Liliaceae	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng	成熟種子
蜂蜜				局方
日本	Mel	Apidae	<i>Apis mellifera</i> Linné ヨーロッパミツバチ <i>Apis cerana</i> Fabricius トヨウミツバチ	巣に集めた甘味物
韓国	Mel	Apidae	<i>Apis mellifera</i> Linne <i>Apis indica</i> Radoszkowski	蜂蜜
中国	Mel	Apidae	<i>Apis cerana</i> Fabricius <i>Apis mellifera</i> Linnaeus 還元糖 64.0%以上	蜂蜜
浜防風				局方
日本	Glehniae Radix cum Rhizoma	セリ科 Umbelliferae	<i>Glehnia littoralis</i> Fr. Schmidt ex Miquel ハマボウフウ	根・根茎
韓国 (海防風)	Glehniae Radix	Umbelliferae	<i>Glehnia littoralis</i> Fr. Schmidt ex Miquel	根
中国 (北沙参)	Glehniae Radix	Umbelliferae	<i>Glehnia littoralis</i> Fr. Schmidt ex Miquel	根

## 菱実

局方外

日本	Trapae Fructus	Trapaceae	<i>Trapa japonica</i> Flerov 同属植物	果実
韓国	記載なし			
中国 (菱角)		Trapaceae	<i>Trapa bispinosa</i> Roxb. <i>Trapa maximowiczii</i> Korsch.	果実

## 没薑

日本	Myrrha	Burseraceae	<i>Commiphora myrrha</i> Engler <i>Balsamodendron ehrenbergianum</i> O. Berg.	樹脂
韓国	Myrrha	Burseraceae	<i>Commiphora molmol</i> Engler <i>Commiphora myrrha</i> Engler	樹脂
中国	Myrrha	Burseraceae	<i>Commiphora myrrha</i> Engler <i>Commiphora molmol</i> Engler	樹脂

## 李根皮

日本	Pruni Salicinae Cortex	Rosaceae	<i>Prunus salicina</i> スモモ	根皮
韓国	記載なし			
中国	Cortex Pruni Salicinae	Rosaceae	<i>Prunus salicina</i> Lindl.	根皮

## マクリ (=海人草)

日本	Digenea	Rhodomelaceae	<i>Digenea simplex</i> C. Agardh マクリ	全藻
韓国	Digenea	Rhodomelaceae	<i>Digenea simplex</i> C. Agardh	全藻
中国	Digenea	Rhodomelaceae	<i>Digenea simplex</i> (Wulf.) C. Agardh	全藻

## 熊胆

日本	Fel Ursi	Ursidae	<i>Ursus arctos</i> Linné 近縁動物	胆汁
韓国	Fel Ursi	Ursidae	<i>Ursus arctos</i> Linné 近縁動物	胆汁
中国	Fel Ursi	Ursidae	<i>Selenarctos thibetanus</i> G. Cuvier <i>Ursus arctos lasiotus</i> Gray <i>Ursus arctos</i> Linné	胆汁

## 楊梅皮

局方外

日本	Myricae Cortex	Myricaceae	<i>Myrica rubra</i> Siebold et Zuccarini ヤマモモ	樹皮
韓国	記載なし			
中国	記載なし			

## 和差活

局方外

日本	Araliae Cordatae Radix	Araliaceae	<i>Aralia cordata</i> Thunberg ウド	根
韓国	記載なし			
中国	記載なし			

## 和藁本

局方外

日本	Osmorrhizae Rhizoma	Umbelliferae	<i>Osmorrhiza aristata</i> Makino et Yabe ヤブニンジン	根・根茎
韓国	記載なし			
中国	記載なし			

日本・中国・韓国における生薬と治療処方の異同性に関する  
国際比較調査研究

(資料)

2. 日本・中国・韓国における治療処方の異同性に関する調査結果

安中散料 [和剤局方]

富山	桂皮 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 苗香 2.0, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
福島	桂皮 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 苗香 2.0, 縮砂 1.5, 炙甘草 1.5, 良姜 0.7
千葉	桂皮 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 苗香 2.0, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
九州	桂皮 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 苗香 2.0, 縮砂 1.5, 炙甘草 1.5, 良姜 0.7
北里	桂皮 3.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 苗香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 1.0
近畿	桂皮 3.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 苗香 2.0, 乾姜 2.0, 甘草 2.0, 良姜 1.0
飯塚	桂皮 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 苗香 2.0, 縮砂 1.5, 炙甘草 1.5, 良姜 0.7
ツムラ	桂皮 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 苗香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.5
クラシエ	桂皮 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 苗香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.5
コタロー	桂皮 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 苗香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.5
東洋	桂枝 3.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 苗香 2.0, 縮砂 2.0, 甘草 2.0, 良姜 1.0
東亜	桂枝 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 苗香 2.0, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
オースギ	桂枝 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 苗香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.5
JPS	桂枝 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 苗香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.8
ティヨク	桂皮 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 苗香 2.0, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
天津	桂枝 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 苗香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.5
本草	桂枝 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 苗香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.5
韓国	桂枝 5.0, 延胡索 5.0, 牡蛎 8.0, 苗香 8.0, 甘草 10.0, 良姜 5.0, 乾姜 5.0
中国	肉桂 2.5, 延胡索 9.0, 牡蛎 18.0, 苗香 9.0, 縮砂 6.0, 甘草 1.0, 良姜 9.0, 茯苓 15.0, 芍藥 9.0, 炙甘草 6.0

萎証方 [秘方集驗]

富山	当帰 5.0, 熟地黄 5.0, 牛膝 3.0, 芍药 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 3.0, 黄耆 2.0, 杜仲 1.5, 黄柏 1.5
福島	当帰 5.0, 熟地黄 5.0, 牛膝 3.0, 芍药 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 3.0, 黄耆 2.0, 杜仲 1.5, 黄柏 1.5
千葉	当帰 5.0, 熟地黄 5.0, 牛膝 3.0, 芍药 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 3.0, 黄耆 2.0, 杜仲 1.5, 黄柏 1.5
九州	当帰 5.0, 熟地黄 5.0, 牛膝 3.0, 芍药 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 3.0, 黄耆 2.0, 杜仲 1.5, 黄柏 1.5
北里	当帰 4.0, 地黄 4.0, 牛膝 3.0, 芍药 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 3.0, 黄耆 3.0, 杜仲 2.0, 黄柏 2.0
近畿	当帰 2.5, 熟地黄 2.5, 牛膝 1.5, 芍药 1.5, 知母 1.5, 黄耆 0.75, 杜仲 0.75, 黄柏 0.75
飯塚	当帰 5.0, 熟地黄 5.0, 牛膝 3.0, 芍药 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 3.0, 黄耆 2.0, 杜仲 1.5, 黄柏 1.5
韓国	記載なし
中国	当帰 5.0, 熟地黄 4.0, 牛膝 3.0, 芍药 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 2.0, 黄耆 2.0, 杜仲 3.0, 黄柏 2.0

胃苓湯 [万病回春]

富山	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍藥 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2.0, 大棗 1.0, 乾姜 1.0, 甘草 1.0
福島	蒼朮 3.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 猪苓 3.0, 沢瀉 3.0, 白朮 3.0, 芍藥 3.0, 茯苓 3.0, 桂皮 2.0, 大棗 2.0, 生姜 1.0, 炙甘草 1.0
千葉	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍藥 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2.0, 大棗 1.0, 乾姜 1.0, 甘草 1.0
九州	蒼朮 3.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 猪苓 3.0, 沢瀉 3.0, 白朮 3.0, 芍藥 3.0, 茯苓 3.0, 桂皮 2.0, 大棗 2.0, 生姜 1.0, 炙甘草 1.0
北里	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍藥 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2.0, 大棗 1.0, 生姜 0.5, 甘草 1.0
近畿	蒼朮 3.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 猪苓 3.0, 沢瀉 3.0, 白朮 3.0, 芍藥 3.0, 茯苓 3.0, 桂皮 2.0, 大棗 1.0, 生姜 1.0, 甘草 2.0
飯塚	蒼朮 3.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 猪苓 3.0, 沢瀉 3.0, 白朮 3.0, 芍藥 3.0, 茯苓 3.0, 桂皮 2.0, 大棗 2.0, 生姜 1.0, 炙甘草 1.0
ツムラ	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍藥 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2.0, 大棗 1.5, 生姜 1.5, 甘草 1.0
KTS	蒼朮 3.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 猪苓 3.0, 沢瀉 3.0, 白朮 3.0, 芍藥 2.5, 茯苓 3.0, 桂皮 2.5, 大棗 1.0, 生姜 1.0, 甘草 1.0
韓国	蒼朮 3.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 猪苓 3.0, 沢瀉 3.0, 白朮 3.0, 芍藥 3.0, 茯苓 3.0, 肉桂 1.5, 炙甘草 3.0, 大棗 3.0, 生姜 6.0
中国	蒼朮 9.0, 厚朴 9.0, 陳皮 6.0, 猪苓 9.0, 沢瀉 15.0, 白朮 9.0, 芍藥 2.5, 茯苓 9.0, 桂枝 6.0, 甘草 3.0, 大棗 3.0, 生姜 3.0

茵陳蒿湯 [傷寒論] [金匱要略]

富山	茵陳蒿 8.0, 山梔子 3.0, 大黃
福島	茵陳蒿 8.0, 山梔子 3.0, 大黃
千葉	茵陳蒿 8.0, 山梔子 3.0, 大黃
九州	茵陳蒿 8.0, 山梔子 3.0, 大黃
北里	茵陳蒿 4.0, 山梔子 3.0, 大黃
近畿	茵陳蒿 6.0, 山梔子 1.4, 大黃 2.0
飯塚	茵陳蒿 8.0, 山梔子 3.0, 大黃
ツムラ	茵陳蒿 4.0, 山梔子 3.0, 大黃 1.0
クラシエ	茵陳蒿 4.0, 山梔子 3.0, 大黃 1.0
コタロー	茵陳蒿 4.0, 山梔子 3.0, 大黃 1.0
オースギ	茵陳蒿 4.0, 山梔子 3.0, 大黃 1.0
ティヨク	茵陳蒿 6.0, 山梔子 2.0, 大黃 2.0
韓国	茵陳蒿 30.0, 山梔子 15.0, 大黃 9.0
中国	茵陳蒿 15.0, 山梔子 9.0, 大黃 6.0

茵陳五苓散料 [金匱要略]

富山	茵陳蒿 6.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3.0
福島	茵陳蒿 9.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 6.0, 桂皮 4.5
千葉	茵陳蒿 6.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3.0
九州	茵陳蒿 9.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 6.0, 桂皮 4.5
北里	茵陳蒿 4.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3.0
近畿	茵陳蒿 6.0, 沢瀉 4.0, 猪苓 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 4.0, 桂皮 3.0
飯塚	茵陳蒿 9.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 6.0, 桂皮 4.5
ツムラ	茵陳蒿 6.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 蒼朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 2.5
KTS	茵陳蒿 4.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 2.5
韓国	茵陳蒿 30.0, 沢瀉 9.0, 猪苓 12.0, 白朮 12.0, 茯苓 15.0, 桂枝 6.0
中国	茵陳蒿 10.0, 沢瀉 1.6, 猪苓 0.9, 白朮 0.9, 茯苓 0.9, 桂枝 0.6

#### 烏頭湯 [金匱要略]

富山	麻黃 3.0, 苓藥 3.0, 黃耆 3.0, 炙甘草 3.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
福島	麻黃 3.0, 苓藥 3.0, 黃耆 3.0, 炙甘草 3.0, 蜂蜜 20g, 烏頭
千葉	麻黃 3.0, 苓藥 3.0, 黃耆 3.0, 炙甘草 3.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
九州	麻黃 3.0, 苓藥 3.0, 黃耆 3.0, 炙甘草 3.0, 蜂蜜 20g, 烏頭
北里	麻黃 3.0, 苓藥 3.0, 黃耆 3.0, 甘草 3.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
近畿	麻黃 3.0, 苓藥 3.0, 黃耆 3.0, 炙甘草 3.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭 1.0
飯塚	麻黃 3.0, 苓藥 3.0, 黃耆 3.0, 炙甘草 3.0, 蜂蜜 20g, 烏頭
韓国	麻黃 9.0, 苓藥 9.0, 黃耆 9.0, 炙甘草 6.0, 蜂蜜 60ml, 烏頭
中国	麻黃 9.0, 苓藥 9.0, 黃耆 9.0, 炙甘草 6.0, 蜂蜜 60ml, 烏頭 6.0

#### 烏頭桂枝湯 [金匱要略]

富山	桂皮 4.0, 苓藥 4.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
福島	桂皮 4.5, 苓藥 4.5, 大棗 4.5, 炙甘草 3.0, 生姜 1.0, 蜂蜜 20g, 烏頭
千葉	桂皮 4.0, 苓藥 4.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
九州	桂皮 4.5, 苓藥 4.5, 大棗 4.5, 炙甘草 3.0, 生姜 1.0, 蜂蜜 20g, 烏頭
北里	桂皮 4.0, 苓藥 4.0, 大棗 4.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, 蜂蜜 40ml, 烏頭
近畿	桂皮 3.0, 苓藥 3.0, 大棗 3.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭 1.0
飯塚	桂皮 4.5, 苓藥 4.5, 大棗 4.5, 炙甘草 3.0, 生姜 1.0, 蜂蜜 20g, 烏頭
韓国	肉桂 10.0, 苓藥 10.0, 大棗 3.0, 炙甘草 7.5, 生姜 6.0, 蜂蜜 60ml, 烏頭
中国	桂枝 9.0, 苓藥 9.0, 大棗 42.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0, 烏頭 10.0

#### 烏藥順氣散料 [和剤局方]

富山	烏藥 2.5, 陳皮 2.5, 瘋蚕 2.5, 麻黃 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 枳殼 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.0
福島	烏藥 5.0, 陳皮 5.0, 瘋蚕 1.5, 麻黃 3.0, 川芎 3.0, 桔梗 3.0, 枳殼 3.0, 白芷 3.0, 炙甘草 1.0, 生姜 1.0
千葉	烏藥 2.5, 陳皮 2.5, 瘋蚕 2.5, 麻黃 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 枳殼 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.0
九州	烏藥 5.0, 陳皮 5.0, 瘋蚕 1.5, 麻黃 3.0, 川芎 3.0, 桔梗 3.0, 枳殼 3.0, 白芷 3.0, 炙甘草 1.0, 生姜 1.0
北里	烏藥 2.5, 陳皮 2.5, 瘋蚕 2.5, 麻黃 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 枳殼 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.5
近畿	烏藥 2.0, 陳皮 2.0, 瘋蚕 1.0, 麻黃 2.0, 川芎 1.0, 桔梗 1.0, 枳殼 1.0, 白芷 1.5, 甘草 1.0, 生姜 1.0, 大棗 1.0, 乾姜 0.5
飯塚	烏藥 5.0, 陳皮 5.0, 瘋蚕 1.5, 麻黃 3.0, 川芎 3.0, 桔梗 3.0, 枳殼 3.0, 白芷 3.0, 炙甘草 1.0, 生姜 1.0
韓国	烏藥 4.5, 陳皮 4.5, 瘋蚕 3.0, 麻黃 4.5, 川芎 3.0, 桔梗 3.0, 枳殼 3.0, 白芷 3.0, 炙甘草 1.0, 生姜 6.0, 大棗 3.0, 乾姜 1.5
中国	烏藥 6.0, 橘皮 6.0, 瘋蚕 6.0, 麻黃 6.0, 川芎 6.0, 桔梗 6.0, 枳殼 6.0, 白芷 6.0, 炙甘草 6.0, 生姜 6.0, 大棗 3.0, 乾姜 3.0

#### 溫經湯 [金匱要略]

富山	麥門冬 5.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 吴茱萸 2.0, 苓藥 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 阿膠 1.5
福島	麥門冬 10.0, 半夏 8.0, 当帰 2.0, 桂皮 2.0, 吴茱萸 3.0, 苓藥 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 阿膠 2.0
千葉	麥門冬 5.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 吴茱萸 2.0, 苓藥 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 阿膠 1.5
九州	麥門冬 10.0, 半夏 8.0, 当帰 2.0, 桂皮 2.0, 吴茱萸 3.0, 苓藥 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 阿膠 2.0
北里	麥門冬 4.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 吴茱萸 1.0, 苓藥 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, 阿膠 2.0
近畿	麥門冬 10.0, 半夏 8.0, 当帰 2.0, 桂皮 2.0, 吴茱萸 3.0, 苓藥 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 阿膠 2.0
飯塚	麥門冬 10.0, 半夏 8.0, 当帰 2.0, 桂皮 2.0, 吴茱萸 3.0, 苓藥 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 阿膠 2.0
ツムラ	麥門冬 4.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 吴茱萸 1.0, 苓藥 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, 阿膠 2.0
コタロー	麥門冬 4.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 吴茱萸 1.0, 苓藥 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, 阿膠 2.0
KTS	麥門冬 4.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 吴茱萸 1.0, 苓藥 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, ゼラチン 2.0
韓国	麥門冬 9.0, 半夏 6.0, 当帰 9.0, 桂枝 6.0, 吴茱萸 9.0, 苓藥 6.0, 川芎 6.0, 人参 6.0, 牡丹皮 6.0, 炙甘草 6.0, 生姜 6.0, 阿膠 9.0
中国	麥門冬 9.0, 半夏 6.0, 当帰 9.0, 桂枝 6.0, 吴茱萸 9.0, 苓藥 6.0, 川芎 6.0, 人参 6.0, 牡丹皮 6.0, 炙甘草 6.0, 生姜 6.0, 阿膠 9.0

温清飲 [万病回春]

富山	当帰 4.0, 茜草 4.0, 川芎 4.0, 熟地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
福島	当帰 4.0, 茜草 4.0, 川芎 4.0, 熟地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
千葉	当帰 4.0, 茜草 4.0, 川芎 4.0, 熟地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
九州	当帰 4.0, 茜草 4.0, 川芎 4.0, 熟地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
北里	当帰 4.0, 茜草 3.0, 川芎 3.0, 地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 2.0, 黄連 2.0
近畿	当帰 4.0, 茜草 4.0, 川芎 4.0, 熟地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 1.0, 黄柏 1.0, 黄連 1.0
飯塚	当帰 4.0, 茜草 4.0, 川芎 4.0, 熟地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
ツムラ	当帰 3.0, 茜草 3.0, 川芎 3.0, 地黄 3.0, 黄芩 1.5, 山梔子 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
クラシエ	当帰 3.0, 茜草 3.0, 川芎 3.0, 地黄 3.0, 黄芩 1.5, 山梔子 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
コタロー	当帰 4.0, 茜草 3.0, 川芎 3.0, 地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
東洋	当帰 3.0, 茜草 3.0, 川芎 3.0, 地黄 3.0, 黄芩 1.5, 山梔子 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
オースギ	当帰 3.0, 茜草 3.0, 川芎 3.0, 地黄 3.0, 黄芩 1.5, 山梔子 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
ジュンコウ	当帰 4.0, 茜草 4.0, 川芎 4.0, 地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
ティヨク	当帰 3.0, 茜草 3.0, 川芎 3.0, 地黄 3.0, 黄芩 1.5, 山梔子 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
本草	当帰 4.0, 茜草 3.0, 川芎 3.0, 地黄 4.0, 黄芩 1.5, 山梔子 2.0, 黄柏 3.0, 黄連 1.5
韓国	当帰 5.0, 茜草 5.0, 川芎 5.0, 熟地黄 8.0, 黄芩 5.0, 山梔子 5.0, 黄柏 5.0, 黄連 5.0
中国	当帰 5.0, 茜草 5.0, 川芎 5.0, 熟地黄 5.0, 黄芩 5.0, 山梔子 5.0, 黄柏 5.0, 黄連 5.0

温胆湯 [千金方]

富山	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 竹茹 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 2.0, 枳実 2.0, 生姜 1.0
福島	半夏 6.0, 茯苓 6.0, 竹茹 3.0, 陳皮 3.0, 炙甘草 1.5, 枳実 1.5, 生姜 1.5
千葉	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 竹茹 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 2.0, 枳実 2.0, 生姜 1.0
九州	半夏 6.0, 茯苓 6.0, 竹茹 3.0, 陳皮 3.0, 炙甘草 1.5, 枳実 1.5, 生姜 1.5
北里	半夏 6.0, 茯苓 6.0, 竹茹 2.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 枳実 1.0, 生姜 0.5
近畿	半夏 6.0, 茯苓 6.0, 竹茹 2.5, 陳皮 6.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 枳実 2.5, 生姜 1.0
飯塚	半夏 6.0, 茯苓 6.0, 竹茹 3.0, 陳皮 3.0, 炙甘草 1.5, 枳実 1.5, 生姜 1.5
韓国	半夏 9.0, 茯苓 9.0, 竹茹 6.0, 陳皮 6.0, 大棗 3.0, 炙甘草 3.0, 枳実 6.0, 生姜 5.0
中国	半夏 6.0, 茯苓 6.0, 竹茹 6.0, 陳皮 9.0, 大棗 3.0, 炙甘草 3.0, 枳実 6.0, 生姜 5.0

温脾湯 [千金方]

富山	炙甘草 4.0, 乾姜 3.0, 人参 2.0, 大黃, 附子
福島	炙甘草 4.0, 乾姜 3.0, 人参 2.0, 大黃, 附子
千葉	炙甘草 4.0, 乾姜 3.0, 人参 2.0, 大黃, 附子
九州	炙甘草 4.0, 乾姜 3.0, 人参 2.0, 大黃, 附子
北里	厚朴 2.0, 桂皮 2.0, 甘草 2.0, 乾姜 2.0, 大黃, 附子
近畿	甘草 4.0, 乾姜 2.0, 人参 2.0, 大黃 3.0, 炮附子 2.0
飯塚	炙甘草 4.0, 乾姜 3.0, 人参 2.0, 大黃, 附子
韓国	記載なし
中国	甘草 6.0, 乾姜 6.0, 人参 6.0, 大黃 12.0, 附子 9.0

越婢湯 [金匱要略]

富山	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0
千葉	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
九州	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5
近畿	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 大棗 4.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
飯塚	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0
韓国	石膏 18.0, 麻黃 6.0, 大棗 6.0, 炙甘草 3.0, 生姜 6.0
中国	石膏 24.0, 麻黃 18.0, 大棗 7.5, 甘草 6.0, 生姜 9.0

越婢加朮湯 [金匱要略]

富山	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 白朮 4.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0
千葉	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
九州	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 白朮 4.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5
近畿	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 白朮 4.0, 大棗 4.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
飯塚	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 白朮 4.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0
ツムラ	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
クラシエ	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 0.8
JPS	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
KTS	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
韓国	石膏 18.0, 麻黃 6.0, 白朮 9.0, 大棗 6.0, 炙甘草 3.0, 生姜 6.0
中国	石膏 18.0, 麻黃 9.0, 白朮 6.0, 大棗 5.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0

越婢加半夏湯 [金匱要略]

富山	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 半夏 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 半夏 6.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0
千葉	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 半夏 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
九州	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 半夏 6.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 半夏 6.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0
近畿	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 半夏 8.0, 大棗 4.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0

飯塚	石膏 8.0, 麻黃 6.0, 半夏 6.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0
韓國	石膏 18.0, 麻黃 6.0, 大棗 6.0, 甘草 3.0, 生姜 6.0, 半夏 9.0
中国	石膏 18.0, 麻黃 9.0, 大棗 5.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0, 半夏 9.0

#### 延年半夏湯 [外台秘要]

富山	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 3.0, 檳榔子 3.0, 龜甲 3.0, 人參 2.0, 枳實 1.0, 吳茱萸 1.0, 生姜 1.0
福島	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 3.0, 檳榔子 3.0, 土鼈甲 3.0, 人參 2.0, 枳實 1.0, 吳茱萸 1.0, 生姜 1.0
千葉	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 3.0, 檳榔子 3.0, 龜甲 3.0, 人參 2.0, 枳實 1.0, 吳茱萸 1.0, 生姜 1.0
九州	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 3.0, 檳榔子 3.0, 土鼈甲 3.0, 人參 2.0, 枳實 1.0, 吳茱萸 1.0, 生姜 1.0
北里	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 3.0, 檳榔子 3.0, 龜甲 3.0, 人參 2.0, 枳實 1.0, 吳茱萸 1.0, 生姜 0.5
近畿	半夏 3.0, 前胡 3.0, 檳榔子 2.0, 土鼈甲 3.0, 人參 1.0, 枳實 2.0, 吳茱萸 2.0, 生姜 2.0
飯塚	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 3.0, 檳榔子 3.0, 土鼈甲 3.0, 人參 2.0, 枳實 1.0, 吳茱萸 1.0, 生姜 1.0
韓國	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 4.0, 檳榔子 4.0, 龜甲 4.0, 枳實 1.0, 吳茱萸 1.0, 生姜 1.0
中国	半夏 12.0, 桔梗 3.0, 前胡 6.0, 檳榔子 6.0, 龜甲 9.0, 人參 3.0, 枳實 3.0, 吳茱萸 3.0, 生姜 3.0

#### 黃耆桂枝五物湯 [金匱要略]

富山	黃耆 3.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 大棗 3.0, 生姜 2.0
福島	黃耆 4.0, 桂皮 4.5, 茵薑 9.0, 大棗 4.5, 生姜 2.0
千葉	黃耆 3.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 大棗 3.0, 生姜 2.0
九州	黃耆 4.0, 桂皮 4.5, 茵薑 9.0, 大棗 4.5, 生姜 2.0
北里	黃耆 3.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 大棗 3.0, 生姜 0.5
近畿	黃耆 3.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 大棗 3.0, 生姜 2.0
飯塚	黃耆 4.0, 桂皮 4.5, 茵薑 9.0, 大棗 4.5, 生姜 2.0
韓國	黃耆 15.0, 桂枝 6.0, 茵薑 6.0, 大棗 7.5, 生姜 30.0
中国	黃耆 9.0, 桂枝 9.0, 茵薑 9.0, 大棗 6.0, 生姜 18.0

#### 黃耆建中湯 [金匱要略]

富山	芍藥 6.0, 黃耆 4.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 甘草 3.0, 生姜 1.0, 膠餡 20.0
福島	芍藥 9.0, 黃耆 4.0, 桂皮 4.5, 大棗 4.5, 炙甘草 3.0, 生姜 1.0, 膠餡 20.0
千葉	芍藥 6.0, 黃耆 4.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 甘草 3.0, 生姜 1.0, 膠餡 20.0
九州	芍藥 9.0, 黃耆 4.0, 桂皮 4.5, 大棗 4.5, 炙甘草 3.0, 生姜 1.0, 膠餡 20.0
北里	芍藥 6.0, 黃耆 4.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, 膠餡 20.0
近畿	芍藥 6.0, 黃耆 1.5, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 3.0, 生姜 1.0, 膠餡 10.0
飯塚	芍藥 9.0, 黃耆 4.0, 桂皮 4.5, 大棗 4.5, 炙甘草 3.0, 生姜 1.0, 膩餡 20.0
ツムラ	芍藥 6.0, 黃耆 4.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 甘草 3.0, 生姜 1.0, 膩餡 10.0
東洋	芍藥 6.0, 黃耆 4.0, 桂枝 4.0, 大棗 4.0, 甘草 2.0, 生生姜 4.0
韓國	芍藥 18.0, 黃耆 18.0, 桂枝 9.0, 大棗 9.0, 炙甘草 9.0, 生姜 9.0, 膩餡 30.0
中国	芍藥 18.0, 黃耆 5.0, 桂枝 9.0, 大棗 9.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0, 膩餡 30.0

#### 黃芩湯 [傷寒論]

富山	黃芩 5.0, 大棗 5.0, 茵薑 3.0, 甘草 3.0
福島	黃芩 5.0, 大棗 5.0, 茵薑 3.0, 炙甘草 3.0
千葉	黃芩 5.0, 大棗 5.0, 茵薑 3.0, 甘草 3.0
九州	黃芩 5.0, 大棗 5.0, 茵薑 3.0, 炙甘草 3.0
北里	記載なし
近畿	記載なし
飯塚	黃芩 5.0, 大棗 5.0, 茵薑 3.0, 炙甘草 3.0
三和	黃芩 4.0, 大棗 4.0, 茵薑 3.0, 甘草 3.0
韓國	黃芩 9.0, 大棗 6.0, 茵薑 6.0, 甘草 6.0
中国	黃芩 9.0, 大棗 6.0, 茵薑 9.0, 炙甘草 3.0

#### 黃連湯 [傷寒論]

富山	半夏 7.0, 黃連 3.0, 甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人參 2.0, 乾姜 1.5
福島	半夏 6.0, 黃連 3.0, 炙甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人參 2.0, 乾姜 3.0
千葉	半夏 7.0, 黃連 3.0, 甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人參 2.0, 乾姜 1.5
九州	半夏 6.0, 黃連 3.0, 炙甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人參 2.0, 乾姜 3.0
北里	半夏 6.0, 黃連 3.0, 甘草 2.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人參 3.0, 乾姜 1.0
近畿	半夏 8.0, 黃連 3.0, 甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人參 2.0, 乾姜 3.0
飯塚	半夏 6.0, 黃連 3.0, 炙甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人參 2.0, 乾姜 3.0
ツムラ	半夏 6.0, 黃連 3.0, 甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人參 3.0, 乾姜 3.0
コタロー	半夏 6.0, 黃連 3.0, 甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人參 3.0, 乾姜 3.0
東洋	半夏 5.0, 黃連 3.0, 甘草 3.0, 桂枝 3.0, 大棗 3.0, 人參 3.0, 乾姜 3.0
太虎堂	半夏 6.0, 黃連 3.0, 甘草 3.0, 桂枝 3.0, 大棗 3.0, 人參 3.0, 生姜 3.0
韓國	半夏 9.0, 黃連 6.0, 炙甘草 9.0, 桂枝 6.0, 大棗 12.0, 人參 9.0, 乾姜 6.0
中国	半夏 9.0, 黃連 9.0, 炙甘草 9.0, 桂枝 9.0, 大棗 6.0, 人參 6.0, 乾姜 9.0

#### 黃連阿膠湯 [傷寒論]

富山	黃連 3.0, 茵薑 2.5, 黃芩 2.0, 阿膠 3.0, 雞子黃 1個
福島	黃連 4.0, 茵薑 2.0, 黃芩 2.0, 阿膠 3.0, 雞子黃 1個
千葉	黃連 3.0, 茵薑 2.5, 黃芩 2.0, 阿膠 3.0, 雞子黃 1個
九州	黃連 4.0, 茵薑 2.0, 黃芩 2.0, 阿膠 3.0, 雞子黃 1個
北里	黃連 3.0, 茵薑 2.5, 黃芩 2.0, 阿膠 3.0, 雞子黃 1個
近畿	黃連 4.0, 茵薑 2.0, 黃芩 2.0, 阿膠 3.0, 雞子黃 1個
飯塚	黃連 4.0, 茵薑 2.0, 黃芩 2.0, 阿膠 3.0, 雞子黃 1個

韓国	黃連 3.0, 茄葉 9.0, 黃芩 9.0, 阿膠 9.0, 雞子黃2個
中国	黃連 12.0, 茄葉 6.0, 黃芩 3.0, 阿膠 9.0, 雞子黃2個

### 黄連解毒湯 [外台秘要]

局方	黃連 1.5, 黃芩 3.0, 黃柏 1.5, 山梔子 2.0 黃連 1.5, 黃芩 3.0, 黃柏 3.0, 山梔子 3.0 黃連 2.0, 黃芩 2.0, 黃柏 3.0, 山梔子 2.0 黃連 2.0, 黃芩 3.0, 黃柏 1.5, 山梔子 2.0
富山	黃連 2.0, 黃芩 3.0, 黃柏 2.0, 山梔子 2.0
福島	黃連 2.0, 黃芩 3.0, 黃柏 1.5, 山梔子 2.0
千葉	黃連 2.0, 黃芩 3.0, 黃柏 2.0, 山梔子 2.0
九州	黃連 2.0, 黃芩 3.0, 黃柏 1.5, 山梔子 2.0
北里	黃連 2.0, 黃芩 3.0, 黃柏 2.0, 山梔子 2.0
近畿	記載なし
飯塚	黃連 2.0, 黃芩 3.0, 黃柏 1.5, 山梔子 2.0
ツムラ	黃連 2.0, 黃芩 3.0, 黃柏 1.5, 山梔子 2.0
クラシエ	黃連 1.5, 黃芩 3.0, 黃柏 1.5, 山梔子 2.0
コタロー	黃連 1.5, 黃芩 3.0, 黃柏 1.5, 山梔子 2.0
東洋	黃連 2.0, 黃芩 3.0, 黃柏 2.0, 山梔子 2.0
三和	黃連 1.5, 黃芩 3.0, 黃柏 1.5, 山梔子 2.0
東亜	黃連 2.0, 黃芩 3.0, 黃柏 2.0, 山梔子 2.0
オースギ	黃連 1.5, 黃芩 3.0, 黃柏 3.0, 山梔子 3.0
ジュンコウ	黃連 2.0, 黃芩 3.0, 黃柏 2.0, 山梔子 2.0
サカモト	黃連 2.0, 黃芩 3.0, 黃柏 2.0, 山梔子 2.0
JPS	黃連 1.5, 黃芩 3.0, 黃柏 1.5, 山梔子 3.0
太虎堂	黃連 1.5, 黃芩 3.0, 黃柏 3.0, 山梔子 3.0
テイコク	黃連 2.0, 黃芩 3.0, 黃柏 2.0, 山梔子 2.0
ホノミ	黃連 1.5, 黃芩 3.0, 黃柏 1.5, 山梔子 2.0
本草	黃連 1.5, 黃芩 3.0, 黃柏 1.5, 山梔子 2.0
韓国	黃連 9.0, 黃芩 6.0, 黃柏 6.0, 山梔子 9.0
中国	黃連 9.0, 黃芩 6.0, 黃柏 6.0, 山梔子 9.0

### 黄連解毒湯 [万病回春]

富山	黃芩 3.0, 黃連 2.0, 山梔子 2.0, 黃柏 1.5, 柴胡 3.0, 茄葉 2.0, 連翹 2.0
福島	黃芩 3.0, 黃連 2.0, 山梔子 2.0, 黃柏 1.5, 柴胡 3.0, 連翹 2.0
千葉	黃芩 3.0, 黃連 2.0, 山梔子 2.0, 黃柏 1.5, 柴胡 3.0, 茄葉 2.0, 連翹 2.0
九州	黃芩 3.0, 黃連 2.0, 山梔子 2.0, 黃柏 1.5, 柴胡 3.0, 連翹 2.0
北里	記載なし
近畿	黃連 3.0, 黃芩 3.0, 山梔子 2.0, 黃柏 1.5, 柴胡 3.0, 連翹 1.5
飯塚	黃芩 3.0, 黃連 2.0, 山梔子 2.0, 黃柏 1.5, 柴胡 3.0, 連翹 2.0
韓国	黃連 3.0, 黃芩 3.0, 山梔子 2.0, 黃柏 1.5, 柴胡 3.0, 連翹 1.5
中国	黃連 6.0, 黃芩 6.0, 山梔子 6.0, 黃柏 6.0, 柴胡 6.0, 連翹 6.0

### 乙字湯 [原南陽]

富山	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃
福島	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 炙甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃
千葉	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃
九州	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 炙甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃
北里	當帰 6.0, 柴胡 6.0, 黃芩 4.0, 甘草 2.0, 升麻 2.0, 大黃
近畿	當帰 5.0, 柴胡 4.0, 黃芩 3.0, 甘草 3.0, 升麻 1.5, 大黃 2.0
飯塚	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 炙甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃
ツムラ	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃 0.5
クラシエ	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃 1.0
コタロー	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃 1.0
三和	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃 1.0
オースギ	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃 1.0
ジュンコウ	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃 1.0
東亜	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.0, 大黃 1.0
JPS	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃 1.0
太虎堂	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃 1.0
テイコク	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 3.0, 升麻 1.0, 大黃 1.0
ホノミ	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 3.0, 升麻 1.0, 大黃 1.0
本草	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黃 1.0
韓国	當帰 8.0, 柴胡 6.0, 黃芩 4.0, 甘草 3.0, 升麻 2.0, 大黃 2.0
中国	當帰 6.0, 柴胡 5.0, 黃芩 3.0, 炙甘草 3.0, 升麻 2.0, 大黃 1.0, 大棗 3.0, 生姜 2.0

### 解急蜀椒湯 [外台秘要]

富山	粳米 8.0, 半夏 5.0, 人參 3.0, 大棗 3.0, 山椒 2.0, 甘草 1.5, 乾姜 1.5, 附子
福島	粳米 10.0, 半夏 7.0, 人參 3.0, 大棗 3.0, 山椒 2.0, 炙甘草 1.5, 乾姜 4.0, 附子
千葉	粳米 8.0, 半夏 5.0, 人參 3.0, 大棗 3.0, 山椒 2.0, 甘草 1.5, 乾姜 1.5, 附子
九州	粳米 10.0, 半夏 7.0, 人參 3.0, 大棗 3.0, 山椒 2.0, 炙甘草 1.5, 乾姜 4.0, 附子
北里	粳米 8.0, 半夏 5.0, 人參 2.0, 大棗 3.0, 山椒 2.0, 甘草 1.5, 乾姜 1.0, 附子
近畿	粳米 7.0, 半夏 8.0, 人參 2.0, 大棗 3.0, 山椒 1.0, 甘草 1.0, 乾姜 4.0, 炮附子 0.3
飯塚	粳米 10.0, 半夏 7.0, 人參 3.0, 大棗 3.0, 山椒 2.0, 炙甘草 1.5, 乾姜 4.0, 附子

韓国	記載なし
中国	粳米 30.0, 半夏 12.0, 人参 18.0, 大棗 17.5, 蜀椒 6.0, 甘草 6.0, 乾姜 12.0, 附子 15.0

### 藿香正氣散料 [和剤局方]

富山	白朮 3.0, 半夏 3.0, 茯苓 3.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 2.0, 桔梗 1.5, 大腹皮 1.0, 蕁香 1.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0
福島	白朮 3.0, 半夏 3.0, 茯苓 3.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 2.0, 桔梗 1.5, 大腹皮 1.0, 蕁香 1.0, 白芷 1.0, 炙甘草 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0
千葉	白朮 3.0, 半夏 3.0, 茯苓 3.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 2.0, 桔梗 1.5, 大腹皮 1.0, 蕁香 1.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0
九州	白朮 3.0, 半夏 3.0, 茯苓 3.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 2.0, 桔梗 1.5, 大腹皮 1.0, 蕁香 1.0, 白芷 1.0, 炙甘草 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0
北里	白朮 3.0, 半夏 3.0, 茯苓 3.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 1.0, 桔梗 1.5, 大腹皮 1.0, 蕁香 1.0, 白芷 1.5, 甘草 1.0, 生姜 0.5, 蘇葉 1.0
近畿	白朮 2.0, 半夏 2.0, 茯苓 1.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 1.0, 桔梗 2.0, 大腹皮 1.0, 蕁香 3.0, 白芷 1.0, 甘草 2.5, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0
飯塚	白朮 3.0, 半夏 3.0, 茯苓 3.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 2.0, 桔梗 1.5, 大腹皮 1.0, 蕁香 1.0, 白芷 1.0, 炙甘草 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0
韓国	白朮 6.0, 半夏 6.0, 茯苓 3.0, 厚朴 6.0, 陳皮 6.0, 桔梗 6.0, 大腹皮 3.0, 蕁香 9.0, 白芷 3.0, 甘草 7.5, 蘇葉 3.0
中国	白朮 6.0, 半夏 6.0, 茯苓 3.0, 厚朴 6.0, 陳皮 6.0, 桔梗 6.0, 大腹皮 3.0, 蕁香 9.0, 白芷 3.0, 甘草 7.5, 蘇葉 3.0

### 葛根湯 [傷寒論] [金匱要略]

局方	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
富山	葛根 4.0, 麻黃 4.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 茵薑 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 茵薑 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
千葉	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 茵薑 2.0, 甘草 2.0, 生姜 2.0
九州	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5
近畿	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 茵薑 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
飯塚	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0
ツムラ	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 茵薑 2.0, 甘草 2.0, 生姜 2.0
クラン	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
コタロー	葛根 4.0, 麻黃 4.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 茵薑 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
東洋	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 茵薑 2.0, 甘草 2.0, 生生姜 3.0
三和	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 茵薑 2.0, 甘草 2.0, 生生姜 1.0
オースギ	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 茵薑 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
ジュンコウ	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 茵薑 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
サカモト	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 茵薑 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
東亜	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 茵薑 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
JPS	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 茵薑 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
太虎堂	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 茵薑 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
ティイク	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 桂枝 3.0, 茵薑 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
ホノミ	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 茵薑 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
本草	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 茵薑 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
松浦	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 茵薑 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
韓国	葛根 9.0, 麻黃 6.0, 大棗 5.0, 桂枝 6.0, 茵薑 6.0, 炙甘草 2.0, 生姜 6.0
中国	葛根 12.0, 麻黃 9.0, 大棗 6.0, 桂枝 6.0, 茵薑 6.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0

### 葛根黃連黃芩湯 [傷寒論]

富山	葛根 9.0, 黃連 3.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0
福島	葛根 8.0, 黃連 3.0, 黃芩 3.0, 炙甘草 2.0
千葉	葛根 9.0, 黃連 3.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0
九州	葛根 8.0, 黃連 3.0, 黃芩 3.0, 炙甘草 2.0
北里	葛根 6.0, 黃連 3.0, 黃芩 3.0, 甘草 2.0
近畿	葛根 8.0, 黃連 3.0, 黃芩 3.0, 甘草 3.0
飯塚	葛根 8.0, 黃連 3.0, 黃芩 3.0, 炙甘草 2.0
韓国	葛根 9.0, 黃連 6.0, 黃芩 9.0, 生甘草 3.0
中国	葛根 15.0, 黃連 9.0, 黃芩 9.0, 炙甘草 6.0

### 葛根加朮附湯

富山	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 蒼朮 3.0, 桂皮 2.0, 茵薑 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 附子
福島	葛根 8.0, 麻黃 3.0, 大棗 4.0, 白朮 5.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 附子
千葉	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 蒼朮 3.0, 桂皮 2.0, 茵薑 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 附子
九州	葛根 8.0, 麻黃 3.0, 大棗 4.0, 白朮 5.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 附子
北里	記載なし
近畿	記載なし
飯塚	葛根 8.0, 麻黃 3.0, 大棗 4.0, 白朮 5.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 附子
三和	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 蒼朮 3.0, 桂皮 2.0, 茵薑 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 炮附子 0.5
韓国	葛根 9.0, 麻黃 6.0, 大棗 5.0, 桂枝 6.0, 茵薑 6.0, 炙甘草 2.0, 生姜 6.0, 白朮 9.0, 附子 6.0

中国 葛根 12.0, 麻黄 9.0, 大棗 6.0, 桂枝 6.0, 茵薑 6.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0, 蒼朮 4.0, 附子 1.0

葛根湯加川芎辛夷

富山	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	葛根 8.0, 麻黃 3.0, 大棗 4.0, 白朮 5.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 附子
千葉	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
九州	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5
近畿	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 茵薑 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 4.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
飯塚	葛根 8.0, 麻黃 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 茵薑 3.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0
ツムラ	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 茵薑 2.0, 川芎 2.0, 辛夷 2.0, 甘草 2.0, 生姜 2.0
クラシエ	葛根 4.0, 麻黃 4.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 茵薑 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 2.0
コタロー	葛根 4.0, 麻黃 4.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 茵薑 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 2.0
東洋	葛根 4.0, 麻黃 3.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 茵薑 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生生姜 3.0
オースギ	葛根 4.0, 麻黃 4.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 茵薑 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
サカモト	葛根 4.0, 麻黃 4.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 茵薑 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
東亜	葛根 4.0, 麻黃 4.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 茵薑 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
JPS	葛根 4.0, 麻黃 4.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 茵薑 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
テイコク	葛根 4.0, 麻黃 4.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 茵薑 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
本草	葛根 4.0, 麻黃 4.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 茵薑 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
韓国	記載なし
中国	葛根 12.0, 麻黃 9.0, 大棗 6.0, 桂枝 6.0, 茵薑 6.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0

加味温胆湯 [万病回春]

富山	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 陳皮 3.0, 竹筍 3.0, 遠志 2.0, 甘草 2.0, 玄参 2.0, 枳実 2.0, 酸棗仁 2.0, 地黃 2.0, 大棗 2.0, 人參 2.0, 生姜 1.0
福島	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 陳皮 3.0, 竹筍 3.0, 遠志 2.0, 炙甘草 2.0, 玄参 2.0, 枳実 2.0, 酸棗仁 2.0, 地黃 2.0, 大棗 2.0, 人參 2.0, 生姜 1.0
千葉	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 陳皮 3.0, 竹筍 3.0, 遠志 2.0, 甘草 2.0, 玄参 2.0, 枳実 2.0, 酸棗仁 2.0, 地黃 2.0, 大棗 2.0, 人參 2.0, 生姜 1.0
九州	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 陳皮 3.0, 竹筍 3.0, 遠志 2.0, 炙甘草 2.0, 玄参 2.0, 枳実 2.0, 酸棗仁 2.0, 地黃 2.0, 大棗 2.0, 人參 2.0, 生姜 1.0
北里	半夏 5.0, 茯苓 3.0, 陳皮 3.0, 竹筍 3.0, 遠志 2.0, 甘草 2.0, 玄参 2.0, 枳実 3.0, 酸棗仁 2.0, 地黃 2.0, 大棗 2.0, 人參 2.0, 生姜 0.5
近畿	半夏 3.5, 茯苓 1.1, 陳皮 2.2, 竹筍 1.5, 遠志 1.0, 甘草 1.1, 玄参 2.0, 枳実 1.5, 酸棗仁 1.0, 熟地黃 1.0, 大棗 1.0, 人參 1.0, 生姜 1.0, 五味子 1.0
飯塚	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 陳皮 3.0, 竹筍 3.0, 遠志 2.0, 炙甘草 2.0, 玄参 2.0, 枳実 2.0, 酸棗仁 2.0, 地黃 2.0, 大棗 2.0, 人參 2.0, 生姜 1.0
韓国	半夏 9.0, 茯苓 9.0, 陳皮 6.0, 竹筍 6.0, 遠志 2.0, 炙甘草 3.0, 玄参 2.0, 枳実 6.0, 酸棗仁 2.0, 熟地黃 5.0, 大棗 3.0, 人參 6.0, 生姜 5.0
中国	半夏 6.0, 茯苓 6.0, 陳皮 9.0, 竹筍 6.0, 遠志 2.0, 炙甘草 3.0, 玄参 2.0, 枳実 6.0, 酸棗仁 2.0, 熟地黃 3.0, 大棗 3.0, 人參 3.0, 生姜 5.0

加味帰脾湯 [内科摘要]

富山	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黃耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
福島	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黃耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 炙甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
千葉	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黃耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
九州	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黃耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 炙甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
北里	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黃耆 3.0, 当帰 2.0, 遠志 2.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 0.5, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
近畿	人参 1.5, 白朮 1.5, 茯苓 1.5, 酸棗仁 1.5, 龍眼肉 1.5, 黃耆 1.5, 当帰 1.0, 遠志 1.0, 大棗 1.5, 甘草 0.5, 木香 0.5, 生姜 0.5, 柴胡 1.5, 山梔子 1.0
飯塚	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黃耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 炙甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
ツムラ	人参 3.0, 蒼朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黃耆 3.0, 当帰 2.0, 遠志 2.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
クラシエ	人参 3.0, 白朮 3.0, 茶芩 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黃耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.5, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 0.5, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
東洋	人参 3.0, 白朮 3.0, 茶芩 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黃耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 2.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生生姜 1.5, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0
オースギ	人参 3.0, 蒼朮 3.0, 茶芩 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黃耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.0, 大棗 1.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
KTS	人参 3.0, 蒼朮 3.0, 茶芩 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黃耆 3.0, 当帰 2.0, 遠志 2.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 0.5, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0
太虎堂	人参 3.0, 白朮 3.0, 茶芩 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黃耆 3.0, 当帰 2.0, 遠志 2.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 0.5, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0
韓国	人参 12.0, 白朮 9.0, 茶芩 9.0, 酸棗仁 9.0, 龍眼肉 9.0, 黃耆 12.0, 当帰 9.0, 遠志 6.0, 大棗 4.5, 甘草 6.0, 木香 6.0, 生姜 6.0, 柴胡 5.0, 山梔子 5.0
中国	人参 4.5, 白朮 9.0, 茶芩 9.0, 酸棗仁 9.0, 龍眼肉 9.0, 黃耆 9.0, 当帰 3.0, 遠志 3.0, 大棗 2.0, 炙甘草 2.0, 木香 4.5, 生姜 5.0, 柴胡 5.0, 山梔子 5.0