

界及び大学生による大麻乱用問題、2009年8月の芸能人によるMDMA、覚せい剤乱用問題の報道により、薬物乱用・依存問題に対する世論の関心が高まり、2009年調査では回収率が上昇すると共に、大麻、MDMAの周知度が急上昇したが、今回の2011年調査では、回収率の維持ができたとともに、これらマスメディア報道の影響が未だに影響を及ぼしている可能性を示唆する結果が多々見られる結果であった。ただし、2009年調査に比べて、生涯被誘惑率はすべての薬物で減少しており、生涯経験率も覚せい剤、MDMA以外の薬物では減少していた。乱用薬物から見たわが国の薬物乱用状況は、従来の有機溶剤優位型（途上国型ないしは我が国独自型）から欧米型（大麻優位型）に変化してきていることには変わりはない。時代と共に変化して行く薬物乱用状況を迅速に把握するために、本調査を継続的に実施して行くことが必要である。

F. 健康危険情報

本調査自体が健康危険情報に関するものであるが、急を要する結果はなかった。

G. 研究発表

1. 著書

- 1) 和田 清、尾崎 茂、近藤あゆみ、嶋根卓也：I 物質依存 2. わが国の物質乱用・依存の疫学と動向. 専門医のための精神科臨床リュミエール26. 中山書店. 東京. pp. 14-27, 2011. 6. 10.

2. 論文

- 1) 和田 清、小堀栄子：薬物依存とHIV/HCV感染－現状と対策－. 日本エイズ学会誌 13(1) : 1-7, 2011.
- 2) 和田 清、嶋根卓也、船田正彦：わが国における薬物乱用・依存の最近の特徴. 日本社会精神医学会雑誌 20(4) : 407-414, 2011.

3. 学会発表

- 1) Kiyoshi Wada: The History and Current State of Drug Abuse in Japan. The First Asian Pacific Conference on Substance Abuse and Prevention/Treatment. 國立中正大學大禮堂國際會議廳(台灣). 國立中正大學、國立成功大學、國家衛生研究院. 2011. 5. 26-

27.

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む）

1. 特許取得 なし
2. 実用新案登録 なし
3. その他 なし

謝辞

本調査研究にご回答をいただいた、多くの方々に、心よりお礼を述べさせていただきます。

引用文献

- 1) 福井 進、和田 清、伊豫雅臣：薬物依存の世帯調査. 平成4年度厚生科学研究費補助金（麻薬等総合対策研究事業）「薬物依存の社会学的、精神医学的特徴に関する研究（主任研究者：福井 進）」平成4年度研究報告書、pp. 9-23, 1993.
- 2) 福井 進、和田 清、伊豫雅臣：薬物依存の世帯調査. 平成5年度厚生科学研究費補助金（麻薬等総合対策研究事業）「薬物依存の社会学的、精神医学的特徴に関する研究（主任研究者：福井 進）」平成5年度研究報告書、pp. 5-26, 1994.
- 3) 福井 進、和田 清、伊豫雅臣：薬物依存の世帯調査. 平成6年度厚生科学研究費補助金（麻薬等総合対策研究事業）「薬物依存の社会学的、精神医学的特徴に関する研究（主任研究者：福井 進）」平成6年度研究報告書、pp. 5-34, 1995.
- 4) 福井 進、和田 清、伊豫雅臣、浦田重治郎、尾崎 茂：薬物乱用・依存の世帯調査. 平成7年度厚生科学研究費補助金（麻薬等対策総合研究事業）「薬物依存・中毒者の疫学調査及び精神医療サービスに関する研究（主任研究者：寺元 弘）」平成7年度研究報告書第1分冊、pp. 5-35, 1996.
- 5) 福井 進、和田 清、菊池周一、尾崎 茂、浦田重治郎：薬物乱用・依存の世帯調査. 平成9年度厚生科学研究費補助金（麻薬等対策総合研究事業）「薬物依存・中毒者の疫学調査及び精神医療サービスに関する研究（主任研究者：寺元 弘）」平成9年度研究報告書第1分冊、pp. 7-48, 1998.
- 6) 和田 清、勝野眞吾、尾崎米厚、中野良吾：中学生における「シンナー遊び」・喫煙・飲酒

- についての調査研究. 平成8年度厚生科学研究費補助金（麻薬等対策総合研究事業）研究報告書「薬物依存・中毒者の疫学調査及び精神医療サービスに関する研究班」（主任研究者：寺元 弘）第1分冊薬物乱用・依存の多面的疫学調査研究（2）. pp. 21-60. 1996.
- 7) Wada, K., Price, R.K., Fukui, S.: Reflecting Adult Drinking Culture: Prevalence of Alcohol Use and Drinking Situations among Japanese Junior High School Students in Japan. *Journal of Studies on Alcohol* 59: 381-386, 1998.
- 8) 和田 清、中野良吾、尾崎米厚、勝野眞吾：薬物乱用に関する全国中学生意識・実態調査. 平成10年度厚生科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存等の疫学的研究及び中毒性精神病患者等に対する適切な医療のあり方についての研究（主任研究者：和田 清）研究報告書. pp. 19-83, 1999.
- 9) 和田 清：薬物依存の最近の傾向と対策. 日本医事新報 第3920号: 25-32, 1999.
- 10) 和田 清：中学生における飲酒－飲酒文化の反映－. 日本アルコール・薬物医学会雑誌 34 : 36-48, 1999.
- 11) 和田 清、菊池安希子、尾崎 茂、菊池周一：薬物使用に関する全国住民調査. 平成11年度厚生科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存等の疫学的研究及び中毒性精神病患者等に対する適切な医療のあり方についての研究（主任研究者：和田 清）研究報告書. pp. 17-70, 2000. 3.
- 12) Wada K.: Lifetime Prevalence of Alcohol Drinking, Cigarette Smoking, and Solvent Inhalation among Junior High School Students in Japan: Tradition and Urbanization. *Jpn. J. Alcohol & Drug Dependence* 36 (2): 124-141, 2001.
- 13) 和田 清、菊池安希子、尾崎米厚、勝野眞吾：薬物乱用に関する全国中学生意識・実態調査. 平成12年度厚生科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存等の疫学的研究及び中毒性精神病患者等に対する適切な医療のあり方についての研究（主任研究者：和田 清）研究報告書. pp. 15-76, 2001.
- 14) 和田 清：薬物乱用の現状と歴史. 神経精神薬理 19: 913-923, 1997.
- 15) 和田 清、菊池安希子、尾崎 茂：薬物使用に関する全国住民調査. 平成13年度厚生科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社会経済的損失に関する研究（主任研究者：和田 清）研究報告書. pp. 15-77, 2002. 3.
- 16) 和田 清、畢 穎、鈴木紀美子、尾崎米厚、勝野眞吾：薬物乱用に関する全国中学生意識・実態調査（2002年）. 平成14年度厚生労働科学研究費補助金（医薬安全総合研究事業）「薬物乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社会経済的損失に関する研究（主任研究者：和田 清）研究報告書. pp. 19-86, 2003.
- 17) 和田 清、高橋伸彰、尾崎 茂：薬物使用に関する全国住民調査. 平成15年度厚生労働科学研究費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）「薬物乱用・依存の実態とその社会的影響・対策に関する研究（主任研究者：和田 清）研究報告書. pp. 17-87, 2004. 3.
- 18) 和田 清、嶋根卓也、近藤あゆみ：薬物使用に関する全国住民調査. 平成17年度厚生労働科学研究費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）「薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究（主任研究者：和田 清）研究報告書. pp. 17-105, 2006. 3. 31.
- 19) 和田 清、嶋根卓也、近藤あゆみ：薬物使用に関する全国住民調査. 平成19年度厚生労働科学研究費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）「薬物乱用・依存等の実態把握と「回復」に向けての対応策に関する研究（主任研究者：和田 清）研究報告書. pp. 15-95, 2008. 3. 31.
- 20) 和田 清、尾崎 茂、近藤あゆみ：薬物乱用・依存の今日的状況と政策的課題. 日本アルコール・薬物医学会誌 43(2): 120-131. 2008.
- 1) 和田 清、嶋根卓也、立森久照：薬物使用に関する全国住民調査（2009年）. 平成21年度厚生労働科学研究費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）「薬物乱用・依存の実態把握と再乱用防止のための社会資源等の現状と課題に関する研究（主任研究者：和田 清）研究報告書. pp. 15-95, 2010. 3. 31.

表5 対象の性・年齢・学歴 (%)

	男	女	全体	
年齢	15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳	105 (7.0) 74 (4.9) 113 (7.5) 117 (7.8) 167 (11.1) 170 (11.3) 158 (10.5) 170 (11.3) 188 (12.5) 242 (16.1)	107 (6.6) 100 (6.2) 112 (6.9) 150 (9.2) 203 (12.5) 194 (12.0) 170 (10.5) 175 (10.8) 180 (11.1) 232 (14.3)	212 (6.8) 174 (5.6) 225 (7.2) 267 (8.5) 370 (11.8) 364 (11.6) 328 (10.5) 345 (11.0) 368 (11.8) 474 (15.2)
学歴	小学校 中学校 専門学校（中卒後） 専門学校（高校中退後、ないし高卒後） 高等学校 短大・大学以上 その他 無回答	1 (.1) 98 (6.5) 33 (2.2) 139 (9.2) 630 (41.9) 583 (38.8) 13 (.9) 7 (.5)	1 (.1) 97 (6.0) 40 (2.5) 251 (15.5) 685 (42.2) 533 (32.8) 12 (.7) 4 (.2)	2 (.1) 195 (6.2) 73 (2.3) 390 (12.5) 1315 (42.1) 1116 (35.7) 25 (.8) 11 (.4)
合計		1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表6 対象の職業・身分 (%)

	男	女	全体
中学生	7 (.5)	10 (.6)	17 (.5)
高校生	69 (4.6)	67 (4.1)	136 (4.3)
予備校生	6 (.4)	1 (.1)	7 (.2)
専門学校、各種学校生徒	11 (.7)	17 (1.0)	28 (.9)
短大生、大学生、大学院生	41 (2.7)	45 (2.8)	86 (2.8)
農林漁業自営者	23 (1.5)	11 (.7)	34 (1.1)
商店主	38 (2.5)	22 (1.4)	60 (1.9)
工場主	26 (1.7)	7 (.4)	33 (1.1)
土木建設業種	41 (2.7)	9 (.6)	50 (1.6)
医療関係業種	11 (.7)	5 (.3)	16 (.5)
サービス業事業主	51 (3.4)	38 (2.3)	89 (2.8)
その他の事業主	23 (1.5)	18 (1.1)	41 (1.3)
販売従業者	120 (8.0)	143 (8.8)	263 (8.4)
保安従業者	32 (2.1)	2 (.1)	34 (1.1)
運輸従業者	85 (5.7)	3 (.2)	88 (2.8)
通信従事者	7 (.5)	3 (.2)	10 (.3)
サービス業従事者	32 (2.1)	83 (5.1)	115 (3.7)
技能職従事者	20 (1.3)	33 (2.0)	53 (1.7)
土木建築業従事者	113 (7.5)	2 (.1)	115 (3.7)
工場労働者、工業作業者	177 (11.8)	59 (3.6)	236 (7.5)
その他の労務従事者	32 (2.1)	30 (1.8)	62 (2.0)
専務従事者	140 (9.3)	211 (13.0)	351 (11.2)
管理的職業	76 (5.1)	4 (.2)	80 (2.6)
医療職従事者	34 (2.3)	123 (7.6)	157 (5.0)
その他の専門、技術職従事者	130 (8.6)	69 (4.3)	199 (6.4)
専業主婦	3 (.2)	456 (28.1)	459 (14.7)
無職	109 (7.2)	63 (3.9)	172 (5.5)
その他	34 (2.3)	73 (4.5)	107 (3.4)
無回答	13 (.9)	16 (1.0)	29 (.9)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表7 これまでの飲酒経験の有無 (%)

飲酒経験		男		女		全体	
		なし	あり	なし	あり	なし	あり
なし		75	(5.0)	85	(5.2)	160	(5.1)
あり		1425	(94.7)	1537	(94.7)	2962	(94.7)
無回答		4	(.3)	1	(.1)	5	(.2)
合計		1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表7-2 生涯飲酒経験率(%) 未補正

男		なし		あり		無回答		合計	
		度数	(%)	度数	(%)	度数	(%)	度数	(%)
年代別	10歳代	52	49.5	51	48.6	2	1.9	105	100.0
	20歳代	5	2.7	182	97.3	0	0	187	100.0
	30歳代	5	1.8	279	98.2	0	0	284	100.0
	40歳代	5	1.5	322	98.2	1	0.3	328	100.0
	50歳代	6	1.7	351	98.2	1	0.3	358	100.0
	60歳代	2	0.8	240	99.2	0	0	242	100.0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	全体	75	5	1425	94.7	4	0.3	1504	100.0
女		なし		あり		無回答		合計	
		度数	(%)	度数	(%)	度数	(%)	度数	(%)
年代別	10歳代	44	41.1	63	58.9	0	0	107	100.0
	20歳代	4	1.9	208	98.1	0	0	212	100.0
	30歳代	2	0.6	351	99.4	0	0	353	100.0
	40歳代	10	2.7	354	97.3	0	0	364	100.0
	50歳代	10	2.8	344	96.9	1	0.3	355	100.0
	60歳代	15	6.5	217	93.5	0	0	232	100.0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	全体	85	5.2	1537	94.7	1	0.1	1623	100.0
全体		なし		あり		無回答		合計	
		度数	(%)	度数	(%)	度数	(%)	度数	(%)
年代別	10歳代	96	45.3	114	53.8	2	0.9	212	100.0
	20歳代	9	2.3	390	97.7	0	0	399	100.0
	30歳代	7	1.1	630	98.9	0	0	637	100.0
	40歳代	15	2.2	676	97.7	1	0.1	692	100.0
	50歳代	16	2.2	695	97.5	2	0.3	713	100.0
	60歳代	17	3.6	457	96.4	0	0	474	100.0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	全体	160	5.1	2962	94.7	5	0.2	3127	100.0

表8 これまでに飲酒した機会（生涯飲酒経験者のみ）（複数回答）（%）

	男		女		全体
冠婚葬祭	1023	(71.8)	1030	(67.0)	2053 (69.3)
仕事・商売上の必要	820	(57.5)	501	(32.6)	1321 (44.6)
上司とのつきあい	782	(54.9)	484	(31.5)	1266 (42.7)
友人・同僚と	1150	(80.7)	1225	(79.7)	2375 (80.2)
その他つきあい	591	(41.5)	313	(20.4)	904 (30.5)
家の食事・団らん	1054	(74.0)	1081	(70.3)	2135 (72.1)
外の食事・団らん	827	(58.0)	811	(52.8)	1638 (55.3)
仕事で嫌なこと	325	(22.8)	228	(14.8)	553 (18.7)
家で面白くないこと	205	(14.4)	167	(10.9)	372 (12.6)
寝る前	457	(32.1)	334	(21.7)	791 (26.7)
その他	30	(2.1)	40	(2.6)	70 (2.4)
飲酒機会ありだが機会不明	10	(.7)	9	(.6)	19 (.6)
合計	1425	(100.0)	1537	(100.0)	2962 (100.0)

表9 初めての飲酒経験年齢（初飲年齢）（飲酒経験者のみ）、（%）、[累積%]

	男		女		全体
小学校以前	69 (4.8)	[4.8]	74 (4.8)	[4.8]	143 (4.8) [4.8]
小学校時代	235 (16.5)	[21.3]	205 (13.3)	[18.2]	440 (14.9) [19.7]
中学校時代	258 (18.1)	[39.4]	148 (9.6)	[27.8]	406 (13.7) [33.4]
中卒後～17歳	259 (18.2)	[57.6]	172 (11.2)	[39.0]	431 (14.6) [47.9]
18～19歳	363 (25.5)	[83.1]	437 (28.4)	[67.4]	800 (27.0) [74.9]
20歳以降	235 (16.5)	[99.6]	490 (31.9)	[99.3]	725 (24.5) [99.4]
初飲酒年齢不明	1 (.1)	[99.6]	5 (.3)	[99.6]	6 (.2) [99.6]
無回答	5 (.4)	[100.0]	6 (.4)	[100.0]	11 (.4) [100.0]
合計	1425 (100.0)		1537 (100.0)		2962 (100.0)

表10 それなりに飲酒するようになった時期（飲酒経験者のみ）、（%）、[累積%]

	男		女		全体
それなりには至ったことない	166 (11.6)	[11.6]	282 (18.3)	[18.3]	448 (15.1) [15.1]
小学校以前	0 (.0)	[0]	1 (.1)	[18.4]	1 (.0) [15.2]
小学校時代	8 (.6)	[12.2]	4 (.3)	[18.7]	12 (.4) [15.6]
中学校時代	9 (.6)	[12.8]	8 (.5)	[19.2]	17 (.6) [16.1]
中卒後～17歳	67 (4.7)	[17.5]	47 (3.1)	[22.3]	114 (3.8) [20.0]
18～19歳	450 (31.6)	[49.1]	239 (15.5)	[37.8]	689 (23.3) [43.2]
20歳以降	694 (48.7)	[97.8]	894 (58.2)	[96.0]	1588 (53.6) [96.9]
飲酒開始時期不明	19 (1.3)	[99.2]	32 (2.1)	[98.0]	51 (1.7) [98.6]
無回答	12 (.8)	[100.0]	30 (2.0)	[100.0]	42 (1.4) [100.0]
合計	1425 (100.0)		1537 (100.0)		2962 (100.0)

表11 過去1年での飲酒経験（飲酒1年経験率）（%）

	男	女	全体
過去1年飲酒経験 なし	163 (10.8)	293 (18.1)	456 (14.6)
あり	1333 (88.6)	1326 (81.7)	2659 (85.0)
無回答	8 (.5)	4 (.2)	12 (.4)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表11-2 飲酒1年経験率の年代別推移（%）

	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	全体
2003							
2005	45.2	95.2	90.1	89.7	86.9	86.5	84
2007	50.6	93	88.9	89.4	88	83.1	83.6
2009	39.3	90.9	86.9	87.8	86.2	83.4	83.8
2011	39.2	89.7	89.6	88.3	88.5	85.4	85

表12 過去1年に飲酒した機会（過去1年飲酒経験者のみ）（複数回答）（%）

	男	女	全体
(冠婚葬祭)	766 (57.5)	590 (44.5)	1356 (51.0)
(仕事・商売上の必要)	631 (47.3)	206 (15.5)	837 (31.5)
(上司とのつきあい)	534 (40.1)	176 (13.3)	710 (26.7)
(友人・同僚と)	990 (74.3)	833 (62.8)	1823 (68.6)
(その他つきあい)	451 (33.8)	187 (14.1)	638 (24.0)
(家の食事・団らん)	975 (73.1)	927 (69.9)	1902 (71.5)
(外の食事・団らん)	687 (51.5)	585 (44.1)	1272 (47.8)
(仕事で嫌なこと)	224 (16.8)	115 (8.7)	339 (12.7)
(家で面白くないこと)	141 (10.6)	96 (7.2)	237 (8.9)
(寝る前)	386 (29.0)	256 (19.3)	642 (24.1)
(その他)	22 (1.7)	27 (2.0)	49 (1.8)
(飲酒機会ありだが機会不明)	3 (.2)	5 (.4)	8 (.3)
合計	1333 (100.0)	1326 (100.0)	2659 (100.0)

表13 過去1年での飲酒頻度（過去1年飲酒経験者のみ）（%）

	男	女	全体
1年間に数回（年5回以内）	219 (16.4)	459 (34.6)	678 (25.5)
2ヶ月に1回（年間約6-11回）	87 (6.5)	127 (9.6)	214 (8.0)
月に1-2回（年間約12-24回）	125 (9.4)	181 (13.7)	306 (11.5)
月に数回（年間約25-51回）	116 (8.7)	128 (9.7)	244 (9.2)
週に1-2回程度	147 (11.0)	156 (11.8)	303 (11.4)
週に3-6回程度	217 (16.3)	138 (10.4)	355 (13.4)
ほとんど毎日	415 (31.1)	125 (9.4)	540 (20.3)
飲んだが頻度不明	4 (.3)	8 (.6)	12 (.5)
無回答	3 (.2)	4 (.3)	7 (.3)
合計	1333 (100.0)	1326 (100.0)	2659 (100.0)

表14 禁酒に対する考え方・実態（生涯飲酒経験者のみ）（%）

	男	女	全体
禁酒は考えたことない	927 (65.1)	1093 (71.1)	2020 (68.2)
禁酒を考えたことはあるが実行したこと はない	290 (20.4)	150 (9.8)	440 (14.9)
禁酒を試みたが現在禁酒に至っていない	96 (6.7)	80 (5.2)	176 (5.9)
禁酒中（初めての禁酒。1年未満。）	9 (.6)	21 (1.4)	30 (1.0)
禁酒中（再挑戦の禁酒。1年未満。）	7 (.5)	10 (.7)	17 (.6)
禁酒中（1年以上）	41 (2.9)	63 (4.1)	104 (3.5)
無回答	55 (3.9)	120 (7.8)	175 (5.9)
合計	1425 (100.0)	1537 (100.0)	2962 (100.0)

表15 禁酒理由（生涯飲酒経験があり、かつ、禁酒を考えたことのある人）（複数回答）（%）

	男	女	全体
健康上の不調は感じないが可能性が心 配になったから	186 (42.0)	114 (35.2)	300 (39.1)
健康上の不調を感じたから	137 (30.9)	58 (17.9)	195 (25.4)
問題は起こしていないが自分の飲酒に その可能性を感じたから	24 (5.4)	10 (3.1)	34 (4.4)
飲酒で問題を起こしたから	10 (2.3)	5 (1.5)	15 (2.0)
その他	39 (8.8)	95 (29.3)	134 (17.5)
禁酒理由不明	57 (12.9)	48 (14.8)	105 (13.7)
無回答	11 (2.5)	11 (3.4)	22 (2.9)
合計	443 (100.0)	324 (100.0)	767 (100.0)

表16 これまでの喫煙経験（生涯喫煙経験）（%）

喫煙経験	男		女		全体	
	なし	あり	なし	あり	なし	あり
なし	277 (18.4)	807 (49.7)	1084 (34.7)			
あり	1222 (81.3)	809 (49.8)	2031 (65.0)			
無回答	5 (.3)	7 (.4)	12 (.4)			
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)			

表16-2 喫煙生涯経験率の年代別比較 生データ

男+女									全体
	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	全体	70歳代以上	
1999	19.1	53.4	54.8	54.1	48.6	48.8			49.3
2001	30.8	71.2	74.5	76.2	65.8	57.8			64.7
2003	24.5	65.2	74.4	73.2	63.7	58.2		49.1	62.1
2005	16.7	68.9	73.5	78.4	69.9	62.2		53.7	65.1
2007	14.9	66.7	73.2	79.1	72.8	63.2		52	65.7
2009	10	58	72.3	77.4	73.9	64.2	66.4		
2011	9.4	51.1	71.0	74.4	74.3	65.4	65.0		
男									
	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	全体	70歳代以上	全体
1999	21.7	69.2	79.7	85.7	85.1	81.4			76.4
2001	39.8	86.6	89.7	91.2	93.1	88.6			86.5
2003	33.6	79.9	88.5	89.2	88.7	85.4		77.1	82.1
2005	15.6	82.5	89.1	93.3	93.3	93.1		86.7	85.9
2007	18.9	75	86.1	91.1	92	92.4		84	84.5
2009	14.2	68.7	86.5	92.4	93.1	96.2	83.1		
2011	9.5	62.6	85.2	89.0	93.3	93.8	81.3		
女									
	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	全体	70歳代以上	全体
1999	15.6	40.2	36.7	26.6	18.5	13.7			25.1
2001	22.5	58.8	62.6	63.7	41.9	23.7			45.1
2003	14.6	54.1	61.9	60.3	41.1	26.9		13	43.1
2005	17.7	57.1	60.9	64.3	48.3	28.2		16.3	45.2
2007	11.3	60.6	63.2	68.3	55.1	32.8		15.9	48.6
2009	5.7	47.1	60.3	61.7	54.7	37.5	50.5		
2011	9.3	41.0	59.5	61.3	55.2	35.8	49.8		

表17 初めての喫煙時期 (生涯喫煙経験者のみ)、(%)、[累積%]

	男	女	全体
小学校以前	14 (1.1) [1.1]	7 (.9) [.9]	21 (1.0) [1.0]
小学校時代	98 (8.0) [9.2]	41 (5.1) [5.9]	139 (6.8) [7.9]
中学校時代	246 (20.1) [29.3]	110 (13.6) [19.5]	356 (17.5) [25.4]
中卒後～17歳	219 (17.9) [47.2]	116 (14.3) [33.9]	335 (16.5) [41.9]
18～19歳	377 (30.9) [78.1]	221 (27.3) [61.2]	598 (29.4) [71.3]
20歳以降	263 (21.5) [99.6]	310 (38.3) [99.5]	573 (28.2) [99.6]
初喫煙年齢不明	3 (.2) [99.8]	3 (.4) [99.9]	6 (.3) [99.9]
無回答	2 (.2) [100.0]	1 (.1) [100.0]	3 (.1) [100.0]
合計	1222 (100.0)	809 (100.0)	2031 (100.0)

表18 それなりに喫煙するようになった時期（喫煙経験者のみ）、（%）、〔累積%〕

	男		女		全体
それなりには至ったことない	138 (11.3)	[11.3]	268 (33.1)	[33.0]	406 (20.0) [20.0]
小学校以前	0 (.0)	[0]	0 (.0)	[0]	0 (.0) [0]
小学校時代	4 (.3)	[11.6]	1 (.1)	[33.3]	5 (.2) [20.2]
中学校時代	66 (5.4)	[17.0]	21 (2.6)	[35.8]	87 (4.3) [24.5]
中卒後～17歳	123 (10.1)	[27.1]	60 (7.4)	[43.3]	183 (9.0) [33.5]
18～19歳	444 (36.3)	[63.4]	133 (16.4)	[59.7]	577 (28.4) [61.9]
20歳以降	401 (32.8)	[96.2]	248 (30.7)	[90.4]	649 (32.0) [93.9]
喫煙開始時期不明	41 (3.4)	[99.6]	62 (7.7)	[98.0]	103 (5.1) [99.0]
無回答	5 (.4)	[100.0]	16 (2.0)	[100.0]	21 (1.0) [100.0]
合計	1222 (100.0)		809 (100.0)		2031 (100.0)

表19 過去1年間での喫煙経験 (%)

	男		女		全体
過去1年喫煙経験	なし	833 (55.4)	1328 (81.8)	2161 (69.1)	
	あり	654 (43.5)	257 (15.8)	911 (29.1)	
	無回答	17 (1.1)	38 (2.3)	55 (1.8)	
合計	1504 (100.0)		1623 (100.0)		3127 (100.0)

表19-2 喫煙1年経験率の年代別比較 生データ

男+女	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	全体	70歳代以上	全体
2001	22.2	52.3	44.7	41.7	34.7	25.1			36
2003	15.3	43	43.4	37.6	33.4	27.5		18.9	32.9
2005	9.9	48.8	41.9	41.2	35.7	32.3		16.2	34.6
2007	8.4	41.1	37.5	37.1	33.2	24.2		17.6	30.3
2009	7.1	35.1	38.9	38.1	31.7	23.7	32.2		
2011	6.1	28.3	35.9	32.5	32.1	21.5	29.1		
男									
	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代以上	全体	70歳代以上	全体
2001	29.7	73.8	68.2	62.4	58.3	40.8			54.7
2003	21.2	62.1	61.7	59.5	53.5	42.9		29.8	49.2
2005	12.4	62.5	60.5	56.6	53.7	48.2		27.2	49.1
2007	10.8	59.2	53.4	49.8	54.7	39.4		27.9	44.8
2009	11.3	48.5	58.9	53.9	50.8	42.2	48.9		
2011	6.7	40.6	54.2	48.2	48.6	35.1	43.5		
女									
	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代以上	全体	70歳代以上	全体
2001	15.5	34.9	26.5	24.4	14	7.9			19.1
2003	8.7	28.6	27.3	20	15.2	9.8		4.7	17.5
2005	7.5	36.9	26.6	26.4	18.1	14.2		2.7	20.3
2007	6.3	27.9	25.3	25.7	13.5	8.3		5.6	17
2009	2.9	21.5	22	21.5	12.4	8.3	16.4		
2011	5.6	17.5	21.2	18.4	15.5	7.3	15.8		

表20 過去1年の喫煙頻度（過去1年喫煙経験者のみ）（%）

	男	女	全体
1年間に数回（年間5回以内）	49 (7.5)	27 (10.5)	76 (8.3)
2ヶ月に1回程度（年6-11回）	5 (.8)	3 (1.2)	8 (.9)
月に1-2回程度（年12-24回）	6 (.9)	2 (.8)	8 (.9)
月に数回（年25-51回）	15 (2.3)	1 (.4)	16 (1.8)
週に1-2回程度	4 (.6)	3 (1.2)	7 (.8)
週に3-6回程度	8 (1.2)	8 (3.1)	16 (1.8)
ほとんど毎日（1日1-10本）	136 (20.8)	120 (46.7)	256 (28.1)
ほとんど毎日（1日11-20本）	292 (44.6)	68 (26.5)	360 (39.5)
ほとんど毎日（1日21本以上）	132 (20.2)	25 (9.7)	157 (17.2)
ほとんど毎日（パイプたばこ）	7 (1.1)	0 (.0)	7 (.8)
合計	654 (100.0)	257 (100.0)	911 (100.0)

表21 禁煙に対する考え方（生涯喫煙経験者のみ）（%）

	男	女	全体
禁煙を考えたことはない	307 (25.1)	346 (42.8)	653 (32.2)
禁煙を考えたことはあるが実行したことではない	201 (16.4)	78 (9.6)	279 (13.7)
禁煙を試みたが現在禁煙に至っていない	243 (19.9)	112 (13.8)	355 (17.5)
禁煙中（初めての禁煙。1年未満。）	26 (2.1)	11 (1.4)	37 (1.8)
禁煙中（再挑戦の禁煙。1年未満。）	26 (2.1)	17 (2.1)	43 (2.1)
禁煙中（1年以上）	396 (32.4)	218 (26.9)	614 (30.2)
無回答	23 (1.9)	27 (3.3)	50 (2.5)
合計	1222 (100.0)	809 (100.0)	2031 (100.0)

表22 禁煙理由（喫煙経験者で、禁煙を考えたことがある人のみ）（複数回答）（%）

	男	女	全体
健康上の不調は感じないが可能性が心配になつた	332 (37.2)	151 (34.6)	483 (36.4)
健康上の不調	231 (25.9)	80 (18.3)	311 (23.4)
喫煙者が白い目で見られるようになった	47 (5.3)	20 (4.6)	67 (5.0)
人から勧められた	99 (11.1)	29 (6.7)	128 (9.6)
家族や他者の健康への影響を考えて	202 (22.6)	91 (20.9)	293 (22.1)
その他	165 (18.5)	126 (28.9)	291 (21.9)
吸える場所の減少	98 (11.0)	32 (7.3)	130 (9.8)
禁煙理由不明	40 (4.5)	20 (4.6)	60 (4.5)
無回答	10 (1.1)	8 (1.8)	18 (1.4)
合計	892 (100.0)	436 (100.0)	1328 (100.0)

表23 家庭の常備薬（複数回答）（%）

	男	女	全体
とくになし	280 (18.6)	138 (8.5)	418 (13.4)
風邪薬	935 (62.2)	1173 (72.3)	2108 (67.4)
胃腸薬	782 (52.0)	960 (59.1)	1742 (55.7)
ビタミン剤	339 (22.5)	462 (28.5)	801 (25.6)
高血圧薬	165 (11.0)	157 (9.7)	322 (10.3)
糖尿病薬	66 (4.4)	44 (2.7)	110 (3.5)
精神安定薬	58 (3.9)	75 (4.6)	133 (4.3)
湿布薬	687 (45.7)	1008 (62.1)	1695 (54.2)
強精強肝薬	14 (.9)	6 (.4)	20 (.6)
睡眠薬	53 (3.5)	83 (5.1)	136 (4.3)
鎮痛薬	516 (34.3)	905 (55.8)	1421 (45.4)
抗生素質	111 (7.4)	143 (8.8)	254 (8.1)
便秘薬	161 (10.7)	345 (21.3)	506 (16.2)
目薬	739 (49.1)	963 (59.3)	1702 (54.4)
鼻炎薬	321 (21.3)	467 (28.8)	788 (25.2)
セットの置き薬	289 (19.2)	315 (19.4)	604 (19.3)
その他	26 (1.7)	59 (3.6)	85 (2.7)
無回答	14 (.9)	8 (.5)	22 (.7)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表24 過去1年間に一回でも使用したことのある医薬品（複数回答）（%）

	男	女	全体
とくになし	173 (11.5)	120 (7.4)	293 (9.4)
風邪薬	913 (60.7)	1082 (66.7)	1995 (63.8)
胃腸薬	593 (39.4)	669 (41.2)	1262 (40.4)
ビタミン剤	306 (20.3)	441 (27.2)	747 (23.9)
高血圧薬	184 (12.2)	112 (6.9)	296 (9.5)
糖尿病薬	70 (4.7)	23 (1.4)	93 (3.0)
湿布薬	571 (38.0)	794 (48.9)	1365 (43.7)
強精強肝薬	23 (1.5)	7 (.4)	30 (1.0)
抗生素質	280 (18.6)	459 (28.3)	739 (23.6)
便秘薬	82 (5.5)	259 (16.0)	341 (10.9)
目薬	689 (45.8)	875 (53.9)	1564 (50.0)
鼻炎薬	304 (20.2)	403 (24.8)	707 (22.6)
セットの置き薬	85 (5.7)	105 (6.5)	190 (6.1)
その他	54 (3.6)	149 (9.2)	203 (6.5)
無回答	15 (1.0)	15 (.9)	30 (1.0)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表25 過去1年間での鎮痛薬使用頻度 (%)

	男	女	全体
一度も飲んでいない	788 (52.4)	489 (30.1)	1277 (40.8)
1年間に数回(年5回以内)	471 (31.3)	570 (35.1)	1041 (33.3)
2ヶ月に1回(年約6-11回)	65 (4.3)	144 (8.9)	209 (6.7)
月に1-2回(年約12-24回)	61 (4.1)	213 (13.1)	274 (8.8)
月に数回(年約25-51回)	37 (2.5)	98 (6.0)	135 (4.3)
週に1-2回程度	23 (1.5)	48 (3.0)	71 (2.3)
週に3-6回程度	14 (.9)	17 (1.0)	31 (1.0)
ほとんど毎日	21 (1.4)	23 (1.4)	44 (1.4)
飲んだが頻度不明	11 (.7)	14 (.9)	25 (.8)
無回答	13 (.9)	7 (.4)	20 (.6)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表26 鎮痛薬の入手先(鎮痛薬を過去1年間に使用した人のみ)(複数回答) (%)

	男	女	全体
常備薬	100 (14.2)	190 (16.9)	290 (15.8)
家族	57 (8.1)	41 (3.6)	98 (5.4)
医院・病院	342 (48.6)	507 (45.0)	849 (46.4)
薬局・薬店	335 (47.7)	650 (57.7)	985 (53.8)
友人・知人	4 (.6)	16 (1.4)	20 (1.1)
愛人・恋人	2 (.3)	1 (.1)	3 (.2)
その他	7 (1.0)	8 (.7)	15 (.8)
飲んだが入手先不明	15 (2.1)	22 (2.0)	37 (2.0)
無回答	3 (.4)	3 (.3)	6 (.3)
合計	703 (100.0)	1127 (100.0)	1830 (100.0)

表27 鎇痛薬の使用理由(鎮痛薬を過去1年間使用した人のみ)(複数回答) (%)

	男	女	全体
頭痛	433 (61.6)	807 (71.6)	1240 (67.8)
歯痛	166 (23.6)	162 (14.4)	328 (17.9)
腰痛	86 (12.2)	95 (8.4)	181 (9.9)
生理痛	0 (.0)	384 (34.1)	384 (21.0)
胃痛	47 (6.7)	66 (5.9)	113 (6.2)
肩こり	57 (8.1)	103 (9.1)	160 (8.7)
その他の痛み	58 (8.3)	58 (5.1)	116 (6.3)
遊び・快感目的	2 (.3)	0 (.0)	2 (.1)
その他	33 (4.7)	45 (4.0)	78 (4.3)
使用目的不明	20 (2.8)	22 (2.0)	42 (2.3)
合計	703 (100.0)	1127 (100.0)	1830 (100.0)

表28 鎮痛薬使用の実情・心情(%)

選択肢		男	女	全体
必要がないので考えたことがない	1504 (100.0)	682 (45.3)	360 (22.2)	1042 (33.3)
必要なときは心配せずに使っている	1504 (100.0)	480 (31.9)	640 (39.4)	1120 (35.8)
心配もあるがどちらかといえば使う	1504 (100.0)	141 (9.4)	358 (22.1)	499 (16.0)
心配だからどちらかというと使わない	1504 (100.0)	31 (2.1)	101 (6.2)	132 (4.2)
心配だからとにかく使わない	1504 (100.0)	6 (.4)	9 (.6)	15 (.5)
不明	1504 (100.0)	131 (8.7)	131 (8.1)	262 (8.4)
無回答	1504 (100.0)	33 (2.2)	24 (1.5)	57 (1.8)
合計	1504 (100.0)	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表29 この1年間での精神安定薬（抗不安薬）の使用頻度 (%)

選択肢		男	女	全体
一度も飲んでいない	1504 (100.0)	1416 (94.1)	1514 (93.3)	2930 (93.7)
1年間に数回（年5回以内）	1504 (100.0)	216 (1.1)	27 (1.7)	43 (1.4)
2ヶ月に1回（年約6-11回）	1504 (100.0)	2 (.1)	6 (.4)	8 (.3)
月に1-2回（年約12-24回）	1504 (100.0)	4 (.3)	4 (.2)	8 (.3)
月に数回（年約25-51回）	1504 (100.0)	5 (.3)	6 (.4)	11 (.4)
週に1-2回	1504 (100.0)	1 (.1)	10 (.6)	11 (.4)
週に3-6回	1504 (100.0)	8 (.5)	9 (.6)	17 (.5)
ほとんど毎日	1504 (100.0)	37 (2.5)	40 (2.5)	77 (2.5)
飲んだが頻度不明	1504 (100.0)	1 (.1)	1 (.1)	2 (.1)
無回答	1504 (100.0)	14 (.9)	6 (.4)	20 (.6)
合計	1504 (100.0)	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表30 精神安定薬の入手先（過去1年間に精神安定薬を使った人）（複数回答）(%)

選択肢		男	女	全体
常備薬	177 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
家族	177 (100.0)	5 (6.8)	1 (1.0)	6 (3.4)
医院・病院	177 (100.0)	61 (82.4)	91 (88.3)	152 (85.9)
薬局・薬店	177 (100.0)	5 (6.8)	3 (2.9)	8 (4.5)
友人・知人	177 (100.0)	0 (.0)	1 (1.0)	1 (.6)
愛人・恋人	177 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
その他	177 (100.0)	2 (2.7)	1 (1.0)	3 (1.7)
飲んだが入手先不明	177 (100.0)	3 (4.1)	8 (7.8)	11 (6.2)
無回答	177 (100.0)	1 (1.4)	1 (1.0)	2 (1.1)
合計	177 (100.0)	74 (100.0)	103 (100.0)	177 (100.0)

表31 精神安定薬の使用理由（過去1年間に精神安定薬を使った人）（複数回答）（%）

理由	男	女	全体
不眠改善	131 (41.9)	54 (52.4)	85 (48.0)
不安解消	31 (41.9)	46 (44.7)	77 (43.5)
ストレス軽減	20 (27.0)	23 (22.3)	43 (24.3)
高血圧の治療	3 (.1)	2 (.1)	5 (.2)
遊び・快感目的	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
その他	10 (13.5)	19 (18.4)	29 (16.4)
使用目的不明	6 (8.1)	8 (7.8)	14 (7.9)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表32 精神安定薬使用の実情・心情（%）

実情・心情	男	女	全体
必要がないので考えたことがない	1333 (88.6)	1385 (85.3)	2718 (86.9)
必要なときは心配せずに使っている	62 (.1)	71 (.4)	133 (.4)
心配もあるがどちらかというと使う	58 (3.9)	80 (4.9)	138 (4.4)
心配だからどちらかというと使わない	19 (1.3)	34 (2.1)	53 (1.7)
心配だからとにかく使わない	9 (.6)	24 (1.5)	33 (1.1)
不明	5 (.3)	9 (.6)	14 (.4)
無回答	18 (1.2)	20 (1.2)	38 (1.2)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表33 1年間での睡眠薬の使用頻度（%）

頻度	男	女	全体
一度も飲んでいない	1426 (94.8)	1515 (93.3)	2941 (94.1)
1年間に数回（年5回以内）	28 (.1)	30 (.1)	58 (.1)
2ヶ月に1回（年約6-11回）	3 (.2)	8 (.5)	11 (.4)
月に1-2回（年約12-24回）	5 (.3)	7 (.4)	12 (.4)
月に数回（年約25-51回）	2 (.1)	7 (.4)	9 (.3)
週に1-2回	3 (.2)	13 (.8)	16 (.5)
週に3-6回	7 (.5)	7 (.4)	14 (.4)
ほとんど毎日	23 (1.5)	23 (1.4)	46 (1.5)
飲んだが頻度不明	2 (.1)	4 (.2)	6 (.2)
無回答	5 (.3)	9 (.6)	14 (.4)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表34 睡眠薬の入手先（過去1年に睡眠薬を使用した人）（複数回答）（%）

入手先	性別		男	女	全体
	男	女			
常備薬	130 (75.0)	106 (59.1)	130 (100.0)	106 (100.0)	236 (100.0)
家族	36 (20.5)	30 (17.5)	36 (27.7)	30 (28.3)	66 (29.1)
医院・病院	61 (34.8)	51 (29.5)	61 (46.2)	51 (48.1)	112 (49.1)
薬局・薬店	17 (9.6)	10 (5.8)	17 (12.5)	10 (10.1)	27 (11.7)
友人・知人	10 (.0)	3 (1.7)	10 (7.5)	3 (3.0)	13 (5.7)
愛人・恋人	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
その他	1 (1.4)	2 (2.0)	1 (1.4)	2 (2.0)	3 (1.7)
入手先不明	2 (2.7)	2 (2.0)	2 (2.7)	2 (2.0)	4 (2.3)
無回答	1 (1.4)	0 (.0)	1 (1.4)	0 (.0)	1 (.6)
合計	173 (100.0)	99 (100.0)	173 (100.0)	99 (100.0)	172 (100.0)

表35 睡眠薬の使用理由（過去1年に睡眠薬を使用した人）（複数回答）（%）

目的	性別		男	女	全体
	男	女			
不眠改善	58 (79.5)	91 (91.9)	149 (86.6)	149 (86.6)	149 (86.6)
不安解消	12 (16.4)	18 (18.2)	30 (17.4)	30 (17.4)	30 (17.4)
ストレス軽減	13 (17.8)	10 (10.1)	23 (13.4)	23 (13.4)	23 (13.4)
高血圧の治療	0 (.0)	1 (1.0)	1 (.6)	1 (.6)	1 (.6)
遊び・快感目的	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
その他	6 (8.2)	5 (5.1)	11 (6.4)	11 (6.4)	11 (6.4)
使用目的不明	2 (2.7)	0 (.0)	2 (1.2)	2 (1.2)	2 (1.2)
合計	173 (100.0)	99 (100.0)	173 (100.0)	99 (100.0)	172 (100.0)

表36 睡眠薬使用の実情・心情（%）

	性別		男	女	全体
	男	女			
必要がないので考えたことがない	1330 (88.4)	1388 (85.5)	2718 (86.9)	2718 (86.9)	2718 (86.9)
必要なときは心配せずに使っている	74 (4.9)	70 (4.3)	144 (4.6)	144 (4.6)	144 (4.6)
心配もあるがどちらかといえば使う	51 (3.4)	80 (4.9)	131 (4.2)	131 (4.2)	131 (4.2)
心配だからどちらかといふと使わない	17 (1.1)	34 (2.1)	51 (1.6)	51 (1.6)	51 (1.6)
心配だからとにかく使わない	14 (.9)	25 (1.5)	39 (1.2)	39 (1.2)	39 (1.2)
不明	5 (.3)	4 (.2)	9 (.3)	9 (.3)	9 (.3)
無回答	13 (.9)	22 (1.4)	35 (1.1)	35 (1.1)	35 (1.1)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)	3127 (100.0)	3127 (100.0)

表37 聞いたことのある薬物名(複数回答) (%)

		男	女	全体
有機溶剤	(有機溶剤)	481 (32.0)	204 (12.6)	685 (21.9)
シンナー	(シンナー)	1238 (82.3)	1341 (82.6)	2579 (82.5)
トルエン	(トルエン)	732 (48.7)	457 (28.2)	1189 (38.0)
大麻	(大麻)	1406 (93.5)	1512 (93.2)	2918 (93.3)
マリファナ	(マリファナ)	1214 (80.7)	1274 (78.5)	2488 (79.6)
ハシッシュ	(ハシッシュ)	353 (23.5)	180 (11.1)	533 (17.0)
覚せい剤	(覚せい剤)	1356 (90.2)	1469 (90.5)	2825 (90.3)
ヒロポン	(ヒロポン)	786 (52.3)	534 (32.9)	1320 (42.2)
シャブ	(シャブ)	1159 (77.1)	1139 (70.2)	2298 (73.5)
スピード	(スピード)	773 (51.4)	685 (42.2)	1458 (46.6)
エス		277 (18.4)	244 (15.0)	521 (16.7)
麻薬		1310 (87.1)	1409 (86.8)	2719 (87.0)
モルヒネ		1217 (80.9)	1331 (82.0)	2548 (81.5)
ヘロイン	(ヘロイン)	1109 (73.7)	1054 (64.9)	2163 (69.2)
コカイン	(コカイン)	1315 (87.4)	1405 (86.6)	2720 (87.0)
クラック	(クラック)	324 (21.5)	138 (8.5)	462 (14.8)
LSD	(LSD)	893 (59.4)	647 (39.9)	1540 (49.2)
アシッド	(アシッド)	113 (7.5)	51 (3.1)	164 (5.2)
MDMA	(MDMA)	728 (48.4)	737 (45.4)	1465 (46.9)
エックス	(エックス)	139 (9.2)	97 (6.0)	236 (7.5)
エクスタシー	(エクスタシー)	701 (46.6)	673 (41.5)	1374 (43.9)
マジック・マッシュルーム	(マジック・マッシュルーム)	608 (40.4)	526 (32.4)	1134 (36.3)
すべて知らない	(すべて知らない)	49 (3.3)	44 (2.7)	93 (3.0)
無回答		31 (2.1)	41 (2.5)	72 (2.3)
合計		1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

左端のカッコは同じものであることを意味している。

表38 薬物乱用を繰り返すと依存状態になることを知っているか? (%)

		男	女	全体
知っている	(知っている)	1440 (95.7)	1575 (97.0)	3015 (96.4)
知らない	(知らない)	45 (3.0)	32 (2.0)	77 (2.5)
無回答	(無回答)	19 (1.3)	16 (1.0)	35 (1.1)
合計		1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表39 「シンナー遊び」で死亡すること(急性中毒死)があることを知っているか? (%)

		男	女	全体
知っている	(知っている)	1280 (85.1)	1312 (80.8)	2592 (82.9)
知らない	(知らない)	222 (14.8)	301 (18.5)	523 (16.7)
無回答	(無回答)	2 (.1)	10 (.6)	12 (.4)
合計		1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表40 「シンナー遊び」で幻視・幻聴・妄想などの精神病状態になることがあることを知っているか？（%）

	男	女	全体
知っている	1366 (90.8)	1459 (89.9)	2825 (90.3)
知らない	131 (8.7)	156 (9.6)	287 (9.2)
無回答	7 (.)	8 (.5)	15 (.5)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表41 「シンナー遊び」でフラッシュバック現象があることを知っているか？（%）

	男	女	全体
知っている	1099 (73.1)	1203 (74.1)	2302 (73.6)
知らない	398 (26.5)	411 (25.3)	809 (25.9)
無回答	7 (.5)	9 (.6)	16 (.5)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表42 「シンナー遊び」で無動機症候群になることがあることを知っているか？（%）

	男	女	全体
知っている	1047 (69.6)	1157 (71.3)	2204 (70.5)
知らない	452 (30.1)	459 (28.3)	911 (29.1)
無回答	5 (.3)	7 (.4)	12 (.4)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表43 身近な人で「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を知っているか？（%）

	男	女	全体
知らない	1199 (79.7)	1393 (85.8)	2592 (82.9)
知っている	300 (19.9)	220 (13.6)	520 (16.6)
無回答	5 (.3)	10 (.6)	15 (.5)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表44 身近な人で「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を知っているか？

(年齢群別) (%)

	「シンナー遊び」をした人				度数	合計
	知らない	知っている	無回答	列 %		
15-19歳	204 (7.9)	8 (1.5)	0 (.0)	212 (6.8)		
20-24歳	150 (5.8)	24 (4.6)	0 (.0)	174 (5.6)		
25-29歳	201 (7.8)	23 (4.4)	1 (6.7)	225 (7.2)		
30-34歳	209 (8.1)	57 (11.0)	1 (6.7)	267 (8.5)		
35-39歳	303 (11.7)	64 (12.3)	3 (20.0)	370 (11.8)		
40-44歳	285 (11.0)	79 (15.2)	0 (.0)	364 (11.6)		
45-49歳	258 (10.0)	67 (12.9)	3 (20.0)	328 (10.5)		
50-54歳	262 (10.1)	80 (15.4)	3 (20.0)	345 (11.0)		
55-59歳	306 (11.8)	59 (11.3)	3 (20.0)	368 (11.8)		
60-64歳	414 (16.0)	59 (11.3)	1 (6.7)	474 (15.2)		
合計	2592 (100.0)	520 (100.0)	15 (100.0)	3127 (100.0)		

表45 身近な人で、「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を何人知っているか？

（「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を知っている者のみ） (%)

	男		女		全体
	度数	列 %	度数	列 %	
1人	60	(20.0)	78	(35.5)	138 (26.5)
2人	67	(22.3)	42	(19.1)	109 (21.0)
3人	46	(15.3)	29	(13.2)	75 (14.4)
4人	12	(4.0)	2	(.9)	14 (2.7)
5人	33	(11.0)	19	(8.6)	52 (10.0)
6人	5	(1.7)	5	(2.3)	10 (1.9)
7人	3	(1.0)	3	(1.4)	6 (1.2)
8人	2	(.7)	0	(.0)	2 (.4)
9人	1	(.3)	0	(.0)	1 (.2)
10人	34	(11.3)	17	(7.7)	51 (9.8)
15人	1	(.3)	1	(.5)	2 (.4)
20人	5	(1.7)	5	(2.3)	10 (1.9)
30人	4	(1.3)	2	(.9)	6 (1.2)
50人	2	(.7)	0	(.0)	2 (.4)
100人	2	(.7)	0	(.0)	2 (.4)
150人	0	(.0)	1	(.5)	1 (.2)
無回答	23	(7.7)	16	(7.3)	39 (7.5)
合計	300	(100.0)	220	(100.0)	520 (100.0)
平均±SD	5.40±10.15		4.40±11.23		4.98±10.62
	n=277		n=204		n=481

表46 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1484 (98.7)	1606 (99.0)	3090 (98.8)
知っている	15 (.0)	11 (.7)	26 (.8)
無回答	5 (.3)	6 (.4)	11 (.4)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表47 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

年齢群別	過去1年「シンナー遊び」をした人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	210 (6.8)	2 (7.7)	0 (.0)	212	(6.8)
20-24歳	172 (5.6)	2 (7.7)	0 (.0)	174	(5.6)
25-29歳	220 (7.1)	4 (15.4)	1 (9.1)	225	(7.2)
30-34歳	264 (8.5)	2 (7.7)	1 (9.1)	267	(8.5)
35-39歳	367 (11.9)	1 (3.8)	2 (18.2)	370	(11.8)
40-44歳	363 (11.7)	1 (3.8)	0 (.0)	364	(11.6)
45-49歳	323 (10.5)	3 (11.5)	2 (18.2)	328	(10.5)
50-54歳	337 (10.9)	5 (19.2)	3 (27.3)	345	(11.0)
55-59歳	366 (11.8)	1 (3.8)	1 (9.1)	368	(11.8)
60-64歳	468 (15.1)	5 (19.2)	1 (9.1)	474	(15.2)
合計	3090 (100.0)	26 (100.0)	11 (100.0)	3127	(100.0)

表48 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を何人知っているか？ (過去1年使用者を知っている人のみ) (%)

	男	女	全体
1人	5 (33.3)	5 (45.5)	10 (38.5)
2人	0 (.0)	1 (9.1)	1 (3.8)
5人	1 (6.7)	0 (.0)	1 (3.8)
6人	1 (6.7)	0 (.0)	1 (3.8)
7人	2 (13.3)	1 (9.1)	3 (11.5)
10人	1 (6.7)	1 (9.1)	2 (7.7)
100人	1 (3.7)	0 (.0)	1 (2.3)
無回答	5 (33.3)	3 (27.3)	8 (30.8)
合計	15 (100.0)	11 (100.0)	26 (100.0)
平均±SD	4.00±3.40	3.00±3.51	3.56±3.38
	n=10	n=8	n=18

表49 これまでに「シンナー遊び」に誘われたことがあるか？（生涯被誘惑経験）（%）

	男	女	全体
ない	1431 (95.1)	1587 (97.8)	3018 (96.5)
1年より前にのみあった	65 (4.3)	29 (1.8)	94 (3.0)
1年より前にも、この1年間にもあった	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
この1年間にのみあった	1 (.1)	0 (.0)	1 (.0)
無回答	7 (.5)	7 (.4)	14 (.4)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表50「シンナー遊び」生涯被誘惑経験（年齢群別）（%）

	「シンナー遊び」に誘われた経験					合計	
	ない	1年より前	1年より前	この1年間	無回答	度数	列 %
にのみあった も、この1年間 のみあった							
15-19歳	208 (6.9)	3 (3.2)	0 (.0)	0 (.0)	1 (7.1)	212	(6.8)
20-24歳	171 (5.7)	3 (3.2)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	174	(5.6)
25-29歳	221 (7.3)	4 (4.3)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	225	(7.2)
30-34歳	251 (8.3)	16 (17.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	267	(8.5)
35-39歳	358 (11.9)	12 (12.8)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	370	(11.8)
40-44歳	350 (11.6)	14 (14.9)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	364	(11.6)
45-49歳	312 (10.3)	13 (13.8)	0 (.0)	0 (.0)	3 (21.4)	328	(10.5)
50-54歳	324 (10.7)	16 (17.0)	0 (.0)	1 (100.0)	4 (28.6)	345	(11.0)
55-59歳	357 (11.8)	8 (8.5)	0 (.0)	0 (.0)	3 (21.4)	368	(11.8)
60-64歳	466 (15.4)	5 (5.3)	0 (.0)	0 (.0)	3 (21.4)	474	(15.2)
合計	3018 (100.0)	94 (100.0)	0 (.0)	1 (100.0)	14 (100.0)	3127	(100.0)

表51「シンナー遊び」生涯被誘惑経験（年齢群別）（%）

	「シンナー遊び」に誘われた経験					合計	
	ない	1年より前	1年より前	この1年間	無回答	度数	行 %
にのみあった も、この1年間 のみあった							
15-19歳	208 (98.1)	3 (1.4)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.5)	212 (100.0)	
20-24歳	171 (98.3)	3 (1.7)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	174 (100.0)	
25-29歳	221 (98.2)	4 (1.8)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	225 (100.0)	
30-34歳	251 (94.0)	16 (6.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	267 (100.0)	
35-39歳	358 (96.8)	12 (3.2)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	370 (100.0)	
40-44歳	350 (96.2)	14 (3.8)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	364 (100.0)	
45-49歳	312 (95.1)	13 (4.0)	0 (.0)	0 (.0)	3 (.9)	328 (100.0)	
50-54歳	324 (93.9)	16 (4.6)	0 (.0)	1 (.3)	4 (1.2)	345 (100.0)	
55-59歳	357 (97.0)	8 (2.2)	0 (.0)	0 (.0)	3 (.8)	368 (100.0)	
60-64歳	466 (98.3)	5 (1.1)	0 (.0)	0 (.0)	3 (.6)	474 (100.0)	
合計	3018 (96.5)	94 (3.0)	0 (.0)	1 (.0)	14 (.4)	3127 (100.0)	