

図1-6. 処方されている抗精神病薬(かかりつけ医/専門医別)

(%)




図1-7. 処方されている抗不安薬(かかりつけ医/専門医別)




図1-8. 処方されている睡眠薬(かかりつけ医/専門医別)




図1-9. 処方されている抗うつ薬(かかりつけ医/専門医別)

(%)




図1-10. 向精神薬が処方されているBPSD




図1-11. 同意の取得(かかりつけ医/専門医別)




図1-12. 年齢(診療科別)




図1-13. 臨床経験年数(診療科別)




図1-14. 認知症対応力向上研修・サポート医養成研修受講歴がある医師(診療科別)
認知症診療を行っている医師に対する割合(%)




図1-15. 処方される抗精神病薬(診療科別)




図1-16. 処方される抗不安薬




図1-17. 処方される睡眠薬(診療科別)




図1-18. 処方される抗うつ薬(診療科別)




図1-19. 向精神薬が処方されるBPSD(診療科別)




図1-20. かかりつけ医で向精神薬が処方されるBPSD(診療科別)




図1-21. 専門医で向精神薬が処方されるBPSD(診療科別)




図1-22. 同意の取得(診療科別)




図1-23. かかりつけ医の同意の取得




図1-24. 専門医の同意の取得




図1-25. かかりつけ医の認知症対応力向上研修・サポート医養成研修受講歴がある医師
(認知症診療を行っている医師に対する割合(%))