

生存率報告に参加した 10 登録は、宮城（分担研究者：西野善一）、山形、新潟、福井（同：服部昌和）、栃木（同：大木いづみ）、群馬、滋賀、大阪（同：井岡亜希子）、長崎（同：早田みどり）、熊本である。

（2）データ収集方法

MCIJ2008の枠組みの中で、2013年8月に地域がん登録実施46県を対象に、提出期間を2013年9月3日から9月28日までと設定し、国立がん研究センターがん対策情報センターで運営しているファイル共有サイトにアップロードする形式でデータの提出を依頼した。地域がん登録実施38県中、宮城、長野を除く36県よりデータを収集した。北海道は2009年データ提出、大阪は2007年データを参考値として収集した。このうち10県が2003-2005年症例の生存確認調査を実施しており、本集計に参加を表明した。

宮城および大阪は、MCIJ2008には不参加であったが、生存率集計の目的において、それぞれ、1993-2007年（宮城）、2003-2005年（大阪）の罹患患者の情報を研究班に提供した。

住民票照会による最終生存確認年月を含む14項目を第3期モニタリング項目とし、2003-2005年診断患者の5年後予後情報を含む1993-2008年罹患データの提供をMCIJ参加地域に依頼し、提供を受けた。標準DBS導入地域においては、目標モニタリング項目の提出を依頼し、集計対象の選択基準に利用した。

2003-2005年の全部位、男女合計について、①「罹患者中死亡情報のみで登録された患者」（DCO）の割合<25%、あるいは、「死亡情報で初めて把握された患者」（DCN）割合<30%、かつ、②「罹患数

と人口動態統計によるがん死亡数との比」（IM 比） ≥ 1.5 の両条件を満たす地域のうち、全国生存率集計の基準として、住民票照会実施で診断から5年後の予後不明割合が5%未満（山形、福井、大阪、長崎）あるいは全死亡情報との照合を実施している（宮城、新潟、滋賀）、計7地域（宮城、山形、新潟、福井、滋賀、大阪、長崎）の資料を集計対象とした。

（3）集計対象

- 1) 罹患数・率の集計対象の内、次のアからエを除くものを生存率の集計対象（解析対象1）とした。
 - (ア) 死亡情報のみで登録された患者（Death Certificate, Only DCO）。具体的には、第3期モニタリング項目におけるdco_j=1となるもの及びextent=8となるもの。（目標モニタリング項目において、集計対象となる場合には、提出データを修正し、extent=9として集計に加えている。）
 - (イ) 悪性以外、大腸の粘膜がんを含む上皮内がん。具体的には、第3期モニタリング項目におけるicdomの5桁目が2となるものに加え、extentにおいて1となるもの。
 - (ウ) 多重がんのあるケースでは第2がん以降。具体的には、第3期モニタリング項目におけるseq_no=1以外となるもの。（目標モニタリング項目において、集計対象となる場合には提出データを修正し、seq_no=2として集計に加えている。）
 - (エ) 年齢不詳および100歳以上の症例
- 2) 更に、解析対象1から「がん死亡情報からの遡り調査による登録」を除外し

て解析対象2とした。具体的には、第3期モニタリング項目においてdcn=1かつdco_j=2となるもの（（1）（ア）においてDCO症例は既削除）。

（4）生存率算出方法

- 1) 診断日を起点とした実測生存率を、Kaplan-Meier 法を用いて計算した。最終生存確認年月には、生存確認調査を実施している住民票照会を実施している地域については、住民票照会の結果に基づく日付を利用し、住民票照会以外で生存確認調査を実施している地域では、各登録より全死亡との照合対象年月として報告された日付を一律代入して利用した。よって、住民票照会を実施しない場合には、死亡情報がなかった症例は、全員 5 年生存とみなされる。
- 2) 対象がんによる生命損失の大きさをみるために、実測生存率を、対象とするがん患者と同じ性、年齢、出生年の一般集団の生存確率から計算した期待生存率で除した相対生存率を計測した。
- 3) 期待生存率は、0.5 歳分加算した cohort 生存率表に基づき、Ederer II 法を用いて計算した。期待生存確率は、国立がん研究センター がん対策情報センター がん情報・統計部が、簡易生命表を用いて毎年計算している cohort 生存率表を用いた（<http://ganjoho.jp/professional/statistics/cohort01.html>）。

C. D. 研究結果および考察

（1）提出データ

表1に、7県の罹患数、登録精度、生存

率集計対象者数を示した。罹患数の総計は282,346件であった。そのうち、死亡情報のみの登録（DCO）30,891件、第2がん以降26,914件、悪性腫瘍以外9,041件、上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）10,990件、年齢不詳および100歳以上を除外して、解析対象1とした。これらの除外基準は、症例によっては重複して当てはまるものがある。

更に、解析対象1から「がん死亡情報からの遡り調査による登録」22,767件を除外して解析対象2とした。この結果、解析対象1は213,171件（2003-05年累積罹患数の75.5%）。解析対象2は190,404件（同67.4%）であった。

（2）生存確認調査の方法と精度

表2に、解析対象2について、診断から5年後の予後状況を診断年別に示した。5年後の予後不詳割合は2.1%であった。7 県合計の生存割合は51.3%となった。

住民票照会無しの3県（宮城、新潟、滋賀）では、住民票照会の4県（山形、福井、大阪、長崎）に比べて死亡割合が若干低く、死亡の把握漏れによって「生存」に含まれる死亡者の存在が示唆された。

（3）部位別生存率

表3および表4に、解析対象1および2について、部位別の対象者数、5年相対生存率、および標準誤差を、性別、診断年別に示した。

全部位男女計の2003-05年診断の5年相対生存率は、解析対象1では52.7%、解析対象2では、58.6%となり、集計対象によって大きな差異のあることが明らかとなった。

解析対象 2 を観察すると、全部位において男性が 55.4%、女性が 62.9% であり、女性の 5 年生存率の方が 7.5 ポイント高い。部位別の観察では、男性では前立腺 93.8% から肺臓 7.1% に分布した。女性では、甲状腺 93.7% から肺臓 6.9% の分布となった。

図 1 に、解析対象 2 について、2003-05 年の部位別 5 年相対生存率が高い順に示した。男性では 5 年相対生存率が比較的高い群（70-100%）には、前立腺、皮膚、甲状腺、膀胱、喉頭、結腸が分類された。中程度の群（40-69%）には、直腸、腎・尿路（膀胱除く）、胃、悪性リンパ腫、口腔・咽頭が含まれた。生存率が低い群（0-39%）に属する部位は、白血病、多発性骨髄腫、食道、脳・中枢神経系、肝および肝内胆管、肺、胆のう・胆管、肺臓であった。女性では 5 年相対生存率が比較的高い群（70-100%）には、甲状腺、皮膚、乳房、子宮体部、喉頭、子宮頸部が分類された。中程度の群（40-69%）には、結腸、直腸、膀胱、腎・尿路（膀胱除く）、悪性リンパ腫、胃、口腔・咽頭、卵巣、食道、肺、白血病が含まれた。生存率が低い群（0-39%）に属する部位は、脳・中枢神経系、多発性骨髄腫、肝および肝内胆管、胆のう・胆管、肺臓であった。

（4）臨床進行度別生存率

表 5 および表 6 に、解析対象 1 および 2 について、診断時の臨床進行度分布を示した。悪性リンパ腫を除く血液のがんについては、臨床進行度分類が意味を持たず、また県によってコーディング方法がまちまちであることから、今回の集計においては、臨床進行度別生存率を表示していない。

解析対象 2 を観察すると、全部位にお

いて限局が 42.6%、領域（所属リンパ節転移、隣接臓器浸潤）が 25.9%、遠隔が 16.9% であり、臨床進行度不明が 14.7% であった。図 2 に、解析対象 2 について、限局の割合が多い順に示した。

臨床進行度不明が多い部位を除き、限局割合が比較的高い群には、皮膚、膀胱、喉頭、子宮体部、乳房などが分類され、逆に診断時に既に進行している部位としては、口腔・咽頭、甲状腺、卵巣、食道、胆のう・胆管、肺、肺臓などが挙げられた。

表 7 および表 8 に、解析対象 1 および 2 について、臨床進行度別 5 年相対生存率と標準誤差を示した。

解析対象 2 を観察すると、全部位において限局の 5 年相対生存率は 88.9%、領域（所属リンパ節転移、隣接臓器浸潤）が 49.4%、遠隔が 11.8% であった。

図 3 に、解析対象 2 について、臨床進行度別の 5 年相対生存率を示した。一様に臨床進行度が高くなるにつれ、生存率が低下している様子が観察された。

（5）年齢階級別生存率

表 9 および表 10 に、解析対象 1 および 2 について、性別年齢階級別（15 歳以上）5 年相対生存率と標準誤差を示した。

全部位においては、年齢階級を追うごとに生存率は低くなり、年齢階級による生存率の差は、男性で 20.4 ポイント、女性で 34.5 ポイントと、女性の方が大きかった。

主要部位でみると、年齢階級による生存率の差は男性では結腸で小さく（6.2 ポイント）、前立腺で大きく（20.7 ポイ

ント)、女性では乳房で小さく(2.2 ポイント)、子宮頸部で大きかった(38.3 ポイント)。

図 4 に、解析対象 2 の男性について、図 5 に、解析対象 2 の女性について、年齢階級別の 5 年相対生存率を示した。先に述べたとおり概ね、加齢とともに生存率が低くなる傾向が観察されたが、男性では食道及び喉頭(若年者、高齢者において生存率が低い)、皮膚(一様)、前立腺(若年者のみ低い)、女性では食道(若年者、高齢者において生存率が低い)、胃及び結腸(高齢者のみ低い)、肺(高齢者において生存率が低い)、皮膚及び乳房(一様)のように、年齢と生存率との相関がはつきりと見られない部位も存在した。

(6) OECD インディケータ

表 11 に、OECD の 2010-2011 年保健医療インディケータとして求められている、大腸、女性乳房、子宮頸部の年齢調整実測・相対生存率およびそれぞれの 95% 信頼区間を示した。OECD 加盟他国との比較のために年齢調整をしたが、調整前の数値と大幅な変化はない。実測生存率と相対生存率の差は大きく、男性の大腸では、10.2 ポイントの差があった。

表 12 に、同 3 部位の年齢階級別実測・相対生存率および標準誤差を示した。実測生存率と相対生存率の差は、どの部位においても年齢が高くなるに従って大きくなっていた。

(7) 地域別集計表

表 13-表 26 に解析対象 1 および 2 について、各地域別の、部位別対象者数、5 年相対生存率、および標準誤差を、性別、診断年別にまとめた。地域に特徴的な傾向が

観察され、地域間の差も見られるが、考察にあるように、地域別集計表は、府県間の数値を詳細に比較するためのものではない。

(8) 考察

全国集計値利用地域の 7 地域の DCO 割合は、欧米諸国に迫り、10.9% であった。がん死亡からの遡り調査による登録を集計対象に含めるか否かによる生存率の違いは、男女計全部位で 5.9 ポイント(52.7% と 58.6%) に及んだ。我が国では遡り調査を実施していない地域も多く、生存率の比較を容易するために、遡り調査登録を含まない解析対象 2 を我が国の標準方式と定めた。しかし、国際ルールでは、遡り調査登録を含む登録対象 1 が標準である。信頼性の高いがん患者の生存率を整備し、国内外で比較するためには、継続した精度向上の努力と、生存確認調査実施地域の拡大が必要である。生存確認調査方法についても課題が残り、集計対象基準に、住民票照会か全死亡情報との照合としたものの、両グループの差は顕著であった。死亡割合を見ると、住民票照会ありの 4 県(解析対象 2、42.6-50.5%) に比べて、住民票照会無しの 3 県(解析対象 2、43.1-48.4%) が若干低く、全死亡情報との照合においても、照合漏れのために生存扱いとなる可能性が示唆された。

臨床進行度別の集計結果では、主要部位においても、部位によっては不明の割合が 20% を超えるようなものもある(肝および肝および肝内胆管、前立腺)。また、我が国の標準方式においては、悪性リンパ腫以外の血液疾患は、臨床進行度

のコード対象外とし、登録作業においても空欄とすることを推奨しているが、米国のSEERのルールでは、白血病の臨床進行度を「遠隔転移」にする、としており、このルールと同様に遠隔転移とコードしている地域も存在する。

こうした部位と他部位との比較は控えることが望ましく、あくまで不明割合が少ない部位において、診断時の進行度の印象を捉える程度にとどまっている。また、「全

部位」の数値に、標準化途上の部位の臨床進行度分布が多少なりとも影響を与えていることは否めない。

これらの背景から、本報告書に掲載されている5年相対生存率の精度には限界があり、県間の比較、部位間の比較等を厳密に実施するには、生存確認調査の方法の統一を含めて更に標準化と精度向上の推進が必要となる。

表 1 罹患者数、登録精度、生存率集計対象者数 -2003-05 年-

登録	罹患者数	集計参加登録:宮城県,山形県,新潟県,福井県,滋賀県,大阪府,長崎県													
		DCO		第2がん		悪性以外		上皮内がん		解析対象1		遡り調査患者		解析対象2	
		N	% ^{*1}	N	% ^{*1}	N	% ^{*1}	N	% ^{*1}	N	% ^{*1}	N	% ^{*2}	N	% ^{*1}
宮城県	41,484	2,917	7.0	5,949	14.3	3,072	7.4	3,072	7.4	30,313	73.1	1,283	4.2	29,030	70.0
山形県	23,200	2,190	9.4	2,342	10.1	934	4.0	934	4.0	18,160	78.3	2,939	16.2	15,221	65.6
新潟県	42,523	6,965	16.4	3,066	7.2	648	1.5	648	1.5	31,865	74.9	0	0.0	31,865	74.9
福井県	13,559	451	3.3	1,255	9.3	511	3.8	511	3.8	11,457	84.5	1,582	13.8	9,875	72.8
滋賀県	18,101	2,436	13.5	1,040	5.7	993	5.5	993	5.5	13,771	76.1	1,758	12.8	12,013	66.4
大阪府	115,219	13,613	11.8	9,394	8.2	1,059	0.9	3,008	2.6	86,771	75.3	15,205	17.5	71,566	62.1
長崎県	28,260	2,319	8.2	3,868	13.7	1,824	6.5	1,824	6.5	20,834	73.7	0	0.0	20,834	73.7
7登録計	282,346	30,891	10.9	26,914	9.5	9,041	3.2	10,990	3.9	213,171	75.5	22,767	10.7	190,404	67.4

DCO：死亡情報のみで登録された患者

第2がん：対象部位が第2がん以降（先行がんあり）

解析対象1：DCO、第2がん以降、悪性以外、上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）、年齢不詳および100歳以上を除外

遡り調査患者：がん死亡からの確認調査で登録された患者

解析対象2：解析対象1から遡り調査患者を除外

*1 全数に占める割合 *2 解析対象1に占める割合

表 2 診断から 5 年後の予後状況 －2003-05 年、解析対象 2－

登録	対象者	集計参加登録:宮城県,山形県,新潟県,福井県,滋賀県,大阪府,長崎県						
		死亡		生存		不詳		不詳を除く 生存割合%
		N	% ^{*1}		N	% ^{*1}		
山形県	15,221	6,490	42.6	8,586	56.4	145	1.0	57.0
福井県	9,875	4,592	46.5	5,076	51.4	207	2.1	52.5
大阪府	71,566	35,607	49.8	32,550	45.5	3,409	4.8	47.8
長崎県*2	20,834	10,526	50.5	10,131	48.6	177	0.8	49.0
宮城県	29,030	12,512	43.1	16,518	56.9	—	—	—
新潟県	31,865	15,432	48.4	16,433	51.6	—	—	—
滋賀県	12,013	5,670	47.2	6,343	52.8	—	—	—
7登録計	190,404	90,829	47.7	95,637	50.2	3,938	2.1	51.3

解析対象 2 : 解析対象 1 から遡り調査患者を除外

*1 : 対象者に占める割合

*2 : 2003年は領域および遠隔転移の症例のみ、2004年、2005年は全症例に住民票照会実施

表 3 対象者数、5年相対生存率、標準誤差 －2003-05年、解析対象1－

部位	集計参加登録:宮城県,山形県,新潟県,福井県,滋賀県,大阪府,長崎県								
	男			女			男女計		
	対象者	相対生存率%	SE	対象者	相対生存率%	SE	対象者	相対生存率%	SE
全部位	122,935	49.5	0.2	90,236	56.9	0.2	213,171	52.7	0.1
口腔・咽頭	2,589	47.1	1.1	1,144	56.2	1.7	3,733	49.9	0.9
食道	5,234	29.1	0.7	973	36.9	1.7	6,207	30.4	0.6
胃	27,039	58.6	0.4	13,084	55.9	0.5	40,123	57.7	0.3
大腸（結腸・直腸）	19,228	65.0	0.4	15,217	62.1	0.5	34,445	63.7	0.3
結腸	11,679	66.6	0.6	10,781	61.8	0.5	22,460	64.3	0.4
直腸	7,549	62.6	0.7	4,436	62.9	0.8	11,985	62.7	0.5
肝および肝内胆管	9,071	23.9	0.5	4,456	21.8	0.7	13,527	23.2	0.4
胆のう・胆管	2,855	18.2	0.8	3,273	15.5	0.7	6,128	16.8	0.5
脾臓	4,143	5.5	0.4	3,562	5.3	0.4	7,705	5.4	0.3
喉頭	1,328	73.8	1.6	86	71.3	5.7	1,414	73.6	1.5
肺	19,716	21.2	0.3	7,755	35.2	0.6	27,471	25.2	0.3
皮膚 *1	1,361	86.6	1.6	1,434	91.4	1.5	2,795	89.1	1.1
乳房 *2				17,552	87.4	0.3	17,552	87.4	0.3
子宮				5,879	71.4	0.6	5,879	71.4	0.6
子宮頸部				3,047	69.5	0.9	3,047	69.5	0.9
子宮体部				2,542	76.3	0.9	2,542	76.3	0.9
卵巣				2,738	49.7	1.0	2,738	49.7	1.0
前立腺	12,648	91.2	0.5				12,648	91.2	0.5
膀胱	3,775	71.1	1.0	1,243	58.6	1.7	5,018	68.0	0.9
腎・尿路（膀胱除く）	3,057	60.6	1.0	1,497	57.3	1.4	4,554	59.5	0.9
脳・中枢神経系	768	26.5	1.7	658	26.6	1.8	1,426	26.5	1.2
甲状腺	692	83.6	1.8	2,332	91.5	0.7	3,024	89.7	0.7
悪性リンパ腫	2,845	49.1	1.1	2,411	57.3	1.1	5,256	52.9	0.8
多発性骨髓腫	747	28.9	1.9	677	26.7	1.9	1,424	27.8	1.3
白血病	1,848	30.4	1.1	1,376	34.2	1.3	3,224	32.0	0.9

解析対象1：DCO、第2がん以降、悪性以外、上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）、年齢不詳および100歳以上を除外

*1 悪性黒色腫を含む *2 女性のみ

表 4 対象者数、5年相対生存率、標準誤差 －2003-05年、解析対象2－

集計参加登録:宮城県、山形県、新潟県、福井県、滋賀県、大阪府、長崎県

部位	男			女			男女計		
	対象者	相対生存率%	SE	対象者	相対生存率%	SE	対象者	相対生存率%	SE
全部位	109,146	55.4	0.2	81,258	62.9	0.2	190,404	58.6	0.1
口腔・咽頭	2,351	51.7	1.2	1,061	60.2	1.7	3,412	54.3	1.0
食道	4,694	32.3	0.8	861	41.3	1.8	5,555	33.7	0.7
胃	24,586	64.2	0.4	11,825	61.5	0.5	36,411	63.3	0.3
大腸（結腸・直腸）	17,704	70.3	0.4	13,854	67.9	0.5	31,558	69.2	0.3
結腸	10,721	72.2	0.6	9,763	67.9	0.6	20,484	70.1	0.4
直腸	6,983	67.3	0.7	4,091	67.8	0.9	11,074	67.5	0.5
肝および肝内胆管	7,416	28.7	0.6	3,619	26.2	0.8	11,035	27.9	0.5
胆のう・胆管	2,268	22.5	1.0	2,548	19.9	0.9	4,816	21.1	0.7
膵臓	3,205	7.1	0.5	2,684	6.9	0.5	5,889	7.0	0.4
喉頭	1,286	76.0	1.6	82	74.6	5.7	1,368	75.9	1.5
肺	16,561	25.0	0.4	6,616	41.0	0.7	23,177	29.7	0.3
皮膚 *1	1,327	88.8	1.6	1,405	93.0	1.5	2,732	90.9	1.1
乳房 *2				17,162	89.1	0.3	17,162	89.1	0.3
子宮				5,576	75.0	0.6	5,576	75.0	0.6
子宮頸部				2,928	72.2	0.9	2,928	72.2	0.9
子宮体部				2,428	79.8	0.9	2,428	79.8	0.9
卵巣				2,447	55.0	1.1	2,447	55.0	1.1
前立腺	12,204	93.8	0.5				12,204	93.8	0.5
膀胱	3,480	76.5	1.0	1,118	64.4	1.8	4,598	73.5	0.9
腎・尿路（膀胱除く）	2,759	66.9	1.1	1,348	63.3	1.5	4,107	65.7	0.9
脳・中枢神経系	595	32.0	2.0	502	33.4	2.2	1,097	32.6	1.5
甲状腺	663	87.0	1.7	2,267	93.7	0.7	2,930	92.2	0.7
悪性リンパ腫	2,525	54.9	1.1	2,178	63.1	1.2	4,703	58.7	0.8
多発性骨髓腫	603	34.0	2.2	553	31.2	2.2	1,156	32.6	1.5
白血病	1,555	35.4	1.3	1,170	39.8	1.5	2,725	37.3	1.0

解析対象2：解析対象1から遡り調査患者を除外

*1 悪性黒色腫を含む *2 女性のみ

表 5 進行度別分布 －2003-05年、解析対象1－

部位	限局		領域(*3)		遠隔		進行度不明 %
	N	分布	N	分布	N	分布	
全部位	82,767	38.8	52,995	24.9	38,804	18.2	18.1
口腔・咽頭	1,211	32.4	1,791	48.0	178	4.8	14.8
食道	1,581	25.5	2,608	42.0	1,032	16.6	15.9
胃	18,640	46.5	9,676	24.1	7,055	17.6	11.8
大腸（結腸・直腸）	14,668	42.6	9,622	27.9	6,107	17.7	11.8
結腸	9,697	43.2	6,025	26.8	4,160	18.5	11.5
直腸	4,971	41.5	3,597	30.0	1,947	16.2	12.3
肝および肝内胆管	6,398	47.3	1,878	13.9	1,262	9.3	29.5
胆のう・胆管	1,041	17.0	2,258	36.8	1,388	22.7	23.5
脾臓	544	7.1	2,422	31.4	3,260	42.3	19.2
喉頭	909	64.3	313	22.1	21	1.5	12.1
肺	6,172	22.5	7,722	28.1	9,043	32.9	16.5
皮膚 *1	2,025	72.5	228	8.2	70	2.5	16.9
乳房 *2	9,827	55.6	5,363	30.4	905	5.1	8.9
子宮	3,116	53.0	1,568	26.7	470	8.0	12.3
子宮頸部	1,460	47.9	1,007	33.0	199	6.5	12.5
子宮体部	1,567	61.6	520	20.5	229	9.0	8.9
卵巣	753	27.5	1,022	37.3	516	18.8	16.3
前立腺	6,241	49.3	1,705	13.5	1,676	13.3	23.9
膀胱	3,283	65.4	592	11.8	258	5.1	17.6
腎・尿路（膀胱除く）	2,347	51.5	794	17.4	821	18.0	13.0
脳・中枢神経系	501	35.1	48	3.4	14	1.0	60.5
甲状腺	1,068	35.3	1,529	50.6	159	5.3	8.9
悪性リンパ腫	762	14.5	568	10.8	1,384	26.3	48.4
多発性骨髓腫	-	-	-	-	-	-	-
白血病	-	-	-	-	-	-	-

解析対象1：DCO、第2がん以降、悪性以外、上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）、年齢不詳および100歳以上を除外

*1 悪性黒色腫を含む *2 女性のみ

*3 領域（所属リンパ節転移、隣接臓器浸潤）

表 6 進行度別分布 －2003-05年、解析対象2－

部位	限局		領域(*3)		遠隔		進行度不明 %
	N	分布	N	分布	N	分布	
全部位	81,127	42.6	49,256	25.9	32,096	16.9	14.7
口腔・咽頭	1,182	34.6	1,666	48.8	133	3.9	12.6
食道	1,529	27.5	2,427	43.7	898	16.2	12.6
胃	18,418	50.6	9,054	24.9	5,905	16.2	8.3
大腸（結腸・直腸）	14,522	46.0	9,274	29.4	5,291	16.8	7.8
結腸	9,599	46.9	5,797	28.3	3,584	17.5	7.3
直腸	4,923	44.5	3,477	31.4	1,707	15.4	8.7
肝および肝内胆管	5,837	52.9	1,510	13.7	941	8.5	24.9
胆のう・胆管	960	19.9	1,914	39.7	1,040	21.6	18.7
脾臓	484	8.2	2,059	35.0	2,493	42.3	14.5
喉頭	907	66.3	302	22.1	20	1.5	10.2
肺	5,965	25.7	6,904	29.8	7,318	31.6	12.9
皮膚 *1	2,018	73.9	222	8.1	62	2.3	15.7
乳房 *2	9,813	56.8	5,313	30.8	831	4.8	7.6
子宮	3,096	55.5	1,502	26.9	398	7.1	10.4
子宮頸部	1,449	49.5	970	33.1	177	6.0	11.3
子宮体部	1,561	64.3	496	20.4	198	8.2	7.1
卵巣	742	30.3	948	38.7	446	18.2	12.7
前立腺	6,204	50.8	1,667	13.7	1,520	12.5	23.0
膀胱	3,231	70.3	519	11.3	198	4.3	14.1
腎・尿路（膀胱除く）	2,325	56.6	729	17.8	652	15.9	9.8
脳・中枢神経系	451	41.1	43	3.9	10	0.9	54.1
甲状腺	1,064	36.3	1,510	51.5	141	4.8	7.3
悪性リンパ腫	736	15.6	521	11.1	1,227	26.1	47.2
多発性骨髓腫	-	-	-	-	-	-	-
白血病	-	-	-	-	-	-	-

解析対象2：解析対象1から遡り調査患者を除外

*1 悪性黒色腫を含む *2 女性のみ

*3 領域（所属リンパ節転移、隣接臓器浸潤）

表 7 進行度別 5 年相対生存率、標準誤差 －2003-05 年、解析対象 1－

集計参加登録:宮城県、山形県、新潟県、福井県、滋賀県、大阪府、長崎県

部位	限局		領域(*3)		遠隔	
	%	SE	%	SE	%	SE
全部位	87.3	0.2	46.1	0.3	9.9	0.2
口腔・咽頭	77.0	1.5	41.5	1.3	9.0	2.3
食道	67.1	1.4	24.2	0.9	3.9	0.6
胃	95.0	0.3	42.0	0.6	4.3	0.3
大腸（結腸・直腸）	95.8	0.4	63.4	0.6	10.4	0.4
結腸	96.5	0.5	65.2	0.8	10.4	0.5
直腸	94.2	0.6	60.4	1.0	10.5	0.7
肝および肝内胆管	37.4	0.7	10.7	0.8	1.5	0.4
胆のう・胆管	54.3	1.9	16.1	0.9	1.4	0.3
膵臓	33.5	2.2	6.7	0.5	0.9	0.2
喉頭	88.0	1.7	48.3	3.3	11.1	7.6
肺	74.8	0.7	20.8	0.5	3.0	0.2
皮膚 *1	97.5	1.2	58.5	4.0	10.9	4.2
乳房 *2	98.1	0.3	83.9	0.6	26.0	1.5
子宮	92.8	0.6	55.7	1.4	14.2	1.7
子宮頸部	92.2	0.8	53.2	1.7	7.4	1.9
子宮体部	93.7	0.8	61.6	2.3	22.4	2.9
卵巣	88.0	1.3	44.8	1.6	21.0	1.9
前立腺	100.0	0.5	93.8	1.2	42.0	1.5
膀胱	87.3	1.0	25.5	2.0	5.1	1.5
腎・尿路（膀胱除く）	90.6	0.9	42.6	2.0	9.4	1.1
脳・中枢神経系	31.5	2.2	17.7	5.7	22.0	11.3
甲状腺	98.8	0.7	92.3	0.9	41.6	4.3
悪性リンパ腫	76.8	1.9	61.5	2.4	44.9	1.5
多発性骨髓腫	—	—	—	—	—	—
白血病	—	—	—	—	—	—

解析対象 1 : DCO、第 2 がん以降、悪性以外、上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）、年齢不詳および 100 歳以上を除外

*1 悪性黒色腫を含む *2 女性のみ

*3 領域（所属リンパ節転移、隣接臓器浸潤）

表 8 進行度別 5 年相対生存率、標準誤差 －2003-05 年、解析対象 2－

集計参加登録:宮城県、山形県、新潟県、福井県、滋賀県、大阪府、長崎県

部位	限局		領域 (*3)		遠隔	
	%	SE	%	SE	%	SE
全部位	88.9	0.2	49.4	0.3	11.8	0.2
口腔・咽頭	78.8	1.5	44.6	1.4	11.1	2.9
食道	69.2	1.4	25.9	1.0	4.3	0.7
胃	96.0	0.3	44.8	0.6	5.1	0.3
大腸（結腸・直腸）	96.5	0.4	65.7	0.6	11.9	0.5
結腸	97.3	0.4	67.7	0.8	11.9	0.6
直腸	95.0	0.6	62.4	1.0	12.0	0.8
肝および肝内胆管	40.8	0.7	13.0	0.9	2.0	0.5
胆のう・胆管	58.7	1.9	18.8	1.0	1.9	0.5
膵臓	37.3	2.4	7.8	0.6	1.2	0.2
喉頭	88.2	1.7	49.7	3.4	11.6	7.9
肺	77.2	0.7	23.1	0.6	3.7	0.2
皮膚 *1	97.6	1.2	59.2	4.1	12.3	4.8
乳房 *2	98.2	0.3	84.5	0.6	28.2	1.7
子宮	93.4	0.6	58.2	1.4	16.8	1.9
子宮頸部	92.9	0.8	55.2	1.7	8.3	2.1
子宮体部	94.0	0.8	64.6	2.3	25.9	3.3
卵巣	89.0	1.3	47.9	1.7	23.5	2.1
前立腺	100.0	0.5	94.8	1.2	45.2	1.6
膀胱	88.4	1.0	28.5	2.3	6.6	1.9
腎・尿路（膀胱除く）	91.2	0.9	46.2	2.1	11.8	1.4
脳・中枢神経系	33.1	2.3	19.8	6.3	30.5	14.8
甲状腺	99.1	0.7	93.4	0.9	45.9	4.7
悪性リンパ腫	79.5	1.8	66.7	2.4	50.3	1.6
多発性骨髓腫	-	-	-	-	-	-
白血病	-	-	-	-	-	-

解析対象 2 : 解析対象 1 から遡り調査患者を除外

*1 悪性黒色腫を含む *2 女性のみ

*3 領域（所属リンパ節転移、隣接臓器浸潤）

表 9 性別年齢階級別 5 年相生存率

— 2003-05 年、解析対象 1 —

集計参加登録:官城県、山形県、新潟県、福井県、滋賀県、大阪府、長崎県

部位	男						女						男女計					
	15-44	45-54	55-64	65-74	75-	差	15-44	45-54	55-64	65-74	75-	差	15-44	45-54	55-64	65-74	75-	差
全部位	65.3	53.7	52.4	51.5	41.5	23.8	79.8	73.6	65.1	56.1	39.3	40.5	75.0	64.8	57.5	53.1	40.5	34.5
口腔・咽頭	65.8	54.5	49.9	43.0	38.7	27.1	81.8	68.2	66.9	59.5	35.8	46.0	72.6	58.3	53.5	47.3	37.3	35.3
食道	19.6	30.3	31.9	32.3	19.0	13.3	29.5	45.5	41.6	45.1	24.4	21.1	22.8	33.0	33.1	34.0	20.3	13.7
胃	68.5	65.6	63.8	60.5	48.4	20.1	62.7	62.9	63.7	62.6	45.7	18.0	65.8	64.7	63.8	61.1	47.3	18.5
大腸（結腸・直腸）	71.8	66.4	66.5	68.4	58.1	13.7	67.6	67.0	68.2	68.4	52.9	15.5	69.8	66.7	67.1	68.4	55.3	14.5
結腸	71.9	69.9	68.3	69.9	60.3	11.6	63.5	65.9	68.9	68.1	53.5	15.4	67.6	68.0	68.5	69.1	56.5	12.6
直腸	71.6	62.8	64.3	66.0	53.5	18.1	74.5	68.7	67.0	69.1	51.2	23.3	72.8	65.0	65.2	67.0	52.4	20.4
肝および肝内胆管	29.0	24.1	25.3	24.6	20.1	8.9	28.9	30.0	28.6	26.1	14.6	15.4	29.0	25.2	26.1	25.1	17.5	11.5
胆のう・胆管	39.1	25.2	25.4	19.2	12.7	26.4	33.5	23.4	22.4	21.0	11.1	22.4	36.6	24.4	24.1	20.1	11.8	24.8
脾臓	12.2	7.9	7.4	5.7	2.5	9.7	10.2	9.0	8.6	5.5	3.5	6.7	11.4	8.2	7.8	5.6	3.1	8.3
喉頭	60.2	82.5	77.7	74.9	64.7	22.3	80.1	80.2	84.1	72.1	54.4	29.7	67.0	82.4	78.0	74.8	63.9	18.5
肺	33.5	30.0	27.9	22.2	14.5	19.0	39.0	48.0	46.3	41.4	22.2	25.8	35.6	35.9	33.0	27.2	16.9	19.0
皮膚 *1	89.4	83.2	90.3	88.0	84.5	7.1	92.9	88.9	93.9	90.3	91.0	5.0	91.2	86.1	91.8	89.0	88.3	5.7
乳房 *2							88.9	88.0	86.3	88.1	85.4	3.5	88.9	88.0	86.3	88.1	85.4	3.5
子宮							85.1	77.3	72.9	64.1	45.5	39.6	85.1	77.3	72.9	64.1	45.5	39.6
子宮頸部							84.3	71.2	65.8	60.7	43.6	40.7	84.3	71.2	65.8	60.7	43.6	40.7
子宮体部							87.8	84.4	79.4	69.2	53.2	34.6	87.8	84.4	79.4	69.2	53.2	34.6
卵巣							73.2	58.3	50.2	38.9	22.8	50.4	73.2	58.3	50.2	38.9	22.8	50.4
前立腺	75.1	85.9	93.5	94.3	86.2	19.2							75.1	85.9	93.5	94.3	86.2	19.2
膀胱	85.4	85.4	79.7	75.4	58.8	26.6	87.1	68.7	77.0	70.2	46.3	40.8	85.8	82.4	79.2	74.4	54.8	31.0
腎・尿路（膀胱除く）	81.8	74.5	65.1	59.5	44.8	37.0	83.6	82.0	69.7	57.9	40.0	43.6	82.4	76.6	66.4	59.0	42.6	39.8
脳・中枢神経系	49.6	24.4	17.9	10.0	8.7	40.9	45.0	44.6	20.8	9.2	4.6	40.4	47.8	33.5	19.3	9.7	6.2	41.6
甲状腺	98.0	90.8	86.1	79.2	52.9	45.1	99.6	96.4	95.4	90.2	66.2	33.4	99.4	95.5	93.4	87.6	63.4	36.0
悪性リンパ腫	73.6	68.8	58.7	41.5	31.0	42.6	84.1	76.4	67.9	55.1	37.2	46.9	78.4	72.4	62.8	47.5	34.0	44.4
多発性骨髓腫	73.7	50.5	36.2	27.5	18.7	55.0	85.8	61.6	34.7	26.8	17.7	68.1	77.6	55.7	35.5	27.2	18.0	59.6
白血病	56.6	37.2	21.7	16.2	8.1	48.5	54.5	44.0	28.4	17.0	13.0	41.5	55.6	40.1	24.5	16.5	10.4	45.2

解析対象 1 : DCO、第 2 がん以降、悪性以外、上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）、年齢不詳および 100 歳以上を除外

差：年齢階級別生存率の最大と最小との差

*1 悪性黒色腫を含む *2 女性のみ

表 10 性別年齢階級別 5 年相生存率

—2003-05 年、解析対象 2 —

集計参加登録:宮城県、山形県、新潟県、福井県、滋賀県、大阪府、長崎県

部位	男						女						男女計					
	15-44	45-54	55-64	65-74	75-	差	15-44	45-54	55-64	65-74	75-	差	15-44	45-54	55-64	65-74	75-	差
全部位	69.3	57.4	57.3	57.0	48.9	20.4	81.7	76.2	69.2	61.1	47.2	34.5	77.7	68.0	62.1	58.5	48.2	29.5
口腔・咽頭	68.2	58.1	54.1	48.5	42.7	25.5	83.4	70.9	68.5	62.0	40.8	42.6	74.7	61.8	57.3	52.3	41.8	32.9
食道	21.4	32.2	35.1	35.6	22.1	14.2	31.3	49.0	44.0	49.9	28.8	21.1	24.6	35.1	36.2	37.5	23.7	13.8
胃	71.8	68.7	68.6	65.8	55.6	16.2	65.9	65.9	67.5	66.3	53.3	14.2	69.0	67.7	68.3	65.9	54.7	14.3
大腸（結腸・直腸）	74.7	70.0	70.4	73.1	66.1	8.6	69.5	69.5	72.5	72.6	61.0	11.6	72.3	69.8	71.2	72.9	63.4	9.5
結腸	74.9	73.9	72.2	74.7	68.7	6.2	65.9	68.2	73.4	72.6	61.8	11.6	70.3	71.2	72.7	73.8	64.9	8.9
直腸	74.6	65.9	68.2	70.4	60.5	14.1	75.4	71.5	70.8	72.5	58.7	16.7	74.9	68.0	69.0	71.1	59.7	15.2
肝および肝内胆管	36.4	27.9	30.1	29.3	24.9	11.5	32.0	33.7	32.9	29.9	18.6	15.1	35.3	29.0	30.7	29.5	21.9	13.4
胆のう・胆管	42.7	29.1	29.4	23.5	16.3	26.4	38.6	27.0	26.7	25.6	14.9	23.7	40.9	28.1	28.2	24.5	15.5	25.4
脾臓	13.7	9.3	9.2	7.2	3.4	10.3	10.9	10.4	10.2	7.0	4.8	6.1	12.5	9.6	9.5	7.1	4.2	8.3
喉頭	60.2	83.3	79.0	77.2	68.1	23.1	80.1	80.2	84.1	73.8	61.1	23.0	67.0	83.2	79.3	77.1	67.6	16.2
肺	36.5	32.5	31.1	25.8	18.1	18.4	41.3	51.1	50.4	46.2	28.5	22.6	38.4	38.7	36.6	31.3	21.3	17.4
皮膚 *1	91.9	85.9	92.5	90.0	86.6	6.6	94.2	89.8	94.6	91.6	93.0	4.8	93.2	87.9	93.4	90.7	90.4	5.5
乳房 *2							89.7	89.1	87.9	90.1	90.0	2.2	89.7	89.1	87.9	90.1	90.0	2.2
子宮							86.2	79.2	76.4	68.6	51.7	34.5	86.2	79.2	76.4	68.6	51.7	34.5
子宮頸部							85.5	72.9	69.3	64.2	47.2	38.3	85.5	72.9	69.3	64.2	47.2	38.3
子宮体部							88.5	86.1	82.0	72.9	61.6	26.9	88.5	86.1	82.0	72.9	61.6	26.9
卵巢							76.1	61.9	55.6	44.2	27.3	48.8	76.1	61.9	55.6	44.2	27.3	48.8
前立腺	75.1	88.8	94.7	95.8	90.8	20.7							75.1	88.8	94.7	95.8	90.8	20.7
膀胱	87.3	88.2	83.3	79.0	66.4	21.8	87.1	68.7	79.8	74.7	53.0	34.1	87.3	84.7	82.6	78.1	62.2	25.1
腎・尿路（膀胱除く）	83.6	76.3	70.1	65.3	54.5	29.1	88.5	83.7	74.0	63.2	46.9	41.6	85.0	78.4	71.1	64.6	51.0	34.0
脳・中枢神経系	57.3	24.5	21.6	12.3	6.3	51.0	51.1	52.3	25.0	11.9	2.8	49.5	54.8	37.2	23.3	12.1	4.2	50.6
甲状腺	99.3	91.6	88.8	81.0	62.5	36.8	99.6	97.1	96.0	92.2	75.0	24.6	99.7	96.2	94.4	89.5	72.7	27.0
悪性リンパ腫	78.0	72.6	63.2	46.3	37.6	40.4	86.2	79.2	72.5	60.1	43.9	42.3	81.8	75.7	67.4	52.5	40.8	41.0
多発性骨髓腫	73.7	54.3	44.8	31.9	20.6	53.1	100.0	63.4	39.8	30.7	20.4	79.6	81.3	58.7	42.5	31.3	20.4	60.9
白血病	61.7	41.6	25.0	19.1	9.2	52.5	59.9	50.6	33.4	20.0	15.6	44.3	60.9	45.4	28.4	19.4	12.4	48.5

解析対象 2 : 解析対象 1 から遡り調査患者を除外

差: 年齢階級別生存率の最大と最小との差

*1 悪性黒色腫を含む *2 女性のみ

表 11 OECD インディケータ(医療の質)年齢調整5年生存率 対象3部位 - 2003-05年、
解析対象 2 —

部位	集計参加登録:宮城県,山形県,新潟県,福井県,滋賀県,大阪府,長崎県									
	男			女			男女計			
			95%信頼区間				95%信頼区間		95%信頼区間	
	N	%	下限	上限	N	%	下限	上限	N	%
大腸 (結腸・直腸)										
実測生存率	17,704	60.0	59.3	60.7	13,854	62.7	61.8	63.5	31,558	61.1
相対生存率		70.2	69.3	71.1		68.6	67.7	69.5		69.3
乳房 *1					17,162	81.7	80.9	82.4		
実測生存率						89.4	88.5	90.3		
相対生存率						67.6	65.9	69.3		
子宮頸部					2,928		70.3	68.5	72.2	

解析対象 2 : 解析対象 1 から遡り調査患者を除外

*1 女性のみ

表 12 OECD インディケータ (医療の質) 年齢階級別 5 年生存率 対象 3 部位 - 2003-05

年、解析対象 2 —

部位	集計参加登録:宮城県,山形県,新潟県,福井県,滋賀県,大阪府,長崎県										男女計					
	男					女										
	15-44	45-54	55-64	65-74	75-	15-44	45-54	55-64	65-74	75-	15-44	45-54	55-64	65-74	75-	
大腸 (結腸・直腸)	実測生存率	74.1	68.3	66.7	63.9	43.9	69.2	68.7	70.9	68.4	46.3	71.8	68.4	68.3	65.7	45.2
	SE	2.0	1.2	0.7	0.6	0.7	2.2	1.3	0.9	0.7	0.7	1.5	0.9	0.6	0.5	0.5
乳房 *1	実測生存率	74.7	70.0	70.4	73.1	66.1	69.5	69.5	72.5	72.6	61.0	72.3	69.8	71.2	72.9	63.4
	SE	2.0	1.2	0.8	0.7	1.1	2.2	1.3	0.9	0.8	0.9	1.5	0.9	0.6	0.5	0.7
子宮頸部	実測生存率						89.3	88.2	86.0	85.2	70.2					
	SE						0.6	0.5	0.5	0.7	1.0					
	相対生存率						89.7	89.1	87.9	90.1	90.0					
	SE						0.6	0.5	0.5	0.7	1.3					

解析対象 2 : 解析対象 1 から遡り調査患者を除外

差 : 年齢階級別生存率の最大と最小との差

*1 女性のみ

表 13 対象者数、5年相対生存率、標準誤差 -2003-05年、解析対象1、宮城県-

部位	男			女			男女計			集計参加登録:宮城県		
	対象者	相対生存率		対象者	相対生存率		対象者	相対生存率		対象者	相対生存率	
		%	SE		%	SE		%	SE		%	SE
全部位	17,704	60.4	0.5	12,609	65.4	0.5	30,313	62.6	0.3			
口腔・咽頭	333	52.3	3.1	120	57.2	5.0	453	53.7	2.6			
食道	816	37.9	1.9	149	50.8	4.5	965	39.9	1.8			
胃	3,867	69.2	0.9	1,707	65.9	1.3	5,574	68.2	0.8			
大腸（結腸・直腸）	2,566	71.7	1.1	2,171	68.3	1.2	4,737	70.1	0.8			
結腸	1,516	75.1	1.5	1,513	67.4	1.4	3,029	71.2	1.0			
直腸	1,050	66.8	1.8	658	70.5	2.1	1,708	68.3	1.3			
肝および肝内胆管	892	26.0	1.6	435	25.3	2.2	1,327	25.8	1.3			
胆のう・胆管	427	26.5	2.5	431	20.8	2.1	858	23.6	1.6			
脾臓	525	8.5	1.3	439	7.5	1.3	964	8.0	0.9			
喉頭	184	71.9	4.2	11	65.7	15.5	195	71.8	4.1			
肺	2,398	25.8	1.0	915	40.5	1.8	3,313	30.0	0.9			
皮膚 *1	240	87.4	3.8	266	93.5	3.1	506	91.7	2.4			
乳房 *2				2,829	90.0	0.7	2,829	90.0	0.7			
子宮				693	74.0	1.8	693	74.0	1.8			
子宮頸部				346	74.5	2.5	346	74.5	2.5			
子宮体部				322	75.4	2.6	322	75.4	2.6			
卵巣				404	53.2	2.6	404	53.2	2.6			
前立腺	2,957	97.5	0.9				2,957	97.5	0.9			
膀胱	438	72.8	2.9	152	64.7	4.7	590	70.7	2.5			
腎・尿路（膀胱除く）	512	72.6	2.4	233	70.0	3.4	745	71.8	2.0			
脳・中枢神経系	94	35.6	5.1	67	38.0	6.0	161	36.7	3.9			
甲状腺	122	94.6	3.3	516	97.1	1.0	638	96.6	1.1			
悪性リンパ腫	419	61.1	2.8	405	70.2	2.6	824	65.6	1.9			
多発性骨髓腫	118	28.0	4.6	104	28.8	4.9	222	28.4	3.4			
白血病	239	36.8	3.3	181	41.0	3.8	420	38.8	2.5			

解析対象1 : DCO、第2がん以降、悪性以外、上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）、年齢不詳および100歳以上を除外

*1 悪性黒色腫を含む *2 女性のみ

表 14 対象者数、5年相対生存率、標準誤差 -2003-05年、解析対象2、宮城県-

部位	集計参加登録:宮城県、山形県、新潟県、福井県、滋賀県、大阪府、長崎県								
	男		女		男女計				
	対象者	相対生存率%	SE	対象者	相対生存率%	SE	対象者	相対生存率%	SE
全部位	109,146	55.4	0.2	81,258	62.9	0.2	190,404	58.6	0.1
口腔・咽頭	2,351	51.7	1.2	1,061	60.2	1.7	3,412	54.3	1.0
食道	4,694	32.3	0.8	861	41.3	1.8	5,555	33.7	0.7
胃	24,586	64.2	0.4	11,825	61.5	0.5	36,411	63.3	0.3
大腸（結腸・直腸）	17,704	70.3	0.4	13,854	67.9	0.5	31,558	69.2	0.3
結腸	10,721	72.2	0.6	9,763	67.9	0.6	20,484	70.1	0.4
直腸	6,983	67.3	0.7	4,091	67.8	0.9	11,074	67.5	0.5
肝および肝内胆管	7,416	28.7	0.6	3,619	26.2	0.8	11,035	27.9	0.5
胆のう・胆管	2,268	22.5	1.0	2,548	19.9	0.9	4,816	21.1	0.7
膵臓	3,205	7.1	0.5	2,684	6.9	0.5	5,889	7.0	0.4
喉頭	1,286	76.0	1.6	82	74.6	5.7	1,368	75.9	1.5
肺	16,561	25.0	0.4	6,616	41.0	0.7	23,177	29.7	0.3
皮膚 *1	1,327	88.8	1.6	1,405	93.0	1.5	2,732	90.9	1.1
乳房 *2				17,162	89.1	0.3	17,162	89.1	0.3
子宮				5,576	75.0	0.6	5,576	75.0	0.6
子宮頸部				2,928	72.2	0.9	2,928	72.2	0.9
子宮体部				2,428	79.8	0.9	2,428	79.8	0.9
卵巣				2,447	55.0	1.1	2,447	55.0	1.1
前立腺	12,204	93.8	0.5				12,204	93.8	0.5
膀胱	3,480	76.5	1.0	1,118	64.4	1.8	4,598	73.5	0.9
腎・尿路（膀胱除く）	2,759	66.9	1.1	1,348	63.3	1.5	4,107	65.7	0.9
脳・中枢神経系	595	32.0	2.0	502	33.4	2.2	1,097	32.6	1.5
甲状腺	663	87.0	1.7	2,267	93.7	0.7	2,930	92.2	0.7
悪性リンパ腫	2,525	54.9	1.1	2,178	63.1	1.2	4,703	58.7	0.8
多発性骨髓腫	603	34.0	2.2	553	31.2	2.2	1,156	32.6	1.5
白血病	1,555	35.4	1.3	1,170	39.8	1.5	2,725	37.3	1.0

解析対象2：解析対象1から遡り調査患者を除外

*1 悪性黒色腫を含む *2 女性のみ

表 15 対象者数、5年相対生存率、標準誤差 -2003-05年、解析対象1、山形県-

部位	男			女			男女計			集計参加登録:山形県		
	対象者	相対生存率		対象者	相対生存率		対象者	相対生存率		対象者	相対生存率	
		%	SE		%	SE		%	SE		%	SE
全部位	10,497	56.2	0.6	7,663	57.7	0.6	18,160	56.8	0.4			
口腔・咽頭	197	48.9	4.0	114	60.4	5.2	311	53.1	3.2			
食道	411	33.8	2.6	75	46.2	6.5	486	35.7	2.5			
胃	2,787	64.7	1.1	1,429	62.1	1.5	4,216	63.8	0.9			
大腸（結腸・直腸）	1,564	70.1	1.5	1,396	64.6	1.5	2,960	67.5	1.1			
結腸	952	70.4	2.0	1,040	63.3	1.8	1,992	66.7	1.3			
直腸	612	69.6	2.3	356	68.6	3.0	968	69.2	1.8			
肝および肝内胆管	411	21.8	2.3	261	15.8	2.4	672	19.4	1.7			
胆のう・胆管	268	20.1	2.9	377	18.1	2.2	645	19.0	1.8			
脾臓	317	4.6	1.3	321	3.6	1.1	638	4.1	0.9			
喉頭	98	82.7	5.5	2	0.0	0.0	100	81.1	5.6			
肺	1,483	20.9	1.2	582	36.9	2.2	2,065	25.5	1.1			
皮膚 *1	139	81.7	5.8	178	87.5	4.6	317	85.5	3.6			
乳房 *2				1,178	87.1	1.2	1,178	87.1	1.2			
子宮				447	75.9	2.2	447	75.9	2.2			
子宮頸部				211	72.2	3.3	211	72.2	3.3			
子宮体部				226	81.1	2.9	226	81.1	2.9			
卵巣				221	48.3	3.5	221	48.3	3.5			
前立腺	1,424	94.0	1.5				1,424	94.0	1.5			
膀胱	337	74.7	3.4	143	57.7	5.1	480	69.6	2.8			
腎・尿路（膀胱除く）	251	66.4	3.6	144	51.4	4.6	395	60.9	2.9			
脳・中枢神経系	64	31.5	6.1	58	23.9	5.9	122	28.0	4.3			
甲状腺	46	82.0	6.8	193	94.3	2.2	239	92.5	2.2			
悪性リンパ腫	212	49.2	4.0	175	54.0	4.1	387	51.4	2.9			
多発性骨髄腫	49	25.1	7.5	70	21.9	5.5	119	23.1	4.4			
白血病	128	29.1	4.3	74	16.9	4.5	202	24.6	3.2			

解析対象1 : DCO、第2がん以降、悪性以外、上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）、年齢不詳および100歳以上を除外

*1 悪性黒色腫を含む *2 女性のみ